

AOK Curaplan Diabetes mellitus Typ 2 der AOK Sachsen-Anhalt - Die Gesundheitskasse

Berichtstyp: Evaluationsbericht

Auswertungshalbjahre: 2003-1 bis 2012-1

Abgabedatum: 30. September 2013

Evaluatoren:

infas infas Institut für angewandte
Sozialwissenschaft GmbH
Friedrich-Wilhelm-Str. 18
53113 Bonn

prognos
Prognos AG
Schwanenmarkt 21
40231 Düsseldorf

WIAD Wissenschaftliches Institut der Ärzte
Deutschlands (WIAD) gem. e.V.
Uhierstr. 78
53175 Bonn

Zusammenfassung	7
0. Einleitung	9
Tabelle 0.1 Inhalte des Evaluationsberichtes	10
0.1 Fallbezogene Auswertung nach Halbjahres-Kohorten	13
Tabelle 0.1.1 Tabellenstandard	14
Tabelle 0.1.2 Plausible Wertebereiche	16
0.2. Beispiel für eine tabellarische Darstellung	17
Tabelle 0.2.1 Muster für eine tabellarische Darstellung am Beispiel der Patienten und ihrer HbA1c-Konzentration	18
0.3 Ausgewertete Teilgruppen: Subkohorten und Kollektive	19
Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte	20
Auswertungskapitel 1: Patientenzahlen und -merkmale	20
Tabelle 1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung	20
Tabelle 1.2 Patientenzahlen zur Stichprobenziehung	22
Tabelle 1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	23
Tabelle 1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	28
Tabelle 1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres	30
Tabelle 1.6 Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten	33
Tabelle 1.7 Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte	34
Tabelle 1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation	36
Auswertungskapitel 2: Leistungserbringer	38
Tabelle 2.1 Leistungserbringer*	39
Auswertungskapitel 3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung	40
3.1 Risikofaktoren	41
Tabelle 3.1.1 Patienten und ihr Body-Mass-Index	42
Tabelle 3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	52
Tabelle 3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten	55
Tabelle 3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation	58
Tabelle 3.1.5 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation	68
Tabelle 3.1.6 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation	71
3.2 Laborwerte	74
Tabelle 3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	75
Tabelle 3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	79
Tabelle 3.2.3 Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	86
3.3 Medikation	91
Tabelle 3.3.1 Patienten und ihre Medikation	92
3.4 Prozessparameter	111
Tabelle 3.4.1 Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	112
Tabelle 3.4.2 Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	118
Tabelle 3.4.3 Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung	124
3.5 Ereigniszeitanalysen bei Begleit- und Folgeerkrankungen, primären und sekundären Endpunkten	127
Tabelle 3.5.1 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation	128
Tabelle 3.5.2 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation	131
Tabelle 3.5.3 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	136
Tabelle 3.5.4 Ereigniszeitanalyse: Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation	143
Tabelle 3.5.5 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation	147
Tabelle 3.5.6 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation	150
Tabelle 3.5.7 Ereigniszeitanalyse: Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie	

	laut Erstdokumentation	153
Tabelle 3.5.8	Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation.	157
Tabelle 3.5.9	Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut Erstdokumentation	161
Tabelle 3.5.10	Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation	165
Berichtsteil II: Evaluation der ökonomischen Inhalte		168
Auswertungskapitel 4: Patientenzahlen der Stichprobe für die Leistungsausgaben		169
Tabelle 4.1	Patienten in der Stichprobe (Anzahl)	169
Auswertungskapitel 5: Leistungsausgaben		171
Tabelle 5.1	Patienten und zugehörige Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)	171
Tabelle 5.2	Patienten und zugehörige Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)	174
Tabelle 5.3	Patienten mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt im Halbjahr	177
Tabelle 5.4	Patienten und zugehörige Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)	179
Tabelle 5.5	Patienten und zugehörige Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)	182
Tabelle 5.6	Patienten und zugehörige Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)	185
Tabelle 5.7	Patienten und zugehörige Ausgaben für Dialyse-Sachkosten in Euro (Stichprobe)	188
Tabelle 5.8	Patienten und zugehörige Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)	191
Tabelle 5.9	Patienten und zugehörige Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)	194
Tabelle 5.10	Patienten und zugehörige Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)	197
Tabelle 5.11	Patienten und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)	201
Auswertungskapitel 6: Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung		204
Tabelle 6.1	Durchschnittliche Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung pro DMP-Teilnehmer und Jahr und Versichertenjahre	204
Berichtsteil III: Auswertungen zur Lebensqualität		205
Abb. III.1	Übersicht über die Bildung der Sub- bzw. Summenskalen und des SF-6D-Gesamtindex	206
Auswertungskapitel 7: Rücklaufstatistik		207
Tabelle 7.1	Patienten in der Stichprobe (Anzahl)	207
Auswertungskapitel 8: Auswertungen zur Lebensqualität		209
Tabelle 8.1	Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Jahr: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	209
Tabelle 8.2	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	212
Tabelle 8.3	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	216
Tabelle 8.4	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	220
Tabelle 8.5	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	224
Tabelle 8.6	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	228
Tabelle 8.7	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	232
Tabelle 8.8	SF-36-Skala Emotionale Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	236
Tabelle 8.9	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	240
Tabelle 8.10	Körperliche Summenskala	244
Tabelle 8.11	Psychische Summenskala	248
Tabelle 8.12	SF-6D-Gesamtindex: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	252
Anhang A: Auswertung für Patienten ohne Endpunkte		257
Auswertungskapitel A.1: Patientenzahlen und -merkmale		258
Tabelle A.1.1	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte ohne Endpunkte	258
Tabelle A.1.3	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte ohne Endpunkte	260
Tabelle A.1.4	Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte	265
Tabelle A.1.5	Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte	267
Tabelle A.1.8	Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte	270

Auswertungskapitel A.3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung	272
A.3.1 Risikofaktoren	273
Tabelle A.3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte	274
Tabelle A.3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte ohne Endpunkte	277
Tabelle A.3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte	280
Tabelle A.3.1.5 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte	291
Tabelle A.3.1.6 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte	294
A.3.2 Laborwerte	297
Tabelle A.3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte ohne Endpunkte	298
Tabelle A.3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte	302
Anhang B: Auswertung für Patienten mit primären Endpunkten	309
Auswertungskapitel B.1: Patientenzahlen und -merkmale	310
Tabelle B.1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte mit primären Endpunkten	310
Tabelle B.1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit primären Endpunkten	312
Tabelle B.1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten	317
Tabelle B.1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten	319
Tabelle B.1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten	322
Auswertungskapitel B.3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung	324
B.3.1 Risikofaktoren	325
Tabelle B.3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten	326
Tabelle B.3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte mit primären Endpunkten	329
Tabelle B.3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten	332
Tabelle B.3.1.5 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten	342
Tabelle B.3.1.6 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten	345
B.3.2 Laborwerte	348
Tabelle B.3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit primären Endpunkten	349
Tabelle B.3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten	353
Anhang C: Auswertung für Patienten nur mit sekundären Endpunkten	360
Auswertungskapitel C.1: Patientenzahlen und -merkmale	361
Tabelle C.1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	361
Tabelle C.1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	363
Tabelle C.1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	368
Tabelle C.1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	370
Tabelle C.1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	373
Auswertungskapitel C.3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung	375
C.3.1 Risikofaktoren	376
Tabelle C.3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	377
Tabelle C.3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	380
Tabelle C.3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	383
Tabelle C.3.1.5 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	402
Tabelle C.3.1.6 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	405
C.3.2 Laborwerte	408
Tabelle C.3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	409
Tabelle C.3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	413

Anhang D: Risikoadjustierter Berichtsteil	420
Tabelle D.1 Übersicht über die Zielwerte, Kollektivabgrenzung und die zugehörigen Gesamtmittelwerte	421
D.3 Krankheitsverlauf nach Einschreibung	422
D.3.1 Risikofaktoren	423
Tabelle D.3.1.1 Risikofaktoren: Body-Mass-Index 1 - Auswertungen einschließlich Beitrittshalbjahr	423
Tabelle D.3.1.2 Risikofaktoren: Body-Mass-Index 2 - Auswertungen einschließlich Beitrittshalbjahr	423
Tabelle D.3.1.3 Risikofaktoren: Rauchen 1 - Auswertungen einschließlich Beitrittshalbjahr	424
Tabelle D.3.1.4 Risikofaktoren: Rauchen 2 - Auswertungen einschließlich Beitrittshalbjahr	424
Tabelle D.3.1.5 Risikofaktoren: Hypertonie - Auswertungen einschließlich Beitrittshalbjahr	424
D.3.2 Laborwerte	425
Tabelle D.3.2.1 Laborwerte: HbA1c 1 - Auswertungen einschließlich Beitrittshalbjahr	425
Tabelle D.3.2.2 Laborwerte: HbA1c 2 - Auswertungen einschließlich Beitrittshalbjahr	425
Tabelle D.3.2.3 Laborwerte: Serum-Kreatinin - Auswertungen einschließlich Beitrittshalbjahr	425
D.3.4 Prozessparameter: Durchgeführte Schulungen und Untersuchungen	426
Tabelle D.3.4.1 Prozessparameter: Diabetesschulung 1 - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	426
Tabelle D.3.4.2 Prozessparameter: Diabetesschulung 2 - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	426
Tabelle D.3.4.3 Prozessparameter: Hypertonieschulung 1 - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	426
Tabelle D.3.4.4 Prozessparameter: Hypertonieschulung 2 - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	426
Tabelle D.3.4.5 Prozessparameter: Ophthalmologische Netzhautuntersuchung - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	427
D.3.5 Begleit- und Folgeerkrankungen	428
Tabelle D.3.5.1 Begleit- und Folgeerkrankungen: Herzinfarkt - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	428
Tabelle D.3.5.2 Begleit- und Folgeerkrankungen: Schlaganfall - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	428
Tabelle D.3.5.3 Begleit- und Folgeerkrankungen: Erheblich auffälliger Fußstatus - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	428
Tabelle D.3.5.4 Begleit- und Folgeerkrankungen: Diabetische Nephropathie - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	428
Tabelle D.3.5.5 Begleit- und Folgeerkrankungen: Diabetische Retinopathie - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	428
D.3.6 Therapien	429
Tabelle D.3.6.1 Therapien: Nierenersatztherapie - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr	429
D.3.7 Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier	430
Tabelle D.3.7.1 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=4, Tod t=5): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	430
Tabelle D.3.7.2 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=5, Tod t=6): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	430
Tabelle D.3.7.3 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=6, Tod t=7): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	430
Tabelle D.3.7.4 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=7, Tod t=8): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	431
Tabelle D.3.7.5 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte (t=8, Tod t=9): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	431
Tabelle D.3.7.6 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=9, Tod t=10): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	431
Tabelle D.3.7.7 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=10, Tod t=11): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	431
Tabelle D.3.7.8 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=11, Tod t=12): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	432
Tabelle D.3.7.9 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=12, Tod t=13): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	432
Tabelle D.3.7.10 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=13, Tod t=14): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	432
Tabelle D.3.7.11 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=14, Tod t=15): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier	432
D.3.8 Endpunktfreiheit	433
Tabelle D.3.8.1 Endpunktfreiheit	433
D.5 Leistungsausgaben	434
Tabelle D.5.1 Leistungsausgaben: Ambulante ärztliche Behandlung und häusliche Krankenpflege - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre	434
Tabelle D.5.2 Leistungsausgaben: Krankenhausbehandlung und Anschlussrehabilitation - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre	434
Tabelle D.5.3 Leistungsausgaben: Arzneimittel - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre	434
Tabelle D.5.4 Leistungsausgaben: Heil- und Hilfsmittel, sowie Dialyse-Sachkosten - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre	434
Tabelle D.5.5 Leistungsausgaben: Krankengeld bei anspruchsberechtigten Patienten - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre	435
Tabelle D.5.6 Leistungsausgaben: Insgesamt - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre	435

Anhang E: Methodik und Datengrundlage	436
E.1 Datengrundlage	436
Abb. E.1.1 Datenfluss im Rahmen des DMP DM2 unter vertraglicher Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) (Regelfall) - ab eDMP	437
E.2 Qualitätssicherung	439
E.3 Sonderfälle bei den medizinischen Datensätzen	440
Tabelle E.3.1 Medizinische Daten: Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr	441
E.4 Modellbildung für die Risikoadjustierung	442
Tabelle E.4.1 Medizinische Zielwerte	443
Tabelle E.4.2 Ökonomische Zielwerte	443
Tabelle E.4.3 Gemessene Ereigniszeiten und Zahl der Bindungen bei primären Endpunkten, sekundären Endpunkten und Tod	444
Tabelle E.4.4 Übersicht über den gemeinsamen Kovariatenatz für die Modellierung	447
Anhang F: Glossar	450

Zusammenfassung

Ausgeschiedene Patienten/-innen

Patienten/-innen können im Zeitverlauf aus dem Programm ausscheiden. Gründe für das Ausscheiden sind: Beendigung durch den Patienten/die Patientin, Ausschluss des Patienten/der Patientin durch die Krankenkasse auf Grund der Nichterfüllung vorgegebener Kriterien oder Tod des Patienten/der Patientin.

Im zweiten Teil der Tabelle werden die wichtigsten Ergebnisse und Entwicklungen für die ausgewählten sieben medizinischen Indikatoren (Body-Mass-Index, Raucheranteil, diastolische und systolische Blutdruckwerte, HbA1c-Laborwerte, Patienten/-innen mit spezifischer Medikation, Diabetes-Schulungen und Auftreten von Folgeschäden/Endpunkten) zusammenfassend dargestellt.

Body-Mass-Index (BMI)

.Der BMI ist eine Maßzahl zur Bewertung des Körpergewichts, in die auch die Körpergröße mit einbezogen wird.

Er wird berechnet aus dem Körpergewicht in kg und der Körpergröße in m im Quadrat ($BMI = \frac{kg}{m^2}$). BMI-Werte unter $25 \frac{kg}{m^2}$ sind als normalgewichtig, BMI-Werte zwischen 25 und $30 \frac{kg}{m^2}$ als leicht übergewichtig und BMI-Werte über $30 \frac{kg}{m^2}$ als übergewichtig (adipös) anzusehen.

Raucheranteil

Zigarettenrauch hat zahlreiche negative Einflüsse auf den Stoffwechsel und das Herz-Kreislauf-System, die die diabetesbedingten Folgeerkrankungen teilweise potenzieren können. In DMP sind Veränderungen im Rauchverhalten der Patienten/-innen, die letztlich zur Reduktion des Raucheranteils im Patientenkollektiv führen, daher bedeutende Therapieziele.

Blutdruck (systolisch/diastolisch)

Ein erhöhter Blutdruck (Hypertonus) hat ebenfalls zahlreiche negative Einflüsse auf das Herz-Kreislauf-System, die die diabetesbedingten Folgeerkrankungen an den Gefäßen potenzieren können. Eine (medikamentöse) Einstellung der erhöhten Blutdruckwerte in den Normalbereich ist daher ein wichtiges Therapieziel in DMP. Die Entwicklung des mittleren diastolischen sowie des mittleren systolischen Blutdruckwertes ist für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert, d.h. für diejenigen Diabetes-Patienten/-innen, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation als Hypertoniker eingestuft wurden. Dazu zählen ausschließlich Patienten/-innen für welche die Hypertonie über den entsprechenden Anamnesebefund dokumentiert ist. Die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation gemessenen Blutdruckwerte werden nicht berücksichtigt.

Dem unteren Druckwert der Blutdruckkurve, dem so genannten diastolischen Wert, kommt eine besondere diagnostische Bedeutung zu, da er permanent auf den Gefäßwänden lastet. Der obere Druckwert der Blutdruckkurve, der so genannte systolische Wert, lastet hingegen nur kurzzeitig auf den Gefäßwänden.

Laborwert HbA1c

.Langfristig erhöhte Blutzuckerwerte führen zu einem Einbau von Zuckerresten in den Blutfarbstoff Hämoglobin (Hb). Während die Messung des Blutzuckerwertes nur eine Momentaufnahme der aktuellen Stoffwechsellage liefert, kann durch Bestimmung des Anteils von glykolisiertem Hämoglobin (HbA1c) als Parameter der diabetischen Stoffwechselkontrolle im Sinne eines „Blutzuckergedächtnisses“ der mittlere Blutzuckerspiegel der vergangenen (4-12) Wochen beurteilt werden. Bei Stoffwechsellgesunden liegt der Anteil unter 6,5%.

Antidiabetische Medikation

Neben Gewichtsreduktion, Ernährungsumstellung sowie ausreichender Bewegung - wodurch ein Teil der Patienten/-innen potenziell keine Arzneimitteltherapie mehr benötigt - besteht die Therapie des Diabetes mellitus in der Anwendung von Blutzuckerspiegel-senkenden Arzneimitteln. In der tabellarischen Ergebnisdarstellung des Berichts sind die Anteile der mit speziellen Arzneimittelgruppen (Insulin, Metformin, etc.) behandelten Patienten/-innen detailliert aufgeführt. An dieser Stelle wird lediglich die Gesamtheit der Patienten/-innen mit antidiabetischer Medikation betrachtet.

Diabetes-Schulungen

Da bei der Erkrankung Diabetes sowohl eine Reihe von Verhaltensänderungen (Ernährung, Gewichtseinstellung, Bewegung, Tabakkonsum) als auch Therapietreue und Selbstmanagement der Patienten/-innen sich positiv auf den Arzneimittelbedarf und das Risiko diabetesbedingter Folgeerkrankungen (Mikro- und Makroangiopathie und Neuropathie) auswirken, sind zum Zeitpunkt der Diagnosestellung, aber auch im weiteren Verlauf der Erkrankung, Schulungsmaßnahmen unverzichtbar.

Zu beachten ist, dass die durch die 9. Risikostrukturausgleich-Änderungsverordnung bedingte Modifizierung der Dokumentationsbögen an dieser Stelle die Vergleichbarkeit einschränkt.

Folgeschäden/Endpunkte

Das wichtigste Ziel in der Behandlung eines Diabetes besteht in der Verhinderung bzw. Verzögerung des Auftretens von diabetesbedingten Folgeerkrankungen. Ergebnisse hierzu sind jedoch erst mittel- bis langfristig zu erwarten. Der Berichtsteil enthält eine detaillierte Übersicht über das Auftreten einzelner Folgeerkrankungen (z.B. an Gefäßen, Nerven, Niere und Netzhaut). An dieser Stelle wird für die Gesamtheit der Patienten/-innen mit Folgeerkrankungen nur nach primären und sekundären Endpunkten unterschieden. Als primäre, d.h. gravierende Endpunkte gelten Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation und Blindheit. Sekundäre, d.h. weniger gravierende Endpunkte sind diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, ein auffälliger Fußstatus, periphere arterielle Verschlusskrankheit und diabetische Retinopathie.

Tabellarische Zusammenfassung

Im ersten Teil der folgenden Tabelle wird dargestellt, wie viele Patienten/-innen in das Programm starteten, wie viele von Ihnen im Auswertungszeitraum ausschieden und welche Altersstruktur die Programmteilnehmer/-innen aufweisen. Sollten in der tabellarischen Zusammenfassung einzelne Zellen nicht befüllt sein, liegt der Grund in zu geringen Patientenzahlen, aufgrund derer die jeweilige Auswertung nicht durchgeführt werden konnte.

Disease-Management-Programm AOK Curaplan Diabetes mellitus Typ 2 der AOK Sachsen-Anhalt - Die Gesundheitskasse							
Variablen			Messzeitpunkt		Tabellen-Nr. im Bericht		
Allgemeine Programm- und Patientendaten	Programmlaufzeit	Starthalbjahr			2003-1	1.1	
		letztes Berichtshalbjahr			2012-1	1.1	
		Gesamtlaufzeit bis letztes Berichtshalbjahr (in Jahren)			9.5	1.1	
	Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Anzahl im letzten Berichtshalbjahr				91327	1.1.
		insgesamt seit dem Start eingeschriebene Patientinnen und Patienten				175551	1.1.
		Anteil Männer (in%)				43.1	1.1
		Anteil Frauen (in%)				56.9	1.1
		Anteil der ausgeschiedenen Patientinnen und Patienten				50.4	1.3
Mittleres Alter der Patientinnen und Patienten (gewichtet, in Jahren)		Beitritts- halbjahr			67.1	1.4	
Medizinische Inhalte	Body Mass Index	durchschnittlicher BMI der erwachsenen Patientinnen und Patienten (in kg/m ²)	Beitritts- halbjahr	Max:	31.4	3.1.1	
			zehntes Folge- halbjahr*	Max:	31.2		
	Raucheranteil	Anteil der Raucherinnen und Raucher in der Gruppe der Raucherinnen und Raucher (laut Erstdokumentation) (in%)	zehntes Folge- halbjahr*	Max:	66.0	3.1.2	
	Blutdruck	Mittlerer systolischer Blutdruck im Kollektiv der Hypertoniker (gewichtet, in mmHg)	zehntes Folge- halbjahr*		136.4	3.1.5	
			zehntes Folge- halbjahr*		78.6		3.1.6
	Laborwert HbA1c	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	Max:	7.3	3.2.1	
			zehntes Folge- halbjahr*	Max:	7.2		
	Medikation	Anteil der Patientinnen und Patienten, die mit diabetesspezifischer Medikation behandelt werden	Beitritts- halbjahr	Max:	80.9	3.3.1	
			zehntes Folge- halbjahr*	Max:	85.1		
	Patientenschulungen	Anteil der Patientinnen und Patienten, die an einer Diabetesschulung teilgenommen haben, an denjenigen, denen eine Schulung empfohlen worden ist	zehntes Folge- halbjahr*	Max:	56.0	3.4.1	
		Anteil der Patientinnen und Patienten, die an einer Hypertonieschulung teilgenommen haben, an denjenigen, denen eine Schulung empfohlen worden ist	zehntes Folge- halbjahr*	Max:	25.0	3.4.2	
	Begleit- und Folgeerkrankungen: primäre und sekundäre Endpunkte	Anteil der Patientinnen und Patienten mit primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation	alle Kohorten, alle Halbjahre**	Max:	4.3	3.5.8	
Anteil der Patientinnen und Patienten mit primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation		alle Kohorten, alle Halbjahre**	Max:	16.3	3.5.10		

* gilt nur für Kohorten mit zehn oder mehr Folgehalbjahren

** mit Ausnahme des Beitritts-
halbjahres

0. Einleitung

Die Disease-Management-Programme (DMP) zielen darauf ab, die medizinische Versorgung chronisch kranker Patientinnen und Patienten flächendeckend qualitativ zu verbessern. Die Behandlung von Patienten wird über den gesamten Verlauf einer chronischen Krankheit und über die Grenzen der einzelnen Leistungserbringer hinweg koordiniert sowie auf der Grundlage medizinischer Evidenz optimiert. Die Patienten sollen systematisch, kontinuierlich und individuell betreut werden, um so den Verlauf der ausgewählten chronischen Krankheiten dauerhaft positiv zu beeinflussen.

Den gesetzlichen Rahmen für die Implementierung von DMP bildet das Risikostruktur-Ausgleichs-Reformgesetz, das seit dem 1. Januar 2002 in Kraft ist. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) erlässt die Rechtsgrundlagen zur Umsetzung von DMP insbesondere als Änderungsverordnungen zur Risikostrukturausgleichs-Verordnung (RSAV). Auf dieser Basis können die Krankenkassen ihre strukturierten Behandlungsprogramme entwickeln und beim Bundesversicherungsamt (BVA) einreichen. Das BVA prüft, ob die Programme den gesetzlichen Kriterien entsprechen und erteilt nach positiver Entscheidung seine Zulassung. Ein Zulassungskriterium ist dabei die Evaluation der DMP. Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe hat das BVA (Mindest-) Anforderungen für die Evaluation der unterschiedlichen Behandlungsprogramme erarbeitet. Hauptziel der Evaluation ist es, zu überprüfen,

- inwieweit die Ziele des Programms erreicht werden konnten,
- inwieweit die Einschreibekriterien eingehalten wurden und
- wie sich die Kosten der Versorgung im strukturierten Behandlungsprogramm entwickeln.

Entsprechend den Kriterien des BVA sind die medizinischen Inhalte aus den Dokumentationen der Ärzte, die Kosten für die einzelnen Leistungserbringer bzw. -bereiche aus den Routinedaten der Krankenkassen, sowie die Veränderungen der subjektiven Lebensqualität der Patienten durch deren schriftliche Befragung zu untersuchen und Zusammenhänge zwischen diesen Ebenen aufzuzeigen. Die Evaluation zeichnet sich dadurch aus, dass für die den Programmen zugrunde liegenden Indikationen erstmalig in großem Umfang medizinische Daten patientenbezogen erhoben und mit weiteren Daten verknüpft werden.

Während in der Anfangsphase der Evaluation die DMP in Abhängigkeit von ihrer Laufzeit – und damit bei unterschiedlichem Programmstart zu unterschiedlichen Zeitpunkten – zu evaluieren waren, gilt seit 1. Juli 2008 eine stichtagsbezogene Regelung. Für die Indikation Diabetes mellitus Typ 2 sind sämtliche DMP zum 30.09.2009 zu evaluieren. Anschließend erfolgt alle zwei Jahre eine Aktualisierung, d.h. zum 30.09.2011, zum 30.09.2013, etc.

Tabelle 0.1 gibt eine Übersicht darüber, welchen Inhalt der vorliegende Evaluationsbericht umfasst. Die in den Evaluationskriterien vorgesehenen geschlechtsspezifischen Zusatzauswertungen sind darin nicht enthalten. Sie werden in einem gesonderten Genderbericht ausgewiesen, für den bundesweite und kassenarten übergreifende (AOK, Knappschaft) Auswertungen vorgenommen werden.

Tabelle 0.1 **Inhalte des Evaluationsberichtes**

Auswertungskapitel	Inhalte
Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte	
1. Patientenzahlen und -merkmale	<ul style="list-style-type: none"> - Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung - Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert) - Mittleres Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres - Alter - Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres - Patienten und ihre Beobachtungszeit - Patienten ohne medizinische Dokumentation
2. Leistungserbringer	Ärzte und stationäre Einrichtungen
3. Krankheitsverlauf nach Einschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewichtsentwicklung (BMI) - Raucherstatus - Hypertonus - HbA1c-Werte - Serum-Kreatinin-Werte - Medikation - Wahrnehmung von Schulungen - Augenärztliche Untersuchung <p>Ereigniszeitanalysen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erblindung - Nephropathie - erheblich auffälliger Fußstatus - Amputation - Herzinfarkt - Schlaganfall - Nierenersatztherapie - primäre und sekundäre Endpunkte
Berichtsteil II: Evaluation der ökonomischen Inhalte	
4. Patientenzahlen der Stichprobe für die Leistungsausgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Patientenzahlen - Ausscheiden aus dem Programm
5. Leistungsausgaben (Stichprobe)	<p>Leistungsausgaben für die nachfolgenden Bereiche insgesamt und einzeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ambulante ärztliche Behandlung - Krankenhausbehandlung - Arzneimittel - Heilmittel - Hilfsmittel - Anschlussrehabilitation - Häusliche Krankenpflege - Krankengeld für Patienten mit Krankengeldanspruch - Dialyse-Sachkosten - Leistungsausgaben der Patienten insgesamt <p>Patienten mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt Patienten mit Krankengeldanspruch und Krankengeldbezug: Patienten mit Krankengeldbezug</p>
6. Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung	Durchschnittliche Kosten pro Patientenjahr

Auswertungskapitel	Inhalte
Berichtsteil III: Auswertungen zur Lebensqualität*	
7. Patientenzahlen der Stichprobe für den SF36	Patientenzahlen und Rücklaufquote
8. Veränderung der subjektiven Lebensqualität (Stichprobe)	Gesundheitszustand im Vergleich zum Vorjahr - Körperliche Funktionsfähigkeit - Körperliche Rollenfunktion - Körperliche Schmerzen - Allgemeine Gesundheitswahrnehmung - Vitalität - Soziale Funktionsfähigkeit - Emotionale Rollenfunktion - Psychisches Wohlbefinden - Körperliche Summenskala - Psychische Summenskala - SF-6D-Gesamtindex
Anhang A: Auswertung für Patienten ohne Endpunkte	
Anhang B: Auswertung für Patienten mit primären Endpunkten	
Anhang C: Auswertung für Patienten mit sekundären Endpunkten	
Anhang D: Risikoadjustierte Auswertungsergebnisse	
Anhang E: Methodik und Datengrundlage	
Anhang F: Glossar	

*Die Lebensqualitätsbefragung wird vom BVA erstmalig ab der 2. Halbjahreskohorte 2006 gefordert

Um eine Vergleichbarkeit aller Evaluationsberichte zu gewährleisten, hat das BVA verbindliche Vorgaben für die Datenauswertung gemacht und in den Kriterien des Bundesversicherungsamts zur Evaluation strukturierter Behandlungsprogramme in der Version 5.4 vom 04. Dezember 2012 veröffentlicht. In Abstimmung mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen und den beteiligten Evaluatoren wurden konkrete Berechnungsvorschriften zur Auswertung der Daten erarbeitet und in einem internen Prozess validiert.

Das vom Gesetzgeber vorgesehene Evaluationsvorhaben ist durch den vorgegebenen Kriterienkatalog formalisiert und basiert in erster Linie auf einer deskriptiven Auswertung der Daten. Eine Verlaufsbeobachtung wird durch die Dokumentation einzelner Messzeitpunkte in Halbjahresabschnitten ermöglicht. Nach Vorlage der Evaluationsberichte wird vom BVA ein Vergleich der Programme untereinander vorgenommen. Um eine Vergleichbarkeit im Hinblick auf die Patientenpopulation herzustellen, erfolgt dazu eine risikoadjustierte Schätzung der interessierenden Parameter.

Der vorliegende Bericht evaluiert das Disease-Management-Programm „AOK Curaplan Diabetes mellitus Typ 2“ der AOK zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 in der Antragsregion Sachsen-Anhalt. Die Akkreditierung für das Programm wurde am 09.04.2003, also im Halbjahr 2003-1 erteilt. In diesem Evaluationsbericht werden die Teilnehmer des Programms vom Zeitpunkt Ihres Beitritts bis einschließlich des Halbjahres 2012-1 beobachtet. Am AOK Curaplan Diabetes mellitus Typ 2 nehmen die Versicherten der AOK Sachsen-Anhalt und gegebenenfalls länderübergreifend betreute AOK-Versicherte anderer Regionen teil.

Zu beachten sind die Auswirkungen der Fusion von Knappschaft und See-Krankenkasse zum 1.1.2008 auf die Evaluationsberichte. Die Fusion wurde bezüglich der DMPs zum 1.4.2008 umgesetzt, also in der Mitte des Halbjahres 2008-1.¹ Während Versicherte der ehemaligen See-Krankenkasse bis zu diesem Zeitpunkt an den DMPs der AOK teilnahmen, nehmen sie seitdem als Knappschaftsversicherte an den DMPs der Knappschaft teil.² Auswertungstechnisch sind nach den Vorgaben des BVA die ehemaligen See-Versicherten ab den Berichten, die das Halbjahr 2008-1 umfassen, den Knappschafts-Berichten zuzuordnen. Folglich enthält der Knappschaftsbericht in den Auswertungshalbjahren bis einschließlich 2008-1 auch Versicherte, die in diesen Halbjahren Teilnehmer der AOK-Programme waren. Umgekehrt werden in den AOK-Berichten dieser Halbjahre diejenigen Programmteilnehmer der AOK-Programme nicht mehr ausgewiesen, die der ehemaligen See-Krankenkasse angehörten.

Für den vorliegenden Bericht ist zudem die Fusion von AOK Sachsen-Anhalt und BKK Sachsen-Anhalt relevant, die bezüglich der DMPs zum 1.4.2009 umgesetzt wurde. Ab diesem Zeitpunkt nahmen die Versicherten der ehemaligen BKK Sachsen-Anhalt nicht mehr an den DMPs der BKK teil, sondern an den DMPs der AOK Sachsen-Anhalt. Die Patientenmerkmale und die dokumentierten medizinischen Parameter der ehemaligen BKK-Versicherten werden mit ihrem historischen Fallverlauf im vorliegenden Evaluationsbericht der AOK Sachsen-Anhalt berücksichtigt. Die stichprobenbasierten Auswertungen, d.h. zu den Leistungsausgaben und zum SF36, sind davon ausgenommen. Für Berichtsteil I gilt also, dass in den Halbjahren bis einschließlich 2009-1 auch Versicherte ausgewertet werden, die in diesen Halbjahren ursprünglich Teilnehmer der BKK-Programme waren. Daher können die Patientenzahlen höher ausfallen als die Patientenzahlen in den DM2-Berichten vom September 2009.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass in den vorliegenden DM2-Berichten Daten aus eDMP enthalten sind. Ab dem Halbjahr 2008-2 kann daher - je nach Auswertungsinhalt - die Vergleichbarkeit der Auswertungsinhalte eingeschränkt sein. Zum einen werden seit eDMP einige Parameter auf geänderte Art und Weise erfasst. Zum anderen besteht - je nach Praxissoftware - seit eDMP die Möglichkeit, auf ergänzende Patienteninformationen zuzugreifen, so dass ggf. ein bisher möglicherweise unterrepräsentierter Parameter korrigiert dargestellt wird.

Um das Verständnis des vorliegenden Evaluationsberichtes zu erleichtern, wird in den folgenden Ausführungen die Auswertung nach Halbjahres-Kohorten beschrieben und anhand einer Beispieltabelle illustriert. Anschließend werden diejenigen Untergruppen erläutert, für die gesonderte Auswertungen vorgenommen werden. Fachbegriffe, die im Text und in den Tabellen verwendet werden, werden im Glossar am Ende des Anhangs erläutert. Ebenfalls im Anhang werden Methodik und Datengrundlage für die Auswertungen in diesem Evaluationsbericht beschrieben.

Zur Vereinfachung wird im folgenden von „Patienten“, „Teilnehmern“ und „Personen“ usw. gesprochen. Damit sind jedoch stets männliche und weibliche Personen gemeint.

¹ Da die Evaluation halbjahresbezogen erfolgt, ergeben sich aus dieser Umstellung mitten im Halbjahr zwangsläufig Unschärfen in der Evaluation des Halbjahres 2008-1.

² Eine Ausnahme bilden die DMPs zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 1 und 2 in der Antragsregion Mecklenburg-Vorpommern. In diesen beiden Fällen hatte die Knappschaft bis zum Fusionszeitpunkt keine eigenen Programme angeboten.

0.1 Fallbezogene Auswertung nach Halbjahres-Kohorten

Mit dem Start des Programms werden sukzessive neue Patienten in das Programm eingeschrieben. Da für die Auswertung von Interesse ist, wie sich Krankheitsverlauf und Leistungsausgaben der Patienten mit zunehmender Teilnahmedauer am DMP verändern und wie sich die subjektive Lebensqualität entwickelt, kann die Auswertung nicht für die Gesamtheit dieser Patienten und damit unabhängig vom Einschreibedatum vorgenommen werden. Vielmehr werden die jeweils neu eingeschriebenen Patienten halbjährlich zusammengefasst als Halbjahres-Kohorte betrachtet.

Der Kohortenansatz, im vorliegenden Fall die Betrachtung von Eintrittskohorten, erlaubt die Erfassung von kohortenspezifischen Effekten. Der Kohortenansatz wird häufig verwendet, um Alters-, Kohorten- und Periodeneffekte zu differenzieren. Im vorliegenden Fall der Betrachtung von Eintrittskohorten, die jeweils über ein halbes Jahr zusammengefasst sind, ist insbesondere die Berücksichtigung von Periodeneffekten („Lerneffekte“ innerhalb der einzelnen DMP, Veränderungen der DMP, Veränderungen relevanter Randbedingungen) bedeutsam.

Die Halbjahres-Kohorten werden im Folgenden in Abhängigkeit vom Kalenderhalbjahr ihrer Einschreibung als „Kohorte 2003-1“, Kohorte „2003-2“, „Kohorte 2004-1“ etc. benannt. Je nach Eintritt des einzelnen Teilnehmers in das Programm kann das Beitrittsjahr weniger als sechs Monate umfassen. Tabelle 0.1.1. verdeutlicht beispielhaft den sich daraus ergebenden Tabellenstandard für ein DMP, das im Halbjahr 2003-1 begann: Jede Zeile beinhaltet die Daten jeweils einer Kohorte. In der ersten Spalte ist für jede Kohorte ausgewiesen, in welches Kalenderhalbjahr der Eintritt der jeweiligen Kohortenmitglieder in das DMP fiel. In der zweiten Spalte ist der Wert des ausgewerteten Parameters für das Beitrittsjahr dargestellt. In der dritten Spalte wird der Wert für das zweite Halbjahr der Programmteilnahme ausgewiesen, in der vierten Spalte für das dritte Halbjahr etc.. Zu beachten ist dabei, dass die Spaltenüberschriften sich auf die **Teilnahme-Halbjahre** der Patienten beziehen. Für jede Halbjahres-Kohorte fällt das x-te Teilnahmehalbjahr in unterschiedliche Kalenderhalbjahre.

Tabelle 0.1.1 Tabellenstandard

Eintrittszeitpunkt	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	20. Halbjahr
2003-1	Wert für 2003-1	Wert für 2003-2	Wert für 2004-1	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...
2003-2	Wert für 2003-2	Wert für 2004-1	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...	
2004-1	Wert für 2004-1	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...		
2004-2	Wert für 2004-2	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...			
2005-1	Wert für 2005-1	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...				
2005-2	Wert für 2005-2	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...					
2006-1	Wert für 2006-1	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...						
2006-2	Wert für 2006-2	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...							
2007-1	Wert für 2007-1	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...								
2007-2	Wert für 2007-2	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...									
2008-1	Wert für 2008-1	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...										
2008-2	Wert für 2008-2	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...											
2009-1	Wert für 2009-1	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...												
2009-2	Wert für 2009-2	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...													
2010-1	Wert für 2010-1	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...														
2010-2	Wert für 2010-2	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...															
2011-1	Wert für 2011-1	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...																
2011-2	Wert für 2011-2	Wert für 2012-1	...																	
2012-1	Wert für 2012-1	...																		
...	...																			

Abweichend von diesem Standard erfolgt für einige Parameter eine jährliche Darstellung. So werden die durchschnittlichen Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung kalenderjährlich dargestellt.

Die zentrale Abgrenzung für die tabellarische Darstellung ist, wie oben erläutert, die Halbjahres-„**Kohorte**“, der alle diejenigen Patienten zugeordnet werden, die sich im selben Kalenderhalbjahr in ein DMP eingeschrieben haben. Ausschlaggebend dafür, welcher Kohorte der Patient zugeordnet wird, ist das Unterschriftsdatum des Arztes auf der **Erstdokumentation**. Wurde die Erstdokumentation beispielsweise mit Datum vom 30.06.2004 unterschrieben, wird der Patient der Kohorte 2004-1 zugeordnet. Wurde die Erstdokumentation am 1.7.2004 unterschrieben, wird der Patient der Kohorte 2004-2 zugerechnet. Bei allen weiteren Dokumentationen, die in den folgenden Halbjahren erstellt werden, spricht man von **Folgedokumentationen**.

Erreicht eine Kohorte nicht die Mindestgröße von 10 Teilnehmern, werden für die entsprechenden Patienten keine Auswertungen vorgenommen. Die Mindestgröße von 10 Patienten bedeutet aber auch, dass Auswertungen für relativ geringe Fallzahlen möglich sind. Bei der Interpretation der Ergebnisse sind daher neben den ausgewiesenen Anteilswerten immer auch die Absolutzahlen zu berücksichtigen.

Bei der Interpretation der Auswertung nach Halbjahren ist zu beachten, dass die Kriterien des BVA eine **fallbezogene Auswertung** vorsehen und keine patientenbezogene: Entsprechend den BVA-Kriterien wird bei wiederholter Einschreibung ein neuer Fall gebildet und damit der Versicherte einer neuen Kohorte zugeordnet.

Ab dem zweiten Halbjahr ist bei den Auswertungen zu berücksichtigen, dass im Zeitverlauf Patienten aus dem Programm ausscheiden können. Gründe für das Ausscheiden sind z.B. eine freiwillige Beendigung oder eine unregelmäßige Teilnahme am Programm, die bei Ausbleiben von zwei aufeinanderfolgenden Dokumentationen zu einem Ausschluss führen. Im Folgenden werden daher diejenigen Patienten, die zu Beginn des Berichtshalbjahres noch Programmteilnehmer sind als „**Restkohorte**“ bezeichnet. Starten beispielsweise im Beitrittsjahr 10.000 Patienten in das Programm und scheiden von ihnen noch im selben Halbjahr 500 wieder aus, umfasst die „Restkohorte“ des folgenden Halbjahres 9.500 Patienten.

Für die Auswertung der medizinischen Daten fällt die Fallbasis jedoch zumeist kleiner aus als die Anzahl der Mitglieder der Restkohorte. Denn in den jeweiligen Berichtshalbjahren liegen in der Regel nicht für alle Patienten der „Restkohorte“ auswertbare und plausible medizinische Angaben vor. Dies kann drei Ursachen haben:

- „total missings“: Der Dokumentationsbogen fehlt vollständig.
- „item missings“: Der Dokumentationsbogen weist bei den benötigten Parametern Lücken auf.
- „unplausible Werte“: Der Dokumentationsbogen enthält z.B. Werte außerhalb eines medizinisch „**plausiblen Wertebereichs**“ (vgl. Tabelle 0.1.2.).

Patienten, bei denen mindestens eines dieser o.g. Kriterien zutrifft, können nicht in die Auswertung des entsprechenden Parameters einfließen, da sie nicht auswertbar sind.

Zu beachten ist weiterhin, dass im Sommer 2010 in Abstimmung mit dem BVA erstmals Regelungen getroffen wurden, die festlegen welcher Wert beim Vorliegen mehrerer Erstdokumentationen pro Halbjahr zu verwenden ist. Zudem wurden auf Basis aktualisierter BVA-Vorgaben seit Herbst 2013 – also erstmalig im vorliegenden Bericht – Anpassungen bei der Aufbereitung der Patientendaten vorgenommen (siehe Kapitel E.3 bzw. E.2).

Tabelle 0.1.2 Plausible Wertebereiche

Parameter	definierter medizinischer Bereich*
Größe (m)	1,20 bis 2,50
Gewicht (kg)	40,00 bis 300,00
RR systolisch (mmHg)	50 bis 300
RR diastolisch (mmHg)	10 bis 200
HbA1c-Werte (%)	2 bis 40
Serum-Kreatinin-Werte (µmol/l)	20 bis 999

* Basis: Expertenmeinungen nach Kenntnisstand September 2006. Wertebereiche sind vom BVA als Evaluationsgrundlage abgenommen und werden aufgrund der jeweils aktuellen Evaluationsergebnisse regelmäßig aktualisiert (mindestens einmal jährlich).

Patienten, bei denen mindestens eines dieser o.g. Kriterien zutrifft, können nicht in die Auswertung des entsprechenden Parameters einfließen, da sie nicht auswertbar sind. Diejenigen Patienten, die der Restkohorte angehören und für die auswertbare medizinische Daten vorliegen, werden als „**auswertbare**“ Patienten bezeichnet und in der Regel in den Tabellen gesondert ausgewiesen.³ Sie bilden in der Regel die Fallbasis für die Berechnung von Anteilswerten, Konfidenzintervallen und Mittelwerten.

Damit sind bereits die statistischen Kennzahlen angesprochen, die in diesem Bericht auszuweisen sind: Neben den Absolutzahlen sind zumeist die **Anteilswerte** zu berechnen. Als Mittelwerte sind in der Regel das **arithmetische Mittel** und der **Median** darzustellen. Bei einigen Auswertungen ist zudem die mittlere personenbezogene Differenz der dokumentierten medizinischen Werte zwischen Folge- und Erstdokumentation zu berechnen.

Ergänzend zum arithmetischen Mittel und den Anteilswerten ist in der Regel das zugehörige **95%-Konfidenzintervall** anzugeben. Generell ist per Definition das Ausweisen von Konfidenzintervallen nur sinnvoll, wenn es sich um Stichproben aus einer Grundgesamtheit handelt. Die Auswertungskriterien des BVA sehen jedoch vor, das 95%-Konfidenzintervall auch bei Auswertungen für die Gesamtheit der (Rest-) Kohortenmitglieder bzw. auswertbaren Patienten zu berechnen. Aus Platzgründen werden in der tabellarischen Darstellung die Namen der statistischen Kennzahlen unter Rückgriff auf die englischsprachigen Bezeichnungen abgekürzt. Das arithmetische Mittel wird als „**Mean**“ bezeichnet; das 95%-Konfidenzintervall wird mit „**CI**“ (Confidence Interval) abgekürzt; die Standardabweichung mit „**SD**“ (Standard Deviation).

³Die „nicht auswertbaren“ Patienten ergeben sich als Differenz zwischen den „Patienten insgesamt“ bzw. den „Kollektivmitglieder insgesamt“ und den „auswertbaren“ Patienten.

0.2. Beispiel für eine tabellarische Darstellung

In den folgenden Absätzen wird am Beispiel der Entwicklung der **HbA1c-Konzentration** eine Tabelle exemplarisch beschrieben (siehe Tabelle 0.2.1). Damit für das Verständnis einzelner Tabellen im Auswertungsteil kein Rückblättern zu diesem erklärenden Text nötig ist, ist in diesem Bericht jede Tabelle mit einem entsprechenden Erläuterungstext und Lesebeispiel versehen. Bei strukturgleichen Tabellen führt dies zu Doppelungen in den jeweiligen Erläuterungstexten. Leser dieses Berichts, die alle Tabellen der Reihe nach durchgehen, können daher einen großen Teil der Erläuterungstexte überspringen.

In der ersten Tabellenspalte ist jeweils angegeben, in welches Halbjahr der **Eintrittszeitpunkt (EZ)** der betrachteten Patienten in das DMP fiel, bzw. auf welche Kohorte sich die ausgewiesenen Werte beziehen. Beispielhaft ist in Tabelle 0.2.1 eine Kohorte dargestellt. Für jede Kohorte beginnt die „eigentliche“ **Tabelle zur Entwicklung der HbA1c-Konzentration** mit der zweiten Spalte. Für jede Kohorte werden dort zunächst Angaben zu den Patienten gemacht. Zuerst wird unter „Patienten insgesamt“ die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch als Programmteilnehmer definiert werden. Die „auswertbaren“ Patienten, also diejenigen, für die im betrachteten Berichtshalbjahr plausible Angaben zum HbA1c-Wert vorlagen, bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnungen, die anschließend ausgewiesen werden. Für die Berechnung der mittleren patientenbezogenen Differenz zwischen HbA1c-Konzentration im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus beiden Halbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtsjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt. Das Konfidenzintervall wird ausgewiesen, indem die untere und obere Grenze durch ein Semikolon getrennt in eckigen Klammern dargestellt werden.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitrittsjahr 18532 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 18524 Patienten lagen auswertbare Angaben vor. Bei ihnen betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich 7,08 %; der Median lag bei 6,80

%. Im letzten Berichtshalbjahr betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich 7,13 %; der Median lag bei 6,90 %, der dafür auswertbaren Patienten.

Tabelle 0.2.1 Muster für eine tabellarische Darstellung am Beispiel der Patienten und ihrer HbA1c-Konzentration

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
Kohorte	Patienten insgesamt	Anzahl	18532	16919	15229	13819	12524	11575	10657	9051	8357	7654	7302	6797	6413	6084	5724	5377	5082	4817	4564	
	auswertbar	Anzahl	18524	13497	14233	13472	12165	11330	10193	8758	8109	7496	6959	6517	6224	5882	5537	5245	4975	4725	4452	
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,08	6,84	6,97	6,87	7,01	6,96	7,03	6,94	7,00	6,95	7,04	6,99	7,09	7,10	7,16	7,07	7,12	7,02	7,13	
		CI Mean	[7,06; 7,10]	[6,82; 6,86]	[6,95; 6,99]	[6,85; 6,89]	[6,99; 7,03]	[6,94; 6,98]	[7,01; 7,06]	[6,91; 6,96]	[6,98; 7,03]	[6,93; 6,98]	[7,01; 7,06]	[6,96; 7,01]	[7,06; 7,12]	[7,08; 7,13]	[7,13; 7,19]	[7,04; 7,10]	[7,09; 7,15]	[6,99; 7,06]	[7,09; 7,16]	
		Median	6,80	6,60	6,80	6,70	6,80	6,80	6,80	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,80	6,90
		Fallbasis mittlere Differenz		13495	14232	13470	12164	11329	10192	8757	8108	7495	6958	6516	6223	5881	5536	5244	4974	4724	4451	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,20	-0,07	-0,14	0,01	-0,02	0,05	-0,03	0,05	0,01	0,10	0,07	0,17	0,19	0,25	0,18	0,23	0,14	0,24	
		CI mittlere Differenz		[-0,21; -0,18]	[-0,08; -0,05]	[-0,16; -0,12]	[-0,02; 0,03]	[-0,04; 0,00]	[0,03; 0,07]	[-0,06; -0,01]	[0,02; 0,08]	[-0,02; 0,04]	[0,07; 0,13]	[0,04; 0,10]	[0,14; 0,20]	[0,16; 0,22]	[0,22; 0,28]	[0,14; 0,21]	[0,20; 0,27]	[0,10; 0,17]	[0,20; 0,28]	
		Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20	0,20	0,20	0,30

0.3 Ausgewertete Teilgruppen: Subkohorten und Kollektive

Bei der tabellarischen Darstellung wird nicht nur danach differenziert, in welchem Halbjahr die Patienten dem DMP beigetreten sind, sondern – in den Tabellen zu Patientenmerkmalen und -zahlen – auch nach Frauen und Männern sowie nach Altersgruppen. Darüber hinaus erfolgt eine Differenzierung nach

- Subkohorten und
- Patientenkollektiven.

Für einen großen Teil der Auswertungen werden die Patienten jeder Kohorte zunächst nach dem Schweregrad ihrer Begleit- oder Folgeerkrankungen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation in drei „**Subkohorten**“ unterteilt. Bei diesen Begleit- oder Folgeerkrankungen handelt es sich zumeist um durch eine langjährige diabetische Stoffwechsellage verursachte, letztlich durch Mikrogefäßerkrankungen bedingte, schwerste Organschädigungen bzw. Organversagen. Die Begleit- oder Folgeerkrankungen werden als „Endpunkte“ bezeichnet. Dieser Begriff ist zentral für die Definition der drei Subkohorten gemäß der BVA-Kriterien⁴:

- Patienten **ohne Endpunkte** in der Erstdokumentation⁵
- Patienten **mit primären, d.h. gravierenden, Endpunkten** in der Erstdokumentation (*Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit*)
- Patienten nur mit **sekundären, d.h. weniger gravierenden, Endpunkten** (*diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, auffälliger Fußstatus, periphere arterielle Verschlusskrankheit, diabetische Retinopathie*)

Zu beachten ist dabei, dass aufgrund der Änderungen im Dokumentationsbogen durch die 9. RSA-ÄndV nicht alle medizinisch relevanten Kriterien in vergleichbarer Weise für die Halbjahre bis 2004-1 einerseits bzw. ab 2004-2 andererseits vorliegen. Daher kann z.B. das Vorliegen einer Nierenersatztherapie nicht als Kriterium für die Abgrenzung der Subkohorten verwendet werden. Auch werden zwar periphere arterielle Verschlusskrankheiten (pAVK) bei der Bildung der Subkohorten berücksichtigt, nicht aber koronare Herzkrankheiten (KHK). Andere Begleit- oder Folgeerkrankungen wie z.B. Hypertonus werden bei der Abgrenzung der primären und sekundären Endpunkte ebenfalls nicht berücksichtigt.

Für die Zuordnung der Patienten zu den Subkohorten ist die jeweils gravierendste (Begleit- oder Folge-) Erkrankung entscheidend. Patienten mit sowohl primären als auch sekundären Endpunkten werden daher der Subkohorte der Patienten mit primären Endpunkten zugeordnet. Die anhand der Erstdokumentation vorgenommene Einteilung in Subkohorten bleibt über den ganzen Berichtszeitraum bestehen, unabhängig davon, ob im weiteren Zeitverlauf Begleit- oder Folgeerkrankungen eines höheren Schweregrads auftreten oder nicht. Eine nach Subkohorten differenzierte Auswertung wird für die Darstellung der Patientenzahlen und -merkmale, des Raucherstatus, des Hypertonus und der HbA1c-Werte vorgenommen. Die entsprechenden Tabellen sind in diesem Bericht im Anhang enthalten.

Für einige weitere Aspekte wird zusätzlich nach „**Kollektiven**“ unterschieden. Die sich hierdurch ergebenden Gruppierungen unterliegen entweder besonderen Risiken (z.B. Raucherstatus) oder weisen bestimmte Begleiterkrankungen auf, die spezifische Therapien erfordern (z.B. Hypertoniker). Einem „Kollektiv“ wird diejenige Teilgruppe der Patienten einer Kohorte zugeordnet, bei der zum Zeitpunkt der Erstdokumentation eine bestimmte Indikation oder eine bestimmte Verhaltensweise vorlag. Diese Einteilung bleibt wiederum unabhängig von der weiteren Entwicklung des interessierenden Parameters über den ganzen Berichtszeitraum bestehen. So wird beispielsweise ein Patient dem Kollektiv der Raucher zugeordnet, wenn in der Erstdokumentation der entsprechende Raucherstatus vermerkt ist. Der Patient bleibt dann – sofern er nicht aus dem DMP ausscheidet – über den gesamten Berichtszeitraum hinweg Mitglied des Raucherkollektivs, selbst wenn er noch innerhalb dieses Zeitraums mit dem Rauchen aufhört.

Wenn die Patientenzahl bzw. die Gruppe der auswertbaren Patienten oder ein Kollektiv in einer Kohorte im jeweiligen Berichtshalbjahr kleiner als 10 ist, wird aus Datenschutzgründen auf den Ausweis von Ergebnissen verzichtet. Die entsprechenden Tabellen bzw. Halbjahre sind dann leer bzw. gestrichelt. Die Anzahl der insgesamt eingeschriebenen Patienten wird jedoch in jedem Fall in der tabellarischen Zusammenfassung ausgewiesen.

⁴ Datenbedingt kann bei der Evaluation des Krankheitsbildes Diabetes mellitus Typ 2 bezüglich der Endpunkte eine differenziertere Erfassung erfolgen als bei der Evaluation des Krankheitsbildes Diabetes mellitus Typ 1.

⁵ Unter diese Kategorie fallen alle Patienten ohne bekannte Begleit- und Folgeerkrankungen laut Erstdokumentation, welche als primäre oder sekundäre Endpunkte zu klassifizieren sind. Die Patienten „ohne Endpunkte“ umfassen demnach alle Patienten, die weder der Subkohorte mit primären noch der Subkohorte mit sekundären Endpunkten zuzuordnen sind.

Berichtsteil I: Evaluation der medizinischen Inhalte

Auswertungskapitel 1: Patientenzahlen und -merkmale

In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der **Patientenzahlen** ab dem Programmeintritt und in den darauffolgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Alle Patienten eines Beitrittsjahres bilden dabei eine Kohorte. Differenziert wird in den Tabellen nach den folgenden Kriterien:

- Geschlechtsverteilung
- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Alter und Altersverteilung
- mittlere und mediane Beobachtungszeit
- Vorliegen einer medizinischen Dokumentation

In Tabelle 1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerzahlen im Programm differenziert nach Kohorten und Geschlecht ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patienten jeweils im Beitrittsjahr und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmer waren.

Beispielsweise sind in der Kohorte 2003-1 insgesamt 18532 Teilnehmer in das Programm gestartet. Darunter waren 7543 Männer und 10989 Frauen. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres waren in dieser Kohorte noch 4564 Teilnehmer im Programm, 1789 Männer und 2775 Frauen. Diese Teilnehmer bilden die entsprechende „Restkohorte“ des letzten Berichtshalbjahres.

Tabelle 1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18532	16919	15229	13819	12524	11575	10657	9051	8357	7654	7302	6797	6413	6084	5724	5377	5082	4817	4564
	männlich	Anzahl	7543	6825	6090	5495	4941	4543	4166	3523	3269	2976	2834	2659	2506	2399	2263	2120	2001	1888	1789
		Anteil in %	40,70	40,34	39,99	39,76	39,45	39,25	39,09	38,92	39,12	38,88	38,81	39,12	39,08	39,43	39,54	39,43	39,37	39,19	39,20
	weiblich	Anzahl	10989	10094	9139	8324	7583	7032	6491	5528	5088	4678	4468	4138	3907	3685	3461	3257	3081	2929	2775
		Anteil in %	59,30	59,66	60,01	60,24	60,55	60,75	60,91	61,08	60,88	61,12	61,19	60,88	60,92	60,57	60,46	60,57	60,63	60,81	60,80
	2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	15338	13264	11995	10737	9767	8914	8042	7361	6677	6381	5997	5700	5383	5096	4829	4575	4304	4094
männlich		Anzahl	6506	5555	5008	4454	4031	3662	3294	3037	2758	2635	2486	2358	2221	2099	1988	1880	1762	1675	
		Anteil in %	42,42	41,88	41,75	41,48	41,27	41,08	40,96	41,26	41,31	41,29	41,45	41,37	41,26	41,19	41,17	41,09	40,94	40,91	
weiblich		Anzahl	8832	7709	6987	6283	5736	5252	4748	4324	3919	3746	3511	3342	3162	2997	2841	2695	2542	2419	
		Anteil in %	57,58	58,12	58,25	58,52	58,73	58,92	59,04	58,74	58,69	58,71	58,55	58,63	58,74	58,81	58,83	58,91	59,06	59,09	
2004-1		Patienten insgesamt	Anzahl	6722	5979	5294	4783	4296	3854	3572	3250	3080	2873	2690	2532	2401	2263	2147	2032	1951	
	männlich	Anzahl	2965	2639	2330	2089	1878	1655	1531	1384	1310	1218	1140	1066	1017	962	909	859	828		
		Anteil in %	44,11	44,14	44,01	43,68	43,72	42,94	42,86	42,58	42,53	42,39	42,38	42,10	42,36	42,51	42,34	42,27	42,44		
	weiblich	Anzahl	3757	3340	2964	2694	2418	2199	2041	1866	1770	1655	1550	1466	1384	1301	1238	1173	1123		
		Anteil in %	55,89	55,86	55,99	56,32	56,28	57,06	57,14	57,42	57,47	57,61	57,62	57,90	57,64	57,49	57,66	57,73	57,56		
	2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5209	4715	4298	3897	3506	3261	3038	2910	2710	2571	2446	2321	2204	2102	2005	1906		
männlich		Anzahl	2275	2049	1856	1685	1520	1424	1316	1257	1157	1089	1040	975	938	891	851	805			
		Anteil in %	43,67	43,46	43,18	43,24	43,35	43,67	43,32	43,20	42,69	42,36	42,52	42,01	42,56	42,39	42,44	42,24			
weiblich		Anzahl	2934	2666	2442	2212	1986	1837	1722	1653	1553	1482	1406	1346	1266	1211	1154	1101			
		Anteil in %	56,33	56,54	56,82	56,76	56,65	56,33	56,68	56,80	57,31	57,64	57,48	57,99	57,44	57,61	57,56	57,76			
2005-1		Patienten insgesamt	Anzahl	7326	6819	6209	5519	4992	4584	4340	4066	3849	3623	3415	3216	3064	2915	2769			
	männlich	Anzahl	3165	2930	2656	2332	2104	1924	1806	1692	1618	1509	1425	1349	1287	1225	1155				
		Anteil in %	43,20	42,97	42,78	42,25	42,15	41,97	41,61	41,61	42,04	41,65	41,73	41,95	42,00	42,02	41,71				
	weiblich	Anzahl	4161	3889	3553	3187	2888	2660	2534	2374	2231	2114	1990	1867	1777	1690	1614				
		Anteil in %	56,80	57,03	57,22	57,75	57,85	58,03	58,39	58,39	57,96	58,35	58,27	58,05	58,00	57,98	58,29				
	2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	9778	8989	8164	7426	6790	6402	5933	5585	5240	4913	4579	4321	4101	3871				
männlich		Anzahl	4208	3850	3504	3180	2897	2733	2521	2377	2232	2087	1939	1834	1742	1624					
		Anteil in %	43,04	42,83	42,92	42,82	42,67	42,69	42,49	42,56	42,60	42,48	42,35	42,44	42,48	41,95					
weiblich		Anzahl	5570	5139	4660	4246	3893	3669	3412	3208	3008	2826	2640	2487	2359	2247					
		Anteil in %	56,96	57,17	57,08	57,18	57,33	57,31	57,51	57,44	57,40	57,52	57,65	57,56	57,52	58,05					
2006-1		Patienten insgesamt	Anzahl	11195	10505	9553	8754	8293	7702	7289	6827	6435	6016	5692	5332	5084					
	männlich	Anzahl	4837	4531	4089	3700	3491	3233	3061	2846	2653	2469	2338	2193	2091						
		Anteil in %	43,21	43,13	42,80	42,27	42,10	41,98	41,99	41,69	41,23	41,04	41,08	41,13	41,13						
	weiblich	Anzahl	6358	5974	5464	5054	4802	4469	4228	3981	3782	3547	3354	3139	2993						
		Anteil in %	56,79	56,87	57,20	57,73	57,90	58,02	58,01	58,31	58,77	58,96	58,92	58,87	58,87						
	2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	14493	13791	12613	11771	10718	10080	9390	8865	8292	7821	7374	6965						
männlich		Anzahl	6242	5929	5412	5029	4575	4283	4001	3773	3514	3310	3128	2954							
		Anteil in %	43,07	42,99	42,91	42,72	42,69	42,49	42,61	42,56	42,38	42,32	42,42	42,41							
weiblich		Anzahl	8251	7862	7201	6742	6143	5797	5389	5092	4778	4511	4246	4011							
		Anteil in %	56,93	57,01	57,09	57,28	57,31	57,51	57,39	57,44	57,62	57,68	57,58	57,59							

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18117	17190	16142	14666	13722	12823	12070	11283	10635	10034	9520										
	männlich	Anzahl	7686	7262	6784	6149	5756	5363	5022	4712	4440	4176	3939										
		Anteil in %	42,42	42,25	42,03	41,93	41,95	41,82	41,61	41,76	41,75	41,62	41,38										
	weiblich	Anzahl	10431	9928	9358	8517	7966	7460	7048	6571	6195	5858	5581										
		Anteil in %	57,58	57,75	57,97	58,07	58,05	58,18	58,39	58,24	58,25	58,38	58,62										
		Patienten insgesamt	Anzahl	10330	9940	9118	8435	7735	7205	6731	6317	5936	5626										
2007-2	männlich	Anzahl	4467	4298	3899	3592	3296	3070	2868	2694	2533	2397											
		Anteil in %	43,24	43,24	42,76	42,58	42,61	42,61	42,61	42,65	42,67	42,61											
	weiblich	Anzahl	5863	5642	5219	4843	4439	4135	3863	3623	3403	3229											
		Anteil in %	56,76	56,76	57,24	57,42	57,39	57,39	57,39	57,35	57,33	57,39											
		Patienten insgesamt	Anzahl	9430	9074	8463	7733	7156	6701	6331	5959	5643											
	2008-1	männlich	Anzahl	4103	3942	3673	3343	3077	2869	2718	2558	2416											
Anteil in %			43,51	43,44	43,40	43,23	43,00	42,81	42,93	42,93	42,81												
weiblich		Anzahl	5327	5132	4790	4390	4079	3832	3613	3401	3227												
		Anteil in %	56,49	56,56	56,60	56,77	57,00	57,19	57,07	57,07	57,19												
		Patienten insgesamt	Anzahl	6552	6320	5851	5399	5008	4674	4394	4147												
2008-2		männlich	Anzahl	2844	2731	2522	2322	2150	1997	1887	1784												
	Anteil in %		43,41	43,21	43,10	43,01	42,93	42,73	42,94	43,02													
	weiblich	Anzahl	3708	3589	3329	3077	2858	2677	2507	2363													
		Anteil in %	56,59	56,79	56,90	56,99	57,07	57,27	57,06	56,98													
		Patienten insgesamt	Anzahl	5527	5299	4907	4513	4221	3942	3724													
	2009-1	männlich	Anzahl	2430	2332	2145	1959	1826	1701	1608													
Anteil in %			43,97	44,01	43,71	43,41	43,26	43,15	43,18														
weiblich		Anzahl	3097	2967	2762	2554	2395	2241	2116														
		Anteil in %	56,03	55,99	56,29	56,59	56,74	56,85	56,82														
		Patienten insgesamt	Anzahl	5982	5705	5205	4802	4483	4208														
2009-2		männlich	Anzahl	2619	2483	2254	2082	1949	1821														
	Anteil in %		43,78	43,52	43,30	43,36	43,48	43,27															
	weiblich	Anzahl	3363	3222	2951	2720	2534	2387															
		Anteil in %	56,22	56,48	56,70	56,64	56,52	56,73															
		Patienten insgesamt	Anzahl	6630	6363	5859	5409	5055															
	2010-1	männlich	Anzahl	2957	2831	2593	2397	2226															
Anteil in %			44,60	44,49	44,26	44,32	44,04																
weiblich		Anzahl	3673	3532	3266	3012	2829																
		Anteil in %	55,40	55,51	55,74	55,68	55,96																
		Patienten insgesamt	Anzahl	6682	6400	5912	5443																
2010-2		männlich	Anzahl	2932	2804	2584	2381																
	Anteil in %		43,88	43,81	43,71	43,74																	
	weiblich	Anzahl	3750	3596	3328	3062																	
		Anteil in %	56,12	56,19	56,29	56,26																	
		Patienten insgesamt	Anzahl	6352	6098	5609																	
	2011-1	männlich	Anzahl	2818	2693	2464																	
Anteil in %			44,36	44,16	43,93																		
weiblich		Anzahl	3534	3405	3145																		
		Anteil in %	55,64	55,84	56,07																		
		Patienten insgesamt	Anzahl	5365	5157																		
2011-2		männlich	Anzahl	2409	2313																		
	Anteil in %		44,90	44,85																			
	weiblich	Anzahl	2956	2844																			
		Anteil in %	55,10	55,15																			
		Patienten insgesamt	Anzahl	5991																			
	2012-1	männlich	Anzahl	2710																			
Anteil in %			45,23																				
weiblich		Anzahl	3281																				
		Anteil in %	54,77																				

In Tabelle 1.2 werden die **Patientenzahlen**, welche die **Basis der Stichprobenziehungen** für die ökonomischen Auswertungen in Berichtsteil II sowie die Durchführung der Lebensqualitätsbefragung in Berichtsteil III darstellen, ausgewiesen.⁶ Zudem wird in der Zeile „Stichprobengröße“ ausgewiesen, wie viele Patienten die daraus gezogene Stichprobe umfasst.

Dargestellt werden die Angaben ab Kohorte 2009-1.

In der Kohorte 2009-1 umfasst die Stichprobe im Beitrittsjahr 500 Patienten. Basis für die Ziehung dieser Stichprobe waren 5285 Patienten.

Tabelle 1.2 Patientenzahlen zur Stichprobenziehung

EZ	Patientenzahlen zur Stichprobenziehung (Anzahl)		Beitritts- halbjahr
2009-1	Stichprobenbasis	Anzahl	5285
	Stichprobengröße	Anzahl	500
2009-2	Stichprobenbasis	Anzahl	5760
	Stichprobengröße	Anzahl	500
2010-1	Stichprobenbasis	Anzahl	6325
	Stichprobengröße	Anzahl	500
2010-2	Stichprobenbasis	Anzahl	6368
	Stichprobengröße	Anzahl	500
2011-1	Stichprobenbasis	Anzahl	5917
	Stichprobengröße	Anzahl	500
2011-2	Stichprobenbasis	Anzahl	5145
	Stichprobengröße	Anzahl	500
2012-1	Stichprobenbasis	Anzahl	5754
	Stichprobengröße	Anzahl	500

⁶Die Angaben zur Stichprobenbasis beziehen sich auf den Datenbestand zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung. Sie können daher von den Fallzahlen in Tabelle 1.1. abweichen, die auf dem ggf. aktualisierten Datenbestand zum Zeitpunkt der Berichtsproduktion beruht.

Tabelle 1.3 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patienten bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patienten aus dem Programm**. Dafür kommen beispielsweise Tod, Ausschluss durch die Kranken-

kasse oder Beendigung durch den Patienten in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patienten werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2003-1 mit 18532 Teilnehmern. 14197 von ihnen bzw. 76,61 Prozent waren bis zum Ende des letzten Berichtshalbjahres ausgeschieden.

Tabelle 1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1613	3303	4713	6008	6957	7875	9481	10175	10878	11230	11735	12119	12448	12808	13155	13450	13715	13968	14197
		Anteil in %	8,70	17,82	25,43	32,42	37,54	42,49	51,16	54,91	58,70	60,60	63,32	65,39	67,17	69,11	70,99	72,58	74,01	75,37	76,61
		CI Anteil in %	[8,30; 9,11]	[17,27; 18,37]	[24,80; 26,06]	[31,75; 33,09]	[36,84; 38,24]	[41,78; 43,21]	[50,44; 51,88]	[54,19; 55,62]	[57,99; 59,41]	[59,89; 61,30]	[62,63; 64,02]	[64,71; 66,08]	[66,49; 67,85]	[68,45; 69,78]	[70,33; 71,64]	[71,93; 73,22]	[73,38; 74,64]	[74,75; 75,99]	[76,00; 77,22]
	davon wegen Tod	Anzahl	20	57	90	117	311	496	686	887	1070	1215	1420	1583	1741	1906	2059	2207	2337	2467	2599
		Anteil in %	0,11	0,31	0,49	0,63	1,68	2,68	3,70	4,79	5,77	6,56	7,66	8,54	9,39	10,28	11,11	11,91	12,61	13,31	14,02
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	311	1067	1843	2693	3273	3846	4131	4332	4400	4454	4511	4556	4633	4703	4756	4820	4879	4919	4948
		Anteil in %	1,68	5,76	9,94	14,53	17,66	20,75	22,29	23,38	23,74	24,03	24,34	24,58	25,00	25,38	25,66	26,01	26,33	26,54	26,70
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	7	24	113	147	175	206	236	293	327	415	434	478	520	593	628	646	680	706
		Anteil in %	0,01	0,04	0,13	0,61	0,79	0,94	1,11	1,27	1,58	1,76	2,24	2,34	2,58	2,81	3,20	3,39	3,49	3,67	3,81
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1281	2172	2756	3085	3226	3358	4458	4720	5115	5234	5389	5546	5596	5679	5747	5795	5853	5902	5944
Anteil in %		6,91	11,72	14,87	16,65	17,41	18,12	24,06	25,47	27,60	28,24	29,08	29,93	30,20	30,64	31,01	31,27	31,58	31,85	32,07	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	18532	16919	15229	13819	12524	11575	10657	9051	8357	7654	7302	6797	6413	6084	5724	5377	5082	4817	4564
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	16919	15229	13819	12524	11575	10657	9051	8357	7654	7302	6797	6413	6084	5724	5377	5082	4817	4564	4335
2003-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	2074	3343	4601	5571	6424	7296	7977	8661	8957	9341	9638	9955	10242	10509	10763	11034	11244	11413	
		Anteil in %	13,52	21,80	30,00	36,32	41,88	47,57	52,01	56,47	58,40	60,90	62,84	64,90	66,78	68,52	70,17	71,94	73,31	74,41	
		CI Anteil in %	[12,98; 14,06]	[21,14; 22,45]	[29,27; 30,72]	[35,56; 37,08]	[41,10; 42,66]	[46,78; 48,36]	[51,22; 52,80]	[55,68; 57,25]	[57,62; 59,18]	[60,13; 61,67]	[62,07; 63,60]	[64,15; 65,66]	[66,03; 67,52]	[67,78; 69,25]	[69,45; 70,90]	[71,23; 72,65]	[72,61; 74,01]	[73,72; 75,10]	
	davon wegen Tod	Anzahl	22	43	71	211	377	542	705	842	955	1093	1217	1369	1472	1602	1719	1843	1959	2054	
		Anteil in %	0,14	0,28	0,46	1,38	2,46	3,53	4,60	5,49	6,23	7,13	7,93	8,93	9,60	10,44	11,21	12,02	12,77	13,39	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	408	931	1795	2487	3023	3342	3588	3652	3692	3727	3772	3816	3888	3937	3988	4036	4069	4088	
		Anteil in %	2,66	6,07	11,70	16,21	19,71	21,79	23,39	23,81	24,07	24,30	24,59	24,88	25,35	25,67	26,00	26,31	26,53	26,65	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	7	25	110	136	162	188	209	268	306	370	407	466	520	562	599	632	656	685	
		Anteil in %	0,05	0,16	0,72	0,89	1,06	1,23	1,36	1,75	2,00	2,41	2,65	3,04	3,39	3,66	3,91	4,12	4,28	4,47	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1637	2344	2625	2737	2862	3224	3475	3899	4004	4151	4242	4304	4362	4408	4457	4523	4560	4586	
Anteil in %		10,67	15,28	17,11	17,84	18,66	21,02	22,66	25,42	26,11	27,06	27,66	28,06	28,44	28,74	29,06	29,49	29,73	29,90		
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	15338	13264	11995	10737	9767	8914	8042	7361	6677	6381	5997	5700	5383	5096	4829	4575	4304	4094	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	13264	11995	10737	9767	8914	8042	7361	6677	6381	5997	5700	5383	5096	4829	4575	4304	4094	3925	
2004-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	743	1428	1939	2426	2868	3150	3472	3642	3849	4032	4190	4321	4459	4575	4690	4771	4851		
		Anteil in %	11,05	21,24	28,85	36,09	42,67	46,86	51,65	54,18	57,26	59,98	62,33	64,28	66,33	68,06	69,77	70,98	72,17		
		CI Anteil in %	[10,30; 11,80]	[20,27; 22,22]	[27,76; 29,93]	[34,94; 37,24]	[41,48; 43,85]	[45,67; 48,05]	[50,46; 52,85]	[52,99; 55,37]	[56,08; 58,44]	[58,81; 61,15]	[61,17; 63,49]	[63,14; 65,43]	[65,20; 67,46]	[66,95; 69,17]	[68,67; 70,87]	[69,89; 72,06]	[71,09; 73,24]		
	davon wegen Tod	Anzahl	11	23	87	180	269	330	406	459	522	584	647	693	751	807	858	898	943		
		Anteil in %	0,16	0,34	1,29	2,68	4,00	4,91	6,04	6,83	7,77	8,69	9,63	10,31	11,17	12,01	12,76	13,36	14,03		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	368	782	1135	1444	1628	1736	1786	1816	1834	1865	1903	1927	1952	1975	1994	2009	2015		
		Anteil in %	5,47	11,63	16,88	21,48	24,22	25,83	26,57	27,02	27,28	27,74	28,31	28,67	29,04	29,38	29,66	29,89	29,98		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	11	70	104	125	146	163	197	213	269	289	319	351	382	399	415	431	445		
		Anteil in %	0,16	1,04	1,55	1,86	2,17	2,42	2,93	3,17	4,00	4,30	4,75	5,22	5,68	5,94	6,17	6,41	6,62		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	353	553	613	677	825	921	1083	1154	1224	1294	1321	1350	1374	1394	1423	1433	1448		
Anteil in %		5,25	8,23	9,12	10,07	12,27	13,70	16,11	17,17	18,21	19,25	19,65	20,08	20,44	20,74	21,17	21,32	21,54			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6722	5979	5294	4783	4296	3854	3572	3250	3080	2873	2690	2532	2401	2263	2147	2032	1951		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	5979	5294	4783	4296	3854	3572	3250	3080	2873	2690	2532	2401	2263	2147	2032	1951	1871		

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	494	911	1312	1703	1948	2171	2299	2499	2638	2763	2888	3005	3107	3204	3303	3381		
		Anteil in %	9,48	17,49	25,19	32,69	37,40	41,68	44,14	47,97	50,64	53,04	55,44	57,69	59,65	61,51	63,41	64,91		
		CI Anteil in %	[8,69; 10,28]	[16,46; 18,52]	[24,01; 26,37]	[31,42; 33,97]	[36,08; 38,71]	[40,34; 43,02]	[42,79; 45,48]	[46,62; 49,33]	[49,29; 52,00]	[51,69; 54,40]	[54,09; 56,79]	[56,35; 59,03]	[58,31; 60,98]	[60,19; 62,83]	[62,10; 64,72]	[63,61; 66,20]		
	davon wegen Tod	Anzahl	8	52	113	174	224	270	321	374	427	477	525	574	625	669	710	748		
		Anteil in %	0,15	1,00	2,17	3,34	4,30	5,18	6,16	7,18	8,20	9,16	10,08	11,02	12,00	12,84	13,63	14,36		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	387	688	921	1074	1188	1239	1261	1283	1304	1329	1348	1360	1378	1400	1427	1435		
		Anteil in %	7,43	13,21	17,68	20,62	22,81	23,79	24,21	24,63	25,03	25,51	25,88	26,11	26,45	26,88	27,39	27,55		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	41	60	71	83	95	122	142	192	209	238	263	289	303	321	333	352		
		Anteil in %	0,79	1,15	1,36	1,59	1,82	2,34	2,73	3,69	4,01	4,57	5,05	5,55	5,82	6,16	6,39	6,76		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	58	111	207	372	441	540	575	650	698	719	752	782	801	814	833	846		
Anteil in %		1,11	2,13	3,97	7,14	8,47	10,37	11,04	12,48	13,40	13,80	14,44	15,01	15,38	15,63	15,99	16,24			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	5209	4715	4298	3897	3506	3261	3038	2910	2710	2571	2446	2321	2204	2102	2005	1906		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	4715	4298	3897	3506	3261	3038	2910	2710	2571	2446	2321	2204	2102	2005	1906	1828		
2005-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	507	1117	1807	2334	2742	2986	3260	3477	3703	3911	4110	4262	4411	4557	4667			
		Anteil in %	6,92	15,25	24,67	31,86	37,43	40,76	44,50	47,46	50,55	53,39	56,10	58,18	60,21	62,20	63,70			
		CI Anteil in %	[6,34; 7,50]	[14,42; 16,07]	[23,68; 25,65]	[30,79; 32,93]	[36,32; 38,54]	[39,63; 41,88]	[43,36; 45,64]	[46,32; 48,60]	[49,40; 51,69]	[52,24; 54,53]	[54,97; 57,24]	[57,05; 59,31]	[59,09; 61,33]	[61,09; 63,31]	[62,60; 64,81]			
	davon wegen Tod	Anzahl	33	118	245	344	434	529	608	683	760	846	934	1009	1088	1152	1218			
		Anteil in %	0,45	1,61	3,34	4,70	5,92	7,22	8,30	9,32	10,37	11,55	12,75	13,77	14,85	15,72	16,63			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	423	796	1075	1287	1353	1384	1408	1455	1500	1542	1584	1610	1637	1662	1667			
		Anteil in %	5,77	10,87	14,67	17,57	18,47	18,89	19,22	19,86	20,48	21,05	21,62	21,98	22,35	22,69	22,75			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	20	56	91	114	156	184	266	287	357	407	434	466	486	509	527			
		Anteil in %	0,27	0,76	1,24	1,56	2,13	2,51	3,63	3,92	4,87	5,56	5,92	6,36	6,63	6,95	7,19			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	31	147	396	589	799	889	978	1052	1086	1116	1158	1177	1200	1234	1255			
Anteil in %		0,42	2,01	5,41	8,04	10,91	12,13	13,35	14,36	14,82	15,23	15,81	16,07	16,38	16,84	17,13				
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	7326	6819	6209	5519	4992	4584	4340	4066	3849	3623	3415	3216	3064	2915	2769			
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	6819	6209	5519	4992	4584	4340	4066	3849	3623	3415	3216	3064	2915	2769	2659			
2005-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	789	1614	2352	2988	3376	3845	4193	4538	4865	5199	5457	5677	5907	6098				
		Anteil in %	8,07	16,51	24,05	30,56	34,53	39,32	42,88	46,41	49,75	53,17	55,81	58,06	60,41	62,36				
		CI Anteil in %	[7,53; 8,61]	[15,77; 17,24]	[23,21; 24,90]	[29,65; 31,47]	[33,58; 35,47]	[38,35; 40,29]	[41,90; 43,86]	[45,42; 47,40]	[48,76; 50,75]	[52,18; 54,16]	[54,82; 56,79]	[57,08; 59,04]	[59,44; 61,38]	[61,40; 63,32]				
	davon wegen Tod	Anzahl	71	240	401	549	682	810	936	1085	1211	1354	1474	1576	1675	1782				
		Anteil in %	0,73	2,45	4,10	5,61	6,97	8,28	9,57	11,10	12,38	13,85	15,07	16,12	17,13	18,22				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	632	942	1234	1359	1420	1482	1556	1617	1700	1756	1816	1859	1894	1911				
		Anteil in %	6,46	9,63	12,62	13,90	14,52	15,16	15,91	16,54	17,39	17,96	18,57	19,01	19,37	19,54				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	41	94	119	177	223	347	388	461	522	580	611	638	687	717				
		Anteil in %	0,42	0,96	1,22	1,81	2,28	3,55	3,97	4,71	5,34	5,93	6,25	6,52	7,03	7,33				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	45	338	598	903	1051	1206	1313	1375	1432	1509	1556	1604	1651	1688				
Anteil in %		0,46	3,46	6,12	9,24	10,75	12,33	13,43	14,06	14,65	15,43	15,91	16,40	16,88	17,26					
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	9778	8989	8164	7426	6790	6402	5933	5585	5240	4913	4579	4321	4101	3871				
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	8989	8164	7426	6790	6402	5933	5585	5240	4913	4579	4321	4101	3871	3680				
2006-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	690	1642	2441	2902	3493	3906	4368	4760	5179	5503	5863	6111	6315					
		Anteil in %	6,16	14,67	21,80	25,92	31,20	34,89	39,02	42,52	46,26	49,16	52,37	54,59	56,41					
		CI Anteil in %	[5,72; 6,61]	[14,01; 15,32]	[21,04; 22,57]	[25,11; 26,73]	[30,34; 32,06]	[34,01; 35,77]	[38,11; 39,92]	[41,60; 43,43]	[45,34; 47,19]	[48,23; 50,08]	[51,45; 53,30]	[53,66; 55,51]	[55,49; 57,33]					
	davon wegen Tod	Anzahl	91	292	488	657	825	989	1186	1327	1488	1647	1809	1949	2058					
		Anteil in %	0,81	2,61	4,36	5,87	7,37	8,83	10,59	11,85	13,29	14,71	16,16	17,41	18,38					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	482	853	1026	1108	1181	1254	1357	1452	1515	1591	1665	1704	1728					
		Anteil in %	4,31	7,62	9,16	9,90	10,55	11,20	12,12	12,97	13,53	14,21	14,87	15,22	15,44					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	44	109	198	247	391	439	532	622	717	765	812	841	867					
		Anteil in %	0,39	0,97	1,77	2,21	3,49	3,92	4,75	5,56	6,40	6,83	7,25	7,51	7,74					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	73	388	729	890	1096	1224	1293	1359	1459	1500	1577	1617	1662					
Anteil in %		0,65	3,47	6,51	7,95	9,79	10,93	11,55	12,14	13,03	13,40	14,09	14,44	14,85						
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	11195	10505	9553	8754	8293	7702	7289	6827	6435	6016	5692	5332	5084	5084				
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	10505	9553	8754	8293	7702	7289	6827	6435	6016	5692	5332	5084	4880					

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2006-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	702	1880	2722	3775	4413	5103	5628	6201	6672	7119	7528	7835								
		Anteil in %	4,84	12,97	18,78	26,05	30,45	35,21	38,83	42,79	46,04	49,12	51,94	54,06								
		CI Anteil in %	[4,49; 5,19]	[12,42; 13,52]	[18,15; 19,42]	[25,33; 26,76]	[29,70; 31,20]	[34,43; 35,99]	[38,04; 39,63]	[41,98; 43,59]	[45,22; 46,85]	[48,31; 49,93]	[51,13; 52,76]	[53,25; 54,87]								
	davon wegen Tod	Anzahl	71	352	592	903	1134	1406	1607	1829	2039	2242	2449	2642								
		Anteil in %	0,49	2,43	4,08	6,23	7,82	9,70	11,09	12,62	14,07	15,47	16,90	18,23								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	535	863	995	1136	1242	1387	1506	1610	1709	1798	1867	1892								
		Anteil in %	3,69	5,95	6,87	7,84	8,57	9,57	10,39	11,11	11,79	12,41	12,88	13,05								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	33	168	244	490	615	781	891	999	1088	1164	1240	1279								
		Anteil in %	0,23	1,16	1,68	3,38	4,24	5,39	6,15	6,89	7,51	8,03	8,56	8,82								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	63	497	891	1246	1422	1529	1624	1763	1836	1915	1972	2022								
Anteil %		0,43	3,43	6,15	8,60	9,81	10,55	11,21	12,16	12,67	13,21	13,61	13,95									
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	14493	13791	12613	11771	10718	10080	9390	8865	8292	7821	7374	6965								
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	13791	12613	11771	10718	10080	9390	8865	8292	7821	7374	6965	6658								
2007-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	927	1975	3451	4395	5294	6047	6834	7482	8083	8597	9089									
		Anteil in %	5,12	10,90	19,05	24,26	29,22	33,38	37,72	41,30	44,62	47,45	50,17									
		CI Anteil in %	[4,80; 5,44]	[10,45; 11,36]	[18,48; 19,62]	[23,63; 24,88]	[28,56; 29,88]	[32,69; 34,06]	[37,02; 38,43]	[40,58; 42,02]	[43,89; 45,34]	[46,73; 48,18]	[49,44; 50,90]									
	davon wegen Tod	Anzahl	148	491	824	1142	1507	1772	2083	2377	2668	2920	3181									
		Anteil in %	0,82	2,71	4,55	6,30	8,32	9,78	11,50	13,12	14,73	16,12	17,56									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	595	818	997	1178	1348	1527	1719	1841	1963	2047	2089									
		Anteil in %	3,28	4,52	5,50	6,50	7,44	8,43	9,49	10,16	10,84	11,30	11,53									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	95	192	717	906	1132	1338	1469	1584	1661	1745	1840									
		Anteil in %	0,52	1,06	3,96	5,00	6,25	7,39	8,11	8,74	9,17	9,63	10,16									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	89	474	913	1169	1307	1410	1563	1680	1791	1885	1979									
Anteil %		0,49	2,62	5,04	6,45	7,21	7,78	8,63	9,27	9,89	10,40	10,92										
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	18117	17190	16142	14666	13722	12823	12070	11283	10635	10034	9520									
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	17190	16142	14666	13722	12823	12070	11283	10635	10034	9520	9028									
2007-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	390	1212	1895	2595	3125	3599	4013	4394	4704	4964										
		Anteil in %	3,78	11,73	18,34	25,12	30,25	34,84	38,85	42,54	45,54	48,05										
		CI Anteil in %	[3,41; 4,14]	[11,11; 12,35]	[17,60; 19,09]	[24,28; 25,96]	[29,37; 31,14]	[33,92; 35,76]	[37,91; 39,79]	[41,58; 43,49]	[44,58; 46,50]	[47,09; 49,02]										
	davon wegen Tod	Anzahl	89	297	498	716	906	1063	1226	1383	1520	1659										
		Anteil in %	0,86	2,88	4,82	6,93	8,77	10,29	11,87	13,39	14,71	16,06										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	203	346	461	597	719	819	905	997	1055	1076										
		Anteil in %	1,97	3,35	4,46	5,78	6,96	7,93	8,76	9,65	10,21	10,42										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	48	295	458	704	849	964	1053	1108	1172	1236										
		Anteil in %	0,46	2,86	4,43	6,82	8,22	9,33	10,19	10,73	11,35	11,97										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	50	274	478	578	651	753	829	906	957	993										
Anteil %		0,48	2,65	4,63	5,60	6,30	7,29	8,03	8,77	9,26	9,61											
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	10330	9940	9118	8435	7735	7205	6731	6317	5936	5626										
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	9940	9118	8435	7735	7205	6731	6317	5936	5626	5366										
2008-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	356	967	1697	2274	2729	3099	3471	3787	4047											
		Anteil in %	3,78	10,25	18,00	24,11	28,94	32,86	36,81	40,16	42,92											
		CI Anteil in %	[3,39; 4,16]	[9,64; 10,87]	[17,22; 18,77]	[23,25; 24,98]	[28,02; 29,85]	[31,92; 33,81]	[35,83; 37,78]	[39,17; 41,15]	[41,92; 43,92]											
	davon wegen Tod	Anzahl	79	229	399	558	698	839	993	1126	1261											
		Anteil in %	0,84	2,43	4,23	5,92	7,40	8,90	10,53	11,94	13,37											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	186	351	493	631	723	801	876	927	952											
		Anteil in %	1,97	3,72	5,23	6,69	7,67	8,49	9,29	9,83	10,10											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	35	145	402	596	712	793	875	935	983											
		Anteil in %	0,37	1,54	4,26	6,32	7,55	8,41	9,28	9,92	10,42											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	56	242	403	489	596	666	727	799	851											
Anteil %		0,59	2,57	4,27	5,19	6,32	7,06	7,71	8,47	9,02												
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	9430	9074	8463	7733	7156	6701	6331	5959	5643											
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	9074	8463	7733	7156	6701	6331	5959	5643	5383											

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2008-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	232	701	1153	1544	1878	2158	2405	2590												
		Anteil in %	3,54	10,70	17,60	23,57	28,66	32,94	36,71	39,53												
		CI Anteil in %	[3,09; 3,99]	[9,95; 11,45]	[16,68; 18,52]	[22,54; 24,59]	[27,57; 29,76]	[31,80; 34,07]	[35,54; 37,87]	[38,35; 40,71]												
	davon wegen Tod	Anzahl	48	193	310	431	539	656	756	865												
		Anteil in %	0,73	2,95	4,73	6,58	8,23	10,01	11,54	13,20												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	136	243	360	443	505	566	607	615												
		Anteil in %	2,08	3,71	5,49	6,76	7,71	8,64	9,26	9,39												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	30	161	308	422	507	554	629	667												
		Anteil in %	0,46	2,46	4,70	6,44	7,74	8,46	9,60	10,18												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	18	104	175	248	327	382	413	443												
Anteil in %		0,27	1,59	2,67	3,79	4,99	5,83	6,30	6,76													
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6552	6320	5851	5399	5008	4674	4394	4147												
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	6320	5851	5399	5008	4674	4394	4147	3962												
2009-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	228	620	1014	1306	1585	1803	1979													
		Anteil in %	4,13	11,22	18,35	23,63	28,68	32,62	35,81													
		CI Anteil in %	[3,60; 4,65]	[10,39; 12,05]	[17,33; 19,37]	[22,51; 24,75]	[27,48; 29,87]	[31,39; 33,86]	[34,54; 37,07]													
	davon wegen Tod	Anzahl	51	145	249	338	429	489	577													
		Anteil in %	0,92	2,62	4,51	6,12	7,76	8,85	10,44													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	133	240	316	377	432	479	498													
		Anteil in %	2,41	4,34	5,72	6,82	7,82	8,67	9,01													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	24	134	269	334	409	483	517													
		Anteil in %	0,43	2,42	4,87	6,04	7,40	8,74	9,35													
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	20	101	180	257	315	352	387													
Anteil in %		0,36	1,83	3,26	4,65	5,70	6,37	7,00														
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	5527	5299	4907	4513	4221	3942	3724													
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	5299	4907	4513	4221	3942	3724	3548													
2009-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	277	777	1180	1499	1774	1955														
		Anteil in %	4,63	12,99	19,73	25,06	29,66	32,68														
		CI Anteil in %	[4,10; 5,16]	[12,14; 13,84]	[18,72; 20,73]	[23,96; 26,16]	[28,50; 30,81]	[31,49; 33,87]														
	davon wegen Tod	Anzahl	71	194	317	412	503	575														
		Anteil in %	1,19	3,24	5,30	6,89	8,41	9,61														
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	149	260	353	423	476	495														
		Anteil in %	2,49	4,35	5,90	7,07	7,96	8,27														
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	27	171	298	392	462	509														
		Anteil in %	0,45	2,86	4,98	6,55	7,72	8,51														
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	30	152	212	272	333	376														
Anteil in %		0,50	2,54	3,54	4,55	5,57	6,29															
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	5982	5705	5205	4802	4483	4208														
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	5705	5205	4802	4483	4208	4027														
2010-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	267	771	1221	1575	1848															
		Anteil in %	4,03	11,63	18,42	23,76	27,87															
		CI Anteil in %	[3,55; 4,50]	[10,86; 12,40]	[17,48; 19,35]	[22,73; 24,78]	[26,79; 28,95]															
	davon wegen Tod	Anzahl	42	173	293	405	495															
		Anteil in %	0,63	2,61	4,42	6,11	7,47															
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	167	292	379	446	471															
		Anteil in %	2,52	4,40	5,72	6,73	7,10															
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	15	165	317	435	517															
		Anteil in %	0,23	2,49	4,78	6,56	7,80															
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	43	141	232	289	365															
Anteil in %		0,65	2,13	3,50	4,36	5,51																
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6630	6363	5859	5409	5055															
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	6363	5859	5409	5055	4782															

EZ	Bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	282	770	1239	1518																
		Anteil in %	4,22	11,52	18,54	22,72																
		CI Anteil in %	[3,74; 4,70]	[10,76; 12,29]	[17,61; 19,47]	[21,71; 23,72]																
	davon wegen Tod	Anzahl	57	180	303	436																
		Anteil in %	0,85	2,69	4,53	6,52																
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	166	296	394	409																
		Anteil in %	2,48	4,43	5,90	6,12																
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	21	178	336	411																
		Anteil in %	0,31	2,66	5,03	6,15																
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	38	116	206	262																
Anteil %		0,57	1,74	3,08	3,92																	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6682	6400	5912	5443																
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	6400	5912	5443	5164																
2011-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	254	743	1092																	
		Anteil in %	4,00	11,70	17,19																	
		CI Anteil in %	[3,52; 4,48]	[10,91; 12,49]	[16,26; 18,12]																	
	davon wegen Tod	Anzahl	40	144	234																	
		Anteil in %	0,63	2,27	3,68																	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	169	288	325																	
		Anteil in %	2,66	4,53	5,12																	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	20	181	331																	
		Anteil in %	0,31	2,85	5,21																	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	25	130	202																	
Anteil %		0,39	2,05	3,18																		
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6352	6098	5609																	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	6098	5609	5260																	
2011-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	208	570																		
		Anteil in %	3,88	10,62																		
		CI Anteil in %	[3,36; 4,39]	[9,80; 11,45]																		
	davon wegen Tod	Anzahl	45	139																		
		Anteil in %	0,84	2,59																		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	114	171																		
		Anteil in %	2,12	3,19																		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	24	156																		
		Anteil in %	0,45	2,91																		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	25	104																		
Anteil %		0,47	1,94																			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	5365	5157																		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	5157	4795																		
2012-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	127																			
		Anteil in %	2,12																			
		CI Anteil in %	[1,76; 2,48]																			
	davon wegen Tod	Anzahl	45																			
		Anteil in %	0,75																			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	53																			
		Anteil in %	0,88																			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	19																			
		Anteil in %	0,32																			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	10																			
Anteil %		0,17																				
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	5991																			
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	5864																			

In Tabelle 1.4 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmer** zur Erstdokumentation ausgewiesen. Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem steht für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebens-

jahren zum 1.1 des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

In der Kohorte 2003-1 starteten 18532 Teilnehmer in das Programm. Ihr durchschnittliches Alter betrug im Beitrittsjahr 68,06 Jahre, der Median lag bei 69,00 Jahren.

Tabelle 1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitrittsjahr
2003-1	Mean	68,06
	CI Mean	[67,91; 68,21]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>18532</i>
2003-2	Mean	66,69
	CI Mean	[66,52; 66,86]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>15338</i>
2004-1	Mean	65,93
	CI Mean	[65,66; 66,19]
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>6722</i>
2004-2	Mean	65,50
	CI Mean	[65,20; 65,80]
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>5209</i>
2005-1	Mean	66,49
	CI Mean	[66,23; 66,75]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>7326</i>
2005-2	Mean	67,16
	CI Mean	[66,93; 67,38]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>9778</i>
2006-1	Mean	67,65
	CI Mean	[67,45; 67,86]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>11195</i>
2006-2	Mean	67,65
	CI Mean	[67,47; 67,82]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>14493</i>
2007-1	Mean	68,59
	CI Mean	[68,42; 68,75]
	Median	70,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>18117</i>
2007-2	Mean	67,48
	CI Mean	[67,25; 67,71]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>10330</i>

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitrittsjahr
2008-1	Mean	67,51
	CI Mean	[67,27; 67,75]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>9430</i>
2008-2	Mean	66,45
	CI Mean	[66,15; 66,75]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>6552</i>
2009-1	Mean	66,60
	CI Mean	[66,27; 66,93]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>5527</i>
2009-2	Mean	66,19
	CI Mean	[65,87; 66,51]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>5982</i>
2010-1	Mean	66,43
	CI Mean	[66,13; 66,73]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>6630</i>
2010-2	Mean	66,28
	CI Mean	[65,98; 66,59]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>6682</i>
2011-1	Mean	66,20
	CI Mean	[65,89; 66,51]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>6352</i>
2011-2	Mean	65,95
	CI Mean	[65,61; 66,29]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>5365</i>
2012-1	Mean	66,38
	CI Mean	[66,05; 66,70]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>5991</i>

In Tabelle 1.5 ist die **Altersverteilung nach Alterskategorien** für alle Patienten im Beitrittsjahr ausgewiesen. Dargestellt sind die absoluten Anzahlen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem ist zu beachten, dass für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung steht. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter

in vollendeten Lebensjahren zum 1.1 des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

In der Kohorte 2003-1 entfielen im Beitrittsjahr 7038 Patienten auf die Altersklasse "61 bis 70" Jahre.

Tabelle 1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitrittsjahr
2003-1	bis 50	1222
	51 bis 60	2318
	61 bis 70	7038
	71 bis 80	6100
	81 und älter	1854
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>18532</i>
2003-2	bis 50	1284
	51 bis 60	2213
	61 bis 70	5944
	71 bis 80	4723
	81 und älter	1173
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>15337</i>
2004-1	bis 50	683
	51 bis 60	1053
	61 bis 70	2582
	71 bis 80	1900
	81 und älter	504
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>6722</i>
2004-2	bis 50	555
	51 bis 60	857
	61 bis 70	1957
	71 bis 80	1498
	81 und älter	341
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>5208</i>
2005-1	bis 50	728
	51 bis 60	1177
	61 bis 70	2574
	71 bis 80	2204
	81 und älter	642
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>7325</i>
2005-2	bis 50	861
	51 bis 60	1432
	61 bis 70	3444
	71 bis 80	3087
	81 und älter	954
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>9778</i>
2006-1	bis 50	914
	51 bis 60	1637
	61 bis 70	3791
	71 bis 80	3727
	81 und älter	1125
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>11194</i>
2006-2	bis 50	1107
	51 bis 60	2147
	61 bis 70	4968
	71 bis 80	4868
	81 und älter	1401
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>14491</i>

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitrittsjahr
2007-1	bis 50	1326
	51 bis 60	2613
	61 bis 70	5447
	71 bis 80	6464
	81 und älter	2267
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>18117</i>
2007-2	bis 50	1002
	51 bis 60	1625
	61 bis 70	3036
	71 bis 80	3467
	81 und älter	1199
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>10329</i>
2008-1	bis 50	953
	51 bis 60	1563
	61 bis 70	2580
	71 bis 80	3185
	81 und älter	1148
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>9429</i>
2008-2	bis 50	780
	51 bis 60	1195
	61 bis 70	1797
	71 bis 80	2051
	81 und älter	728
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>6551</i>
2009-1	bis 50	653
	51 bis 60	1063
	61 bis 70	1453
	71 bis 80	1661
	81 und älter	697
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>5527</i>
2009-2	bis 50	749
	51 bis 60	1134
	61 bis 70	1632
	71 bis 80	1792
	81 und älter	674
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>5981</i>
2010-1	bis 50	818
	51 bis 60	1301
	61 bis 70	1683
	71 bis 80	2014
	81 und älter	814
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>6630</i>
2010-2	bis 50	812
	51 bis 60	1305
	61 bis 70	1731
	71 bis 80	2061
	81 und älter	772
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>6681</i>
2011-1	bis 50	770
	51 bis 60	1317
	61 bis 70	1554
	71 bis 80	1983
	81 und älter	728
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>6352</i>
2011-2	bis 50	691
	51 bis 60	1088
	61 bis 70	1362
	71 bis 80	1612
	81 und älter	610
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>5363</i>

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebens- jahren zum 1.1. des Beitrittsjahres	Beitritts- halbjahr
2012-1	bis 50	723
	51 bis 60	1201
	61 bis 70	1407
	71 bis 80	1950
	81 und älter	709
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>5990</i>

In Tabelle 1.6 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patienten **über alle Kohorten und alle Folgehalbjahre**. In diese Auswertung fließen alle Patienten unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintritts in das DMP ein, d.h. es handelt sich um eine kohortenübergreifende Darstellung. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet

zudem keine halbjahresbezogene Betrachtung statt, sondern es wird ermittelt wie viele Folgehalbjahre die Patienten durchschnittlich Teilnehmer des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Alle Patienten sind im Durchschnitt 6,30 Folgehalbjahre als Teilnehmer in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 5,00 Folgehalbjahren.

Tabelle 1.6 Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit über alle Kohorten		Folgehalbjahre
Kohorte	Fallbezogene Beobachtungszeit über alle Kohorten	Mean	6,30
		Median	5,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>1105099</i>

In Tabelle 1.7 erfolgt die Darstellung der **mittleren und medianen Beobachtungszeit** für alle Patienten **pro Kohorte und über alle Folgehalbjahre**. Abweichend zur sonstigen Form der Auswertung findet jedoch keine halbjahresbezogene Betrachtung statt, sondern es wird ermittelt wie viele Folgehalbjahre die Patienten durchschnittlich Teilnehmer des DMP sind, sie also beobachtet werden können. Als Ergänzung zu dieser mittleren Beobachtungszeit wird zusätzlich der Median zur Beobachtungszeit ausgewiesen.

Die Patienten der Kohorte 2003-1 sind im Durchschnitt 8,52 Folgehalbjahre als Teilnehmer in das DMP eingeschrieben. Der Median dieser Beobachtungszeit liegt bei 6,00 Folgehalbjahren.

Tabelle 1.7 Patienten und ihre mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte		Folgehalbjahre
2003-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	8,52
		Median	6,00
		Halbjahressumme	157945
2003-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	8,03
		Median	6,00
		Halbjahressumme	123116
2004-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,88
		Median	6,00
		Halbjahressumme	52997
2004-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	8,43
		Median	8,00
		Halbjahressumme	43890
2005-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	8,11
		Median	8,00
		Halbjahressumme	59380
2005-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,80
		Median	9,00
		Halbjahressumme	76314
2006-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,81
		Median	10,00
		Halbjahressumme	87482
2006-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,43
		Median	10,00
		Halbjahressumme	107680
2007-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	7,07
		Median	10,00
		Halbjahressumme	128085
2007-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,49
		Median	9,00
		Halbjahressumme	67043
2008-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	6,05
		Median	8,00
		Halbjahressumme	57060
2008-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	5,46
		Median	7,00
		Halbjahressumme	35793
2009-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,81
		Median	6,00
		Halbjahressumme	26606
2009-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	4,08
		Median	5,00
		Halbjahressumme	24403
2010-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	3,42
		Median	4,00
		Halbjahressumme	22686
2010-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	2,66
		Median	3,00
		Halbjahressumme	17755
2011-1	Fallbezogene Beobachtungszeit	Mean	1,84
		Median	2,00
		Halbjahressumme	11707

EZ	Mittlere und mediane Beobachtungszeit pro Kohorte		Folgehalbjahre
	2011-2	Fallbezogene Beobachtungszeit	
Median			1,00
		<i>Halbjahressumme</i>	<i>5157</i>

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle 1.8 noch diejenigen Patienten aufgeführt, für die im Berichtshalbjahr **kein medizinischer Dokumentationsbogen** vorlag. Diese Patienten wurden bei den medizinischen Auswertungen nicht berücksichtigt. Für das Beitritts-halbjahr sind keine Patienten mit fehlender medizinischer Dokumentation ausgewiesen, da definitionsgemäß nur Patienten mit Erstdokumentation in die Evaluation einfließen können.

In der Kohorte 2003-1 waren im letzten Berichtshalbjahr 4564 Patienten in das Programm eingeschrieben. Bei 111 von Ihnen bzw. 2,43 Prozent lagen im letzten Berichtshalbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Tabelle 1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18532	16919	15229	13819	12524	11575	10657	9051	8357	7654	7302	6797	6413	6084	5724	5377	5082	4817	4564
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		3407	996	344	354	242	463	293	247	157	341	280	187	201	186	132	106	91	111
		Anteil in %		20,14	6,54	2,49	2,83	2,09	4,34	3,24	2,96	2,05	4,67	4,12	2,92	3,30	3,25	2,45	2,09	1,89	2,43
		CI Anteil in %		[19,53; 20,74]	[6,15; 6,93]	[2,23; 2,75]	[2,54; 3,12]	[1,83; 2,35]	[3,96; 4,73]	[2,87; 3,60]	[2,59; 3,32]	[1,73; 2,37]	[4,19; 5,15]	[3,65; 4,59]	[2,50; 3,33]	[2,85; 3,75]	[2,79; 3,71]	[2,04; 2,87]	[1,69; 2,48]	[1,50; 2,27]	[1,99; 2,88]
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	15338	13264	11995	10737	9767	8914	8042	7361	6677	6381	5997	5700	5383	5096	4829	4575	4304	4094	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		1361	390	289	244	341	272	350	162	296	276	265	171	163	127	140	112	122	
		Anteil in %		10,26	3,25	2,69	2,50	3,83	3,38	4,75	2,43	4,64	4,60	4,65	3,18	3,20	2,63	3,06	2,60	2,98	
		CI Anteil in %		[9,74; 10,78]	[2,93; 3,57]	[2,39; 3,00]	[2,19; 2,81]	[3,43; 4,22]	[2,99; 3,78]	[4,27; 5,24]	[2,06; 2,80]	[4,12; 5,15]	[4,07; 5,13]	[4,10; 5,20]	[2,71; 3,65]	[2,72; 3,68]	[2,18; 3,08]	[2,56; 3,56]	[2,13; 3,08]	[2,46; 3,50]	
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6722	5979	5294	4783	4296	3854	3572	3250	3080	2873	2690	2532	2401	2263	2147	2032	1951		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		331	232	165	155	123	168	116	214	169	142	124	120	91	95	70	81		
		Anteil in %		5,54	4,38	3,45	3,61	3,19	4,70	3,57	6,95	5,88	5,28	4,90	5,00	4,02	4,42	3,44	4,15		
		CI Anteil in %		[4,96; 6,12]	[3,83; 4,93]	[2,93; 3,97]	[3,05; 4,17]	[2,64; 3,75]	[4,01; 5,40]	[2,93; 4,21]	[6,05; 7,85]	[5,02; 6,74]	[4,43; 6,12]	[4,06; 5,74]	[4,13; 5,87]	[3,21; 4,83]	[3,55; 5,29]	[2,65; 4,24]	[3,27; 5,04]		
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5209	4715	4298	3897	3506	3261	3038	2910	2710	2571	2446	2321	2204	2102	2005	1906			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		260	177	149	239	241	239	322	269	259	231	243	217	222	209	208			
		Anteil in %		5,51	4,12	3,82	6,82	7,39	7,87	11,07	9,93	10,07	9,44	10,47	9,85	10,56	10,42	10,91			
		CI Anteil in %		[4,86; 6,17]	[3,52; 4,71]	[3,22; 4,43]	[5,98; 7,65]	[6,49; 8,29]	[6,91; 8,82]	[9,93; 12,21]	[8,80; 11,05]	[8,91; 11,24]	[8,28; 10,60]	[9,22; 11,72]	[8,60; 11,09]	[9,25; 11,88]	[9,09; 11,76]	[9,51; 12,31]			
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7326	6819	6209	5519	4992	4584	4340	4066	3849	3623	3415	3216	3064	2915	2769				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		327	347	227	225	172	243	192	184	120	119	90	108	99	79				
		Anteil in %		4,80	5,59	4,11	4,51	3,75	5,60	4,72	4,78	3,31	3,48	2,80	3,52	3,40	2,85				
		CI Anteil in %		[4,29; 5,30]	[5,02; 6,16]	[3,59; 4,64]	[3,93; 5,08]	[3,20; 4,30]	[4,92; 6,28]	[4,07; 5,37]	[4,11; 5,45]	[2,73; 3,90]	[2,87; 4,10]	[2,23; 3,37]	[2,87; 4,18]	[2,74; 4,05]	[2,23; 3,47]				
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	9778	8989	8164	7426	6790	6402	5933	5585	5240	4913	4579	4321	4101	3871					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		433	358	323	282	381	344	287	221	230	157	147	144	133					
		Anteil in %		4,82	4,39	4,35	4,15	5,95	5,80	5,14	4,22	4,68	3,43	3,40	3,51	3,44					
		CI Anteil in %		[4,37; 5,26]	[3,94; 4,83]	[3,89; 4,81]	[3,68; 4,63]	[5,37; 6,53]	[5,20; 6,39]	[4,56; 5,72]	[3,67; 4,76]	[4,09; 5,27]	[2,90; 3,96]	[2,86; 3,94]	[2,95; 4,07]	[2,86; 4,01]					
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	11195	10505	9553	8754	8293	7702	7289	6827	6435	6016	5692	5332	5084						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		367	406	260	488	392	316	237	265	170	190	156	123						
		Anteil in %		3,49	4,25	2,97	5,88	5,09	4,34	3,47	4,12	2,83	3,34	2,93	2,42						
		CI Anteil in %		[3,14; 3,84]	[3,85; 4,65]	[2,61; 3,33]	[5,38; 6,39]	[4,60; 5,58]	[3,87; 4,80]	[3,04; 3,91]	[3,63; 4,60]	[2,41; 3,24]	[2,87; 3,80]	[2,47; 3,38]	[2,00; 2,84]						
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	14493	13791	12613	11771	10718	10080	9390	8865	8292	7821	7374	6965							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		793	683	865	741	606	406	440	339	351	266	273							
		Anteil in %		5,75	5,42	7,35	6,91	6,01	4,32	4,96	4,09	4,49	3,61	3,92							
		CI Anteil in %		[5,36; 6,14]	[5,02; 5,81]	[6,88; 7,82]	[6,43; 7,39]	[5,55; 6,48]	[3,91; 4,74]	[4,51; 5,42]	[3,66; 4,51]	[4,03; 4,95]	[3,18; 4,03]	[3,46; 4,38]							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18117	17190	16142	14666	13722	12823	12070	11283	10635	10034	9520								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		818	1214	1036	802	548	483	475	432	343	350								
		Anteil in %		4,76	7,52	7,06	5,84	4,27	4,00	4,21	4,06	3,42	3,68								
		CI Anteil in %		[4,44; 5,08]	[7,11; 7,93]	[6,65; 7,48]	[5,45; 6,24]	[3,92; 4,62]	[3,65; 4,35]	[3,84; 4,58]	[3,69; 4,44]	[3,06; 3,77]	[3,30; 4,05]								
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10330	9940	9118	8435	7735	7205	6731	6317	5936	5626									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		634	856	649	432	347	299	263	215	236									
		Anteil in %		6,38	9,39	7,69	5,59	4,82	4,44	4,16	3,62	4,19									
		CI Anteil in %		[5,90; 6,86]	[8,79; 9,99]	[7,13; 8,26]	[5,07; 6,10]	[4,32; 5,31]	[3,95; 4,93]	[3,67; 4,66]	[3,15; 4,10]	[3,67; 4,72]									
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	9430	9074	8463	7733	7156	6701	6331	5959	5643										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		615	586	441	333	270	266	232	215										
		Anteil in %		6,78	6,92	5,70	4,65	4,03	4,20	3,89	3,81										
		CI Anteil in %		[6,26; 7,29]	[6,38; 7,47]	[5,19; 6,22]	[4,17; 5,14]	[3,56; 4,50]	[3,71; 4,70]	[3,40; 4,38]	[3,31; 4,31]										
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6552	6320	5851	5399	5008	4674	4394	4147											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		355	360	295	208	200	191	177											
		Anteil in %		5,62	6,15	5,46	4,15	4,28	4,35	4,27											
		CI Anteil in %		[5,05; 6,18]	[5,54; 6,77]	[4,86; 6,07]	[3,60; 4,71]	[3,70; 4,86]	[3,74; 4,95]	[3,65; 4,88]											

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5527	5299	4907	4513	4221	3942	3724											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		228	269	207	176	155	113											
		Anteil in %		4,30	5,48	4,59	4,17	3,93	3,03											
		CI Anteil in %		[3,76; 4,85]	[4,85; 6,12]	[3,98; 5,20]	[3,57; 4,77]	[3,33; 4,54]	[2,48; 3,59]											
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5982	5705	5205	4802	4483	4208												
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		284	271	193	170	145												
		Anteil in %		4,98	5,21	4,02	3,79	3,45												
		CI Anteil in %		[4,41; 5,54]	[4,60; 5,81]	[3,46; 4,57]	[3,23; 4,35]	[2,89; 4,00]												
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6630	6363	5859	5409	5055													
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		230	298	240	198													
		Anteil in %		3,61	5,09	4,44	3,92													
		CI Anteil in %		[3,16; 4,07]	[4,52; 5,65]	[3,89; 4,99]	[3,38; 4,45]													
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6682	6400	5912	5443														
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		270	337	222														
		Anteil in %		4,22	5,70	4,08														
		CI Anteil in %		[3,73; 4,71]	[5,11; 6,29]	[3,55; 4,60]														
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6352	6098	5609															
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		259	310															
		Anteil in %		4,25	5,53															
		CI Anteil in %		[3,74; 4,75]	[4,93; 6,12]															
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5365	5157																
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		212																
		Anteil in %		4,11																
		CI Anteil in %		[3,57; 4,65]																
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5991																	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		

Auswertungskapitel 2: Leistungserbringer

In Tabelle 2.1. ist dargestellt, wie viele **Leistungserbringer**, d.h. Ärzte bzw. stationäre Einrichtungen sich jeweils zum Stichtag 30.6. und 31.12. eines Jahres an der Behandlung der DMP-Teilnehmer in Sachsen-Anhalt beteiligten und wie viele eingeschriebene Versicherte rechnerisch auf einen Leistungserbringer entfielen. Diese Angaben werden von den Krankenkassen gesondert zur Verfügung gestellt und gelten kassenartenübergreifend.

Gemäß den Evaluationskriterien des BVA sollten folgende Leistungserbringer ausgewiesen werden:

- Hausärzte
- diabetologische Schwerpunktpraxen (Diabetologisch qualifizierte Fachärzte)
- Koordinierende diabetologisch qualifizierte Fachärzte
- Diabetologisch qualifizierte Krankenhäuser
- Diabetologisch qualifizierte Rehabilitationseinrichtungen

Die Evaluationskriterien des BVA sehen zusätzlich vor, dass für alle ausgewiesenen Leistungserbringer ergänzend dargestellt wird, wie viele Versicherte rechnerisch auf einen Leistungserbringer entfielen.

Tabelle 2.1 Leistungserbringer *

EZ		zum Stich- tag 30.06.2003	zum Stich- tag 31.12.2003	zum Stich- tag 30.06.2004	zum Stich- tag 31.12.2004	zum Stich- tag 30.06.2005	zum Stich- tag 31.12.2005	zum Stich- tag 30.06.2006	zum Stich- tag 31.12.2006	zum Stich- tag 30.06.2007	zum Stich- tag 31.12.2007	zum Stich- tag 30.06.2008	zum Stich- tag 31.12.2008	zum Stich- tag 30.06.2009	zum Stich- tag 31.12.2009	zum Stich- tag 30.06.2010	zum Stich- tag 31.12.2010	zum Stich- tag 30.06.2011	zum Stich- tag 31.12.2011	zum Stich- tag 30.06.2012
Hausärzte	Anzahl Leistungserbringer	858	1026	1056	1111	1128	1148	1172	1308	1361	1207	1347	1372	1358	1370	1372	1366	1374	1363	1367
	Veränderung**, absolut		168	30	55	17	20	24	136	53	-154	140	25	-14	12	2	-6	8	-11	4
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	14,67	47,22	58,86	66,08	71,70	79,15	85,42	83,59	95,51	120,70	115,25	117,42	122,09	123,67	122,69	125,93	127,40	130,99	131,42
diabetologische Schwerpunktpraxen*** (diabetologisch qualifizierte Fachärzte)	Anzahl Leistungserbringer	39	40	43	46	46	48	50	50	52	53	52	54	57	59	56	62	63	62	63
	Veränderung**, absolut		1	3	3	0	2	2	0	2	1	-1	2	3	2	-3	6	1	-1	1
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	322,67	1211,18	1445,40	1595,89	1758,17	1893,04	2002,24	2186,76	2499,87	2748,66	2985,48	2983,22	2908,84	2871,69	3005,89	2774,53	2778,59	2879,76	2851,68
davon koordinierende diabetologisch qualifizierte Fachärzte	Anzahl Leistungserbringer	30	31	34	37	37	39	41	42	45	47	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	Veränderung**, absolut		1	3	3	0	2	2	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	419,47	1562,81	1828,00	1984,08	2185,84	2329,90	2441,76	2603,29	2888,73	3099,55	3234,27	3356,13	3454,25	3529,79	3506,88	3583,77	3646,90	3719,69	3742,83
diabetologisch qualifizierte Krankenhäuser	Anzahl Leistungserbringer	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	16	16	16
	Veränderung**, absolut		0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0	0
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	0,00	0,00	3452,89	4078,39	4493,11	5048,11	5561,78	6074,33	7221,83	8093,28	8624,72	9476,12	9753,18	9966,47	9901,76	10118,88	10940,69	11159,06	11228,50
diabetologisch qualifizierte Rehabilitationseinrichtungen	Anzahl Leistungserbringer	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Veränderung**, absolut		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eingeschriebene Versicherte je Leistungserbringer	0,00	48447,00	62152,00	73411,00	80876,00	90866,00	100112,00	109338,00	129993,00	145679,00	155245,00	161094,00	165804,00	169430,00	168330,00	172021,00	175051,00	178545,00	179656,00
zum Vergleich: eingeschriebene Versicherte lt. KM 6/2		12584	48447	62152	73411	80876	90866	100112	109338	129993	145679	155245	161094	165804	169430	168330	172021	175051	178545	179656

* Die Daten zu den Leistungserbringern werden von der jeweils zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung (KV), bzw. vom Vertragspartner geliefert. Sollten Leistungserbringerzahlen dieses Berichtes geringfügig von den Zahlen vorhergehender Berichte abweichen, so ist dies in unterschiedlichen Zugriffszeitpunkten auf die KV Daten begründet.

** Veränderung gegenüber dem vorangegangenen Stichtag.

*** Die Anzahl der diabetologischen Schwerpunktpraxen entspricht der vom vdek übermittelten Anzahl der diabetologisch qualifizierten Fachärzte.

Auswertungskapitel 3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung

Ein wesentliches Ziel der Evaluation besteht in der Überprüfung der medizinischen Versorgungsqualität der DMP-Patienten. Hierzu werden die patientenbezogenen Angaben zum Krankheitsverlauf nach der Einschreibung in das DMP aus den Dokumentationen der Leistungserbringer ausgewertet.

Die standardisierten Tabellen für den Evaluationsbericht weisen die patientenbezogenen Ergebnisse nach Kohorten getrennt für die folgenden Bereiche und Variablen aus:

Risikofaktoren

- Gewichtsentwicklung (BMI)
- Raucherstatus
- Hypertonus

Laborwerte

- HbA1c-Werte
- Serum-Kreatinin-Werte

Medikation

- Medikation nach Medikamentengruppen

Prozessparameter

- Diabetes-Schulungen
- Hypertonie-Schulung
- Ophthalmologische Netzhautuntersuchung

Ereigniszeitanalysen: Neu auftretende Begleit- und Folgeerkrankungen, Endpunktfreiheit

- Erblindung
- Diabetische Nephropathie
- Erheblich auffälliger Fußstatus
- Amputation
- Herzinfarkt
- Schlaganfall
- Nierenersatztherapie
- Überlebensraten bei primären und sekundären Endpunkten

3.1 Risikofaktoren

In diesem Kapitel werden Auswertungen zu drei Variablen dargestellt. Zunächst werden Angaben zur Gewichtsentwicklung anhand des Body-Mass-Index (BMI) dargestellt. Der BMI wird durch den Quotienten aus Körpergewicht in kg und Körpergröße in m im Quadrat errechnet (kg/m^2). BMI-Werte unter $25 \text{ kg}/\text{m}^2$ sind als normalgewichtig, BMI-Werte zwischen 25 und $30 \text{ kg}/\text{m}^2$ als leicht übergewichtig und BMI-Werte über $30 \text{ kg}/\text{m}^2$ als übergewichtig (adipös) zu werten.

Anschließend werden Auswertungen zum Raucherstatus vorgenommen. Rauchen stellt einen der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen dar. Eine Reduktion des Raucheranteils der DMP-Patienten ist demnach eine wichtige Zielsetzung der Behandlung.

Schließlich werden Angaben zum Bluthochdruck bzw. Hypertonus gemacht, da dieser eine bedeutende Begleiterkrankung des Diabetes mit potenzierenden negativen Effekten auf die Herz-Kreislaufmorbidity und -mortality ist. Eine Senkung des Blutdrucks in den Normbereich bei den DMP-Patienten mit erhöhten Blutdruckwerten ist demnach eine weitere wichtige Zielsetzung der Behandlung.

In Tabelle 3.1.1 ist die Entwicklung des **Body-Mass-Index** ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnung, Differenzbildung und Kategorienbildung. Für die Berechnung der durchschnittlichen Differenz zwischen BMI im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei nicht um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen (plausible) Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtsjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt. Abschließend werden die Patientenzahlen in den BMI-Kategorien (normalgewichtig, leicht übergewichtig, übergewichtig) dargestellt.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitrittsjahr 18532 Patienten in das Programm eingeschrieben. In die folgenden Auswertungen konnten 18519 Patienten einbezogen werden. Im Beitrittsjahr waren 2921 Prozent der Patienten aus der Kohorte 2003-1 normal- oder untergewichtig, 6959 Prozent leicht übergewichtig und 8639 Prozent übergewichtig. Im letzten Berichtsjahr sind in dieser Kohorte von 4446 Patienten mit Angaben zum BMI 714 Prozent normal- oder untergewichtig, 1538 Prozent leicht übergewichtig und 2194 Prozent übergewichtig.

Tabelle 3.1.1 Patienten und ihr Body-Mass-Index

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18532	16919	15229	13819	12524	11575	10657	9051	8357	7654	7302	6797	6413	6084	5724	5377	5082	4817	4564	
	auswertbar	Anzahl	18519	13492	14226	13469	12165	11332	10193	8755	8105	7493	6958	6512	6220	5875	5531	5240	4972	4721	4446	
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		30,22	30,22	30,36	30,36	30,47	30,44	30,56	30,45	30,50	30,50	30,56	30,55	30,62	30,62	30,69	30,63	30,61	30,55	30,55
		CI Mean		[30,14; 30,30]	[30,12; 30,31]	[30,27; 30,45]	[30,26; 30,45]	[30,36; 30,57]	[30,33; 30,54]	[30,45; 30,68]	[30,33; 30,57]	[30,38; 30,63]	[30,36; 30,63]	[30,42; 30,70]	[30,40; 30,69]	[30,47; 30,77]	[30,47; 30,77]	[30,54; 30,85]	[30,47; 30,79]	[30,45; 30,78]	[30,38; 30,72]	[30,38; 30,73]
		Median		29,48	29,41	29,69	29,71	29,73	29,71	29,75	29,75	29,75	29,75	29,76	29,75	29,76	29,80	29,98	29,76	29,76	29,76	29,84
		Fallbasis mittlere Differenz			13489	14220	13463	12159	11327	10189	8751	8101	7489	6956	6510	6219	5874	5530	5239	4971	4720	4445
		Mittlere Differenz zur ED			-0,01	0,11	0,08	0,15	0,10	0,19	0,07	0,09	0,05	0,06	0,03	0,05	0,02	0,09	0,03	-0,01	-0,08	-0,09
		CI mittlere Differenz			[-0,04; 0,02]	[0,08; 0,14]	[0,05; 0,12]	[0,11; 0,20]	[0,06; 0,15]	[0,14; 0,23]	[0,02; 0,13]	[0,04; 0,15]	[-0,01; 0,11]	[-0,01; 0,12]	[-0,04; 0,10]	[-0,02; 0,13]	[-0,06; 0,10]	[0,01; 0,18]	[-0,06; 0,12]	[-0,11; 0,08]	[-0,18; 0,02]	[-0,19; 0,01]
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		2921	2134	2144	2045	1771	1690	1475	1327	1184	1116	1033	994	939	889	823	805	771	753	714
		Anteil in %		15,77	15,82	15,07	15,18	14,56	14,91	14,47	15,16	14,61	14,89	14,85	15,26	15,10	15,13	14,88	15,36	15,51	15,95	16,06
		CI Anteil in %		[15,25; 16,30]	[15,20; 16,43]	[14,48; 15,66]	[14,58; 15,79]	[13,93; 15,18]	[14,26; 15,57]	[13,79; 15,15]	[14,41; 15,91]	[13,84; 15,38]	[14,09; 15,70]	[14,01; 15,68]	[14,39; 16,14]	[14,21; 15,99]	[14,22; 16,05]	[13,94; 15,82]	[14,39; 16,34]	[14,50; 16,51]	[14,91; 16,99]	[14,98; 17,14]
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		6959	5087	5295	4991	4527	4225	3776	3253	2977	2748	2527	2342	2234	2084	1950	1858	1761	1653	1538
		Anteil in %		37,58	37,70	37,22	37,06	37,21	37,28	37,05	37,16	36,73	36,67	36,32	35,96	35,92	35,47	35,26	35,46	35,42	35,01	34,59
		CI Anteil in %		[36,88; 38,28]	[36,89; 38,52]	[36,43; 38,01]	[36,24; 37,87]	[36,35; 38,07]	[36,39; 38,17]	[36,11; 37,98]	[36,14; 38,17]	[35,68; 37,77]	[35,58; 37,77]	[35,19; 37,45]	[34,80; 37,13]	[34,72; 37,11]	[34,25; 36,70]	[34,00; 36,52]	[34,16; 36,75]	[34,09; 36,75]	[33,65; 36,37]	[33,19; 35,99]
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		8639	6271	6787	6433	5867	5417	4942	4175	3944	3629	3398	3176	3047	2902	2758	2577	2440	2315	2194
		Anteil in %		46,65	46,48	47,71	47,76	48,23	47,80	48,48	47,69	48,66	48,43	48,84	48,77	48,99	49,40	49,86	49,18	49,07	49,04	49,35
		CI Anteil in %		[45,93; 47,37]	[45,64; 47,32]	[46,89; 48,53]	[46,92; 48,61]	[47,34; 49,12]	[46,88; 48,72]	[47,51; 49,45]	[46,64; 48,73]	[47,57; 49,75]	[47,30; 49,56]	[47,66; 50,01]	[47,56; 49,99]	[47,74; 50,23]	[48,12; 50,67]	[48,55; 51,18]	[47,83; 50,53]	[47,69; 50,46]	[47,61; 50,46]	[47,88; 50,82]
	2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	15338	13264	11995	10737	9767	8914	8042	7361	6677	6381	5997	5700	5383	5096	4829	4575	4304	4094	
		auswertbar	Anzahl	15309	11889	11594	10439	9511	8561	7759	7002	6507	6075	5709	5420	5197	4919	4690	4424	4183	3963	
Auswertungs- ergebnisse zum BMI		Mean		30,48	30,66	30,61	30,70	30,66	30,76	30,68	30,76	30,71	30,82	30,73	30,78	30,80	30,89	30,78	30,79	30,76	30,77	
		CI Mean		[30,39; 30,57]	[30,56; 30,76]	[30,50; 30,71]	[30,59; 30,81]	[30,55; 30,77]	[30,64; 30,88]	[30,55; 30,81]	[30,63; 30,89]	[30,58; 30,85]	[30,68; 30,96]	[30,58; 30,87]	[30,63; 30,93]	[30,64; 30,95]	[30,73; 31,06]	[30,61; 30,94]	[30,62; 30,96]	[30,59; 30,94]	[30,59; 30,95]	
		Median		29,75	29,97	29,97	30,08	30,07	30,12	30,06	30,11	30,08	30,11	30,07	30,09	30,10	30,10	30,10	30,06	30,07	30,06	
		Fallbasis mittlere Differenz			11881	11587	10434	9507	8556	7754	6997	6503	6071	5705	5416	5193	4915	4686	4420	4179	3959	
		Mittlere Differenz zur ED			0,13	0,08	0,15	0,09	0,19	0,06	0,09	0,04	0,09	-0,02	0,02	0,00	0,09	-0,04	-0,05	-0,08	-0,08	
		CI mittlere Differenz			[0,10; 0,16]	[0,04; 0,11]	[0,11; 0,19]	[0,05; 0,14]	[0,14; 0,24]	[0,01; 0,12]	[0,03; 0,15]	[-0,03; 0,10]	[0,02; 0,15]	[-0,09; 0,05]	[-0,06; 0,09]	[-0,09; 0,08]	[0,00; 0,18]	[-0,13; 0,05]	[-0,15; 0,04]	[-0,18; 0,01]	[-0,18; 0,01]	
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pat. in Kategorie BMI < 25		Anzahl		2210	1623	1578	1396	1254	1086	1003	863	833	732	755	691	669	633	627	575	543	493	
		Anteil in %		14,44	13,65	13,61	13,37	13,18	12,69	12,93	12,33	12,80	12,05	13,22	12,75	12,87	12,87	13,37	13,00	12,98	12,44	
		CI Anteil in %		[13,88; 14,99]	[13,03; 14,27]	[12,99; 14,23]	[12,72; 14,03]	[12,50; 13,86]	[11,98; 13,39]	[12,18; 13,67]	[11,56; 13,10]	[11,99; 13,61]	[11,23; 12,87]	[12,35; 13,64]	[11,86; 13,78]	[11,96; 13,80]	[11,93; 13,80]	[12,39; 14,34]	[12,01; 13,99]	[11,96; 14,00]	[11,41; 13,47]	
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30		Anzahl		5659	4350	4249	3758	3449	3076	2836	2551	2374	2235	2079	1966	1879	1767	1678	1612	1524	1469	
		Anteil in %		36,97	36,59	36,65	36,00	36,26	35,93	36,55	36,43	36,48	36,79	36,42	36,27	36,16	35,92	35,78	36,44	36,43	37,07	
		CI Anteil in %		[36,20; 37,73]	[35,72; 37,45]	[35,77; 37,53]	[35,08; 36,92]	[35,30; 37,23]	[34,91; 36,95]	[35,48; 37,62]	[35,31; 37,56]	[35,31; 37,65]	[35,58; 38,00]	[35,17; 37,66]	[34,99; 37,55]	[34,85; 37,46]	[34,58; 37,26]	[34,41; 37,15]	[35,02; 37,86]	[34,97; 37,89]	[35,56; 38,57]	
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30		Anzahl		7440	5916	5767	5285	4808	4399	3920	3588	3300	3108	2875	2763	2649	2519	2385	2237	2116	2001	
		Anteil in %		48,60	49,76	49,74	50,63	50,55	51,38	50,52	51,24	50,71	51,16	50,36	50,98	50,97	51,21	50,85	50,57	50,59	50,49	
		CI Anteil in %		[47,81; 49,39]	[48,86; 50,66]	[48,83; 50,65]	[49,67; 51,59]	[49,55; 51,56]	[50,33; 52,44]	[49,41; 51,63]	[50,07; 52,41]	[49,50; 51,93]	[49,90; 52,42]	[49,06; 51,66]	[49,65; 52,31]	[49,61; 52,33]	[49,81; 52,61]	[49,42; 52,28]	[49,09; 52,04]	[49,07; 52,10]	[48,94; 52,05]	

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6722	5979	5294	4783	4296	3854	3572	3250	3080	2873	2690	2532	2401	2263	2147	2032	1951			
	auswertbar	Anzahl	6718	5642	5058	4614	4137	3729	3403	3133	2864	2702	2542	2402	2273	2164	2045	1956	1865			
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		30,78	30,75	30,83	30,81	30,97	30,88	30,96	30,85	30,85	30,89	30,93	30,89	30,95	30,87	30,86	30,93	30,99		
		CI Mean		[30,64; 30,92]	[30,59; 30,90]	[30,67; 30,99]	[30,65; 30,98]	[30,79; 31,14]	[30,69; 31,07]	[30,77; 31,16]	[30,65; 31,06]	[30,64; 31,07]	[30,67; 31,11]	[30,70; 31,16]	[30,65; 31,12]	[30,71; 31,20]	[30,62; 31,12]	[30,60; 31,11]	[30,67; 31,20]	[30,72; 31,26]		
		Median		30,08	30,08	30,11	30,11	30,41	30,22	30,12	30,10	30,10	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,10	30,12	30,12	30,12	
		Fallbasis mittlere Differenz			5642	5058	4614	4137	3729	3403	3133	2864	2701	2541	2401	2272	2163	2044	1955	1865		
		Mittlere Differenz zur ED			-0,12	-0,05	-0,09	-0,04	-0,12	-0,13	-0,21	-0,21	-0,23	-0,23	-0,29	-0,27	-0,36	-0,41	-0,42	-0,41		
		CI mittlere Differenz			[-0,17; - 0,06]	[-0,11; 0,01]	[-0,16; - 0,03]	[-0,11; 0,03]	[-0,20; - 0,04]	[-0,22; - 0,05]	[-0,31; - 0,12]	[-0,30; - 0,11]	[-0,34; - 0,12]	[-0,35; - 0,11]	[-0,42; - 0,17]	[-0,39; - 0,14]	[-0,49; - 0,23]	[-0,55; - 0,28]	[-0,55; - 0,28]	[-0,55; - 0,27]		
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35		
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		856	755	630	586	506	462	420	400	364	366	331	324	293	292	277	262	245		
		Anteil in %		12,74	13,38	12,46	12,70	12,23	12,39	12,34	12,77	12,71	13,55	13,02	13,49	12,89	13,49	13,55	13,39	13,14		
		CI Anteil in %		[11,94; 13,54]	[12,49; 14,27]	[11,55; 13,37]	[11,74; 13,66]	[11,23; 13,23]	[11,33; 13,45]	[11,24; 13,45]	[11,60; 13,94]	[11,49; 13,93]	[12,25; 14,84]	[11,71; 14,33]	[12,12; 14,86]	[11,51; 14,27]	[12,05; 14,93]	[12,06; 15,03]	[11,88; 14,90]	[11,60; 14,67]		
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		2453	2018	1834	1647	1445	1319	1212	1129	1032	939	907	844	801	758	721	686	651		
		Anteil in %		36,51	35,77	36,26	35,70	34,93	35,37	35,62	36,04	36,03	34,75	35,68	35,14	35,24	35,03	35,26	35,07	34,91		
		CI Anteil in %		[35,36; 37,67]	[34,52; 37,02]	[34,93; 37,58]	[34,31; 37,08]	[33,48; 36,38]	[33,84; 36,91]	[34,01; 37,22]	[34,35; 37,72]	[34,27; 37,79]	[32,96; 36,55]	[33,82; 37,54]	[33,23; 37,05]	[33,28; 37,20]	[33,02; 37,04]	[33,19; 37,33]	[32,96; 37,19]	[32,74; 37,07]		
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		3409	2869	2594	2381	2186	1948	1771	1604	1468	1397	1304	1234	1179	1114	1047	1008	969		
		Anteil in %		50,74	50,85	51,29	51,60	52,84	52,24	52,04	51,20	51,26	51,70	51,30	51,37	51,87	51,48	51,20	51,53	51,96		
		CI Anteil in %		[49,55; 51,94]	[49,55; 52,16]	[49,91; 52,66]	[50,16; 53,05]	[51,32; 54,36]	[50,64; 53,84]	[50,36; 53,72]	[49,45; 52,95]	[49,43; 53,09]	[49,82; 53,59]	[49,35; 53,24]	[49,37; 53,37]	[49,82; 53,92]	[49,37; 53,58]	[49,03; 53,37]	[49,32; 53,75]	[49,69; 54,23]		
	2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5209	4715	4298	3897	3506	3261	3038	2910	2710	2571	2446	2321	2204	2102	2005	1906			
		auswertbar	Anzahl	5202	4452	4116	3744	3264	3018	2796	2585	2438	2306	2211	2073	1982	1877	1793	1694			
		Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		30,83	30,91	30,87	30,95	30,90	30,94	30,92	31,02	31,00	31,06	31,00	31,06	31,01	30,96	30,99	30,92		
			CI Mean		[30,67; 30,98]	[30,73; 31,09]	[30,69; 31,04]	[30,77; 31,14]	[30,69; 31,10]	[30,73; 31,14]	[30,70; 31,14]	[30,79; 31,25]	[30,76; 31,24]	[30,81; 31,31]	[30,75; 31,25]	[30,80; 31,32]	[30,74; 31,28]	[30,68; 31,23]	[30,71; 31,27]	[30,62; 31,21]		
			Median		30,11	30,12	30,12	30,35	30,12	30,12	30,12	30,30	30,29	30,31	30,25	30,30	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	
			Fallbasis mittlere Differenz			4449	4115	3743	3263	3017	2795	2584	2437	2305	2210	2072	1981	1876	1792	1693		
Mittlere Differenz zur ED					0,02	-0,03	0,04	-0,02	0,02	-0,09	-0,04	-0,07	-0,04	-0,18	-0,15	-0,25	-0,32	-0,34	-0,35			
CI mittlere Differenz					[-0,04; 0,08]	[-0,09; 0,04]	[-0,04; 0,13]	[-0,12; 0,08]	[-0,07; 0,11]	[-0,19; 0,01]	[-0,15; 0,06]	[-0,19; 0,04]	[-0,16; 0,08]	[-0,30; - 0,05]	[-0,28; - 0,01]	[-0,39; - 0,10]	[-0,47; - 0,17]	[-0,50; - 0,19]	[-0,51; - 0,19]			
Median mittlere Differenz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31			
Pat. in Kategorie BMI < 25		Anzahl		697	582	551	492	441	403	362	332	332	305	297	281	264	261	236	239			
		Anteil in %		13,40	13,07	13,39	13,14	13,51	13,35	12,95	12,84	13,62	13,23	13,43	13,56	13,32	13,91	13,16	14,11			
		CI Anteil in %		[12,47; 14,32]	[12,08; 14,06]	[12,35; 14,43]	[12,06; 14,22]	[12,34; 14,68]	[12,14; 14,57]	[11,70; 14,19]	[11,55; 14,13]	[12,26; 14,98]	[11,84; 14,61]	[12,01; 14,85]	[12,08; 15,03]	[11,82; 14,82]	[12,34; 15,47]	[11,60; 14,73]	[12,45; 15,77]			
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30		Anzahl		1833	1574	1434	1286	1147	1048	1002	902	837	802	764	702	690	644	613	573			
		Anteil in %		35,24	35,35	34,84	34,35	35,14	34,72	35,84	34,89	34,33	34,78	34,55	33,86	34,81	34,31	34,19	33,83			
		CI Anteil in %		[33,94; 36,53]	[33,95; 36,76]	[33,38; 36,30]	[32,83; 35,87]	[33,50; 36,78]	[33,03; 36,42]	[34,06; 37,61]	[33,06; 36,73]	[32,45; 36,22]	[32,83; 36,72]	[32,57; 36,54]	[31,83; 35,90]	[32,72; 36,91]	[32,16; 36,46]	[31,99; 36,38]	[31,57; 36,08]			
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30		Anzahl		2672	2296	2131	1966	1676	1567	1432	1351	1269	1199	1150	1090	1028	972	944	882			
		Anteil in %		51,36	51,57	51,77	52,51	51,35	51,92	51,22	52,26	52,05	51,99	52,01	52,58	51,87	52,65	52,07				
		CI Anteil in %		[50,01; 52,72]	[50,10; 53,04]	[50,25; 53,30]	[50,91; 54,11]	[49,63; 53,06]	[50,14; 53,70]	[49,36; 53,07]	[50,34; 54,19]	[50,07; 54,03]	[49,96; 54,03]	[49,93; 54,10]	[50,43; 54,73]	[49,67; 54,07]	[49,52; 54,05]	[50,34; 54,96]	[49,69; 54,45]			

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7326	6819	6209	5519	4992	4584	4340	4066	3849	3623	3415	3216	3064	2915	2769					
	auswertbar	Anzahl	7316	6484	5856	5288	4762	4409	4092	3854	3647	3483	3281	3112	2942	2805	2678					
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		30,86	30,77	30,82	30,76	30,84	30,81	30,86	30,83	30,96	30,89	30,92	30,88	30,92	30,87	30,94				
		CI Mean		[30,73; 30,99]	[30,63; 30,91]	[30,67; 30,92]	[30,61; 30,92]	[30,67; 31,00]	[30,64; 30,98]	[30,68; 31,03]	[30,65; 31,02]	[30,77; 31,15]	[30,69; 31,08]	[30,73; 31,12]	[30,68; 31,08]	[30,71; 31,12]	[30,66; 31,09]	[30,72; 31,15]				
		Median		30,10	30,04	30,08	29,98	30,08	30,08	30,08	30,11	30,12	30,11	30,12	30,12	30,12	30,12	30,11	30,12			
		Fallbasis mittlere Differenz			6483	5854	5286	4760	4407	4091	3853	3646	3482	3281	3112	2942	2805	2678				
		Mittlere Differenz zur ED			-0,11	-0,04	-0,11	-0,10	-0,16	-0,14	-0,13	-0,12	-0,17	-0,14	-0,19	-0,24	-0,28	-0,27				
		CI mittlere Differenz			[-0,15; - 0,06]	[-0,09; 0,02]	[-0,17; - 0,05]	[-0,17; - 0,04]	[-0,23; - 0,10]	[-0,21; - 0,06]	[-0,22; - 0,04]	[-0,21; - 0,02]	[-0,26; - 0,07]	[-0,23; - 0,04]	[-0,30; - 0,09]	[-0,34; - 0,13]	[-0,39; - 0,16]	[-0,39; - 0,16]				
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,31				
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		915	810	742	666	573	542	485	478	437	417	399	377	354	344	324				
		Anteil in %		12,51	12,49	12,67	12,59	12,03	12,29	11,85	12,40	11,98	11,97	12,16	12,11	12,03	12,26	12,10				
		CI Anteil in %		[11,75; 13,26]	[11,69; 13,30]	[11,82; 13,52]	[11,70; 13,49]	[11,11; 12,96]	[11,32; 13,26]	[10,86; 12,84]	[11,36; 13,44]	[10,93; 13,04]	[10,89; 13,05]	[11,04; 13,28]	[10,97; 13,26]	[10,86; 13,21]	[11,05; 13,48]	[10,86; 13,33]				
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		2659	2415	2140	1984	1762	1632	1524	1411	1339	1289	1189	1135	1065	1024	974				
		Anteil in %		36,34	37,25	36,54	37,52	37,00	37,02	37,24	36,61	36,72	37,01	36,24	36,47	36,20	36,51	36,37				
		CI Anteil in %		[35,24; 37,45]	[36,07; 38,42]	[35,31; 37,78]	[36,21; 38,82]	[35,63; 38,37]	[35,59; 38,44]	[35,76; 38,72]	[35,09; 38,13]	[35,15; 38,28]	[35,40; 38,61]	[34,59; 37,88]	[34,78; 38,16]	[34,46; 37,94]	[34,72; 38,29]	[34,55; 38,19]				
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		3742	3259	2974	2638	2427	2235	2083	1965	1871	1777	1693	1600	1523	1437	1380				
		Anteil in %		51,15	50,26	50,79	49,89	50,97	50,69	50,90	50,99	51,30	51,02	51,60	51,41	51,77	51,23	51,53				
		CI Anteil in %		[50,00; 52,29]	[49,05; 51,48]	[49,50; 52,07]	[48,54; 51,23]	[49,55; 52,39]	[49,22; 52,17]	[49,37; 52,44]	[49,41; 52,56]	[49,68; 52,92]	[49,36; 52,68]	[49,89; 53,31]	[49,66; 53,17]	[49,96; 53,57]	[49,38; 53,08]	[49,64; 53,42]				
	2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	9778	8989	8164	7426	6790	6402	5933	5585	5240	4913	4579	4321	4101	3871					
		auswertbar	Anzahl	9757	8540	7797	7094	6497	6006	5578	5283	5007	4671	4413	4165	3947	3726					
		Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		30,81	30,87	30,86	30,88	30,85	30,92	30,90	30,98	30,99	31,05	31,04	31,03	31,01	31,00				
CI Mean				[30,70; 30,93]	[30,75; 31,00]	[30,74; 30,99]	[30,75; 31,02]	[30,71; 30,99]	[30,78; 31,07]	[30,75; 31,05]	[30,83; 31,14]	[30,83; 31,15]	[30,88; 31,22]	[30,86; 31,21]	[30,86; 31,21]	[30,83; 31,20]	[30,82; 31,19]					
Median				30,09	30,12	30,12	30,25	30,12	30,25	30,12	30,30	30,25	30,42	30,39	30,41	30,39	30,39					
Fallbasis mittlere Differenz					8535	7793	7090	6493	6002	5574	5279	5003	4668	4410	4163	3945	3724					
Mittlere Differenz zur ED					0,09	0,01	0,03	-0,08	-0,03	-0,11	-0,09	-0,13	-0,13	-0,18	-0,21	-0,26	-0,29					
CI mittlere Differenz					[0,04; 0,13]	[-0,03; 0,06]	[-0,02; 0,08]	[-0,14; - 0,02]	[-0,09; 0,03]	[-0,18; - 0,04]	[-0,16; - 0,02]	[-0,21; - 0,06]	[-0,21; - 0,05]	[-0,27; - 0,10]	[-0,30; - 0,13]	[-0,35; - 0,17]	[-0,39; - 0,19]					
Median mittlere Differenz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pat. in Kategorie BMI < 25		Anzahl		1320	1137	1056	950	871	790	730	671	652	585	565	528	522	480					
		Anteil in %		13,53	13,31	13,54	13,39	13,41	13,15	13,09	12,70	13,02	12,52	12,80	12,68	13,23	12,88					
		CI Anteil in %		[12,85; 14,21]	[12,59; 14,03]	[12,78; 14,30]	[12,60; 14,18]	[12,58; 14,23]	[12,30; 14,01]	[12,20; 13,97]	[11,80; 13,60]	[12,09; 13,95]	[11,57; 13,47]	[11,82; 13,79]	[11,67; 13,69]	[12,17; 14,28]	[11,81; 13,96]					
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30		Anzahl		3457	3014	2721	2451	2262	2068	1967	1850	1741	1615	1522	1443	1334	1288					
		Anteil in %		35,43	35,29	34,90	34,55	34,82	34,43	35,26	35,02	34,77	34,58	34,49	34,65	33,80	34,57					
		CI Anteil in %		[34,48; 36,38]	[34,28; 36,31]	[33,84; 35,96]	[33,44; 35,66]	[33,66; 35,97]	[33,23; 35,63]	[34,01; 36,52]	[33,73; 36,30]	[33,45; 36,09]	[33,21; 35,94]	[33,09; 35,89]	[33,20; 36,09]	[32,32; 35,27]	[33,04; 36,10]					
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30		Anzahl		4980	4389	4020	3693	3364	3148	2881	2762	2614	2471	2326	2194	2091	1958					
		Anteil in %		51,04	51,39	51,56	52,06	51,78	52,41	51,65	52,28	52,21	52,90	52,71	52,68	52,98	52,55					
		CI Anteil in %		[50,05; 52,03]	[50,33; 52,45]	[50,45; 52,67]	[50,90; 53,22]	[50,56; 52,99]	[51,15; 53,68]	[50,34; 52,96]	[50,93; 53,63]	[50,82; 53,59]	[51,47; 54,33]	[51,23; 54,18]	[51,16; 54,19]	[51,42; 54,53]	[50,95; 54,15]					

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr					
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	11195	10505	9553	8754	8293	7702	7289	6827	6435	6016	5692	5332	5084										
	auswertbar	Anzahl	11145	10099	9106	8456	7765	7272	6933	6552	6136	5810	5468	5143	4930										
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		31,04	30,95	31,05	31,01	31,08	31,04	31,10	31,13	31,20	31,12	31,15	31,13	31,17									
		CI Mean		[30,93; 31,15]	[30,83; 31,06]	[30,93; 31,17]	[30,88; 31,13]	[30,95; 31,21]	[30,91; 31,18]	[30,96; 31,24]	[30,99; 31,28]	[31,05; 31,36]	[30,96; 31,27]	[30,99; 31,32]	[30,96; 31,30]	[31,00; 31,34]									
		Median		30,25	30,12	30,22	30,33	30,41	30,25	30,22	30,25	30,39	30,12	30,35	30,12	30,37									
		Fallbasis mittlere Differenz			10094	9102	8452	7761	7268	6929	6548	6134	5807	5466	5141	4928									
		Mittlere Differenz zur ED			-0,12	-0,05	-0,10	-0,07	-0,11	-0,08	-0,09	-0,09	-0,18	-0,19	-0,23	-0,25									
		CI mittlere Differenz			[-0,16; - 0,08]	[-0,09; - 0,01]	[-0,14; - 0,05]	[-0,12; - 0,02]	[-0,17; - 0,05]	[-0,14; - 0,03]	[-0,15; - 0,02]	[-0,16; - 0,02]	[-0,25; - 0,10]	[-0,27; - 0,12]	[-0,31; - 0,15]	[-0,33; - 0,17]									
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		1405	1302	1127	1036	971	917	859	836	773	754	705	651	587									
		Anteil in %		12,61	12,89	12,38	12,25	12,50	12,61	12,39	12,76	12,60	12,98	12,89	12,66	11,91									
		CI Anteil in %		[11,99; 13,22]	[12,24; 13,55]	[11,70; 13,05]	[11,55; 12,95]	[11,77; 13,24]	[11,85; 13,37]	[11,61; 13,17]	[11,95; 13,57]	[11,77; 13,43]	[12,11; 13,84]	[12,00; 13,78]	[11,75; 13,57]	[11,00; 12,81]									
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		3906	3600	3222	3003	2693	2552	2445	2274	2118	2035	1892	1806	1756									
		Anteil in %		35,05	35,65	35,38	35,51	34,68	35,09	35,27	34,71	34,52	35,03	34,60	35,12	35,62									
		CI Anteil in %		[34,16; 35,93]	[34,71; 36,58]	[34,40; 36,37]	[34,49; 36,53]	[33,62; 35,74]	[34,00; 36,19]	[34,14; 36,39]	[33,55; 35,86]	[33,33; 35,71]	[33,80; 36,25]	[33,34; 35,86]	[33,81; 36,42]	[34,28; 36,96]									
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		5834	5197	4757	4417	4101	3803	3629	3442	3245	3021	2871	2686	2587									
		Anteil in %		52,35	51,46	52,24	52,24	52,81	52,30	52,34	52,53	52,88	52,00	52,51	52,23	52,47									
		CI Anteil in %		[51,42; 53,27]	[50,49; 52,44]	[51,21; 53,27]	[51,17; 53,30]	[51,70; 53,92]	[51,15; 53,44]	[51,17; 53,52]	[51,32; 53,74]	[51,64; 54,13]	[50,71; 53,28]	[51,18; 53,83]	[50,86; 53,59]	[51,08; 53,87]									
	2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	14493	13791	12613	11771	10718	10080	9390	8865	8292	7821	7374	6965										
		auswertbar	Anzahl	14392	12908	11846	10824	9893	9388	8899	8345	7878	7398	7033	6620										
		Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		30,82	30,87	30,83	30,86	30,82	30,87	30,87	30,92	30,86	30,93	30,88	30,89									
CI Mean				[30,72; 30,91]	[30,77; 30,97]	[30,73; 30,94]	[30,75; 30,97]	[30,70; 30,94]	[30,75; 30,99]	[30,75; 31,00]	[30,79; 31,05]	[30,73; 30,99]	[30,79; 31,06]	[30,74; 31,02]	[30,75; 31,04]										
Median				30,08	30,11	30,11	30,11	30,07	30,09	30,07	30,10	30,08	30,10	30,06	30,06										
Fallbasis mittlere Differenz					12900	11838	10817	9887	9383	8894	8342	7875	7395	7030	6617										
Mittlere Differenz zur ED					0,06	-0,02	0,00	-0,07	-0,04	-0,09	-0,06	-0,14	-0,13	-0,15	-0,18										
CI mittlere Differenz					[0,02; 0,09]	[-0,06; 0,02]	[-0,05; 0,04]	[-0,12; - 0,03]	[-0,10; 0,01]	[-0,14; - 0,03]	[-0,12; 0,00]	[-0,20; - 0,08]	[-0,19; - 0,06]	[-0,22; - 0,08]	[-0,25; - 0,11]										
Median mittlere Differenz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Pat. in Kategorie BMI < 25		Anzahl		1979	1751	1629	1485	1359	1255	1212	1112	1078	980	946	887										
		Anteil in %		13,75	13,57	13,75	13,72	13,74	13,37	13,62	13,33	13,68	13,25	13,45	13,40										
		CI Anteil in %		[13,19; 14,31]	[12,97; 14,16]	[13,13; 14,37]	[13,07; 14,37]	[13,06; 14,42]	[12,68; 14,06]	[12,91; 14,33]	[12,60; 14,05]	[12,92; 14,44]	[12,47; 14,02]	[12,65; 14,25]	[12,58; 14,22]										
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30		Anzahl		5108	4529	4142	3795	3533	3356	3184	2973	2809	2647	2536	2397										
		Anteil in %		35,49	35,09	34,97	35,06	35,71	35,75	35,78	35,63	35,66	35,78	36,06	36,21										
		CI Anteil in %		[34,71; 36,27]	[34,26; 35,91]	[34,11; 35,82]	[34,16; 35,96]	[34,77; 36,66]	[34,78; 36,72]	[34,78; 36,78]	[34,60; 36,65]	[34,60; 36,71]	[34,69; 36,87]	[34,94; 37,18]	[35,05; 37,37]										
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30		Anzahl		7305	6628	6075	5544	5001	4777	4503	4260	3991	3771	3551	3336										
		Anteil in %		50,76	51,35	51,28	51,22	50,55	50,88	50,60	51,05	50,66	50,97	50,49	50,39										
		CI Anteil in %		[49,94; 51,57]	[50,49; 52,21]	[50,38; 52,18]	[50,28; 52,16]	[49,57; 51,54]	[49,87; 51,90]	[49,56; 51,64]	[49,98; 52,12]	[49,56; 51,76]	[49,83; 52,11]	[49,32; 51,66]	[49,19; 51,60]										

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18117	17190	16142	14666	13722	12823	12070	11283	10635	10034	9520								
	auswertbar	Anzahl	18008	16278	14842	13540	12757	12185	11489	10717	10118	9610	9086								
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		30,81	30,77	30,83	30,78	30,78	30,82	30,87	30,82	30,89	30,84	30,85							
		CI Mean		[30,72; 30,89]	[30,68; 30,86]	[30,74; 30,93]	[30,68; 30,87]	[30,67; 30,88]	[30,72; 30,93]	[30,76; 30,97]	[30,71; 30,93]	[30,77; 31,00]	[30,72; 30,96]	[30,73; 30,97]							
		Median		30,08	30,02	30,08	30,00	30,02	30,04	30,09	30,04	30,08	30,04	30,04							
		Fallbasis mittlere Differenz			16264	14831	13528	12745	12174	11480	10710	10113	9605	9082							
		Mittlere Differenz zur ED			-0,08	-0,09	-0,18	-0,18	-0,22	-0,18	-0,25	-0,24	-0,32	-0,35							
		CI mittlere Differenz			[-0,11; - 0,05]	[-0,13; - 0,06]	[-0,22; - 0,15]	[-0,22; - 0,14]	[-0,26; - 0,17]	[-0,23; - 0,13]	[-0,30; - 0,20]	[-0,29; - 0,19]	[-0,38; - 0,27]	[-0,40; - 0,29]							
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		2431	2255	2042	1856	1782	1672	1545	1471	1385	1308	1253							
		Anteil in %		13,50	13,85	13,76	13,71	13,97	13,72	13,45	13,73	13,69	13,61	13,79							
		CI Anteil in %		[13,00; 14,00]	[13,32; 14,38]	[13,20; 14,31]	[13,13; 14,29]	[13,37; 14,57]	[13,11; 14,33]	[12,82; 14,07]	[13,07; 14,38]	[13,02; 14,36]	[12,93; 14,30]	[13,08; 14,50]							
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		6456	5870	5250	4915	4586	4375	4105	3875	3604	3478	3272							
		Anteil in %		35,85	36,06	35,37	36,30	35,95	35,90	35,73	36,16	35,62	36,19	36,01							
		CI Anteil in %		[35,15; 36,55]	[35,32; 36,80]	[34,60; 36,14]	[35,49; 37,11]	[35,12; 36,78]	[35,05; 36,76]	[34,85; 36,61]	[35,25; 37,07]	[34,69; 36,55]	[35,23; 37,15]	[35,02; 37,00]							
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		9121	8153	7550	6769	6389	6138	5839	5371	5129	4824	4561							
		Anteil in %		50,65	50,09	50,87	49,99	50,08	50,37	50,82	50,12	50,69	50,20	50,20							
		CI Anteil in %		[49,92; 51,38]	[49,32; 50,85]	[50,06; 51,67]	[49,15; 50,83]	[49,21; 50,95]	[49,49; 51,26]	[49,91; 51,74]	[49,17; 51,06]	[49,72; 51,67]	[49,20; 51,20]	[49,17; 51,23]							
	2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10330	9940	9118	8435	7735	7205	6731	6317	5936	5626								
		auswertbar	Anzahl	10263	9251	8207	7719	7249	6805	6383	6001	5675	5350								
Auswertungs- ergebnisse zum BMI		Mean		30,85	30,95	30,84	30,89	30,95	31,01	30,97	30,96	30,97	30,97								
		CI Mean		[30,73; 30,97]	[30,82; 31,07]	[30,71; 30,97]	[30,76; 31,03]	[30,81; 31,09]	[30,86; 31,15]	[30,82; 31,12]	[30,81; 31,11]	[30,81; 31,12]	[30,81; 31,13]								
		Median		30,04	30,11	29,98	30,04	30,10	30,12	30,11	30,10	30,08	30,12								
		Fallbasis mittlere Differenz			9245	8201	7714	7245	6801	6379	5998	5672	5348								
		Mittlere Differenz zur ED			0,02	-0,11	-0,06	-0,09	-0,08	-0,15	-0,17	-0,21	-0,22								
		CI mittlere Differenz			[-0,03; 0,06]	[-0,16; - 0,06]	[-0,11; 0,00]	[-0,15; - 0,03]	[-0,15; - 0,02]	[-0,22; - 0,09]	[-0,24; - 0,10]	[-0,28; - 0,14]	[-0,30; - 0,15]								
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Pat. in Kategorie BMI < 25		Anzahl		1458	1292	1142	1055	973	904	839	799	751	724								
		Anteil in %		14,21	13,97	13,91	13,67	13,42	13,28	13,14	13,31	13,23	13,53								
		CI Anteil in %		[13,53; 14,88]	[13,26; 14,67]	[13,17; 14,66]	[12,90; 14,43]	[12,64; 14,21]	[12,48; 14,09]	[12,32; 13,97]	[12,45; 14,17]	[12,35; 14,12]	[12,62; 14,45]								
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30		Anzahl		3655	3245	2969	2775	2581	2400	2264	2135	2029	1867								
		Anteil in %		35,61	35,08	36,18	35,95	35,60	35,27	35,47	35,58	35,75	34,90								
		CI Anteil in %		[34,69; 36,54]	[34,10; 36,05]	[35,14; 37,22]	[34,88; 37,02]	[34,50; 36,71]	[34,13; 36,40]	[34,30; 36,64]	[34,37; 36,79]	[34,51; 37,00]	[33,62; 36,17]								
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30		Anzahl		5150	4714	4096	3889	3695	3501	3280	3067	2895	2759								
		Anteil in %		50,18	50,96	49,91	50,38	50,97	51,45	51,39	51,11	51,01	51,57								
		CI Anteil in %		[49,21; 51,15]	[49,94; 51,98]	[48,83; 50,99]	[49,27; 51,50]	[49,82; 52,12]	[50,26; 52,64]	[50,16; 52,61]	[49,84; 52,37]	[49,71; 52,31]	[50,23; 52,91]								

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	9430	9074	8463	7733	7156	6701	6331	5959	5643									
	auswertbar	Anzahl	9371	8414	7797	7237	6778	6394	6027	5693	5394									
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	31,06	30,96	31,02	31,02	31,07	31,00	31,07	31,07	31,07	31,15								
		CI Mean	[30,94; 31,19]	[30,83; 31,09]	[30,88; 31,16]	[30,88; 31,16]	[30,92; 31,21]	[30,85; 31,15]	[30,92; 31,23]	[30,92; 31,23]	[30,92; 31,23]	[30,98; 31,31]								
		Median	30,12	30,11	30,11	30,11	30,22	30,12	30,35	30,22	30,22	30,42								
		Fallbasis mittlere Differenz		8409	7793	7233	6774	6391	6024	5691	5392									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,15	-0,11	-0,17	-0,15	-0,25	-0,24	-0,29	-0,31									
		CI mittlere Differenz		[-0,19; - 0,11]	[-0,16; - 0,06]	[-0,22; - 0,11]	[-0,21; - 0,09]	[-0,32; - 0,19]	[-0,30; - 0,17]	[-0,36; - 0,22]	[-0,38; - 0,23]									
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	1258	1182	1062	982	912	872	796	741	693									
		Anteil in %	13,42	14,05	13,62	13,57	13,46	13,64	13,21	13,02	12,85									
		CI Anteil in %	[12,73; 14,11]	[13,31; 14,79]	[12,86; 14,38]	[12,78; 14,36]	[12,64; 14,27]	[12,80; 14,48]	[12,35; 14,06]	[12,14; 13,89]	[11,95; 13,74]									
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	3260	2934	2733	2533	2335	2199	2061	1977	1824									
		Anteil in %	34,79	34,87	35,05	35,00	34,45	34,39	34,20	34,73	33,82									
		CI Anteil in %	[33,82; 35,75]	[33,85; 35,89]	[33,99; 36,11]	[33,90; 36,10]	[33,32; 35,58]	[33,23; 35,56]	[33,00; 35,39]	[33,49; 35,96]	[32,55; 35,08]									
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	4853	4298	4002	3722	3531	3323	3170	2975	2877									
		Anteil in %	51,79	51,08	51,33	51,43	52,10	51,97	52,60	52,26	53,34									
		CI Anteil in %	[50,78; 52,80]	[50,01; 52,15]	[50,22; 52,44]	[50,28; 52,58]	[50,91; 53,28]	[50,75; 53,20]	[51,34; 53,86]	[50,96; 53,55]	[52,01; 54,67]									
	2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6552	6320	5851	5399	5008	4674	4394	4147									
		auswertbar	Anzahl	6495	5911	5442	5057	4756	4435	4165	3934									
Auswertungs- ergebnisse zum BMI		Mean	31,01	31,10	31,14	31,17	31,13	31,16	31,14	31,15										
		CI Mean	[30,86; 31,16]	[30,94; 31,25]	[30,98; 31,30]	[31,01; 31,34]	[30,96; 31,30]	[30,98; 31,34]	[30,95; 31,32]	[30,96; 31,34]										
		Median	30,12	30,30	30,36	30,42	30,30	30,16	30,23	30,37										
		Fallbasis mittlere Differenz		5907	5436	5052	4752	4432	4162	3932										
		Mittlere Differenz zur ED		0,01	-0,01	0,01	-0,07	-0,06	-0,14	-0,14										
		CI mittlere Differenz		[-0,03; 0,05]	[-0,06; 0,05]	[-0,06; 0,07]	[-0,14; - 0,01]	[-0,13; 0,01]	[-0,22; - 0,07]	[-0,22; - 0,06]										
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Pat. in Kategorie BMI < 25		Anzahl	865	745	674	611	594	554	529	512										
		Anteil in %	13,32	12,60	12,39	12,08	12,49	12,49	12,70	13,01										
		CI Anteil in %	[12,49; 14,14]	[11,76; 13,45]	[11,51; 13,26]	[11,18; 12,98]	[11,55; 13,43]	[11,52; 13,46]	[11,69; 13,71]	[11,96; 14,07]										
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30		Anzahl	2271	2083	1895	1770	1665	1571	1461	1331										
		Anteil in %	34,97	35,24	34,82	35,00	35,01	35,42	35,08	33,83										
		CI Anteil in %	[33,81; 36,13]	[34,02; 36,46]	[33,56; 36,09]	[33,69; 36,32]	[33,65; 36,36]	[34,01; 36,83]	[33,63; 36,53]	[32,35; 35,31]										
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30		Anzahl	3359	3083	2873	2676	2497	2310	2175	2091										
		Anteil in %	51,72	52,16	52,79	52,92	52,50	52,09	52,22	53,15										
		CI Anteil in %	[50,50; 52,93]	[50,88; 53,43]	[51,47; 54,12]	[51,54; 54,29]	[51,08; 53,92]	[50,62; 53,56]	[50,70; 53,74]	[51,59; 54,71]										

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5527	5299	4907	4513	4221	3942	3724														
	auswertbar	Anzahl	5499	5045	4614	4285	4024	3764	3591														
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	31,06	31,02	31,13	31,05	31,06	31,01	31,07														
		CI Mean	[30,90; 31,22]	[30,85; 31,18]	[30,95; 31,31]	[30,87; 31,24]	[30,87; 31,24]	[30,82; 31,20]	[30,88; 31,26]														
		Median	30,12	30,10	30,14	30,12	30,12	30,11	30,12														
		Fallbasis mittlere Differenz		5041	4610	4281	4020	3760	3587														
		Mittlere Differenz zur ED		-0,13	-0,08	-0,18	-0,20	-0,25	-0,26														
		CI mittlere Differenz		[-0,18; - 0,08]	[-0,14; - 0,02]	[-0,24; - 0,12]	[-0,27; - 0,13]	[-0,33; - 0,17]	[-0,34; - 0,18]														
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	734	669	599	554	514	474	441														
		Anteil in %	13,35	13,26	12,98	12,93	12,77	12,59	12,28														
		CI Anteil in %	[12,45; 14,25]	[12,32; 14,20]	[12,01; 13,95]	[11,92; 13,93]	[11,74; 13,80]	[11,53; 13,65]	[11,21; 13,35]														
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	1922	1802	1618	1526	1424	1347	1295														
		Anteil in %	34,95	35,72	35,07	35,61	35,39	35,79	36,06														
		CI Anteil in %	[33,69; 36,21]	[34,40; 37,04]	[33,69; 36,44]	[34,18; 37,05]	[33,91; 36,87]	[34,25; 37,32]	[34,49; 37,63]														
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	2843	2574	2397	2205	2086	1943	1855														
		Anteil in %	51,70	51,02	51,95	51,46	51,84	51,62	51,66														
		CI Anteil in %	[50,38; 53,02]	[49,64; 52,40]	[50,51; 53,39]	[49,96; 52,96]	[50,29; 53,38]	[50,02; 53,22]	[50,02; 53,29]														
	2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5982	5705	5205	4802	4483	4208														
		auswertbar	Anzahl	5944	5389	4905	4583	4283	4034														
Auswertungs- ergebnisse zum BMI		Mean	30,98	31,06	31,07	31,02	31,03	31,07															
		CI Mean	[30,82; 31,13]	[30,89; 31,22]	[30,90; 31,24]	[30,85; 31,20]	[30,86; 31,21]	[30,89; 31,26]															
		Median	30,12	30,12	30,12	30,12	30,11	30,25															
		Fallbasis mittlere Differenz		5383	4899	4576	4277	4030															
		Mittlere Differenz zur ED		0,01	-0,04	-0,06	-0,09	-0,08															
		CI mittlere Differenz		[-0,04; 0,05]	[-0,10; 0,01]	[-0,12; 0,00]	[-0,16; - 0,02]	[-0,15; - 0,01]															
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Pat. in Kategorie BMI < 25		Anzahl	828	726	636	616	560	525															
		Anteil in %	13,93	13,47	12,97	13,44	13,07	13,01															
		CI Anteil in %	[13,05; 14,81]	[12,56; 14,38]	[12,03; 13,91]	[12,45; 14,43]	[12,07; 14,08]	[11,98; 14,05]															
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30		Anzahl	2045	1872	1732	1604	1532	1407															
		Anteil in %	34,40	34,74	35,31	35,00	35,77	34,88															
		CI Anteil in %	[33,20; 35,61]	[33,47; 36,01]	[33,97; 36,65]	[33,62; 36,38]	[34,33; 37,21]	[33,41; 36,35]															
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30		Anzahl	3071	2791	2537	2363	2191	2102															
		Anteil in %	51,67	51,79	51,72	51,56	51,16	52,11															
		CI Anteil in %	[50,40; 52,94]	[50,46; 53,12]	[50,32; 53,12]	[50,11; 53,01]	[49,66; 52,65]	[50,57; 53,65]															

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6630	6363	5859	5409	5055														
	auswertbar	Anzahl	6588	6094	5527	5137	4829														
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		31,12	31,02	31,13	31,11	31,19													
		CI Mean		[30,98; 31,27]	[30,87; 31,17]	[30,97; 31,29]	[30,94; 31,27]	[31,02; 31,35]													
		Median		30,35	30,22	30,41	30,35	30,43													
		Fallbasis mittlere Differenz			6091	5522	5132	4825													
		Mittlere Differenz zur ED			-0,14	-0,12	-0,18	-0,17													
		CI mittlere Differenz			[-0,18; - 0,10]	[-0,17; - 0,07]	[-0,24; - 0,12]	[-0,24; - 0,11]													
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00													
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		804	792	695	635	572													
		Anteil in %		12,20	13,00	12,57	12,36	11,85													
		CI Anteil in %		[11,41; 12,99]	[12,15; 13,84]	[11,70; 13,45]	[11,46; 13,26]	[10,93; 12,76]													
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		2311	2129	1902	1816	1680													
		Anteil in %		35,08	34,94	34,41	35,35	34,79													
		CI Anteil in %		[33,93; 36,23]	[33,74; 36,13]	[33,16; 35,67]	[34,04; 36,66]	[33,45; 36,13]													
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		3473	3173	2930	2686	2577													
		Anteil in %		52,72	52,07	53,01	52,29	53,37													
		CI Anteil in %		[51,51; 53,92]	[50,81; 53,32]	[51,70; 54,33]	[50,92; 53,65]	[51,96; 54,77]													
	2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6682	6400	5912	5443														
		auswertbar	Anzahl	6636	6082	5527	5171														
Auswertungs- ergebnisse zum BMI		Mean		30,99	30,98	30,97	31,04														
		CI Mean		[30,84; 31,14]	[30,82; 31,13]	[30,81; 31,13]	[30,88; 31,21]														
		Median		30,11	30,11	30,10	30,12														
		Fallbasis mittlere Differenz			6079	5524	5168														
		Mittlere Differenz zur ED			-0,05	-0,10	-0,11														
		CI mittlere Differenz			[-0,09; - 0,01]	[-0,15; - 0,05]	[-0,16; - 0,05]														
		Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00														
Pat. in Kategorie BMI < 25		Anzahl		949	873	768	689														
		Anteil in %		14,30	14,35	13,90	13,32														
		CI Anteil in %		[13,46; 15,14]	[13,47; 15,24]	[12,98; 14,81]	[12,40; 14,25]														
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30		Anzahl		2291	2091	1937	1820														
		Anteil in %		34,52	34,38	35,05	35,20														
		CI Anteil in %		[33,38; 35,67]	[33,19; 35,57]	[33,79; 36,30]	[33,89; 36,50]														
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30		Anzahl		3396	3118	2822	2662														
		Anteil in %		51,18	51,27	51,06	51,48														
		CI Anteil in %		[49,97; 52,38]	[50,01; 52,52]	[49,74; 52,38]	[50,12; 52,84]														

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6352	6098	5609																		
	auswertbar	Anzahl	6313	5799	5258																		
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean		31,28	31,19	31,26																	
		CI Mean		[31,13; 31,43]	[31,03; 31,34]	[31,10; 31,43]																	
		Median		30,39	30,30	30,42																	
		Fallbasis mittlere Differenz			5795	5255																	
		Mittlere Differenz zur ED				-0,09	-0,08																
		CI mittlere Differenz					[-0,13; - 0,05]	[-0,13; - 0,03]															
		Median mittlere Differenz				0,00	0,00																
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl		797	740	643																	
		Anteil in %		12,62	12,76	12,23																	
		CI Anteil in %		[11,81; 13,44]	[11,90; 13,62]	[11,34; 13,11]																	
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl		2192	2031	1829																	
		Anteil in %		34,72	35,02	34,79																	
		CI Anteil in %		[33,55; 35,90]	[33,80; 36,25]	[33,50; 36,07]																	
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl		3324	3028	2786																	
		Anteil in %		52,65	52,22	52,99																	
		CI Anteil in %		[51,42; 53,89]	[50,93; 53,50]	[51,64; 54,34]																	
	2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5365	5157																		
		auswertbar	Anzahl	5331	4906																		
Auswertungs- ergebnisse zum BMI		Mean		31,16	31,22																		
		CI Mean		[30,99; 31,33]	[31,05; 31,39]																		
		Median		30,12	30,38																		
		Fallbasis mittlere Differenz			4906																		
		Mittlere Differenz zur ED				-0,01																	
		CI mittlere Differenz					[-0,05; 0,04]																
		Median mittlere Differenz				0,00																	
Pat. in Kategorie BMI < 25		Anzahl		746	665																		
		Anteil in %		13,99	13,55																		
		CI Anteil in %		[13,06; 14,92]	[12,60; 14,51]																		
Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30		Anzahl		1799	1638																		
		Anteil in %		33,75	33,39																		
		CI Anteil in %		[32,48; 35,02]	[32,07; 34,71]																		
Pat. in Kategorie BMI ≥ 30		Anzahl		2786	2603																		
		Anteil in %		52,26	53,06																		
		CI Anteil in %		[50,92; 53,60]	[51,66; 54,45]																		

EZ	Patienten und ihr Body-Mass-Index		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5991																					
	auswertbar	Anzahl	5952																					
	Auswertungs- ergebnisse zum BMI	Mean	31,36																					
		CI Mean	[31,20; 31,52]																					
		Median	30,46																					
		Fallbasis mittlere Differenz																						
		Mittlere Differenz zur ED																						
		CI mittlere Differenz																						
		Median mittlere Differenz																						
	Pat. in Kategorie BMI < 25	Anzahl	761																					
		Anteil in %	12,79																					
		CI Anteil in %	[11,94; 13,63]																					
	Pat. in Kategorie 25 ≤ BMI < 30	Anzahl	1986																					
		Anteil in %	33,37																					
		CI Anteil in %	[32,17; 34,56]																					
	Pat. in Kategorie BMI ≥ 30	Anzahl	3205																					
		Anteil in %	53,85																					
CI Anteil in %		[52,58; 55,11]																						

In Tabelle 3.1.2 wird die Entwicklung des Raucherstatus für die Gruppe der **Raucher (Kollektivmitglieder insgesamt) laut Erstdokumentation** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Raucher waren.

an dieser Gruppe ist. Da der Anteil der Raucher im Beitrittsjahr definitionsgemäß bei 100 Prozent liegt, wird auf eine Darstellung dieser Information verzichtet.

Zunächst wird für jede Kohorte unter „Kollektivmitglieder insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten aus der Gruppe der Raucher im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil

In der Kohorte 2003-1 waren laut Erstdokumentation 2015 Personen Raucher. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für 417 Patienten aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation Angaben vor. Davon waren im letzten Berichtshalbjahr noch 47,96 Prozent Raucher.

Tabelle 3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2003-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2015	1820	1614	1433	1268	1161	1059	899	820	738	700	653	616	589	557	515	481	449	424
	auswertbar	Anzahl		1464	1507	1377	1232	1138	1026	864	793	719	661	618	607	558	531	496	468	433	417
	Raucher	Anzahl		1212	1185	984	783	681	585	455	405	350	326	303	292	267	249	232	223	203	200
		Anteil in %		82,79	78,63	71,46	63,56	59,84	57,02	52,66	51,07	48,68	49,32	49,03	48,11	47,85	46,89	46,77	47,65	46,88	47,96
		CI Anteil in %		[80,85; 84,72]	[76,56; 80,70]	[69,07; 73,85]	[60,87; 66,24]	[56,99; 62,69]	[53,99; 60,05]	[49,33; 55,99]	[47,59; 54,55]	[45,02; 52,33]	[45,50; 53,13]	[45,08; 52,97]	[44,13; 52,08]	[43,70; 52,00]	[42,64; 51,14]	[42,38; 51,17]	[43,12; 52,18]	[42,18; 51,59]	[43,16; 52,76]
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18532</i>	<i>16919</i>	<i>15229</i>	<i>13819</i>	<i>12524</i>	<i>11575</i>	<i>10657</i>	<i>9051</i>	<i>8357</i>	<i>7654</i>	<i>7302</i>	<i>6797</i>	<i>6413</i>	<i>6084</i>	<i>5724</i>	<i>5377</i>	<i>5082</i>	<i>4817</i>	<i>4564</i>
2003-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1735	1455	1294	1122	984	879	770	710	634	602	564	541	509	469	443	417	389	361	
	auswertbar	Anzahl		1284	1237	1079	953	837	749	671	616	578	538	517	487	452	430	404	378	349	
	Raucher	Anzahl		1079	897	711	599	514	438	372	330	302	271	261	246	230	218	206	188	174	
		Anteil in %		84,03	72,51	65,89	62,85	61,41	58,48	55,44	53,57	52,25	50,37	50,48	50,51	50,88	50,70	50,99	49,74	49,86	
		CI Anteil in %		[82,03; 86,04]	[70,03; 75,00]	[63,06; 68,72]	[59,78; 65,92]	[58,11; 64,71]	[54,95; 62,01]	[51,68; 59,20]	[49,63; 57,51]	[48,17; 56,32]	[46,14; 54,60]	[46,17; 54,80]	[46,07; 54,96]	[46,27; 55,50]	[45,97; 55,43]	[46,11; 55,87]	[44,69; 54,78]	[44,60; 55,11]	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15338</i>	<i>13264</i>	<i>11995</i>	<i>10737</i>	<i>9767</i>	<i>8914</i>	<i>8042</i>	<i>7361</i>	<i>6677</i>	<i>6381</i>	<i>5997</i>	<i>5700</i>	<i>5383</i>	<i>5096</i>	<i>4829</i>	<i>4575</i>	<i>4304</i>	<i>4094</i>	
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	804	693	600	526	460	406	368	339	319	292	273	252	238	224	210	198	190		
	auswertbar	Anzahl		649	565	498	440	395	353	331	298	273	256	238	228	215	200	190	184		
	Raucher	Anzahl		531	406	337	286	251	213	192	168	150	139	122	116	110	103	95	93		
		Anteil in %		81,82	71,86	67,67	65,00	63,54	60,34	58,01	56,38	54,95	54,30	51,26	50,88	51,16	51,50	50,00	50,54		
		CI Anteil in %		[78,85; 84,79]	[68,15; 75,57]	[63,56; 71,78]	[60,54; 69,46]	[58,79; 68,30]	[55,23; 65,45]	[52,68; 63,33]	[50,74; 62,02]	[49,03; 60,86]	[48,18; 60,41]	[44,90; 57,62]	[44,37; 57,38]	[44,47; 57,86]	[44,56; 58,44]	[42,87; 57,13]	[43,30; 57,79]		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6722</i>	<i>5979</i>	<i>5294</i>	<i>4783</i>	<i>4296</i>	<i>3854</i>	<i>3572</i>	<i>3250</i>	<i>3080</i>	<i>2873</i>	<i>2690</i>	<i>2532</i>	<i>2401</i>	<i>2263</i>	<i>2147</i>	<i>2032</i>	<i>1951</i>		
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	606	520	463	427	378	354	319	299	278	264	249	236	223	217	210	197			
	auswertbar	Anzahl		489	440	412	354	321	292	264	248	234	225	208	202	194	186	174			
	Raucher	Anzahl		409	315	285	234	201	173	158	147	133	125	120	114	112	105	100			
		Anteil in %		83,64	71,59	69,17	66,10	62,62	59,25	59,85	59,27	56,84	55,56	57,69	56,44	57,73	56,45	57,47			
		CI Anteil in %		[80,36; 86,92]	[67,37; 75,81]	[64,71; 73,64]	[61,16; 71,04]	[57,32; 67,92]	[53,60; 64,89]	[53,92; 65,77]	[53,15; 65,40]	[50,48; 63,20]	[49,05; 62,06]	[50,96; 64,42]	[49,58; 63,29]	[50,76; 64,70]	[49,31; 63,60]	[50,10; 64,84]			
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5209</i>	<i>4715</i>	<i>4298</i>	<i>3897</i>	<i>3506</i>	<i>3261</i>	<i>3038</i>	<i>2910</i>	<i>2710</i>	<i>2571</i>	<i>2446</i>	<i>2321</i>	<i>2204</i>	<i>2102</i>	<i>2005</i>	<i>1906</i>			
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	845	766	669	573	510	467	447	418	396	369	342	329	315	296	281				
	auswertbar	Anzahl		721	634	543	476	452	415	401	374	353	332	319	305	284	268				
	Raucher	Anzahl		599	461	373	308	267	238	231	211	200	178	177	165	153	143				
		Anteil in %		83,08	72,71	68,69	64,71	59,07	57,35	57,61	56,42	56,66	53,61	55,49	54,10	53,87	53,36				
		CI Anteil in %		[80,34; 85,82]	[69,24; 76,18]	[64,79; 72,60]	[60,41; 69,00]	[54,53; 63,61]	[52,59; 62,11]	[52,76; 62,45]	[51,38; 61,45]	[51,48; 61,83]	[48,24; 58,99]	[50,02; 60,95]	[48,50; 59,70]	[48,07; 59,68]	[47,37; 59,34]				
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7326</i>	<i>6819</i>	<i>6209</i>	<i>5519</i>	<i>4992</i>	<i>4584</i>	<i>4340</i>	<i>4066</i>	<i>3849</i>	<i>3623</i>	<i>3415</i>	<i>3216</i>	<i>3064</i>	<i>2915</i>	<i>2769</i>				
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	986	881	782	689	620	584	544	518	492	457	429	407	383	361					
	auswertbar	Anzahl		833	732	655	599	547	521	489	468	435	411	383	369	345					
	Raucher	Anzahl		679	532	445	393	340	308	286	263	248	235	215	206	198					
		Anteil in %		81,51	72,68	67,94	65,61	62,16	59,12	58,49	56,20	57,01	57,18	56,14	55,83	57,39					
		CI Anteil in %		[78,87; 84,15]	[69,45; 75,91]	[64,36; 71,52]	[61,80; 69,42]	[58,09; 66,23]	[54,89; 63,34]	[54,11; 62,86]	[51,70; 60,70]	[52,35; 61,67]	[52,39; 61,97]	[51,16; 61,11]	[50,75; 60,90]	[52,17; 62,62]					
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9778</i>	<i>8989</i>	<i>8164</i>	<i>7426</i>	<i>6790</i>	<i>6402</i>	<i>5933</i>	<i>5585</i>	<i>5240</i>	<i>4913</i>	<i>4579</i>	<i>4321</i>	<i>4101</i>	<i>3871</i>					
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1112	1035	911	813	768	709	667	623	595	560	533	501	471						
	auswertbar	Anzahl		997	859	784	709	673	630	604	572	538	510	481	462						
	Raucher	Anzahl		866	672	587	513	433	405	380	369	340	322	303	290						
		Anteil in %		86,86	78,23	74,87	72,36	64,34	64,29	62,91	64,51	63,20	63,14	62,99	62,77						
		CI Anteil in %		[84,76; 88,96]	[75,47; 80,99]	[71,83; 77,91]	[69,06; 75,65]	[60,72; 67,96]	[60,54; 68,03]	[59,06; 66,77]	[60,59; 68,44]	[59,12; 67,28]	[58,95; 67,33]	[58,67; 67,31]	[58,36; 67,18]						
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11195</i>	<i>10505</i>	<i>9553</i>	<i>8754</i>	<i>8293</i>	<i>7702</i>	<i>7289</i>	<i>6827</i>	<i>6435</i>	<i>6016</i>	<i>5692</i>	<i>5332</i>	<i>5084</i>						

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1484	1368	1229	1136	1023	951	889	834	762	710	669	628							
	auswertbar	Anzahl		1294	1156	1037	951	894	847	777	733	668	638	602							
	Raucher	Anzahl		1085	898	766	642	588	554	494	468	426	401	382							
		Anteil in %		83,85	77,68	73,87	67,51	65,77	65,41	63,58	63,85	63,77	62,85	63,46							
		CI Anteil in %		[81,84; 85,85]	[75,28; 80,08]	[71,19; 76,54]	[64,53; 70,49]	[62,66; 68,88]	[62,20; 68,61]	[60,19; 66,96]	[60,37; 67,33]	[60,12; 67,42]	[59,10; 66,61]	[59,61; 67,31]							
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>13791</i>	<i>12613</i>	<i>11771</i>	<i>10718</i>	<i>10080</i>	<i>9390</i>	<i>8865</i>	<i>8292</i>	<i>7821</i>	<i>7374</i>	<i>6965</i>							
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1901	1776	1650	1474	1363	1264	1174	1093	1034	973	921								
	auswertbar	Anzahl		1684	1493	1348	1270	1195	1126	1052	982	929	885								
	Raucher	Anzahl		1444	1185	988	911	854	784	740	675	617	584								
		Anteil in %		85,75	79,37	73,29	71,73	71,46	69,63	70,34	68,74	66,42	65,99								
		CI Anteil in %		[84,08; 87,42]	[77,32; 81,42]	[70,93; 75,66]	[69,25; 74,21]	[68,90; 74,03]	[66,94; 72,31]	[67,58; 73,10]	[65,84; 71,64]	[63,38; 69,45]	[62,87; 69,11]								
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>17190</i>	<i>16142</i>	<i>14666</i>	<i>13722</i>	<i>12823</i>	<i>12070</i>	<i>11283</i>	<i>10635</i>	<i>10034</i>	<i>9520</i>								
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1177	1123	1012	921	836	780	726	673	632	592									
	auswertbar	Anzahl		1031	893	838	789	732	690	640	598	568									
	Raucher	Anzahl		891	685	633	580	537	505	445	418	390									
		Anteil in %		86,42	76,71	75,54	73,51	73,36	73,19	69,53	69,90	68,66									
		CI Anteil in %		[84,33; 88,51]	[73,93; 79,48]	[72,62; 78,45]	[70,43; 76,59]	[70,16; 76,57]	[69,88; 76,50]	[65,96; 73,10]	[66,22; 73,58]	[64,84; 72,48]									
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>9940</i>	<i>9118</i>	<i>8435</i>	<i>7735</i>	<i>7205</i>	<i>6731</i>	<i>6317</i>	<i>5936</i>	<i>5626</i>									
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1098	1050	965	849	778	730	684	650	613										
	auswertbar	Anzahl		956	881	805	732	696	651	619	587										
	Raucher	Anzahl		830	695	633	567	533	501	472	442										
		Anteil in %		86,82	78,89	78,63	77,46	76,58	76,96	76,25	75,30										
		CI Anteil in %		[84,67; 88,97]	[76,19; 81,58]	[75,80; 81,47]	[74,43; 80,49]	[73,43; 79,73]	[73,72; 80,20]	[72,90; 79,61]	[71,81; 78,79]										
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>9074</i>	<i>8463</i>	<i>7737</i>	<i>7156</i>	<i>6701</i>	<i>6331</i>	<i>5959</i>	<i>5643</i>										
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	854	812	729	660	600	568	538	499											
	auswertbar	Anzahl		744	677	619	580	540	502	483											
	Raucher	Anzahl		702	610	551	512	474	430	413											
		Anteil in %		94,35	90,10	89,01	88,28	87,78	85,66	85,51											
		CI Anteil in %		[92,70; 96,01]	[87,85; 92,35]	[86,55; 91,48]	[85,66; 90,90]	[85,01; 90,54]	[82,59; 88,73]	[82,36; 88,65]											
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>6320</i>	<i>5851</i>	<i>5399</i>	<i>5008</i>	<i>4674</i>	<i>4394</i>	<i>4147</i>											
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	692	650	593	535	500	460	433												
	auswertbar	Anzahl		613	547	506	471	441	420												
	Raucher	Anzahl		572	497	455	422	384	363												
		Anteil in %		93,31	90,86	89,92	89,60	87,07	86,43												
		CI Anteil in %		[91,33; 95,29]	[88,44; 93,28]	[87,30; 92,55]	[86,84; 92,36]	[83,94; 90,21]	[83,15; 89,71]												
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>5299</i>	<i>4907</i>	<i>4513</i>	<i>4221</i>	<i>3942</i>	<i>3724</i>												
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	808	758	668	605	555	509													
	auswertbar	Anzahl		702	625	582	521	477													
	Raucher	Anzahl		665	583	526	458	419													
		Anteil in %		94,73	93,28	90,38	87,91	87,84													
		CI Anteil in %		[93,08; 96,38]	[91,32; 95,24]	[87,98; 92,78]	[85,11; 90,71]	[84,90; 90,78]													
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>5705</i>	<i>5205</i>	<i>4802</i>	<i>4483</i>	<i>4208</i>													
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	873	841	758	684	630														
	auswertbar	Anzahl		801	696	638	598														
	Raucher	Anzahl		770	642	582	541														
		Anteil in %		96,13	92,24	91,22	90,47														
		CI Anteil in %		[94,79; 97,47]	[90,25; 94,23]	[89,03; 93,42]	[88,11; 92,82]														
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>6363</i>	<i>5859</i>	<i>5409</i>	<i>5055</i>														
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	865	821	751	680															
	auswertbar	Anzahl		780	704	649															
	Raucher	Anzahl		750	658	600															
		Anteil in %		96,15	93,47	92,45															
		CI Anteil in %		[94,80; 97,50]	[91,64; 95,29]	[90,42; 94,48]															
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>	<i>6400</i>	<i>5912</i>	<i>5443</i>															

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	840	797	723															
	auswertbar	Anzahl		756	673															
	Raucher	Anzahl		734	636															
		Anteil in %			97,09	94,50														
		CI Anteil in %			[95,89; 98,29]	[92,78; 96,23]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>	<i>6098</i>	<i>5609</i>																
2011-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	746	717																
	auswertbar	Anzahl		683																
	Raucher	Anzahl		657																
		Anteil in %			96,19															
		CI Anteil in %			[94,76; 97,63]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>	<i>5157</i>																	
2012-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	863																	
	auswertbar	Anzahl																		
	Raucher	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>																		

In Tabelle 3.1.3 werden Anzahl und Anteile der aktuellen **Raucher (Patienten insgesamt)** dokumentiert. Betrachtet werden dabei alle Patienten, also auch diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Nichtraucher waren. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher im jeweiligen Halbjahr dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ist.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitrittsjahr 18532 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 18532 der Patienten lagen auswertbare Daten vor. Davon waren 10,87 Prozent Raucher. Im letzten Berichtshalbjahr waren noch 4564 Patienten eingeschrieben. Für 4453 dieser Patienten lagen auswertbare Daten vor. Davon waren 6,22 Prozent Raucher.

Tabelle 3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten

EZ	Raucherquote bei allen Patienten		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18532	16919	15229	13819	12524	11575	10657	9051	8357	7654	7302	6797	6413	6084	5724	5377	5082	4817	4564
	auswertbar	Anzahl	18532	13512	14233	13475	12170	11333	10194	8758	8110	7497	6961	6517	6226	5883	5538	5245	4976	4726	4453
	Raucher	Anzahl	2015	1370	1381	1340	981	840	723	563	499	428	393	400	382	361	345	322	302	281	277
		Anteil in %	10,87	10,14	9,70	9,94	8,06	7,41	7,09	6,43	6,15	5,71	5,65	6,14	6,14	6,14	6,23	6,14	6,07	5,95	6,22
	CI Anteil in %	[10,42; 11,32]	[9,63; 10,65]	[9,22; 10,19]	[9,44; 10,45]	[7,58; 8,54]	[6,93; 7,89]	[6,59; 7,59]	[5,91; 6,94]	[5,63; 6,68]	[5,18; 6,23]	[5,10; 6,19]	[5,55; 6,72]	[5,54; 6,73]	[5,52; 6,75]	[5,59; 6,87]	[5,49; 6,79]	[5,41; 6,73]	[5,27; 6,62]	[5,51; 6,93]	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	15338	13264	11995	10737	9767	8914	8042	7361	6677	6381	5997	5700	5383	5096	4829	4575	4304	4094	
	auswertbar	Anzahl	15338	11903	11605	10448	9523	8573	7770	7011	6515	6085	5721	5435	5212	4933	4702	4435	4192	3972	
	Raucher	Anzahl	1735	1191	1158	839	708	610	527	448	393	357	342	328	309	285	270	249	230	214	
		Anteil in %	11,31	10,01	9,98	8,03	7,43	7,12	6,78	6,39	6,03	5,87	5,98	6,03	5,93	5,78	5,74	5,61	5,49	5,39	
	CI Anteil in %	[10,81; 11,81]	[9,47; 10,54]	[9,43; 10,52]	[7,51; 8,55]	[6,91; 7,96]	[6,57; 7,66]	[6,22; 7,34]	[5,82; 6,96]	[5,45; 6,61]	[5,28; 6,46]	[5,36; 6,59]	[5,40; 6,67]	[5,29; 6,57]	[5,13; 6,43]	[5,08; 6,41]	[4,94; 6,29]	[4,80; 6,18]	[4,69; 6,09]		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6722	5979	5294	4783	4296	3854	3572	3250	3080	2873	2690	2532	2401	2263	2147	2032	1951		
	auswertbar	Anzahl	6722	5648	5062	4618	4141	3731	3404	3134	2866	2704	2548	2408	2281	2172	2052	1962	1870		
	Raucher	Anzahl	804	661	475	397	335	304	253	230	203	204	189	173	162	149	142	127	128		
		Anteil in %	11,96	11,70	9,38	8,60	8,09	8,15	7,43	7,34	7,08	7,54	7,42	7,18	7,10	6,86	6,92	6,47	6,84		
	CI Anteil in %	[11,18; 12,74]	[10,86; 12,54]	[8,58; 10,19]	[7,79; 9,41]	[7,26; 8,92]	[7,27; 9,03]	[6,55; 8,31]	[6,43; 8,25]	[6,14; 8,02]	[6,55; 8,54]	[6,40; 8,44]	[6,15; 8,22]	[6,05; 8,16]	[5,80; 7,92]	[5,82; 8,02]	[5,38; 7,56]	[5,70; 7,99]			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5209	4715	4298	3897	3506	3261	3038	2910	2710	2571	2446	2321	2204	2102	2005	1906			
	auswertbar	Anzahl	5209	4455	4121	3748	3267	3020	2798	2588	2441	2312	2215	2078	1987	1880	1796	1698			
	Raucher	Anzahl	606	485	380	338	275	244	215	188	184	171	162	151	144	145	135	128			
		Anteil in %	11,63	10,89	9,22	9,02	8,42	8,08	7,68	7,26	7,54	7,40	7,31	7,27	7,25	7,71	7,52	7,54			
	CI Anteil in %	[10,76; 12,50]	[9,97; 11,80]	[8,34; 10,10]	[8,10; 9,94]	[7,47; 9,37]	[7,11; 9,05]	[6,70; 8,67]	[6,26; 8,26]	[6,49; 8,59]	[6,33; 8,46]	[6,23; 8,40]	[6,15; 8,38]	[6,11; 8,39]	[6,51; 8,92]	[6,30; 8,74]	[6,28; 8,79]				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7326	6819	6209	5519	4992	4584	4340	4066	3849	3623	3415	3216	3064	2915	2769				
	auswertbar	Anzahl	7326	6492	5862	5292	4767	4412	4097	3874	3665	3503	3296	3126	2956	2816	2690				
	Raucher	Anzahl	845	692	550	450	386	339	305	302	278	265	245	237	226	214	206				
		Anteil in %	11,53	10,66	9,38	8,50	8,10	7,68	7,44	7,80	7,59	7,56	7,43	7,58	7,65	7,60	7,66				
	CI Anteil in %	[10,80; 12,27]	[9,91; 11,41]	[8,64; 10,13]	[7,75; 9,26]	[7,32; 8,87]	[6,90; 8,47]	[6,64; 8,25]	[6,95; 8,64]	[6,73; 8,44]	[6,69; 8,44]	[6,54; 8,33]	[6,65; 8,51]	[6,69; 8,60]	[6,62; 8,58]	[6,65; 8,66]					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	9778	8989	8164	7426	6790	6402	5933	5585	5240	4913	4579	4321	4101	3871					
	auswertbar	Anzahl	9778	8556	7806	7103	6508	6021	5589	5298	5019	4683	4422	4174	3957	3738					
	Raucher	Anzahl	986	769	605	518	458	405	419	398	372	356	343	316	302	288					
		Anteil in %	10,08	8,99	7,75	7,29	7,04	6,73	7,50	7,51	7,41	7,60	7,76	7,57	7,63	7,70					
	CI Anteil in %	[9,49; 10,68]	[8,38; 9,59]	[7,16; 8,34]	[6,69; 7,90]	[6,42; 7,66]	[6,09; 7,36]	[6,81; 8,19]	[6,80; 8,22]	[6,69; 8,14]	[6,84; 8,36]	[6,97; 8,55]	[6,77; 8,37]	[6,80; 8,46]	[6,85; 8,56]						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	11195	10505	9553	8754	8293	7702	7289	6827	6435	6016	5692	5332	5084						
	auswertbar	Anzahl	11195	10138	9147	8494	7805	7310	6973	6590	6170	5846	5502	5176	4961						
	Raucher	Anzahl	1112	993	771	690	608	572	532	506	493	457	441	413	399						
		Anteil in %	9,93	9,79	8,43	8,12	7,79	7,82	7,63	7,68	7,99	7,82	8,02	7,98	8,04						
	CI Anteil in %	[9,38; 10,49]	[9,22; 10,37]	[7,86; 9,00]	[7,54; 8,70]	[7,20; 8,38]	[7,21; 8,44]	[7,01; 8,25]	[7,04; 8,32]	[7,31; 8,67]	[7,13; 8,51]	[7,30; 8,73]	[7,24; 8,72]	[7,29; 8,80]							
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	14493	13791	12613	11771	10718	10080	9390	8865	8292	7821	7374	6965							
	auswertbar	Anzahl	14493	12998	11930	10904	9977	9474	8984	8425	7953	7470	7108	6692							
	Raucher	Anzahl	1484	1237	1025	879	838	776	729	670	635	582	554	530							
		Anteil in %	10,24	9,52	8,59	8,06	8,40	8,19	8,11	7,95	7,98	7,79	7,79	7,92							
	CI Anteil in %	[9,75; 10,73]	[9,01; 10,02]	[8,09; 9,09]	[7,55; 8,57]	[7,86; 8,94]	[7,64; 8,74]	[7,55; 8,68]	[7,37; 8,53]	[7,39; 8,58]	[7,18; 8,40]	[7,17; 8,42]	[7,27; 8,57]								
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18117	17190	16142	14666	13722	12823	12070	11283	10635	10034	9520								
	auswertbar	Anzahl	18117	16372	14928	13630	12920	12275	11587	10808	10203	9691	9170								
	Raucher	Anzahl	1901	1603	1327	1253	1173	1088	1008	966	886	816	770								
		Anteil in %	10,49	9,79	8,89	9,19	9,08	8,86	8,70	8,94	8,68	8,42	8,40								
	CI Anteil in %	[10,05; 10,94]	[9,34; 10,25]	[8,43; 9,35]	[8,71; 9,68]	[8,58; 9,57]	[8,36; 9,37]	[8,19; 9,21]	[8,40; 9,48]	[8,14; 9,23]	[7,87; 8,97]	[7,83; 8,96]									

EZ	Raucherquote bei allen Patienten		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10330	9940	9118	8435	7735	7205	6731	6317	5936	5626									
	auswertbar	Anzahl	10330	9306	8262	7786	7303	6858	6432	6054	5721	5390									
	Raucher	Anzahl	1177	996	815	753	708	641	625	549	522	489									
		Anteil in %	11,39	10,70	9,86	9,67	9,69	9,35	9,72	9,07	9,12	9,07									
	CI Anteil in %	[10,78; 12,01]	[10,07; 11,33]	[9,22; 10,51]	[9,01; 10,33]	[9,02; 10,37]	[8,66; 10,04]	[8,99; 10,44]	[8,34; 9,79]	[8,38; 9,87]	[8,31; 9,84]										
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	9430	9074	8463	7733	7156	6701	6331	5959	5643										
	auswertbar	Anzahl	9430	8459	7877	7292	6823	6431	6065	5727	5428										
	Raucher	Anzahl	1098	999	861	791	703	669	629	600	576										
		Anteil in %	11,64	11,81	10,93	10,85	10,30	10,40	10,37	10,48	10,61										
	CI Anteil in %	[11,00; 12,29]	[11,12; 12,50]	[10,24; 11,62]	[10,13; 11,56]	[9,58; 11,02]	[9,66; 11,15]	[9,60; 11,14]	[9,68; 11,27]	[9,79; 11,43]											
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6552	6320	5851	5399	5008	4674	4394	4147											
	auswertbar	Anzahl	6552	5965	5491	5104	4800	4474	4203	3970											
	Raucher	Anzahl	854	768	665	605	566	526	490	470											
		Anteil in %	13,03	12,88	12,11	11,85	11,79	11,76	11,66	11,84											
	CI Anteil in %	[12,22; 13,85]	[12,03; 13,73]	[11,25; 12,97]	[10,97; 12,74]	[10,88; 12,70]	[10,81; 12,70]	[10,69; 12,63]	[10,83; 12,84]												
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5527	5299	4907	4513	4221	3942	3724												
	auswertbar	Anzahl	5527	5071	4638	4306	4045	3787	3611												
	Raucher	Anzahl	692	624	545	505	477	434	422												
		Anteil in %	12,52	12,31	11,75	11,73	11,79	11,46	11,69												
	CI Anteil in %	[11,65; 13,39]	[11,40; 13,21]	[10,82; 12,68]	[10,77; 12,69]	[10,80; 12,79]	[10,45; 12,47]	[10,64; 12,73]													
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5982	5705	5205	4802	4483	4208													
	auswertbar	Anzahl	5982	5421	4934	4609	4313	4063													
	Raucher	Anzahl	808	714	626	580	518	479													
		Anteil in %	13,51	13,17	12,69	12,58	12,01	11,79													
	CI Anteil in %	[12,64; 14,37]	[12,27; 14,07]	[11,76; 13,62]	[11,63; 13,54]	[11,04; 12,98]	[10,80; 12,78]														
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6630	6363	5859	5409	5055														
	auswertbar	Anzahl	6630	6133	5561	5169	4857														
	Raucher	Anzahl	873	816	697	632	599														
		Anteil in %	13,17	13,31	12,53	12,23	12,33														
	CI Anteil in %	[12,35; 13,98]	[12,45; 14,16]	[11,66; 13,40]	[11,33; 13,12]	[11,41; 13,26]															
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6682	6400	5912	5443															
	auswertbar	Anzahl	6682	6130	5575	5221															
	Raucher	Anzahl	865	830	716	660															
		Anteil in %	12,95	13,54	12,84	12,64															
	CI Anteil in %	[12,14; 13,75]	[12,68; 14,40]	[11,96; 13,72]	[11,74; 13,54]																
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6352	6098	5609																
	auswertbar	Anzahl	6352	5839	5299																
	Raucher	Anzahl	840	777	681																
		Anteil in %	13,22	13,31	12,85																
	CI Anteil in %	[12,39; 14,06]	[12,44; 14,18]	[11,95; 13,75]																	
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5365	5157																	
	auswertbar	Anzahl	5365	4945																	
	Raucher	Anzahl	746	705																	
		Anteil in %	13,90	14,26																	
	CI Anteil in %	[12,98; 14,83]	[13,28; 15,23]																		
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5991																		
	auswertbar	Anzahl	5991																		
	Raucher	Anzahl	863																		
		Anteil in %	14,40																		
	CI Anteil in %	[13,52; 15,29]																			

In Tabelle 3.1.4 wird die Entwicklung des Blutdrucks für das Kollektiv der Patienten mit **Hypertonus** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation als Hypertoniker eingestuft wurden.

Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Für jede Kohorte wird unter „Kollektivmitglieder insgesamt“ zunächst die Anzahl derjenigen Hypertoniker laut Anamnesebefund zur ED angegeben, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren.

Alle Kollektivmitglieder, die im jeweiligen Berichtshalbjahr sowohl eine Angabe zum diastolischen als auch zum systolischen Blutdruck und gleichzeitig Angaben zur antihypertensiven Medikation dokumentiert haben, werden in der Zeile ‚auswertbar‘ abgebildet. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der gut eingestellten Kollektivmitglieder (Normotoniker) dokumentiert, bei denen der systolische und der diastolische Blutdruckwert im Normalbereich liegt und es wird gezeigt, wie hoch ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern ist. Außerdem wird ausgewiesen, welcher Anteil dieser gut eingestellten Kollektivmitglieder eine antihypertensive Therapie erhält bzw. nicht erhält.

Anschließend wird die Anzahl der nicht gut eingestellten Kollektivmitglieder (Hypertoniker) ausgewiesen und ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern dargestellt. Die Hypertoniker werden anhand ihrer Blutdruckwerte und in Abhängigkeit davon, ob eine antihypertensive Therapie (AHT) dokumentiert ist in vier Kategorien einsortiert. Den **Kategorien 3 und 4** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und der diastolische Blutdruckwert mindestens die festgelegten Schwellenwerte von 140mmHg (systolisch) bzw. 90 mmHg (diastolisch) erreicht, jedoch um maximal 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet. Den **Kategorien 5 und 6** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und/oder diastolische Blutdruckwert diese Schwellenwerte um mehr als 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet.

Im Beitrittsjahr können die Kategorien 1 und 2 – definitionsgemäß keine Hypertoniker – nicht besetzt sein, da das Kollektiv der Hypertoniker ohne die Patienten gebildet wird, die laut Erstdokumentation in diese Kategorien fallen würden.

In der Tabelle wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den sechs Kategorien über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern angegeben.

In der Kohorte 2003-1 waren von den 18532 anfangs eingeschriebenen Teilnehmern laut Erstdokumentation 15406 Personen Hypertoniker. Im letzten Berichtshalbjahr umfasst dieses Kollektiv noch 3787 Personen. Eine im Zeitverlauf abnehmende Anzahl an Hypertonikern kann zwei Ursachen haben: Zum einen kann es sein, dass Patienten aus dem Programm ausscheiden und damit auch keine Kollektivmitglieder mehr sind. Zum anderen kann es sein, dass sich die Blutdruckwerte der Pati-

enten verbessern und sie daher in späteren Berichtshalbjahren den Kategorien 1 oder 2 zuzuordnen sind, also als Kollektivmitglieder ohne Hypertonus gelten. Daher ist neben der absoluten Anzahl der Hypertoniker auch der entsprechende Anteilwert zu beachten. So lag im letzten Berichtshalbjahr der Hypertonikeranteil bei 44,32 Prozent der dann auswertbaren Kollektivmitglieder.

Tabelle 3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation

* Die Patienten sind in die für sie jeweils höchste, für sie zutreffende Kategorie einzustufen. Die Kategorisierung hat somit mit der höchsten Kategorie zu beginnen, also mit „6. Patienten mit Blutdruck systolisch > 160 oder diastolisch > 100 und antihypertensive Therapie“. Die dort eingestufteten Patienten können nicht mehr in eine andere Kategorie eingestuft werden etc..

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	15406	14097	12720	11540	10481	9708	8972	7622	7045	6441	6135	5712	5388	5105	4796	4490	4238	4008	3787
	auswertbar	Anzahl	15406	11315	11925	9737	8856	8442	7636	6551	6114	5637	5280	5481	5231	4937	4640	4375	4149	3929	3691
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	5737	4814	5256	4245	3885	3935	3643	3245	3146	2976	2821	2898	2733	2620	2406	2362	2262	2214	2055
		Anteil in %	37,24	42,55	44,08	43,60	43,87	46,61	47,71	49,53	51,46	52,79	53,43	52,87	52,25	53,07	51,85	53,99	54,52	56,35	55,68
		CI Anteil in %	[36,48; 38,00]	[41,63; 43,46]	[43,18; 44,97]	[42,61; 44,58]	[42,83; 44,90]	[45,55; 47,68]	[46,59; 48,83]	[48,32; 50,75]	[50,20; 52,71]	[51,49; 54,10]	[52,08; 54,77]	[51,55; 54,20]	[50,89; 53,60]	[51,68; 54,46]	[50,42; 53,29]	[52,51; 55,47]	[53,00; 56,03]	[54,80; 57,90]	[54,07; 57,28]
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	264	537	551	78	69	48	50	39	39	33	25	122	113	109	94	83	76	73	65
		Anteil in %	1,71	4,75	4,62	0,80	0,78	0,57	0,65	0,60	0,64	0,59	0,47	2,23	2,16	2,21	2,03	1,90	1,83	1,86	1,76
		CI Anteil in %	[1,51; 1,92]	[4,35; 5,14]	[4,24; 5,00]	[0,62; 0,98]	[0,60; 0,96]	[0,41; 0,73]	[0,47; 0,84]	[0,41; 0,78]	[0,44; 0,84]	[0,39; 0,78]	[0,29; 0,66]	[1,84; 2,62]	[1,77; 2,55]	[1,80; 2,62]	[1,62; 2,43]	[1,49; 2,30]	[1,42; 2,24]	[1,44; 2,28]	[1,34; 2,19]
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	5473	4277	4705	4167	3816	3887	3593	3206	3107	2943	2796	2776	2620	2511	2312	2279	2186	2141	1990
		Anteil in %	35,53	37,80	39,45	42,80	43,09	46,04	47,05	48,94	50,82	52,21	52,95	50,65	50,09	50,86	49,83	52,09	52,69	54,49	53,91
		CI Anteil in %	[34,77; 36,28]	[36,91; 38,69]	[38,58; 40,33]	[41,81; 43,78]	[42,06; 44,12]	[44,98; 47,11]	[45,93; 48,17]	[47,73; 50,15]	[49,56; 52,07]	[50,90; 53,51]	[51,61; 54,30]	[49,32; 51,97]	[48,73; 51,44]	[49,47; 52,26]	[48,39; 51,27]	[50,61; 53,57]	[51,17; 54,21]	[52,93; 56,05]	[52,31; 55,52]
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	9669	6501	6669	5492	4971	4507	3993	3306	2968	2661	2459	2583	2498	2317	2234	2013	1887	1715	1636
		Anteil in %	62,76	57,45	55,92	56,40	56,13	53,39	52,29	50,47	48,54	47,21	46,57	47,13	47,75	46,93	48,15	46,01	45,48	43,65	44,32
		CI Anteil in %	[62,00; 63,52]	[56,54; 58,37]	[55,03; 56,82]	[55,42; 57,39]	[55,10; 57,17]	[52,32; 54,45]	[51,17; 53,41]	[49,25; 51,68]	[47,29; 49,80]	[45,90; 48,51]	[45,23; 47,92]	[45,80; 48,45]	[46,40; 49,11]	[45,54; 48,32]	[46,71; 49,58]	[44,53; 47,49]	[43,97; 47,00]	[42,10; 45,20]	[42,72; 45,93]
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	418	523	475	61	44	33	33	28	19	13	19	81	73	74	72	68	53	38	39
		Anteil in %	2,71	4,62	3,98	0,63	0,50	0,39	0,43	0,43	0,31	0,23	0,36	1,48	1,40	1,50	1,55	1,55	1,28	0,97	1,06
		CI Anteil in %	[2,46; 2,97]	[4,24; 5,01]	[3,63; 4,33]	[0,47; 0,78]	[0,35; 0,64]	[0,26; 0,52]	[0,29; 0,58]	[0,27; 0,59]	[0,17; 0,45]	[0,11; 0,36]	[0,20; 0,52]	[1,16; 1,80]	[1,08; 1,71]	[1,16; 1,84]	[1,20; 1,91]	[1,19; 1,92]	[0,94; 1,62]	[0,66; 1,27]	[0,73; 1,39]
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	7981	5225	5486	4891	4439	4102	3621	3031	2707	2406	2228	2264	2197	2019	1917	1733	1657	1520	1424
		Anteil in %	51,80	46,18	46,00	50,23	50,12	48,59	47,42	46,27	44,28	42,68	42,20	41,31	42,00	40,90	41,31	39,61	39,94	38,69	38,58
		CI Anteil in %	[51,02; 52,59]	[45,26; 47,10]	[45,11; 46,90]	[49,24; 51,22]	[49,08; 51,17]	[47,52; 49,66]	[46,30; 48,54]	[45,06; 47,48]	[43,03; 45,52]	[41,39; 43,97]	[40,86; 43,53]	[40,00; 42,61]	[40,66; 43,34]	[39,52; 42,27]	[39,90; 42,73]	[38,16; 41,06]	[38,45; 41,43]	[37,16; 40,21]	[37,01; 40,15]
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	42	45	52	11	8	3	1	1	1	3	0	5	4	4	4	3	6	3	3	
	Anteil in %	0,27	0,40	0,44	0,11	0,09	0,04	0,01	0,02	0,02	0,05	0,00	0,09	0,08	0,08	0,09	0,07	0,14	0,08	0,08	
	CI Anteil in %	[0,19; 0,35]	[0,28; 0,51]	[0,32; 0,55]	[0,05; 0,18]	[0,03; 0,15]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,00]	[0,01; 0,17]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,15]	[0,03; 0,26]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,17]	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1228	708	656	529	480	369	338	246	241	239	212	233	224	220	241	209	171	154	170	
	Anteil in %	7,97	6,26	5,50	5,43	5,42	4,37	4,43	3,76	3,94	4,24	4,02	4,25	4,28	4,46	5,19	4,78	4,12	3,92	4,61	
	CI Anteil in %	[7,54; 8,40]	[5,81; 6,70]	[5,09; 5,91]	[4,98; 5,88]	[4,95; 5,89]	[3,93; 4,81]	[3,97; 4,89]	[3,29; 4,22]	[3,45; 4,43]	[3,71; 4,77]	[3,49; 4,54]	[3,72; 4,79]	[3,73; 4,83]	[3,88; 5,03]	[4,56; 5,83]	[4,15; 5,41]	[3,52; 4,73]	[3,31; 4,53]	[3,93; 5,28]	
Patienten insgesamt	Anzahl	18532	16919	15229	13819	12524	11575	10657	9051	8357	7654	7302	6797	6413	6084	5724	5377	5082	4817	4564	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2003-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	12524	10865	9865	8860	8090	7381	6660	6078	5508	5264	4945	4695	4427	4181	3959	3750	3517	3338
	auswertbar	Anzahl	12523	9804	7916	7273	6722	6097	5562	5079	4721	4449	4718	4475	4285	4048	3852	3627	3421	3241
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	4657	3920	3243	3092	3031	2734	2588	2464	2332	2243	2426	2243	2185	2024	2046	1960	1842	1793
		Anteil in %	37,19	39,98	40,97	42,51	45,09	44,84	46,53	48,51	49,40	50,42	51,42	50,12	50,99	50,00	53,12	54,04	53,84	55,32
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[36,34; 38,03]	[39,01; 40,95]	[39,88; 42,05]	[41,38; 43,65]	[43,90; 46,28]	[43,59; 46,09]	[45,22; 47,84]	[47,14; 49,89]	[47,97; 50,82]	[48,95; 51,89]	[49,99; 52,85]	[48,66; 51,59]	[49,49; 52,49]	[48,46; 51,54]	[51,54; 54,69]	[52,42; 55,66]	[52,17; 55,51]	[53,84; 57,03]
		Anzahl	268	433	73	61	60	46	49	39	37	31	107	84	85	85	81	79	76	67
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	2,14	4,42	0,92	0,84	0,89	0,75	0,88	0,77	0,78	0,70	2,27	1,88	1,98	2,10	2,10	2,18	2,22	2,07
		CI Anteil in %	[1,89; 2,39]	[4,01; 4,82]	[0,71; 1,13]	[0,63; 1,05]	[0,67; 1,12]	[0,54; 0,97]	[0,64; 1,13]	[0,53; 1,01]	[0,53; 1,04]	[0,45; 0,94]	[1,84; 2,69]	[1,48; 2,27]	[1,57; 2,40]	[1,66; 2,54]	[1,65; 2,56]	[1,70; 2,65]	[1,73; 2,72]	[1,58; 2,56]
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	4389	3487	3170	3031	2971	2688	2539	2425	2295	2212	2319	2159	2100	1939	1965	1881	1766	1726
		Anteil in %	35,05	35,57	40,05	41,67	44,20	44,09	45,65	47,75	48,61	49,72	49,15	48,25	49,01	47,90	51,01	51,86	51,62	53,26
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[34,21; 35,88]	[34,62; 36,51]	[38,97; 41,12]	[40,54; 42,81]	[43,01; 45,39]	[42,84; 45,33]	[44,34; 46,96]	[46,37; 49,12]	[47,19; 50,04]	[48,25; 51,19]	[47,73; 50,58]	[46,78; 49,71]	[47,51; 50,51]	[46,36; 49,44]	[49,43; 52,59]	[50,23; 53,49]	[49,95; 53,30]	[51,54; 54,97]
		Anzahl	7866	5884	4673	4181	3691	3363	2974	2615	2389	2206	2292	2232	2100	2024	1806	1667	1579	1448
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	62,81	60,02	59,03	57,49	54,91	55,16	53,47	51,49	50,60	49,58	48,58	49,88	49,01	50,00	46,88	45,96	46,16	44,68
		CI Anteil in %	[61,97; 63,66]	[59,05; 60,99]	[57,95; 60,12]	[56,35; 58,62]	[53,72; 56,10]	[53,91; 56,41]	[52,16; 54,78]	[50,11; 52,86]	[49,18; 52,03]	[48,11; 51,05]	[47,15; 50,01]	[48,41; 51,34]	[47,51; 50,51]	[48,46; 51,54]	[45,31; 48,46]	[44,34; 47,58]	[44,49; 47,83]	[42,97; 46,39]
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	329	486	60	47	38	42	35	23	25	21	73	73	55	51	52	47	41	43
		Anteil in %	2,63	4,96	0,76	0,65	0,57	0,69	0,63	0,45	0,53	0,47	1,55	1,63	1,28	1,26	1,35	1,30	1,20	1,33
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[2,35; 2,91]	[4,53; 5,39]	[0,57; 0,95]	[0,46; 0,83]	[0,39; 0,74]	[0,48; 0,90]	[0,42; 0,84]	[0,27; 0,64]	[0,32; 0,74]	[0,27; 0,67]	[1,20; 1,90]	[1,26; 2,00]	[0,95; 1,62]	[0,92; 1,60]	[0,99; 1,71]	[0,93; 1,66]	[0,83; 1,56]	[0,93; 1,72]
		Anzahl	6364	4663	4092	3660	3249	2971	2634	2343	2131	1986	1973	1923	1817	1783	1633	1567	1433	1377
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	50,82	47,56	51,69	50,32	48,33	48,73	47,36	46,13	45,14	44,64	41,82	42,97	42,40	44,05	40,68	39,51	40,25	38,17
		CI Anteil in %	[49,94; 51,69]	[46,57; 48,55]	[50,59; 52,79]	[49,17; 51,47]	[47,14; 49,53]	[47,47; 49,98]	[46,04; 48,67]	[44,76; 47,50]	[43,72; 46,56]	[43,18; 46,10]	[40,41; 43,23]	[41,52; 44,42]	[40,92; 43,88]	[42,52; 45,58]	[39,13; 42,23]	[37,92; 41,10]	[38,61; 41,89]	[36,49; 39,84]
Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	55	57	6	6	6	1	3	1	3	2	12	4	5	0	1	4	2	2	
	Anteil in %	0,44	0,58	0,08	0,08	0,09	0,02	0,05	0,02	0,06	0,04	0,25	0,09	0,12	0,00	0,03	0,11	0,06	0,06	
Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[0,32; 0,56]	[0,43; 0,73]	[0,02; 0,14]	[0,02; 0,15]	[0,02; 0,16]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,11]	[0,11; 0,40]	[0,00; 0,18]	[0,01; 0,22]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,22]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,15]	
	Anzahl	1118	678	515	468	398	349	302	248	230	197	234	232	223	190	186	183	159	166	
Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	8,93	6,92	6,51	6,43	5,92	5,72	5,43	4,88	4,87	4,43	4,96	5,18	5,20	4,69	4,83	5,05	4,65	5,12	
	CI Anteil in %	[8,43; 9,43]	[6,41; 7,42]	[5,96; 7,05]	[5,87; 7,00]	[5,36; 6,49]	[5,14; 6,31]	[4,83; 6,03]	[4,29; 5,48]	[4,26; 5,49]	[3,82; 5,03]	[4,34; 5,58]	[4,53; 5,83]	[4,54; 5,87]	[4,04; 5,35]	[4,15; 5,51]	[4,33; 5,76]	[3,94; 5,35]	[4,36; 5,88]	
Patienten insgesamt	Anzahl	15338	13264	11995	10737	9767	8914	8042	7361	6677	6381	5997	5700	5383	5096	4829	4575	4304	4094	
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5332	4764	4236	3849	3469	3106	2874	2602	2467	2312	2162	2028	1923	1811	1721	1623	1556	
	auswertbar	Anzahl	5327	3860	3479	3272	2946	2649	2456	2262	2079	2186	2051	1926	1824	1739	1640	1568	1487	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1769	1526	1420	1403	1263	1225	1130	1124	995	1062	965	933	890	892	869	831	803	
		Anteil in %	33,21	39,53	40,82	42,88	42,87	46,24	46,01	49,69	47,86	48,58	47,05	48,44	48,79	51,29	52,99	53,00	54,00	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[31,94; 34,47]	[37,99; 41,08]	[39,18; 42,45]	[41,18; 44,58]	[41,08; 44,66]	[44,34; 48,14]	[44,04; 47,98]	[47,63; 51,75]	[45,71; 50,01]	[46,49; 50,68]	[44,89; 49,21]	[46,21; 50,67]	[46,50; 51,09]	[48,94; 53,64]	[50,57; 55,40]	[50,53; 55,47]	[51,47; 56,54]	
		Anzahl	84	58	29	19	22	16	26	15	10	51	36	37	31	40	39	28	24	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	1,58	1,50	0,83	0,58	0,75	0,60	1,06	0,66	0,48	2,33	1,76	1,92	1,70	2,30	2,38	1,79	1,61	
		CI Anteil in %	[1,24; 1,91]	[1,12; 1,89]	[0,53; 1,14]	[0,32; 0,84]	[0,44; 1,06]	[0,31; 0,90]	[0,65; 1,46]	[0,33; 1,00]	[0,18; 0,78]	[1,70; 2,97]	[1,19; 2,32]	[1,31; 2,53]	[1,11; 2,29]	[1,60; 3,00]	[1,64; 3,12]	[1,13; 2,44]	[0,97; 2,25]	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1685	1468	1391	1384	1241	1209	1104	1109	985	1011	929	896	859	852	830	803	779	
		Anteil in %	31,63	38,03	39,98	42,30	42,12	45,64	44,95	49,03	47,38	46,25	45,29	46,52	47,09	48,99	50,61	51,21	52,39	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[30,38; 32,88]	[36,50; 39,56]	[38,35; 41,61]	[40,61; 43,99]	[40,34; 43,91]	[43,74; 47,54]	[42,98; 46,92]	[46,97; 51,09]	[45,23; 49,53]	[44,16; 48,34]	[43,14; 47,45]	[44,29; 48,75]	[44,80; 49,39]	[46,64; 51,34]	[48,19; 53,03]	[48,74; 53,69]	[49,85; 54,93]	
		Anzahl	3558	2334	2059	1869	1683	1424	1326	1138	1084	1124	1086	993	934	847	771	737	684	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	66,79	60,47	59,18	57,12	57,13	53,76	53,99	50,31	52,14	51,42	52,95	51,56	51,21	48,71	47,01	47,00	46,00	
		CI Anteil in %	[65,53; 68,06]	[58,92; 62,01]	[57,55; 60,82]	[55,42; 58,82]	[55,34; 58,92]	[51,86; 55,66]	[52,02; 55,96]	[48,25; 52,37]	[49,99; 54,29]	[49,32; 53,51]	[50,79; 55,11]	[49,33; 53,79]	[48,91; 53,50]	[46,36; 51,06]	[44,60; 49,43]	[44,53; 49,47]	[43,46; 48,53]	
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	151	52	31	32	31	27	23	20	19	44	48	30	37	27	19	21	21	
		Anteil in %	2,83	1,35	0,89	0,98	1,05	1,02	0,94	0,88	0,91	2,01	2,34	1,56	2,03	1,55	1,16	1,34	1,41	
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[2,39; 3,28]	[0,98; 1,71]	[0,58; 1,20]	[0,64; 1,32]	[0,68; 1,42]	[0,64; 1,40]	[0,56; 1,32]	[0,50; 1,27]	[0,50; 1,32]	[1,42; 2,60]	[1,69; 2,99]	[1,00; 2,11]	[1,38; 2,68]	[0,97; 2,13]	[0,64; 1,68]	[0,77; 1,91]	[0,81; 2,01]	
		Anzahl	2815	1986	1791	1619	1468	1238	1171	992	960	956	922	857	791	714	658	627	573	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	52,84	51,45	51,48	49,48	49,83	46,73	47,68	43,85	46,18	43,73	44,95	44,50	43,37	41,06	40,12	39,99	38,53	
		CI Anteil in %	[51,50; 54,18]	[49,87; 53,03]	[49,82; 53,14]	[47,77; 51,19]	[48,02; 51,64]	[44,83; 48,63]	[45,70; 49,65]	[41,81; 45,90]	[44,03; 48,32]	[41,65; 45,81]	[42,80; 47,11]	[42,28; 46,72]	[41,09; 45,64]	[38,75; 43,37]	[37,75; 42,49]	[37,56; 42,41]	[36,06; 41,01]	
Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	25	3	1	0	1	2	1	2	1	3	1	3	3	1	3	3	3		
	Anteil in %	0,47	0,08	0,03	0,00	0,03	0,08	0,04	0,09	0,05	0,14	0,05	0,16	0,16	0,06	0,18	0,19	0,20		
Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[0,29; 0,65]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,21]	[0,00;										

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4166	3805	3482	3155	2832	2636	2456	2358	2196	2083	1982	1877	1784	1697	1623	1546		
	auswertbar	Anzahl	3218	2930	2761	2538	2227	2091	1936	1796	1978	1874	1797	1682	1605	1520	1456	1375		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1253	1221	1221	1187	1092	1073	960	958	976	967	949	871	871	827	798	768		
		Anteil in %	38,94	41,67	44,22	46,77	49,03	51,32	49,59	53,34	49,34	51,60	52,81	51,78	54,27	54,41	54,81	55,85		
		CI Anteil in %	[37,25; 40,62]	[39,89; 43,46]	[42,37; 46,08]	[44,83; 48,71]	[46,96; 51,11]	[49,17; 53,46]	[47,36; 51,81]	[51,03; 55,65]	[47,14; 51,55]	[49,34; 53,86]	[50,50; 55,12]	[49,39; 54,17]	[51,83; 56,71]	[51,90; 56,91]	[52,25; 57,36]	[53,23; 58,48]		
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	30	34	25	24	20	20	16	11	55	48	48	39	43	37	42	37		
		Anteil in %	0,93	1,16	0,91	0,95	0,90	0,96	0,83	0,61	2,78	2,56	2,67	2,32	2,68	2,43	2,88	2,69		
		CI Anteil in %	[0,60; 1,26]	[0,77; 1,55]	[0,55; 1,26]	[0,57; 1,32]	[0,51; 1,29]	[0,54; 1,37]	[0,42; 1,23]	[0,25; 0,97]	[2,06; 3,51]	[1,85; 3,28]	[1,93; 3,42]	[1,60; 3,04]	[1,89; 3,47]	[1,66; 3,21]	[2,02; 3,74]	[1,84; 3,55]		
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1223	1187	1196	1163	1072	1053	944	947	921	919	901	832	828	790	756	731		
		Anteil in %	38,00	40,51	43,32	45,82	48,14	50,36	48,76	52,73	46,56	49,04	50,14	49,46	51,59	51,97	51,92	53,16		
		CI Anteil in %	[36,33; 39,68]	[38,73; 42,29]	[41,47; 45,17]	[43,88; 47,76]	[46,06; 50,21]	[48,22; 52,50]	[46,53; 50,99]	[50,42; 55,04]	[44,36; 48,76]	[46,78; 51,30]	[47,83; 52,45]	[47,07; 51,86]	[49,14; 54,03]	[49,46; 54,49]	[49,36; 54,49]	[50,53; 55,80]		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1965	1709	1540	1351	1135	1018	976	838	1002	907	848	811	734	693	658	607		
		Anteil in %	61,06	58,33	55,78	53,23	50,97	48,68	50,41	46,66	50,66	48,40	47,19	48,22	45,73	45,59	45,19	44,15		
		CI Anteil in %	[59,38; 62,75]	[56,54; 60,11]	[53,92; 57,63]	[51,29; 55,17]	[48,89; 53,04]	[46,54; 50,83]	[48,19; 52,64]	[44,35; 48,97]	[48,45; 52,86]	[46,14; 50,66]	[44,88; 49,50]	[45,83; 50,61]	[43,29; 48,17]	[43,09; 48,10]	[42,64; 47,75]	[41,52; 46,77]		
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	27	28	22	16	10	5	7	8	45	34	38	34	29	26	21	20		
		Anteil in %	0,84	0,96	0,80	0,63	0,45	0,24	0,36	0,45	2,28	1,81	2,11	2,02	1,81	1,71	1,44	1,45		
		CI Anteil in %	[0,52; 1,15]	[0,60; 1,31]	[0,47; 1,13]	[0,32; 0,94]	[0,17; 0,73]	[0,03; 0,45]	[0,09; 0,63]	[0,14; 0,75]	[1,62; 2,93]	[1,21; 2,42]	[1,45; 2,78]	[1,35; 2,69]	[1,15; 2,46]	[1,06; 2,36]	[0,83; 2,05]	[0,82; 2,09]		
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1660	1476	1341	1184	1004	904	861	735	842	784	717	695	615	593	558	514		
		Anteil in %	51,58	50,38	48,57	46,65	45,08	43,23	44,47	40,92	42,57	41,84	39,90	41,32	38,32	39,01	38,32	37,38		
		CI Anteil in %	[49,86; 53,31]	[48,56; 52,19]	[46,70; 50,43]	[44,71; 48,59]	[43,02; 47,15]	[41,11; 45,36]	[42,26; 46,69]	[38,65; 43,20]	[40,39; 44,75]	[39,60; 44,07]	[37,64; 42,16]	[38,97; 43,67]	[35,94; 40,70]	[36,56; 41,47]	[35,83; 40,82]	[34,82; 39,94]		
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	3	6	5	5	2	1	0	1	4	3	1	4	1	1	1	1			
	Anteil in %	0,09	0,20	0,18	0,20	0,09	0,05	0,00	0,06	0,20	0,16	0,06	0,24	0,06	0,07	0,07	0,07			
	CI Anteil in %	[0,00; 0,20]	[0,04; 0,37]	[0,02; 0,34]	[0,02; 0,37]	[0,00; 0,21]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,40]	[0,00; 0,34]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,47]	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,19]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,22]			
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	275	199	172	146	119	108	108	94	111	86	92	78	89	73	78	72			
	Anteil in %	8,55	6,79	6,23	5,75	5,34	5,16	5,58	5,23	5,61	4,59	5,12	4,64	5,55	4,80	5,36	5,24			
	CI Anteil in %	[7,58; 9,51]	[5,88; 7,70]	[5,33; 7,13]	[4,85; 6,66]	[4,41; 6,28]	[4,22; 6,11]	[4,56; 6,60]	[4,20; 6,26]	[4,60; 6,63]	[3,64; 5,54]	[4,10; 6,14]	[3,63; 5,64]	[4,43; 6,67]	[3,73; 5,88]	[4,20; 6,51]	[4,06; 6,41]			
Patienten insgesamt	Anzahl	5209	4715	4298	3897	3506	3261	3038	2910	2710	2571	2446	2321	2204	2102	2005	1906			
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6030	5652	5166	4590	4148	3825	3627	3394	3207	3031	2863	2697	2569	2441	2311			
	auswertbar	Anzahl	4847	4526	4161	3796	3511	3252	3052	3236	3073	2938	2765	2621	2475	2356	2243			
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1774	1882	1844	1817	1723	1590	1555	1655	1640	1564	1427	1410	1370	1297	1252			
		Anteil in %	36,60	41,58	44,32	47,87	49,07	48,89	50,95	51,14	53,37	53,23	51,61	53,80	55,35	55,05	55,82			
		CI Anteil in %	[35,24; 37,96]	[40,15; 43,02]	[42,81; 45,83]	[46,28; 49,46]	[47,42; 50,73]	[47,17; 50,61]	[49,18; 52,72]	[49,42; 55,13]	[49,42; 55,04]	[51,60; 55,04]	[51,43; 55,04]	[49,75; 53,47]	[51,89; 55,71]	[53,39; 57,31]	[53,04; 57,06]	[53,76; 57,87]		
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	25	33	33	23	26	28	24	102	106	93	83	78	73	70	65			
		Anteil in %	0,52	0,73	0,79	0,61	0,74	0,86	0,79	3,15	3,45	3,17	3,00	2,98	2,95	2,97	2,90			
		CI Anteil in %	[0,31; 0,72]	[0,48; 0,98]	[0,52; 1,06]	[0,36; 0,85]	[0,46; 1,02]	[0,54; 1,18]	[0,47; 1,10]	[2,55; 3,75]	[2,80; 4,09]	[2,53; 3,80]	[2,37; 3,64]	[2,33; 3,63]	[2,28; 3,62]	[2,29; 3,66]	[2,20; 3,59]			
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1749	1849	1811	1794	1697	1562	1531	1553	1534	1471	1344	1332	1297	1227	1187			
		Anteil in %	36,08	40,85	43,52	47,26	48,33	48,03	50,16	47,99	49,92	50,07	48,61	50,82	52,40	52,08	52,92			
		CI Anteil in %	[34,73; 37,44]	[39,42; 42,29]	[42,02; 45,03]	[45,67; 48,85]	[46,68; 49,99]	[46,31; 49,75]	[48,39; 51,94]	[46,27; 49,71]	[48,15; 51,69]	[48,26; 51,88]	[46,74; 50,47]	[48,91; 52,73]	[50,44; 54,37]	[50,06; 54,10]	[50,85; 54,99]			
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	3073	2644	2317	1979	1788	1662	1497	1581	1433	1374	1338	1211	1105	1059	991			
		Anteil in %	63,40	58,42	55,68	52,13	50,93	51,11	49,05	48,86	46,63	46,77	48,39	46,20	44,65	44,95	44,18			
		CI Anteil in %	[62,04; 64,76]	[56,98; 59,85]	[54,17; 57,19]	[50,54; 53,72]	[49,27; 52,58]	[49,39; 52,83]	[47,28; 50,82]	[47,13; 50,58]	[44,87; 48,40]	[44,96; 48,57]	[46,53; 50,25]	[44,29; 48,11]	[42,69; 46,61]	[42,94; 46,96]	[42,13; 46,24]			
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	44	32	30	26	21	16	21	59	58	57	53	47	37	30	33			
		Anteil in %	0,91	0,71	0,72	0,68	0,60	0,49	0,69	1,82	1,89	1,94	1,92	1,79	1,49	1,27	1,47			
		CI Anteil in %	[0,64; 1,17]	[0,46; 0,95]	[0,46; 0,98]	[0,42; 0,95]	[0,34; 0,85]	[0,25; 0,73]	[0,39; 0,98]	[1,36; 2,28]	[1,41; 2,37]	[1,44; 2,44]	[1,41; 2,43]	[1,29; 2,30]	[1,02; 1,97]	[0,82; 1,73]	[0,97; 1,97]			
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2562	2270	1990	1736	1575	1475	1314	1332	1208	1161	1115	1018	952	918	848			
		Anteil in %	52,86	50,15	47,83	45,73	44,86	45,36	43,05	41,16	39,31	39,52	40,33	38,84	38,46	38,96	37,81			
		CI Anteil in %	[51,45; 54,26]	[48,70; 51,61]	[46,31; 49,34]	[44,15; 47,32]	[43,21; 46,50]	[43,65; 47,07]	[41,30; 44,81]	[39,47; 42,86]	[37,58; 41,04]	[37,75; 41,28]	[38,50; 42,15]	[36,97; 40,71]	[36,55; 40,38]	[36,99; 40,93]	[35,80; 39,81]			
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	10	5	2	2	4	3	2	4	6	2	7	4	5	2	1				
	Anteil in %	0,21	0,11	0,05	0,05	0,11	0,09	0,07	0,12	0,20	0,07	0,25	0,15	0,20	0,08	0,04				
	CI Anteil in %	[0,08; 0,33]	[0,01; 0,21]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,23]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,24]	[0,04; 0,35]	[0,00; 0,16]	[0,07; 0,44]	[0,00; 0,30]	[0,03; 0,38]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,13]				
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	457	337	295	215	188	168	160	186	161	154	163	142	111	109	109				
	Anteil in %	9,43	7,45	7,09	5,66	5,35	5,17	5,24	5,75	5,24	5,24	5,90	5,42	4,48	4,63	4,86				
	CI Anteil in %	[8,61; 10,25]	[6,68; 8,21]	[6,31; 7,87]	[4,93; 6,40]	[4,61; 6,10]	[4,41; 5,93]	[4,45; 6,03]	[4,95; 6,55]	[4,45; 6,03]	[4,44; 6,05]	[5,02; 6,77]	[4,55; 6,28]	[3,67; 5,30]	[3,78; 5,47]	[3,97; 5,75]				
Patienten insgesamt	Anzahl	7326	6819	6209	5519	4992	4584													

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8022	7388	6740	6142	5627	5318	4943	4669	4380	4104	3827	3603	3419	3233				
	auswertbar	Anzahl	6653	6050	5572	5161	4769	4470	4662	4426	4195	3921	3697	3484	3295	3117				
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2701	2551	2515	2369	2302	2220	2277	2175	2071	1940	1891	1796	1761	1726				
		Anteil in %	40,60	42,17	45,14	45,90	48,27	49,66	48,84	49,14	49,37	49,48	51,15	51,55	53,44	55,37				
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[39,42; 41,78]	[40,92; 43,41]	[43,83; 46,44]	[44,54; 47,26]	[46,85; 49,69]	[48,20; 51,13]	[47,41; 50,28]	[47,67; 50,61]	[47,86; 50,88]	[47,91; 51,04]	[49,54; 52,76]	[49,89; 53,21]	[51,74; 55,15]	[53,63; 57,12]				
		Anzahl	54	57	54	52	48	50	143	129	114	91	93	88	79	86				
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	0,81	0,94	0,97	1,01	1,01	1,12	3,07	2,91	2,72	2,32	2,52	2,53	2,40	2,76				
		CI Anteil in %	[0,60; 1,03]	[0,70; 1,19]	[0,71; 1,23]	[0,74; 1,28]	[0,72; 1,29]	[0,81; 1,43]	[2,57; 3,56]	[2,42; 3,41]	[2,23; 3,21]	[1,85; 2,79]	[2,01; 3,02]	[2,00; 3,05]	[1,88; 2,92]	[2,18; 3,33]				
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2647	2494	2461	2317	2254	2170	2134	2046	1957	1849	1798	1708	1682	1640				
		Anteil in %	39,79	41,22	44,17	44,89	47,26	48,55	45,77	46,23	46,65	47,16	48,63	49,02	51,05	52,61				
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	CI Anteil in %	[38,61; 40,96]	[39,98; 42,46]	[42,86; 45,47]	[43,54; 46,25]	[45,85; 48,68]	[47,08; 50,01]	[44,34; 47,20]	[44,76; 48,16]	[45,14; 48,72]	[45,59; 48,72]	[47,02; 50,25]	[47,36; 50,68]	[49,34; 52,75]	[50,86; 54,37]				
		Anzahl	3952	3499	3057	2792	2467	2250	2385	2251	2124	1981	1806	1688	1534	1391				
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	59,40	57,83	54,86	54,10	51,73	50,34	51,16	50,86	50,63	50,52	48,85	48,45	46,56	44,63				
		CI Anteil in %	[58,22; 60,58]	[56,59; 59,08]	[53,56; 56,17]	[52,74; 55,46]	[50,31; 53,15]	[48,87; 51,80]	[49,72; 52,59]	[49,39; 52,33]	[49,12; 52,14]	[48,96; 52,09]	[47,24; 50,46]	[46,79; 50,11]	[44,85; 48,26]	[42,88; 46,37]				
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	64	56	61	52	35	31	108	90	86	86	77	61	59	48				
		Anteil in %	0,96	0,93	1,09	1,01	0,73	0,69	2,32	2,03	2,05	2,19	2,08	1,75	1,79	1,54				
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,73; 1,20]	[0,68; 1,17]	[0,82; 1,37]	[0,74; 1,28]	[0,49; 0,98]	[0,45; 0,94]	[1,88; 2,75]	[1,62; 2,45]	[1,62; 2,48]	[1,73; 2,65]	[1,62; 2,54]	[1,32; 2,19]	[1,34; 2,24]	[1,11; 1,97]				
		Anzahl	3299	3024	2608	2426	2144	1930	1981	1897	1803	1651	1490	1457	1315	1182				
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	49,59	49,98	46,81	47,01	44,96	43,18	42,49	42,86	42,98	42,11	40,30	41,82	39,91	37,92				
CI Anteil in %		[48,39; 50,79]	[48,72; 51,24]	[45,50; 48,12]	[45,64; 48,37]	[43,55; 46,37]	[41,72; 44,63]	[41,07; 43,91]	[41,40; 44,32]	[41,48; 44,48]	[40,56; 43,65]	[38,72; 41,88]	[40,18; 43,46]	[38,24; 41,58]	[36,22; 39,62]					
Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	7	2	4	3	7	6	9	7	10	12	8	6	7	1					
	Anteil in %	0,11	0,03	0,07	0,06	0,15	0,13	0,19	0,16	0,24	0,31	0,22	0,17	0,21	0,03					
Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[0,03; 0,18]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,12]	[0,04; 0,26]	[0,03; 0,24]	[0,07; 0,32]	[0,04; 0,28]	[0,09; 0,39]	[0,13; 0,48]	[0,07; 0,37]	[0,03; 0,31]	[0,06; 0,37]	[0,00; 0,09]					
	Anzahl	582	417	384	311	281	283	287	257	225	232	164	153	160						
Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anteil in %	8,75	6,89	6,89	6,03	5,89	6,33	6,16	5,81	5,36	5,92	6,25	4,71	4,64	5,13					
	CI Anteil in %	[8,07; 9,43]	[6,25; 7,53]	[6,23; 7,56]	[5,38; 6,68]	[5,22; 6,56]	[5,62; 7,05]	[5,47; 6,85]	[5,12; 6,50]	[4,68; 6,05]	[5,18; 6,66]	[5,47; 7,03]	[4,00; 5,41]	[3,92; 5,36]	[4,36; 5,91]					
Patienten insgesamt	Anzahl	9778	8989	8164	7426	6790	6402	5933	5585	5240	4913	4579	4321	4101	3871					
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9160	8616	7855	7232	6859	6367	6029	5640	5318	4976	4703	4409	4207					
	auswertbar	Anzahl	7760	7312	6642	6221	5792	6060	5774	5451	5109	4834	4552	4279	4103					
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	3066	3286	3035	2967	2815	2926	2808	2633	2523	2404	2306	2220	2149					
		Anteil in %	39,51	44,94	45,69	47,69	48,60	48,28	48,63	48,30	49,38	49,73	50,66	51,88	52,38					
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[38,42; 40,60]	[43,80; 46,08]	[44,50; 46,89]	[46,45; 48,93]	[47,31; 49,89]	[47,03; 49,54]	[47,34; 49,92]	[46,98; 49,63]	[48,01; 50,75]	[48,32; 51,14]	[49,21; 52,11]	[50,38; 53,38]	[50,85; 53,90]					
		Anzahl	57	59	61	65	50	171	155	159	146	119	117	107	95					
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	0,73	0,81	0,92	1,04	0,86	2,82	2,68	2,92	2,86	2,46	2,57	2,50	2,32					
		CI Anteil in %	[0,54; 0,92]	[0,60; 1,01]	[0,69; 1,15]	[0,79; 1,30]	[0,62; 1,10]	[2,40; 3,24]	[2,27; 3,10]	[2,47; 3,36]	[2,40; 3,31]	[2,02; 2,90]	[2,11; 3,03]	[2,03; 2,97]	[1,86; 2,78]					
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	3009	3227	2974	2902	2765	2755	2653	2474	2377	2285	2189	2113	2054					
		Anteil in %	38,78	44,13	44,78	46,65	47,74	45,46	45,95	45,39	46,53	47,27	48,09	49,38	50,06					
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	CI Anteil in %	[37,69; 39,86]	[42,99; 45,27]	[43,58; 45,97]	[45,41; 47,89]	[46,45; 49,02]	[44,21; 46,72]	[44,66; 47,23]	[44,06; 46,71]	[45,16; 47,89]	[45,86; 48,68]	[46,64; 49,54]	[47,88; 50,88]	[48,53; 51,59]					
		Anzahl	4694	4026	3607	3254	2977	3134	2966	2818	2586	2430	2246	2059	1954					
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	60,49	55,06	54,31	52,31	51,40	51,72	51,37	51,70	50,62	50,27	49,34	48,12	47,62					
		CI Anteil in %	[59,40; 61,58]	[53,92; 56,20]	[53,11; 55,50]	[51,07; 53,55]	[50,11; 52,69]	[50,46; 52,97]	[50,08; 52,66]	[50,37; 53,02]	[49,25; 51,99]	[48,86; 51,68]	[47,89; 50,79]	[46,62; 49,62]	[46,10; 49,15]					
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	68	56	49	40	41	150	140	113	86	99	88	77	76					
		Anteil in %	0,88	0,77	0,74	0,64	0,71	2,48	2,42	2,07	1,68	2,05	1,93	1,80	1,85					
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,67; 1,08]	[0,57; 0,97]	[0,53; 0,94]	[0,44; 0,84]	[0,49; 0,92]	[2,08; 2,87]	[2,03; 2,82]	[1,69; 2,45]	[1,33; 2,04]	[1,65; 2,45]	[1,53; 2,33]	[1,40; 2,20]	[1,44; 2,26]					
		Anzahl	3886	3440	3087	2793	2584	2649	2464	2357	2150	2001	1902	1722	1648					
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	50,08	47,05	46,48	44,90	44,61	43,71	42,67	43,24	42,08	41,39	41,78	40,24	40,17					
CI Anteil in %		[48,96; 51,19]	[45,90; 48,19]	[45,28; 47,68]	[43,66; 46,13]	[43,33; 45,89]	[42,46; 44,96]	[41,40; 43,95]	[41,92; 44,56]	[40,73; 43,44]	[40,01; 42,78]	[40,35; 43,22]	[38,77; 41,71]	[38,67; 41,67]						
Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	10	2	9	3	4	14	12	9	12	11	5	11	6						
	Anteil in %	0,13	0,03	0,14	0,05	0,07	0,23	0,21	0,17	0,23	0,23	0,11	0,26	0,15						
Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[0,05; 0,21]	[0,00; 0,07]	[0,05; 0,22]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,14]	[0,11; 0,35]	[0,09; 0,33]	[0,06; 0,27]	[0,10; 0,37]	[0,09; 0,36]	[0,01; 0,21]	[0,11; 0,41]	[0,03; 0,26]						
	Anzahl	730	528	462	418	348	321	350	339	338	319	251	249	224						
Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anteil in %	9,41	7,22	6,96	6,72	6,01	5,30	6,06	6,22	6,62	6,60	5,51	5,82	5,46						
	CI Anteil in %	[8,76; 10,06]	[6,63; 7,81]	[6,34; 7,57]	[6,10; 7,34]	[5,40; 6,62]	[4,73; 5,86]	[5,45; 6,68]	[5,58; 6,86]	[5,93; 7,30]	[5,90; 7,30]	[4,85; 6,18]	[5,12; 6,52]	[4,76; 6,15]						
Patienten insgesamt	Anzahl	11195	10505	9553	8754	8293	7702	7289	6827	6435	6016	5692	5332	5084						

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	12062	11512	10573	9874	8979	8460	7894	7444	6960	6552	6164	5819						
	auswertbar	Anzahl	10026	9370	8698	8078	8371	7955	7540	7063	6671	6251	5940	5586						
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	4340	4262	3972	3912	4033	3745	3626	3411	3351	3254	3089	3039						
		Anteil in %	43,29	45,49	45,67	48,43	48,18	47,08	48,09	48,29	50,23	52,06	52,00	54,40						
		CI Anteil in %	[42,32; 44,26]	[44,48; 46,49]	[44,62; 46,71]	[47,34; 49,52]	[47,11; 49,25]	[45,98; 48,17]	[46,96; 49,22]	[47,13; 49,46]	[49,03; 51,43]	[50,82; 53,29]	[50,73; 53,27]	[53,10; 55,71]						
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	90	82	73	76	262	224	210	167	174	153	152	135						
		Anteil in %	0,90	0,88	0,84	0,94	3,13	2,82	2,79	2,36	2,61	2,45	2,56	2,42						
		CI Anteil in %	[0,71; 1,08]	[0,69; 1,06]	[0,65; 1,03]	[0,73; 1,15]	[2,76; 3,50]	[2,45; 3,18]	[2,41; 3,16]	[2,01; 2,72]	[2,23; 2,99]	[2,06; 2,83]	[2,16; 2,96]	[2,01; 2,82]						
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	4250	4180	3899	3836	3771	3521	3416	3244	3177	3101	2937	2904						
		Anteil in %	42,39	44,61	44,83	47,49	45,05	44,26	45,31	45,93	47,62	49,61	49,44	51,99						
		CI Anteil in %	[41,42; 43,36]	[43,60; 45,62]	[43,78; 45,87]	[46,40; 48,58]	[43,98; 46,11]	[43,17; 45,35]	[44,18; 46,43]	[44,77; 47,09]	[46,43; 48,82]	[48,37; 50,85]	[48,17; 50,72]	[50,68; 53,30]						
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	5686	5108	4726	4166	4338	4210	3914	3652	3320	2997	2851	2547						
		Anteil in %	56,71	54,51	54,33	51,57	51,82	52,92	51,91	51,71	49,77	47,94	48,00	45,60						
		CI Anteil in %	[55,74; 57,68]	[53,51; 55,52]	[53,29; 55,38]	[50,48; 52,66]	[50,75; 52,89]	[51,83; 54,02]	[50,78; 53,04]	[50,54; 52,87]	[48,57; 50,97]	[46,71; 49,18]	[46,73; 49,27]	[44,29; 46,90]						
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	61	75	62	59	247	198	173	165	140	132	108	98						
		Anteil in %	0,61	0,80	0,71	0,73	2,95	2,49	2,29	2,34	2,10	2,11	1,82	1,75						
		CI Anteil in %	[0,46; 0,76]	[0,62; 0,98]	[0,54; 0,89]	[0,54; 0,92]	[2,59; 3,31]	[2,15; 2,83]	[1,96; 2,63]	[1,98; 2,69]	[1,75; 2,44]	[1,76; 2,47]	[1,48; 2,16]	[1,41; 2,10]						
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	4909	4455	4131	3666	3599	3515	3303	3094	2857	2567	2459	2190						
		Anteil in %	48,96	47,55	47,49	45,38	42,99	44,19	43,81	43,81	42,83	41,07	41,40	39,21						
		CI Anteil in %	[47,98; 49,94]	[46,53; 48,56]	[46,44; 48,54]	[44,30; 46,47]	[41,93; 44,05]	[43,09; 45,28]	[42,69; 44,93]	[42,65; 44,96]	[41,64; 44,01]	[39,85; 42,29]	[40,14; 42,65]	[37,92; 40,49]						
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	9	10	7	9	20	18	22	20	16	18	9	13						
Anteil in %		0,09	0,11	0,08	0,11	0,24	0,23	0,29	0,28	0,24	0,29	0,15	0,23							
CI Anteil in %		[0,03; 0,15]	[0,04; 0,17]	[0,02; 0,14]	[0,04; 0,18]	[0,13; 0,34]	[0,12; 0,33]	[0,17; 0,41]	[0,16; 0,41]	[0,12; 0,36]	[0,16; 0,42]	[0,05; 0,25]	[0,11; 0,36]							
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	707	568	526	432	472	479	416	373	307	280	275	246							
	Anteil in %	7,05	6,06	6,05	5,35	5,64	6,02	5,52	5,28	4,60	4,48	4,63	4,40							
	CI Anteil in %	[6,55; 7,55]	[5,58; 6,55]	[5,55; 6,55]	[4,86; 5,84]	[5,14; 6,13]	[5,50; 6,54]	[5,00; 6,03]	[4,76; 5,80]	[4,10; 5,10]	[3,97; 4,99]	[4,10; 5,16]	[3,87; 4,94]							
Patienten insgesamt	Anzahl	14493	13791	12613	11771	10718	10080	9390	8865	8292	7821	7374	6965							
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	15207	14487	13635	12410	11640	10877	10244	9565	9012	8501	8071							
	auswertbar	Anzahl	12736	11919	10966	11587	10977	10422	9829	9158	8641	8223	7763							
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	5105	5406	5183	5548	5250	4967	4691	4509	4409	4317	4050							
		Anteil in %	40,08	45,36	47,26	47,88	47,83	47,66	47,73	49,24	51,02	52,50	52,17							
		CI Anteil in %	[39,23; 40,93]	[44,46; 46,25]	[46,33; 48,20]	[46,97; 48,79]	[46,89; 48,76]	[46,70; 48,62]	[46,74; 48,71]	[48,21; 50,26]	[49,97; 52,08]	[51,42; 53,58]	[51,06; 53,28]							
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	97	117	111	381	316	284	219	215	197	194	183							
		Anteil in %	0,76	0,98	1,01	3,29	2,88	2,73	2,23	2,35	2,28	2,36	2,36							
		CI Anteil in %	[0,61; 0,91]	[0,80; 1,16]	[0,82; 1,20]	[2,96; 3,61]	[2,57; 3,19]	[2,41; 3,04]	[1,94; 2,52]	[2,04; 2,66]	[1,97; 2,59]	[2,03; 2,69]	[2,02; 2,69]							
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	5008	5289	5072	5167	4934	4683	4472	4294	4212	4123	3867							
		Anteil in %	39,32	44,37	46,25	44,59	44,95	44,93	45,50	46,89	48,74	50,14	49,81							
		CI Anteil in %	[38,47; 40,17]	[43,48; 45,27]	[45,32; 47,19]	[43,69; 45,50]	[44,02; 45,88]	[43,98; 45,89]	[44,51; 46,48]	[45,87; 47,91]	[47,69; 49,80]	[49,06; 51,22]	[48,70; 50,93]							
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	7631	6513	5783	6039	5727	5455	5138	4649	4232	3906	3713							
		Anteil in %	59,92	54,64	52,74	52,12	52,17	52,34	52,27	50,76	48,98	47,50	47,83							
		CI Anteil in %	[59,07; 60,77]	[53,75; 55,54]	[51,80; 53,67]	[51,21; 53,03]	[51,24; 53,11]	[51,38; 53,30]	[51,29; 53,26]	[49,74; 51,79]	[47,92; 50,03]	[46,42; 48,58]	[46,72; 48,94]							
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	99	90	74	292	271	234	229	186	154	134	122							
		Anteil in %	0,78	0,76	0,67	2,52	2,47	2,25	2,33	2,03	1,78	1,63	1,57							
		CI Anteil in %	[0,62; 0,93]	[0,60; 0,91]	[0,52; 0,83]	[2,23; 2,81]	[2,18; 2,76]	[1,96; 2,53]	[2,03; 2,63]	[1,74; 2,32]	[1,50; 2,06]	[1,36; 1,90]	[1,29; 1,85]							
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	6403	5621	5069	5076	4813	4643	4348	3978	3661	3377	3180							
		Anteil in %	50,27	47,16	46,22	43,81	43,85	44,55	44,24	43,44	42,37	41,07	40,96							
		CI Anteil in %	[49,41; 51,14]	[46,26; 48,06]	[45,29; 47,16]	[42,90; 44,71]	[42,92; 44,77]	[43,60; 45,50]	[43,25; 45,22]	[42,42; 44,45]	[41,33; 43,41]	[40,00; 42,13]	[39,87; 42,06]							
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	15	7	8	32	28	22	13	10	8	8	9							
Anteil in %		0,12	0,06	0,07	0,28	0,26	0,21	0,13	0,11	0,09	0,10	0,12								
CI Anteil in %		[0,06; 0,18]	[0,02; 0,10]	[0,02; 0,12]	[0,18; 0,37]	[0,16; 0,35]	[0,12; 0,30]	[0,06; 0,20]	[0,04; 0,18]	[0,03; 0,16]	[0,03; 0,16]	[0,04; 0,19]								
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1114	795	632	639	615	556	548	475	409	387	402								
	Anteil in %	8,75	6,67	5,76	5,51	5,60	5,33	5,58	5,19	4,73	4,71	5,18								
	CI Anteil in %	[8,26; 9,24]	[6,22; 7,12]	[5,33; 6,20]	[5,10; 5,93]	[5,17; 6,03]	[4,90; 5,77]	[5,12; 6,03]	[4,73; 5,64]	[4,29; 5,18]	[4,25; 5,16]	[4,69; 5,67]								
Patienten insgesamt	Anzahl	18117	17190	16142	14666	13722	12823	12070	11283	10635	10034	9520								

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8629	8331	7680	7113	6534	6092	5694	5346	5029	4771								
	auswertbar	Anzahl	7273	6702	6997	6583	6173	5808	5446	5120	4844	4579								
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	3144	3184	3457	3197	3036	2842	2728	2744	2578	2406								
		Anteil in %	43,23	47,51	49,41	48,56	49,18	48,93	50,09	53,59	53,22	52,54								
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[42,09; 44,37]	[46,31; 48,70]	[48,24; 50,58]	[47,36; 49,77]	[47,93; 50,43]	[47,65; 50,22]	[48,76; 51,42]	[52,23; 54,96]	[51,82; 54,63]	[51,10; 53,99]								
		Anzahl	58	59	277	196	185	187	176	170	162	146								
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	0,80	0,88	3,96	2,98	3,00	3,22	3,23	3,32	3,34	3,19								
		CI Anteil in %	[0,59; 1,00]	[0,66; 1,10]	[3,50; 4,42]	[2,57; 3,39]	[2,57; 3,42]	[2,77; 3,67]	[2,76; 3,70]	[2,83; 3,81]	[2,84; 3,85]	[2,68; 3,70]								
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	3086	3125	3180	3001	2851	2655	2552	2574	2416	2260								
		Anteil in %	42,43	46,63	45,45	45,59	46,18	45,71	46,86	50,27	49,88	49,36								
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[41,29; 43,57]	[45,43; 47,82]	[44,28; 46,61]	[44,38; 46,79]	[44,94; 47,43]	[44,43; 46,99]	[45,53; 48,19]	[48,90; 51,64]	[48,47; 51,28]	[47,91; 50,80]								
		Anzahl	4129	3518	3540	3386	3137	2966	2718	2376	2266	2173								
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	56,77	52,49	50,59	51,44	50,82	51,07	49,91	46,41	46,78	47,46								
		CI Anteil in %	[55,63; 57,91]	[51,30; 53,69]	[49,42; 51,76]	[50,23; 52,64]	[49,57; 52,07]	[49,78; 52,35]	[48,58; 51,24]	[45,04; 47,77]	[45,37; 48,18]	[46,01; 48,90]								
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	70	65	184	200	172	146	129	108	89	93								
		Anteil in %	0,96	0,97	2,63	3,04	2,79	2,51	2,37	2,11	1,84	2,03								
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,74; 1,19]	[0,74; 1,20]	[2,25; 3,00]	[2,62; 3,45]	[2,38; 3,20]	[2,11; 2,92]	[1,96; 2,77]	[1,72; 2,50]	[1,46; 2,22]	[1,62; 2,44]								
		Anzahl	3441	3024	2934	2769	2604	2457	2268	1996	1910	1838								
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	47,31	45,12	41,93	42,06	42,18	42,30	41,65	38,98	39,43	40,14								
		CI Anteil in %	[46,16; 48,46]	[43,93; 46,31]	[40,78; 43,09]	[40,87; 43,26]	[40,95; 43,42]	[41,03; 43,57]	[40,34; 42,95]	[37,65; 40,32]	[38,05; 40,81]	[38,72; 41,56]								
Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2	5	18	21	17	20	7	8	12	9									
	Anteil in %	0,03	0,07	0,26	0,32	0,28	0,34	0,13	0,16	0,25	0,20									
Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[0,00; 0,07]	[0,01; 0,14]	[0,14; 0,38]	[0,18; 0,46]	[0,14; 0,41]	[0,19; 0,50]	[0,03; 0,22]	[0,05; 0,26]	[0,11; 0,39]	[0,07; 0,32]									
	Anzahl	616	424	404	396	344	343	314	264	255	233									
Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anteil in %	8,47	6,33	5,77	6,02	5,57	5,91	5,77	5,16	5,26	5,09									
	CI Anteil in %	[7,83; 9,11]	[5,74; 6,91]	[5,23; 6,32]	[5,44; 6,59]	[5,00; 6,14]	[5,30; 6,51]	[5,15; 6,38]	[4,55; 5,76]	[4,64; 5,89]	[4,45; 5,73]									
Patienten insgesamt	Anzahl	10330	9940	9118	8435	7735	7205	6731	6317	5936	5626									
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	7816	7529	7031	6455	5982	5596	5296	4977	4715									
	auswertbar	Anzahl	6534	7021	6571	6082	5705	5373	5067	4795	4535									
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2807	3267	3049	2886	2699	2596	2611	2492	2368									
		Anteil in %	42,96	46,53	46,40	47,45	47,31	48,32	51,53	51,97	52,22									
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[41,76; 44,16]	[45,36; 47,70]	[45,19; 47,61]	[46,20; 48,71]	[46,01; 48,61]	[46,98; 49,65]	[50,15; 52,91]	[50,56; 53,39]	[50,76; 53,67]									
		Anzahl	72	237	213	182	158	155	138	127	118									
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	1,10	3,38	3,24	2,99	2,77	2,88	2,72	2,65	2,60									
		CI Anteil in %	[0,85; 1,36]	[2,95; 3,80]	[2,81; 3,67]	[2,56; 3,42]	[2,34; 3,20]	[2,44; 3,33]	[2,28; 3,17]	[2,19; 3,10]	[2,14; 3,07]									
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2735	3030	2836	2704	2541	2441	2473	2365	2250									
		Anteil in %	41,86	43,16	43,16	44,46	44,54	45,43	48,81	49,32	49,61									
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[40,66; 43,05]	[42,00; 44,31]	[41,96; 44,36]	[43,21; 45,71]	[43,25; 45,83]	[44,10; 46,76]	[47,43; 50,18]	[47,91; 50,74]	[48,16; 51,07]									
		Anzahl	3727	3754	3522	3196	3006	2777	2456	2303	2167									
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	57,04	53,47	53,60	52,55	52,69	51,68	48,47	48,03	47,78									
		CI Anteil in %	[55,84; 58,24]	[52,30; 54,64]	[52,39; 54,81]	[51,29; 53,80]	[51,39; 53,99]	[50,35; 53,02]	[47,09; 49,85]	[46,61; 49,44]	[46,33; 49,24]									
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	62	236	199	176	146	123	105	96	79									
		Anteil in %	0,95	3,36	3,03	2,89	2,56	2,29	2,07	2,00	1,74									
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,71; 1,18]	[2,94; 3,78]	[2,61; 3,44]	[2,47; 3,32]	[2,15; 2,97]	[1,89; 2,69]	[1,68; 2,46]	[1,61; 2,40]	[1,36; 2,12]									
		Anzahl	3058	3008	2863	2635	2481	2317	2082	1923	1816									
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	46,80	42,84	43,57	43,32	43,49	43,12	41,09	40,10	40,04									
		CI Anteil in %	[45,59; 48,01]	[41,69; 44,00]	[42,37; 44,77]	[42,08; 44,57]	[42,20; 44,77]	[41,80; 44,45]	[39,73; 42,44]	[38,72; 41,49]	[38,62; 41,47]									
Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	7	23	26	22	22	11	19	16	10										
	Anteil in %	0,11	0,33	0,40	0,36	0,39	0,20	0,37	0,33	0,22										
Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[0,03; 0,19]	[0,19; 0,46]	[0,24; 0,55]	[0,21; 0,51]	[0,22; 0,55]	[0,08; 0,33]	[0,21; 0,54]	[0,17; 0,50]	[0,08; 0,36]										
	Anzahl	600	487	434	363	357	326	250	268	262										
Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anteil in %	9,18	6,94	6,60	5,97	6,26	6,07	4,93	5,59	5,78										
	CI Anteil in %	[8,48; 9,88]	[6,34; 7,53]	[6,00; 7,21]	[5,37; 6,56]	[5,63; 6,89]	[5,43; 6,71]	[4,34; 5,53]	[4,94; 6,24]	[5,10; 6,46]										
Patienten insgesamt	Anzahl	9430	9074	8463	7733	7156	6701	6331	5959	5643										

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5258	5096	4753	4392	4084	3827	3605	3394												
	auswertbar	Anzahl	5258	4843	4481	4169	3927	3670	3450	3248												
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2460	2266	2160	1993	1898	1850	1782	1719												
		Anteil in %	46,79	46,79	48,20	47,81	48,33	50,41	51,65	52,92												
		CI Anteil in %	[45,44; 48,13]	[45,38; 48,19]	[46,74; 49,67]	[46,29; 49,32]	[46,77; 49,90]	[48,79; 52,03]	[49,98; 53,32]	[51,21; 54,64]												
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	165	137	143	121	120	113	114	96												
		Anteil in %	3,14	2,83	3,19	2,90	3,06	3,08	3,30	2,96												
		CI Anteil in %	[2,67; 3,61]	[2,36; 3,30]	[2,68; 3,71]	[2,39; 3,41]	[2,52; 3,59]	[2,52; 3,64]	[2,71; 3,90]	[2,37; 3,54]												
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2295	2129	2017	1872	1778	1737	1668	1623												
		Anteil in %	43,65	43,96	45,01	44,90	45,28	47,33	48,35	49,97												
		CI Anteil in %	[42,31; 44,99]	[42,56; 45,36]	[43,56; 46,47]	[43,39; 46,41]	[43,72; 46,83]	[45,71; 48,95]	[46,68; 50,02]	[48,25; 51,69]												
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2798	2577	2321	2176	2029	1820	1668	1529												
		Anteil in %	53,21	53,21	51,80	52,19	51,67	49,59	48,35	47,08												
		CI Anteil in %	[51,87; 54,56]	[51,81; 54,62]	[50,33; 53,26]	[50,68; 53,71]	[50,10; 53,23]	[47,97; 51,21]	[46,68; 50,02]	[45,36; 48,79]												
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	180	158	124	108	100	86	64	63												
		Anteil in %	3,42	3,26	2,77	2,59	2,55	2,34	1,86	1,94												
		CI Anteil in %	[2,93; 3,91]	[2,76; 3,76]	[2,29; 3,25]	[2,11; 3,07]	[2,05; 3,04]	[1,85; 2,83]	[1,40; 2,31]	[1,47; 2,41]												
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2181	2062	1892	1791	1667	1527	1393	1270												
		Anteil in %	41,48	42,58	42,22	42,96	42,45	41,61	40,38	39,10												
		CI Anteil in %	[40,15; 42,81]	[41,18; 43,97]	[40,78; 43,67]	[41,46; 44,46]	[40,90; 44,00]	[40,01; 43,20]	[38,74; 42,01]	[37,42; 40,78]												
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	23	16	14	12	7	5	8	10													
	Anteil in %	0,44	0,33	0,31	0,29	0,18	0,14	0,23	0,31													
	CI Anteil in %	[0,26; 0,62]	[0,17; 0,49]	[0,15; 0,48]	[0,13; 0,45]	[0,05; 0,31]	[0,02; 0,26]	[0,07; 0,39]	[0,12; 0,50]													
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	414	341	291	265	255	202	203	186													
	Anteil in %	7,87	7,04	6,49	6,36	6,49	5,50	5,88	5,73													
	CI Anteil in %	[7,15; 8,60]	[6,32; 7,76]	[5,77; 7,22]	[5,62; 7,10]	[5,72; 7,26]	[4,77; 6,24]	[5,10; 6,67]	[4,93; 6,53]													
Patienten insgesamt	Anzahl	6552	6320	5851	5399	5008	4674	4394	4147													
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4470	4299	3997	3690	3461	3244	3067													
	auswertbar	Anzahl	4468	4110	3789	3522	3318	3121	2973													
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1928	1983	1891	1797	1786	1692	1585													
		Anteil in %	43,15	48,25	49,91	51,02	53,83	54,21	53,31													
		CI Anteil in %	[41,70; 44,60]	[46,72; 49,78]	[48,32; 51,50]	[49,37; 52,67]	[52,13; 55,52]	[52,47; 55,96]	[51,52; 55,11]													
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	115	146	116	113	90	83	79													
		Anteil in %	2,57	3,55	3,06	3,21	2,71	2,66	2,66													
		CI Anteil in %	[2,11; 3,04]	[2,99; 4,12]	[2,51; 3,61]	[2,63; 3,79]	[2,16; 3,27]	[2,09; 3,22]	[2,08; 3,24]													
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1813	1837	1775	1684	1696	1609	1506													
		Anteil in %	40,58	44,70	46,85	47,81	51,12	51,55	50,66													
		CI Anteil in %	[39,14; 42,02]	[43,18; 46,22]	[45,26; 48,44]	[46,16; 49,46]	[49,41; 52,82]	[49,80; 53,31]	[48,86; 52,45]													
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2540	2127	1898	1725	1532	1429	1388													
		Anteil in %	56,85	51,75	50,09	48,98	46,17	45,79	46,69													
		CI Anteil in %	[55,40; 58,30]	[50,22; 53,28]	[48,50; 51,68]	[47,33; 50,63]	[44,48; 47,87]	[44,04; 47,53]	[44,89; 48,48]													
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	170	113	96	79	80	73	60													
		Anteil in %	3,80	2,75	2,53	2,24	2,41	2,34	2,02													
		CI Anteil in %	[3,24; 4,37]	[2,25; 3,25]	[2,03; 3,03]	[1,75; 2,73]	[1,89; 2,93]	[1,81; 2,87]	[1,51; 2,52]													
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1982	1726	1561	1439	1265	1200	1158													
		Anteil in %	44,36	42,00	41,20	40,86	38,13	38,45	38,95													
		CI Anteil in %	[42,90; 45,82]	[40,49; 43,50]	[39,63; 42,77]	[39,23; 42,48]	[36,47; 39,78]	[36,74; 40,16]	[37,20; 40,70]													
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	23	11	7	6	8	7	7														
	Anteil in %	0,51	0,27	0,18	0,17	0,24	0,22	0,24														
	CI Anteil in %	[0,30; 0,72]	[0,11; 0,43]	[0,05; 0,32]	[0,03; 0,31]	[0,07; 0,41]	[0,06; 0,39]	[0,06; 0,41]														
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	365	277	234	201	179	149	163														
	Anteil in %	8,17	6,74	6,18	5,71	5,39	4,77	5,48														
	CI Anteil in %	[7,37; 8,97]	[5,97; 7,51]	[5,41; 6,94]	[4,94; 6,47]	[4,63; 6,16]	[4,03; 5,52]	[4,66; 6,30]														
Patienten insgesamt	Anzahl	5527	5299	4907	4513	4221	3942	3724														

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4796	4592	4215	3898	3631	3407													
	auswertbar	Anzahl	4795	4383	4009	3739	3501	3298													
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2283	2143	2025	1984	1892	1750													
		Anteil in %	47,61	48,89	50,51	53,06	54,04	53,06													
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[46,20; 49,03]	[47,41; 50,37]	[48,96; 52,06]	[51,46; 54,66]	[52,39; 55,69]	[51,36; 54,77]													
		Anzahl	165	154	139	128	99	84													
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	3,44	3,51	3,47	3,42	2,83	2,55													
		CI Anteil in %	[2,93; 3,96]	[2,97; 4,06]	[2,90; 4,03]	[2,84; 4,01]	[2,28; 3,38]	[2,01; 3,08]													
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2118	1989	1886	1856	1793	1666													
		Anteil in %	44,17	45,38	47,04	49,64	51,21	50,52													
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[42,77; 45,58]	[43,91; 46,85]	[45,50; 48,59]	[48,04; 51,24]	[49,56; 52,87]	[48,81; 52,22]													
		Anzahl	2512	2240	1984	1755	1609	1548													
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	52,39	51,11	49,49	46,94	45,96	46,94													
		CI Anteil in %	[50,97; 53,80]	[49,63; 52,59]	[47,94; 51,04]	[45,34; 48,54]	[44,31; 47,61]	[45,23; 48,64]													
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	150	121	97	70	84	76													
		Anteil in %	3,13	2,76	2,42	1,87	2,40	2,30													
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[2,64; 3,62]	[2,28; 3,25]	[1,94; 2,90]	[1,44; 2,31]	[1,89; 2,91]	[1,79; 2,82]													
		Anzahl	1978	1820	1668	1484	1351	1328													
	Patienten insgesamt	Anteil in %	41,25	41,52	41,61	39,69	38,59	40,27													
		CI Anteil in %	[39,86; 42,64]	[40,07; 42,98]	[40,08; 43,13]	[38,12; 41,26]	[36,98; 40,20]	[38,59; 41,94]													
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5982	5705	5205	4802	4483	4208													
	auswertbar	Anzahl	5389	5013	4561	4267	4021														
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2328	2497	2324	2235	2114														
		Anteil in %	43,20	49,81	50,95	52,38	52,57														
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[41,88; 44,52]	[48,43; 51,19]	[49,50; 52,40]	[50,88; 53,88]	[51,03; 54,12]														
		Anzahl	153	158	119	134	113														
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	2,84	3,15	2,61	3,14	2,81														
		CI Anteil in %	[2,40; 3,28]	[2,67; 3,64]	[2,15; 3,07]	[2,62; 3,66]	[2,30; 3,32]														
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2175	2339	2205	2101	2001														
		Anteil in %	40,36	46,66	48,34	49,24	49,76														
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[39,05; 41,67]	[45,28; 48,04]	[46,89; 49,80]	[47,74; 50,74]	[48,22; 51,31]														
		Anzahl	3061	2516	2237	2032	1907														
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	56,80	50,19	49,05	47,62	47,43														
		CI Anteil in %	[55,48; 58,12]	[48,81; 51,57]	[47,60; 50,50]	[46,12; 49,12]	[45,88; 48,97]														
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	143	121	112	86	84														
		Anteil in %	2,65	2,41	2,46	2,02	2,09														
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[2,22; 3,08]	[1,99; 2,84]	[2,01; 2,90]	[1,59; 2,44]	[1,65; 2,53]														
		Anzahl	2440	2100	1853	1720	1594														
	Patienten insgesamt	Anteil in %	45,28	41,89	40,63	40,31	39,64														
		CI Anteil in %	[43,95; 46,61]	[40,53; 43,26]	[39,20; 42,05]	[38,84; 41,78]	[38,13; 41,15]														
Patienten insgesamt	Anzahl	34	13	11	9	7															
	Anteil in %	0,63	0,26	0,24	0,21	0,17															
Patienten insgesamt	CI Anteil in %	[0,42; 0,84]	[0,12; 0,40]	[0,10; 0,38]	[0,07; 0,35]	[0,05; 0,30]															
	Anzahl	444	282	261	217	222															
Patienten insgesamt	Anteil in %	8,24	5,63	5,72	5,09	5,52															
	CI Anteil in %	[7,50; 8,97]	[4,99; 6,26]	[5,05; 6,40]	[4,43; 5,74]	[4,81; 6,23]															

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5422	5199	4831	4457															
	auswertbar	Anzahl	5419	4992	4554	4276															
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2555	2588	2400	2220															
		Anteil in %	47,15	51,84	52,70	51,92															
		CI Anteil in %	[45,82; 48,48]	[50,46; 53,23]	[51,25; 54,15]	[50,42; 53,42]															
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	171	165	126	128															
		Anteil in %	3,16	3,31	2,77	2,99															
		CI Anteil in %	[2,69; 3,62]	[2,81; 3,80]	[2,29; 3,24]	[2,48; 3,50]															
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2384	2423	2274	2092															
		Anteil in %	43,99	48,54	49,93	48,92															
		CI Anteil in %	[42,67; 45,32]	[47,15; 49,92]	[48,48; 51,39]	[47,43; 50,42]															
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2864	2404	2154	2056															
		Anteil in %	52,85	48,16	47,30	48,08															
		CI Anteil in %	[51,52; 54,18]	[46,77; 49,54]	[45,85; 48,75]	[46,58; 49,58]															
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	172	127	101	86															
		Anteil in %	3,17	2,54	2,22	2,01															
		CI Anteil in %	[2,71; 3,64]	[2,11; 2,98]	[1,79; 2,65]	[1,59; 2,43]															
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2288	1985	1786	1735															
		Anteil in %	42,22	39,76	39,22	40,58															
		CI Anteil in %	[40,91; 43,54]	[38,41; 41,12]	[37,80; 40,64]	[39,10; 42,05]															
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	31	10	11	10																
	Anteil in %	0,57	0,20	0,24	0,23																
	CI Anteil in %	[0,37; 0,77]	[0,08; 0,32]	[0,10; 0,38]	[0,09; 0,38]																
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	373	282	256	225																
	Anteil in %	6,88	5,65	5,62	5,26																
	CI Anteil in %	[6,21; 7,56]	[5,01; 6,29]	[4,95; 6,29]	[4,59; 5,93]																
Patienten insgesamt	Anzahl	6682	6400	5912	5443																
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5163	4972	4601																
	auswertbar	Anzahl	5161	4783	4357																
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2361	2448	2296																
		Anteil in %	45,75	51,18	52,70																
		CI Anteil in %	[44,39; 47,11]	[49,76; 52,60]	[51,21; 54,18]																
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	144	144	104																
		Anteil in %	2,79	3,01	2,39																
		CI Anteil in %	[2,34; 3,24]	[2,53; 3,49]	[1,93; 2,84]																
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2217	2304	2192																
		Anteil in %	42,96	48,17	50,31																
		CI Anteil in %	[41,61; 44,31]	[46,75; 49,59]	[48,83; 51,79]																
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2800	2335	2061																
		Anteil in %	54,25	48,82	47,30																
		CI Anteil in %	[52,89; 55,61]	[47,40; 50,24]	[45,82; 48,79]																
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	151	116	91																
		Anteil in %	2,93	2,43	2,09																
		CI Anteil in %	[2,47; 3,39]	[1,99; 2,86]	[1,66; 2,51]																
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2213	1914	1717																
		Anteil in %	42,88	40,02	39,41																
		CI Anteil in %	[41,53; 44,23]	[38,63; 41,41]	[37,96; 40,86]																
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	32	12	14																	
	Anteil in %	0,62	0,25	0,32																	
	CI Anteil in %	[0,41; 0,83]	[0,11; 0,39]	[0,15; 0,49]																	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	404	293	239																	
	Anteil in %	7,83	6,13	5,49																	
	CI Anteil in %	[7,10; 8,56]	[5,45; 6,81]	[4,81; 6,16]																	
Patienten insgesamt	Anzahl	6352	6098	5609																	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4405	4246																		
	auswertbar	Anzahl	4403	4079																		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2089	2091																		
		Anteil in %	47,44	51,26																		
		CI Anteil in %	[45,97; 48,92]	[49,73; 52,80]																		
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	134	124																		
		Anteil in %	3,04	3,04																		
		CI Anteil in %	[2,54; 3,55]	[2,51; 3,57]																		
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1955	1967																		
		Anteil in %	44,40	48,22																		
		CI Anteil in %	[42,93; 45,87]	[46,69; 49,76]																		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2314	1988																		
		Anteil in %	52,56	48,74																		
		CI Anteil in %	[51,08; 54,03]	[47,20; 50,27]																		
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	130	90																		
		Anteil in %	2,95	2,21																		
		CI Anteil in %	[2,45; 3,45]	[1,76; 2,66]																		
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1838	1647																		
		Anteil in %	41,74	40,38																		
		CI Anteil in %	[40,29; 43,20]	[38,87; 41,88]																		
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	26	12																			
	Anteil in %	0,59	0,29																			
	CI Anteil in %	[0,36; 0,82]	[0,13; 0,46]																			
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	320	239																			
	Anteil in %	7,27	5,86																			
	CI Anteil in %	[6,50; 8,03]	[5,14; 6,58]																			
Patienten insgesamt	Anzahl	5365	5157																			
2012-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4927																			
	auswertbar	Anzahl	4923																			
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2353																			
		Anteil in %	47,80																			
		CI Anteil in %	[46,40; 49,19]																			
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	141																			
		Anteil in %	2,86																			
		CI Anteil in %	[2,40; 3,33]																			
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2212																			
		Anteil in %	44,93																			
		CI Anteil in %	[43,54; 46,32]																			
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2570																			
		Anteil in %	52,20																			
		CI Anteil in %	[50,81; 53,60]																			
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	135																			
		Anteil in %	2,74																			
		CI Anteil in %	[2,29; 3,20]																			
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2001																			
		Anteil in %	40,65																			
		CI Anteil in %	[39,27; 42,02]																			
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	24																				
	Anteil in %	0,49																				
	CI Anteil in %	[0,29; 0,68]																				
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	410																				
	Anteil in %	8,33																				
	CI Anteil in %	[7,56; 9,10]																				
Patienten insgesamt	Anzahl	5991																				

In Tabelle 3.1.5 wird die Entwicklung des **mittleren systolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

In der Kohorte 2003-1 lagen im Beitrittsjahr für 15406 Patienten im Hypertoniker-Kollektiv auswertbare Angaben zum systolischen Blutdruck vor. Der arithmetische Mittelwert lag bei 140,93 mmHg, der Median bei 140,00 mmHg der dafür auswertbaren Patienten. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für 3691 der dann noch eingeschriebenen Patienten auswertbare Angaben vor. Der Mittelwert lag bei 135,14 und der Median bei 135,00.

Tabelle 3.1.5 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	15406	14097	12720	11540	10481	9708	8972	7622	7045	6441	6135	5712	5388	5105	4796	4490	4238	4008	3787
	auswertbar	Anzahl	15406	11315	11925	11273	10208	9517	8584	7377	6835	6306	5855	5481	5231	4937	4640	4375	4149	3929	3691
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,93	139,22	138,39	138,30	137,99	136,94	136,95	135,99	135,65	135,60	135,21	135,65	135,85	135,57	136,13	135,83	135,30	134,73	135,14
		CI Mean	[140,68; 141,17]	[138,94; 139,51]	[138,12; 138,65]	[138,03; 138,57]	[137,71; 138,28]	[136,65; 137,23]	[136,64; 137,25]	[135,66; 136,31]	[135,31; 135,98]	[135,24; 135,96]	[134,84; 135,57]	[135,26; 136,04]	[135,46; 136,24]	[135,16; 135,98]	[135,70; 136,56]	[135,39; 136,26]	[134,85; 135,76]	[134,28; 135,17]	[134,67; 135,60]
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18532</i>	<i>16919</i>	<i>15229</i>	<i>13819</i>	<i>12524</i>	<i>11575</i>	<i>10657</i>	<i>9051</i>	<i>8357</i>	<i>7654</i>	<i>7302</i>	<i>6797</i>	<i>6413</i>	<i>6084</i>	<i>5724</i>	<i>5377</i>	<i>5082</i>	<i>4817</i>	<i>4564</i>	
2003-2	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	12524	10865	9865	8860	8090	7381	6660	6078	5508	5264	4945	4695	4427	4181	3959	3750	3517	3338	
	auswertbar	Anzahl	12524	9804	9548	8627	7885	7101	6431	5787	5376	5019	4719	4476	4286	4050	3853	3628	3421	3241	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	141,40	140,03	139,32	139,11	138,14	137,94	137,29	137,01	136,94	136,58	136,82	136,78	136,54	136,86	136,12	135,92	135,83	135,82	
		CI Mean	[141,12; 141,68]	[139,73; 140,34]	[139,02; 139,62]	[138,79; 139,43]	[137,81; 138,47]	[137,60; 138,29]	[136,92; 137,65]	[136,62; 137,39]	[136,55; 137,33]	[136,17; 136,98]	[136,38; 137,26]	[136,35; 137,22]	[136,08; 137,00]	[136,40; 137,31]	[135,65; 136,60]	[135,41; 136,43]	[135,32; 136,33]	[135,29; 136,35]	
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15338</i>	<i>13264</i>	<i>11995</i>	<i>10737</i>	<i>9767</i>	<i>8914</i>	<i>8042</i>	<i>7361</i>	<i>6677</i>	<i>6381</i>	<i>5997</i>	<i>5700</i>	<i>5383</i>	<i>5096</i>	<i>4829</i>	<i>4575</i>	<i>4304</i>	<i>4094</i>		
2004-1	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5332	4764	4236	3849	3469	3106	2874	2602	2467	2312	2162	2028	1923	1811	1721	1623	1556		
	auswertbar	Anzahl	5332	4514	4053	3720	3341	3006	2739	2504	2300	2186	2051	1926	1824	1739	1640	1568	1487		
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	143,21	140,26	139,70	138,98	138,97	138,30	137,80	137,24	137,18	137,40	137,17	137,10	137,39	136,95	136,41	136,46	136,05		
		CI Mean	[142,76; 143,66]	[139,80; 140,72]	[139,23; 140,18]	[138,48; 139,47]	[138,45; 139,50]	[137,77; 138,84]	[137,24; 138,37]	[136,64; 137,84]	[136,59; 137,77]	[136,75; 138,04]	[136,49; 137,85]	[136,42; 137,78]	[136,67; 138,11]	[136,21; 137,69]	[135,65; 137,17]	[135,71; 137,22]	[135,27; 136,84]		
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	135,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00		
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6722</i>	<i>5979</i>	<i>5294</i>	<i>4783</i>	<i>4296</i>	<i>3854</i>	<i>3572</i>	<i>3250</i>	<i>3080</i>	<i>2873</i>	<i>2690</i>	<i>2532</i>	<i>2401</i>	<i>2263</i>	<i>2147</i>	<i>2032</i>	<i>1951</i>			
2004-2	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4166	3805	3482	3155	2832	2636	2456	2358	2196	2083	1982	1877	1784	1697	1623	1546			
	auswertbar	Anzahl	4166	3588	3339	3036	2635	2443	2265	2098	1978	1874	1797	1682	1605	1520	1456	1375			
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	141,18	139,53	138,63	138,29	137,05	136,81	136,71	136,42	136,90	136,28	135,92	136,41	135,68	135,49	135,33	135,13			
		CI Mean	[140,68; 141,67]	[139,01; 140,04]	[138,12; 139,14]	[137,75; 138,84]	[136,47; 137,63]	[136,20; 137,42]	[136,09; 137,33]	[135,78; 137,05]	[136,24; 137,57]	[135,60; 136,95]	[135,20; 136,63]	[135,69; 137,13]	[134,95; 136,42]	[134,74; 136,24]	[134,57; 136,10]	[134,34; 135,92]			
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00			
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5209</i>	<i>4715</i>	<i>4298</i>	<i>3897</i>	<i>3506</i>	<i>3261</i>	<i>3038</i>	<i>2910</i>	<i>2710</i>	<i>2571</i>	<i>2446</i>	<i>2321</i>	<i>2204</i>	<i>2102</i>	<i>2005</i>	<i>1906</i>				
2005-1	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6030	5652	5166	4590	4148	3825	3627	3394	3207	3031	2863	2697	2569	2441	2311				
	auswertbar	Anzahl	6030	5389	4876	4405	3985	3683	3424	3236	3073	2938	2765	2621	2475	2356	2243				
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	141,48	139,40	138,73	137,42	136,87	137,03	136,41	136,92	136,41	136,20	136,71	136,03	135,34	135,22	135,14				
		CI Mean	[141,07; 141,90]	[138,98; 139,83]	[138,29; 139,16]	[136,97; 137,87]	[136,40; 137,33]	[136,55; 137,51]	[135,92; 136,91]	[136,41; 137,44]	[135,87; 136,94]	[135,65; 136,76]	[136,13; 137,29]	[135,45; 136,62]	[134,77; 135,92]	[134,62; 135,82]	[134,52; 135,76]				
		Median	140,00	140,00	140,00	138,00	136,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	134,00	135,00			
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7326</i>	<i>6819</i>	<i>6209</i>	<i>5519</i>	<i>4992</i>	<i>4584</i>	<i>4340</i>	<i>4066</i>	<i>3849</i>	<i>3623</i>	<i>3415</i>	<i>3216</i>	<i>3064</i>	<i>2915</i>	<i>2769</i>					
2005-2	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8022	7388	6740	6142	5627	5318	4943	4669	4380	4104	3827	3603	3419	3233					
	auswertbar	Anzahl	8022	7042	6438	5886	5409	5011	4662	4428	4197	3923	3699	3486	3297	3119					
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,31	139,25	138,43	137,86	137,40	137,09	137,32	137,04	137,31	137,27	137,10	136,23	136,17	135,94					
		CI Mean	[139,95; 140,68]	[138,88; 139,62]	[138,04; 138,81]	[137,47; 138,25]	[137,00; 137,81]	[136,67; 137,50]	[136,87; 137,77]	[136,58; 137,49]	[136,85; 137,77]	[136,78; 137,77]	[136,59; 137,61]	[135,74; 136,73]	[135,66; 136,68]	[135,42; 136,47]					
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	137,00	136,00	137,00	135,00	136,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00					
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9778</i>	<i>8989</i>	<i>8164</i>	<i>7426</i>	<i>6790</i>	<i>6402</i>	<i>5933</i>	<i>5585</i>	<i>5240</i>	<i>4913</i>	<i>4579</i>	<i>4321</i>	<i>4101</i>	<i>3871</i>						

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2006-1	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9160	8616	7855	7232	6859	6367	6029	5640	5318	4976	4703	4409	4207							
	auswertbar	Anzahl	9160	8317	7542	7029	6459	6060	5774	5451	5109	4834	4552	4280	4105							
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,66	138,42	138,04	137,65	137,17	137,21	137,31	137,36	137,49	137,36	136,81	136,50	136,40							
		CI Mean	[140,32; 140,99]	[138,07; 138,76]	[137,69; 138,40]	[137,29; 138,02]	[136,79; 137,54]	[136,83; 137,59]	[136,91; 137,70]	[136,95; 137,77]	[137,06; 137,93]	[136,91; 137,81]	[136,37; 137,25]	[136,04; 136,96]	[135,94; 136,87]							
		Median	140,00	140,00	140,00	138,00	137,00	138,00	138,00	138,00	138,00	137,00	136,00	135,00	135,00	135,00						
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11195</i>	<i>10505</i>	<i>9553</i>	<i>8754</i>	<i>8293</i>	<i>7702</i>	<i>7289</i>	<i>6827</i>	<i>6435</i>	<i>6016</i>	<i>5692</i>	<i>5332</i>	<i>5084</i>								
2006-2	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	12062	11512	10573	9874	8979	8460	7894	7444	6960	6552	6164	5819								
	auswertbar	Anzahl	12062	10860	9994	9178	8375	7960	7545	7068	6674	6254	5942	5588								
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,21	138,11	138,11	137,24	137,56	137,65	137,32	137,49	136,93	136,15	136,28	135,77								
		CI Mean	[138,93; 139,49]	[137,83; 138,39]	[137,81; 138,40]	[136,93; 137,54]	[137,24; 137,89]	[137,31; 137,99]	[136,98; 137,67]	[137,14; 137,84]	[136,58; 137,29]	[135,78; 136,51]	[135,91; 136,66]	[135,39; 136,15]								
		Median	140,00	140,00	140,00	138,00	138,00	140,00	139,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00							
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>13791</i>	<i>12613</i>	<i>11771</i>	<i>10718</i>	<i>10080</i>	<i>9390</i>	<i>8865</i>	<i>8292</i>	<i>7821</i>	<i>7374</i>	<i>6965</i>									
2007-1	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	15207	14487	13635	12410	11640	10877	10244	9565	9012	8501	8071									
	auswertbar	Anzahl	15207	13805	12663	11588	10978	10423	9830	9158	8643	8225	7765									
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,43	138,34	137,83	137,60	137,50	137,27	137,51	137,16	136,32	136,03	136,17									
		CI Mean	[140,18; 140,69]	[138,08; 138,59]	[137,57; 138,10]	[137,33; 137,88]	[137,21; 137,79]	[136,98; 137,56]	[137,21; 137,81]	[136,85; 137,46]	[136,00; 136,64]	[135,72; 136,35]	[135,84; 136,51]									
		Median	140,00	140,00	140,00	139,00	138,00	139,00	138,00	136,00	135,00	135,00	135,00	135,00								
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>17190</i>	<i>16142</i>	<i>14666</i>	<i>13722</i>	<i>12823</i>	<i>12070</i>	<i>11283</i>	<i>10635</i>	<i>10034</i>	<i>9520</i>										
2007-2	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8629	8331	7680	7113	6534	6092	5694	5346	5029	4771										
	auswertbar	Anzahl	8629	7826	6997	6583	6173	5808	5446	5120	4844	4579										
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,44	137,83	137,47	137,58	137,11	137,33	137,06	136,38	136,24	136,38										
		CI Mean	[139,10; 139,78]	[137,49; 138,17]	[137,10; 137,84]	[137,21; 137,96]	[136,72; 137,50]	[136,94; 137,73]	[136,65; 137,47]	[135,96; 136,79]	[135,81; 136,67]	[135,94; 136,82]										
		Median	140,00	139,00	135,00	136,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00								
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>9940</i>	<i>9118</i>	<i>8435</i>	<i>7735</i>	<i>7205</i>	<i>6731</i>	<i>6317</i>	<i>5936</i>	<i>5626</i>											
2008-1	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	7816	7529	7031	6455	5982	5596	5296	4977	4715											
	auswertbar	Anzahl	7816	7049	6571	6082	5706	5373	5067	4795	4535											
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,17	138,18	138,14	137,67	137,59	137,28	136,39	136,37	136,33											
		CI Mean	[139,80; 140,54]	[137,81; 138,56]	[137,76; 138,53]	[137,28; 138,07]	[137,18; 138,00]	[136,86; 137,69]	[135,97; 136,81]	[135,94; 136,80]	[135,88; 136,79]											
		Median	140,00	140,00	140,00	138,00	139,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00										
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>9074</i>	<i>8463</i>	<i>7733</i>	<i>7156</i>	<i>6701</i>	<i>6331</i>	<i>5959</i>	<i>5643</i>												
2008-2	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5258	5096	4753	4392	4084	3827	3605	3394												
	auswertbar	Anzahl	5258	4843	4481	4169	3927	3670	3450	3249												
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,47	137,71	137,20	137,40	137,15	136,37	136,13	136,40												
		CI Mean	[138,02; 138,93]	[137,24; 138,18]	[136,73; 137,68]	[136,92; 137,89]	[136,65; 137,65]	[135,86; 136,87]	[135,60; 136,66]	[135,85; 136,95]												
		Median	140,00	139,00	136,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00											
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>6320</i>	<i>5851</i>	<i>5399</i>	<i>5008</i>	<i>4674</i>	<i>4394</i>	<i>4147</i>													
2009-1	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4470	4299	3997	3690	3461	3244	3067													
	auswertbar	Anzahl	4470	4112	3790	3523	3318	3121	2974													
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,46	137,47	136,96	136,70	135,86	135,72	135,69													
		CI Mean	[138,97; 139,95]	[136,99; 137,96]	[136,46; 137,46]	[136,19; 137,21]	[135,35; 136,38]	[135,17; 136,26]	[135,13; 136,25]													
		Median	140,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00												
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>5299</i>	<i>4907</i>	<i>4513</i>	<i>4221</i>	<i>3942</i>	<i>3724</i>														

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der erwachsenen Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2009-2	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4796	4592	4215	3898	3631	3407																
	auswertbar	Anzahl	4796	4383	4011	3741	3503	3299																
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,13	137,55	136,75	136,10	135,70	135,74																
		CI Mean	[137,65; 138,60]	[137,08; 138,03]	[136,28; 137,23]	[135,62; 136,58]	[135,21; 136,19]	[135,24; 136,24]																
		Median	138,00	136,00	135,00	135,00	135,00	135,00																
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>5705</i>	<i>5205</i>	<i>4802</i>	<i>4483</i>	<i>4208</i>																	
2010-1	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5389	5190	4803	4441	4175																	
	auswertbar	Anzahl	5389	5013	4561	4269	4021																	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,40	136,86	136,43	136,02	136,03																	
		CI Mean	[138,95; 139,85]	[136,43; 137,29]	[135,98; 136,87]	[135,55; 136,48]	[135,56; 136,51]																	
		Median	140,00	135,00	135,00	135,00	135,00																	
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>6363</i>	<i>5859</i>	<i>5409</i>	<i>5055</i>																		
2010-2	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5422	5199	4831	4457																		
	auswertbar	Anzahl	5422	4995	4557	4278																		
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	137,93	136,15	136,14	136,09																		
		CI Mean	[137,50; 138,36]	[135,72; 136,58]	[135,69; 136,59]	[135,62; 136,56]																		
		Median	138,00	135,00	135,00	135,00																		
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>	<i>6400</i>	<i>5912</i>	<i>5443</i>																			
2011-1	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5163	4972	4601																			
	auswertbar	Anzahl	5163	4784	4357																			
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,68	136,79	136,13																			
		CI Mean	[138,22; 139,14]	[136,34; 137,24]	[135,67; 136,60]																			
		Median	140,00	135,00	135,00																			
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>	<i>6098</i>	<i>5609</i>																				
2011-2	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4405	4246																				
	auswertbar	Anzahl	4405	4080																				
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,08	136,90																				
		CI Mean	[137,59; 138,57]	[136,40; 137,39]																				
		Median	139,00	135,00																				
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>	<i>5157</i>																					
2012-1	erwachsene Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4927																					
	auswertbar	Anzahl	4927																					
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,47																					
		CI Mean	[138,01; 138,94]																					
		Median	138,00																					
<i>erwachsene Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>																						

In Tabelle 3.1.6 wird die Entwicklung des **mittleren diastolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

In der Kohorte 2003-1 lagen im Beitrittsjahr für 15406 Patienten im Hypertoniker-Kollektiv auswertbare Angaben zum diastolischen Blutdruck vor. Der arithmetische Mittelwert lag bei 80,74 mmHg, der Median bei 80,00 mmHg der dafür auswertbaren Patienten. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für 3691 der dann noch eingeschriebenen Patienten auswertbare Angaben vor. Der Mittelwert lag für diese Patienten bei 77,86 und der Median bei 80,00.

Tabelle 3.1.6 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	15406	14097	12720	11540	10481	9708	8972	7622	7045	6441	6135	5712	5388	5105	4796	4490	4238	4008	3787
	auswertbar	Anzahl	15406	11315	11925	11273	10208	9517	8584	7377	6835	6306	5855	5481	5231	4937	4640	4375	4149	3929	3691
		Mean	80,74	80,12	79,73	79,60	79,31	78,80	78,81	78,53	78,33	78,26	77,93	78,16	78,21	78,15	78,29	78,19	77,73	77,85	77,86
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	CI Mean	[80,60; 80,89]	[79,95; 80,28]	[79,58; 79,88]	[79,44; 79,75]	[79,15; 79,47]	[78,63; 78,96]	[78,63; 78,98]	[78,33; 78,72]	[78,14; 78,53]	[78,04; 78,47]	[77,71; 78,15]	[77,93; 78,38]	[77,98; 78,44]	[77,91; 78,39]	[78,04; 78,54]	[77,93; 78,45]	[77,46; 77,99]	[77,57; 78,12]	[77,58; 78,14]
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18532</i>	<i>16919</i>	<i>15229</i>	<i>13819</i>	<i>12524</i>	<i>11575</i>	<i>10657</i>	<i>9051</i>	<i>8357</i>	<i>7654</i>	<i>7302</i>	<i>6797</i>	<i>6413</i>	<i>6084</i>	<i>5724</i>	<i>5377</i>	<i>5082</i>	<i>4817</i>	<i>4564</i>
2003-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	12524	10865	9865	8860	8090	7381	6660	6078	5508	5264	4945	4695	4427	4181	3959	3750	3517	3338	
	auswertbar	Anzahl	12524	9804	9548	8627	7885	7101	6431	5787	5376	5019	4719	4476	4286	4050	3853	3628	3421	3241	
		Mean	81,20	80,64	79,98	79,76	79,27	79,11	79,01	78,96	79,02	78,66	78,73	78,70	78,44	78,65	78,33	77,74	77,88	78,19	
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	CI Mean	[81,05; 81,36]	[80,48; 80,81]	[79,82; 80,15]	[79,58; 79,94]	[79,09; 79,46]	[78,92; 79,31]	[78,81; 79,21]	[78,75; 79,17]	[78,80; 79,25]	[78,44; 78,89]	[78,49; 78,97]	[78,45; 78,94]	[78,18; 78,69]	[78,39; 78,90]	[78,06; 78,59]	[77,45; 78,03]	[77,59; 78,17]	[77,90; 78,49]	
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15338</i>	<i>13264</i>	<i>11995</i>	<i>10737</i>	<i>9767</i>	<i>8914</i>	<i>8042</i>	<i>7361</i>	<i>6677</i>	<i>6381</i>	<i>5997</i>	<i>5700</i>	<i>5383</i>	<i>5096</i>	<i>4829</i>	<i>4575</i>	<i>4304</i>	<i>4094</i>	
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5332	4764	4236	3849	3469	3106	2874	2602	2467	2312	2162	2028	1923	1811	1721	1623	1556		
	auswertbar	Anzahl	5332	4514	4053	3720	3341	3006	2739	2504	2300	2186	2051	1926	1824	1739	1640	1568	1487		
		Mean	81,83	80,52	80,07	79,56	79,45	79,41	79,21	79,00	78,82	78,75	78,83	78,91	78,68	78,40	78,10	78,02	77,94		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	CI Mean	[81,58; 82,08]	[80,27; 80,77]	[79,80; 80,33]	[79,29; 79,82]	[79,17; 79,74]	[79,12; 79,71]	[78,90; 79,52]	[78,68; 79,32]	[78,47; 79,17]	[78,40; 79,11]	[78,46; 79,19]	[78,53; 79,29]	[78,27; 79,09]	[77,99; 78,80]	[77,68; 78,52]	[77,61; 78,44]	[77,51; 78,38]		
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6722</i>	<i>5979</i>	<i>5294</i>	<i>4783</i>	<i>4296</i>	<i>3854</i>	<i>3572</i>	<i>3250</i>	<i>3080</i>	<i>2873</i>	<i>2690</i>	<i>2532</i>	<i>2401</i>	<i>2263</i>	<i>2147</i>	<i>2032</i>	<i>1951</i>		
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4166	3805	3482	3155	2832	2636	2456	2358	2196	2083	1982	1877	1784	1697	1623	1546			
	auswertbar	Anzahl	4166	3588	3339	3036	2635	2443	2265	2098	1978	1874	1797	1682	1605	1520	1456	1375			
		Mean	81,44	80,31	79,87	79,65	79,31	79,14	79,21	79,10	79,03	79,10	78,91	79,05	78,78	78,34	78,50	78,34			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	CI Mean	[81,17; 81,71]	[80,03; 80,60]	[79,58; 80,16]	[79,35; 79,95]	[78,99; 79,63]	[78,82; 79,47]	[78,87; 79,55]	[78,76; 79,45]	[78,66; 79,40]	[78,71; 79,49]	[78,53; 79,29]	[78,64; 79,45]	[78,34; 79,22]	[77,91; 78,78]	[78,08; 78,91]	[77,88; 78,79]			
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5209</i>	<i>4715</i>	<i>4298</i>	<i>3897</i>	<i>3506</i>	<i>3261</i>	<i>3038</i>	<i>2910</i>	<i>2710</i>	<i>2571</i>	<i>2446</i>	<i>2321</i>	<i>2204</i>	<i>2102</i>	<i>2005</i>	<i>1906</i>			
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6030	5652	5166	4590	4148	3825	3627	3394	3207	3031	2863	2697	2569	2441	2311				
	auswertbar	Anzahl	6030	5389	4876	4405	3985	3683	3424	3236	3073	2938	2765	2621	2475	2356	2243				
		Mean	81,34	80,08	79,89	79,40	79,13	79,43	79,05	79,18	79,11	78,90	78,82	78,81	78,29	78,49	78,33				
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	CI Mean	[81,11; 81,57]	[79,85; 80,31]	[79,65; 80,13]	[79,14; 79,65]	[78,86; 79,41]	[79,15; 79,71]	[78,76; 79,34]	[78,89; 79,47]	[78,80; 79,43]	[78,59; 79,21]	[78,49; 79,15]	[78,49; 79,13]	[77,94; 78,63]	[78,15; 78,83]	[77,98; 78,69]				
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7326</i>	<i>6819</i>	<i>6209</i>	<i>5519</i>	<i>4992</i>	<i>4584</i>	<i>4340</i>	<i>4066</i>	<i>3849</i>	<i>3623</i>	<i>3415</i>	<i>3216</i>	<i>3064</i>	<i>2915</i>	<i>2769</i>				
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8022	7388	6740	6142	5627	5318	4943	4669	4380	4104	3827	3603	3419	3233					
	auswertbar	Anzahl	8022	7042	6438	5886	5409	5011	4662	4428	4197	3923	3699	3486	3297	3119					
		Mean	80,45	79,89	79,65	79,73	79,43	79,33	79,07	79,18	79,12	78,91	78,97	78,43	78,62	78,35					
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	CI Mean	[80,26; 80,64]	[79,69; 80,08]	[79,44; 79,85]	[79,51; 79,95]	[79,20; 79,66]	[79,10; 79,56]	[78,82; 79,32]	[78,93; 79,43]	[78,85; 79,38]	[78,64; 79,18]	[78,69; 79,26]	[78,15; 78,72]	[78,32; 78,92]	[78,04; 78,65]					
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9778</i>	<i>8989</i>	<i>8164</i>	<i>7426</i>	<i>6790</i>	<i>6402</i>	<i>5933</i>	<i>5585</i>	<i>5240</i>	<i>4913</i>	<i>4579</i>	<i>4321</i>	<i>4101</i>	<i>3871</i>					
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9160	8616	7855	7232	6859	6367	6029	5640	5318	4976	4703	4409	4207						
	auswertbar	Anzahl	9160	8317	7542	7029	6459	6060	5774	5451	5109	4834	4552	4280	4105						
		Mean	80,77	79,60	79,62	79,33	79,21	79,17	78,96	78,99	78,83	78,86	78,68	78,62	78,24						
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	CI Mean	[80,59; 80,95]	[79,42; 79,79]	[79,42; 79,81]	[79,13; 79,53]	[79,00; 79,42]	[78,95; 79,39]	[78,74; 79,18]	[78,76; 79,22]	[78,59; 79,07]	[78,61; 79,11]	[78,43; 78,93]	[78,36; 78,89]	[77,97; 78,51]						
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11195</i>	<i>10505</i>	<i>9553</i>	<i>8754</i>	<i>8293</i>	<i>7702</i>	<i>7289</i>	<i>6827</i>	<i>6435</i>	<i>6016</i>	<i>5692</i>	<i>5332</i>	<i>5084</i>						

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr			
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	12062	11512	10573	9874	8979	8460	7894	7444	6960	6552	6164	5819									
	auswertbar	Anzahl	12062	10860	9994	9178	8375	7960	7545	7068	6674	6254	5942	5588									
		Mean	80,50	79,86	79,84	79,44	79,46	79,52	79,26	79,17	79,00	78,66	78,71	78,43									
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	CI Mean	[80,35; 80,66]	[79,70; 80,01]	[79,67; 80,00]	[79,27; 79,61]	[79,28; 79,64]	[79,33; 79,71]	[79,07; 79,46]	[78,97; 79,37]	[78,80; 79,20]	[78,45; 78,87]	[78,50; 78,92]	[78,21; 78,65]									
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00									
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>13791</i>	<i>12613</i>	<i>11771</i>	<i>10718</i>	<i>10080</i>	<i>9390</i>	<i>8865</i>	<i>8292</i>	<i>7821</i>	<i>7374</i>	<i>6965</i>									
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	15207	14487	13635	12410	11640	10877	10244	9565	9012	8501	8071										
	auswertbar	Anzahl	15207	13805	12663	11588	10978	10423	9830	9158	8643	8225	7765										
		Mean	80,77	79,93	79,65	79,49	79,47	79,35	79,33	79,04	78,63	78,57	78,67										
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	CI Mean	[80,63; 80,91]	[79,78; 80,07]	[79,50; 79,79]	[79,34; 79,64]	[79,30; 79,63]	[79,18; 79,51]	[79,16; 79,50]	[78,86; 79,22]	[78,45; 78,81]	[78,38; 78,75]	[78,48; 78,85]										
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00										
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>17190</i>	<i>16142</i>	<i>14666</i>	<i>13722</i>	<i>12823</i>	<i>12070</i>	<i>11283</i>	<i>10635</i>	<i>10034</i>	<i>9520</i>										
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8629	8331	7680	7113	6534	6092	5694	5346	5029	4771											
	auswertbar	Anzahl	8629	7826	6997	6583	6173	5808	5446	5120	4844	4579											
		Mean	80,55	79,76	79,49	79,49	79,21	79,30	79,08	78,72	78,89	78,66											
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	CI Mean	[80,36; 80,75]	[79,57; 79,96]	[79,29; 79,70]	[79,28; 79,70]	[78,99; 79,42]	[79,08; 79,52]	[78,85; 79,31]	[78,48; 78,95]	[78,65; 79,13]	[78,42; 78,90]											
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00											
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>9940</i>	<i>9118</i>	<i>8435</i>	<i>7735</i>	<i>7205</i>	<i>6731</i>	<i>6317</i>	<i>5936</i>	<i>5626</i>											
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	7816	7529	7031	6455	5982	5596	5296	4977	4715												
	auswertbar	Anzahl	7816	7049	6571	6082	5706	5373	5067	4795	4535												
		Mean	80,96	80,01	79,99	79,82	79,50	79,35	78,97	78,97	78,82												
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	CI Mean	[80,76; 81,16]	[79,81; 80,21]	[79,77; 80,20]	[79,60; 80,04]	[79,28; 79,73]	[79,12; 79,59]	[78,73; 79,21]	[78,72; 79,22]	[78,57; 79,07]												
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00												
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>9074</i>	<i>8463</i>	<i>7733</i>	<i>7156</i>	<i>6701</i>	<i>6331</i>	<i>5959</i>	<i>5643</i>												
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5258	5096	4753	4392	4084	3827	3605	3394													
	auswertbar	Anzahl	5258	4843	4481	4169	3927	3670	3450	3249													
		Mean	80,54	80,03	79,97	79,92	79,72	78,92	79,06	78,89													
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	CI Mean	[80,30; 80,79]	[79,77; 80,29]	[79,71; 80,23]	[79,64; 80,19]	[79,44; 80,01]	[78,63; 79,21]	[78,77; 79,36]	[78,58; 79,20]													
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00													
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>6320</i>	<i>5851</i>	<i>5399</i>	<i>5008</i>	<i>4674</i>	<i>4394</i>	<i>4147</i>													
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4470	4299	3997	3690	3461	3244	3067														
	auswertbar	Anzahl	4470	4112	3790	3523	3318	3121	2974														
		Mean	81,12	80,09	79,92	79,69	79,21	79,38	79,14														
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	CI Mean	[80,85; 81,39]	[79,82; 80,36]	[79,64; 80,21]	[79,40; 79,98]	[78,90; 79,51]	[79,07; 79,69]	[78,83; 79,45]														
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00														
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>5299</i>	<i>4907</i>	<i>4513</i>	<i>4221</i>	<i>3942</i>	<i>3724</i>														
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4796	4592	4215	3898	3631	3407															
	auswertbar	Anzahl	4796	4383	4011	3741	3503	3299															
		Mean	80,59	80,19	79,68	79,32	79,23	79,40															
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	CI Mean	[80,32; 80,85]	[79,92; 80,46]	[79,41; 79,95]	[79,04; 79,60]	[78,95; 79,51]	[79,12; 79,68]															
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00															
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>5705</i>	<i>5205</i>	<i>4802</i>	<i>4483</i>	<i>4208</i>															
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5389	5190	4803	4441	4175																
	auswertbar	Anzahl	5389	5013	4561	4269	4021																
		Mean	80,99	79,91	79,39	79,50	79,46																
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	CI Mean	[80,74; 81,25]	[79,67; 80,16]	[79,13; 79,65]	[79,24; 79,76]	[79,19; 79,73]																
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00																
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>6363</i>	<i>5859</i>	<i>5409</i>	<i>5055</i>																
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5422	5199	4831	4457																	
	auswertbar	Anzahl	5422	4995	4557	4278																	
		Mean	80,28	79,61	79,56	79,30																	
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	CI Mean	[80,03; 80,53]	[79,35; 79,86]	[79,29; 79,82]	[79,02; 79,57]																	
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00																	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>	<i>6400</i>	<i>5912</i>	<i>5443</i>																	

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr				
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5163	4972	4601																			
	auswertbar	Anzahl	5163	4784	4357																			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,72	79,81	79,49																			
		CI Mean	[80,46; 80,98]	[79,55; 80,07]	[79,22; 79,76]																			
		Median	80,00	80,00	80,00																			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>	<i>6098</i>	<i>5609</i>																				
2011-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4405	4246																				
	auswertbar	Anzahl	4405	4080																				
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,48	79,77																				
		CI Mean	[80,20; 80,76]	[79,49; 80,05]																				
		Median	80,00	80,00																				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>	<i>5157</i>																					
2012-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4927																					
	auswertbar	Anzahl	4927																					
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,76																					
		CI Mean	[80,49; 81,03]																					
		Median	80,00																					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>																						

3.2 Laborwerte

Neben der Einstellung des erhöhten Blutdrucks in den Normbereich ist bei Diabetikern die Einstellung bei erhöhten Blutzucker-/Glukosekonzentrationen entscheidend für den Therapieerfolg bzw. für das Verhindern von Folgeerkrankungen. Während die Messung des Blutzuckerwertes nur eine Momentaufnahme der aktuellen Stoffwechsellage liefert, kann durch Bestimmung des Anteils von glykolisiertem Hämoglobin (hier gemessen als: HbA1c) als Parameter der diabetischen Stoffwechselkontrolle im Sinne eines „Blutzuckergedächtnisses“ der mittlere Blutzuckerspiegel der vergangenen (4-12) Wochen beurteilt werden. So sind beispielsweise Diabetiker, deren Blutzuckerwerte durch eine intensivierete Insulintherapie dauerhaft gut eingestellt sind und die in der Folge HbA1c-Werte von unter 6,5% aufweisen, deutlich besser vor den Komplikationen und Folgeerkrankungen eines Diabetes mellitus geschützt als solche mit höheren HbA1c-Werten.

Eine etwaige Beeinträchtigung der Filter- bzw. Klärfunktion der Nieren kann durch die so genannte Kreatinin-Clearance beurteilt werden. Für deren Berechnung wird der Kreatininwert im Blut (Serum) des Patienten ermittelt. Ein erhöhter Kreatininwert kann eine Funktionsverschlechterung der Nieren anzeigen.

In Tabelle 3.2.1 ist die Entwicklung der **HbA1c**-Konzentration ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnungen, die anschließend ausgewiesen werden. Für die Berechnung der durchschnittlichen Differenz zwischen HbA1c-Konzentration im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtshalbjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitrittsjahr 18532 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 18524 Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei ihnen betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich 7,08 %; der Median lag bei 6,80 %. Im letzten Berichtshalbjahr betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich 7,13 %; der Median lag bei 6,90 %, der dafür auswertbaren Patienten.

Tabelle 3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18532	16919	15229	13819	12524	11575	10657	9051	8357	7654	7302	6797	6413	6084	5724	5377	5082	4817	4564	
	auswertbar	Anzahl	18524	13497	14233	13472	12165	11330	10193	8758	8109	7496	6959	6517	6224	5882	5537	5245	4975	4725	4452	
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,08	6,84	6,97	6,87	7,01	6,96	7,03	6,94	7,00	6,95	7,04	6,99	7,09	7,10	7,16	7,07	7,12	7,02	7,13	
		CI Mean	[7,06; 7,10]	[6,82; 6,86]	[6,95; 6,99]	[6,85; 6,89]	[6,99; 7,03]	[6,94; 6,98]	[7,01; 7,06]	[6,91; 6,96]	[6,98; 7,03]	[6,93; 6,98]	[7,01; 7,06]	[6,96; 7,01]	[7,06; 7,12]	[7,08; 7,13]	[7,13; 7,19]	[7,04; 7,10]	[7,09; 7,15]	[6,99; 7,06]	[7,09; 7,16]	
		Median	6,80	6,60	6,80	6,70	6,80	6,80	6,80	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,80	6,90
		Fallbasis mittlere Differenz		13495	14232	13470	12164	11329	10192	8757	8108	7495	6958	6516	6223	5881	5536	5244	4974	4724	4451	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,20	-0,07	-0,14	0,01	-0,02	0,05	-0,03	0,05	0,01	0,10	0,07	0,17	0,19	0,25	0,18	0,23	0,14	0,24	
		CI mittlere Differenz		[-0,21; -0,18]	[-0,08; -0,05]	[-0,16; -0,12]	[-0,02; -0,03]	[-0,04; 0,00]	[0,03; 0,07]	[-0,06; -0,01]	[0,02; 0,08]	[-0,02; 0,04]	[0,07; 0,13]	[0,04; 0,10]	[0,14; 0,20]	[0,16; 0,22]	[0,22; 0,28]	[0,14; 0,21]	[0,20; 0,27]	[0,10; 0,17]	[0,20; 0,28]	
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20	0,20	0,20	0,30		
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	15338	13264	11995	10737	9767	8914	8042	7361	6677	6381	5997	5700	5383	5096	4829	4575	4304	4094		
	auswertbar	Anzahl	15322	11899	11598	10439	9519	8573	7769	7008	6514	6085	5715	5433	5212	4932	4702	4435	4189	3972		
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,06	6,96	6,87	6,97	6,96	7,01	6,94	7,00	6,96	7,00	6,96	7,07	7,07	7,16	7,05	7,13	7,03	7,15		
		CI Mean	[7,03; 7,08]	[6,93; 6,98]	[6,85; 6,89]	[6,95; 7,00]	[6,94; 6,98]	[6,99; 7,04]	[6,91; 6,96]	[6,98; 7,03]	[6,93; 6,98]	[6,98; 7,03]	[6,93; 6,99]	[7,04; 7,11]	[7,04; 7,10]	[7,13; 7,19]	[7,02; 7,08]	[7,09; 7,16]	[7,00; 7,06]	[7,11; 7,19]		
		Median	6,80	6,70	6,70	6,80	6,80	6,80	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,90	7,00	6,90	6,90	6,80	6,90		
		Fallbasis mittlere Differenz		11885	11585	10429	9512	8565	7761	7003	6508	6079	5710	5429	5209	4929	4699	4433	4188	3971		
		Mittlere Differenz zur ED		-0,06	-0,12	-0,01	-0,02	0,05	-0,02	0,04	0,01	0,07	0,03	0,15	0,14	0,25	0,14	0,22	0,13	0,26		
		CI mittlere Differenz		[-0,08; -0,04]	[-0,15; -0,10]	[-0,03; 0,01]	[-0,04; 0,01]	[0,02; 0,07]	[-0,05; 0,01]	[0,01; 0,07]	[-0,02; 0,04]	[0,04; 0,10]	[-0,01; 0,06]	[0,11; 0,18]	[0,11; 0,18]	[0,21; 0,29]	[0,10; 0,18]	[0,18; 0,26]	[0,09; 0,17]	[0,21; 0,30]		
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30	0,20	0,30				
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6722	5979	5294	4783	4296	3854	3572	3250	3080	2873	2690	2532	2401	2263	2147	2032	1951			
	auswertbar	Anzahl	6705	5644	5056	4616	4140	3730	3403	3133	2865	2701	2546	2408	2281	2171	2051	1962	1868			
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,29	6,89	7,00	6,99	7,05	6,98	7,07	7,04	7,08	7,03	7,14	7,13	7,19	7,14	7,21	7,15	7,22			
		CI Mean	[7,26; 7,33]	[6,86; 6,92]	[6,97; 7,03]	[6,95; 7,02]	[7,01; 7,08]	[6,94; 7,02]	[7,03; 7,11]	[6,99; 7,08]	[7,04; 7,12]	[6,98; 7,07]	[7,10; 7,19]	[7,08; 7,18]	[7,14; 7,23]	[7,09; 7,19]	[7,16; 7,26]	[7,09; 7,20]	[7,17; 7,28]			
		Median	7,00	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00	6,90	7,00			
		Fallbasis mittlere Differenz		5631	5043	4604	4130	3720	3393	3123	2855	2691	2539	2401	2274	2164	2044	1955	1861			
		Mittlere Differenz zur ED		-0,39	-0,27	-0,26	-0,18	-0,24	-0,15	-0,17	-0,11	-0,17	-0,04	-0,05	0,01	-0,03	0,07	0,01	0,09			
		CI mittlere Differenz		[-0,43; -0,36]	[-0,30; -0,23]	[-0,30; -0,22]	[-0,22; -0,14]	[-0,29; -0,20]	[-0,19; -0,10]	[-0,22; -0,12]	[-0,16; -0,06]	[-0,22; -0,11]	[-0,09; 0,02]	[-0,11; 0,00]	[-0,05; 0,07]	[-0,10; 0,03]	[0,01; 0,14]	[-0,06; 0,07]	[0,02; 0,16]			
Median mittlere Differenz		-0,20	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,10	0,20					
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5209	4715	4298	3897	3506	3261	3038	2910	2710	2571	2446	2321	2204	2102	2005	1906				
	auswertbar	Anzahl	5203	4453	4118	3748	3265	3018	2798	2588	2441	2312	2215	2078	1986	1878	1795	1696				
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,19	6,95	6,92	6,96	6,88	6,94	6,91	7,00	6,98	7,05	7,03	7,10	7,03	7,08	7,05	7,09				
		CI Mean	[7,15; 7,23]	[6,92; 6,99]	[6,88; 6,95]	[6,92; 6,99]	[6,84; 6,92]	[6,90; 6,98]	[6,87; 6,95]	[6,96; 7,05]	[6,93; 7,02]	[7,00; 7,10]	[6,98; 7,07]	[7,05; 7,15]	[6,98; 7,08]	[7,03; 7,13]	[6,99; 7,10]	[7,04; 7,15]				
		Median	6,80	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,90	6,80	6,80	6,80	6,90				
		Fallbasis mittlere Differenz		4448	4113	3745	3263	3016	2796	2586	2439	2310	2213	2076	1984	1876	1793	1694				
		Mittlere Differenz zur ED		-0,21	-0,22	-0,15	-0,22	-0,14	-0,16	-0,05	-0,06	0,03	0,02	0,10	0,04	0,10	0,06	0,13				
		CI mittlere Differenz		[-0,24; -0,17]	[-0,26; -0,18]	[-0,20; -0,11]	[-0,26; -0,17]	[-0,19; -0,09]	[-0,21; -0,10]	[-0,10; 0,01]	[-0,11; 0,00]	[-0,03; 0,08]	[-0,04; 0,07]	[0,04; 0,16]	[-0,03; 0,10]	[0,04; 0,16]	[0,00; 0,13]	[0,07; 0,20]				
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,10	0,20						
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7326	6819	6209	5519	4992	4584	4340	4066	3849	3623	3415	3216	3064	2915	2769					
	auswertbar	Anzahl	7313	6486	5861	5292	4767	4411	4097	3871	3663	3502	3296	3124	2955	2809	2688					
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,32	6,95	7,01	6,93	6,97	6,93	7,00	6,97	7,08	7,06	7,14	7,03	7,13	7,07	7,12					
		CI Mean	[7,29; 7,35]	[6,93; 6,98]	[6,98; 7,04]	[6,90; 6,96]	[6,93; 7,00]	[6,89; 6,96]	[6,97; 7,04]	[6,93; 7,01]	[7,04; 7,11]	[7,02; 7,10]	[7,10; 7,18]	[6,99; 7,07]	[7,09; 7,17]	[7,03; 7,11]	[7,07; 7,16]					
		Median	7,00	6,70	6,80	6,70	6,70	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90					
		Fallbasis mittlere Differenz		6474	5850	5288	4763	4408	4094	3870	3662	3501	3295	3123	2954	2808	2687					
		Mittlere Differenz zur ED		-0,34	-0,26	-0,33	-0,27	-0,30	-0,21	-0,23	-0,13	-0,13	-0,04	-0,13	-0,03	-0,08	-0,03					
		CI mittlere Differenz		[-0,37; -0,31]	[-0,30; -0,23]	[-0,36; -0,29]	[-0,30; -0,23]	[-0,34; -0,26]	[-0,25; -0,17]	[-0,27; -0,19]	[-0,17; -0,08]	[-0,18; -0,08]	[-0,09; 0,01]	[-0,18; -0,08]	[-0,08; 0,03]	[-0,13; -0,03]	[-0,08; 0,03]					
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10							

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	9778	8989	8164	7426	6790	6402	5933	5585	5240	4913	4579	4321	4101	3871					
	auswertbar	Anzahl	9768	8555	7805	7102	6507	6018	5581	5292	5017	4680	4420	4171	3956	3738					
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,23	7,07	6,99	7,04	7,00	7,08	7,04	7,13	7,14	7,21	7,14	7,19	7,12	7,21					
		CI Mean	[7,20; 7,26]	[7,04; 7,09]	[6,96; 7,02]	[7,01; 7,07]	[6,97; 7,03]	[7,05; 7,12]	[7,01; 7,07]	[7,10; 7,17]	[7,11; 7,18]	[7,18; 7,25]	[7,10; 7,17]	[7,16; 7,23]	[7,09; 7,16]	[7,18; 7,25]					
		Median	6,90	6,80	6,80	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00	6,90	7,00					
		Fallbasis mittlere Differenz		8547	7798	7095	6502	6014	5577	5288	5013	4677	4417	4169	3954	3736					
		Mittlere Differenz zur ED		-0,15	-0,20	-0,14	-0,18	-0,09	-0,13	-0,03	-0,01	0,05	-0,02	0,04	-0,03	0,07					
		CI mittlere Differenz		[-0,17; -0,12]	[-0,23; -0,17]	[-0,17; -0,12]	[-0,21; -0,15]	[-0,12; -0,06]	[-0,16; -0,09]	[-0,07; -0,01]	[-0,05; -0,03]	[0,01; 0,09]	[-0,06; -0,02]	[0,00; 0,08]	[-0,07; -0,02]	[0,03; 0,12]					
Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10							
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	11195	10505	9553	8754	8293	7702	7289	6827	6435	6016	5692	5332	5084						
	auswertbar	Anzahl	11183	10136	9145	8493	7804	7309	6970	6588	6169	5845	5498	5174	4959						
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,33	7,02	7,06	7,02	7,09	7,04	7,17	7,17	7,23	7,12	7,19	7,11	7,18						
		CI Mean	[7,30; 7,35]	[7,00; 7,05]	[7,03; 7,08]	[6,99; 7,04]	[7,06; 7,11]	[7,02; 7,07]	[7,14; 7,19]	[7,14; 7,20]	[7,20; 7,26]	[7,09; 7,15]	[7,16; 7,22]	[7,08; 7,14]	[7,15; 7,21]						
		Median	7,00	6,80	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00	6,90	7,00						
		Fallbasis mittlere Differenz		10126	9134	8485	7794	7299	6961	6579	6161	5838	5493	5168	4953						
		Mittlere Differenz zur ED		-0,30	-0,25	-0,27	-0,20	-0,23	-0,10	-0,09	-0,02	-0,11	-0,04	-0,11	-0,03						
		CI mittlere Differenz		[-0,32; -0,27]	[-0,27; -0,22]	[-0,30; -0,24]	[-0,23; -0,17]	[-0,26; -0,20]	[-0,13; -0,06]	[-0,12; -0,05]	[-0,05; -0,02]	[-0,15; -0,08]	[-0,07; -0,00]	[-0,15; -0,07]	[-0,07; -0,01]						
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10								
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	14493	13791	12613	11771	10718	10080	9390	8865	8292	7821	7374	6965							
	auswertbar	Anzahl	14481	12996	11927	10904	9976	9473	8981	8423	7950	7468	7106	6690							
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,14	7,05	6,98	7,03	6,99	7,10	7,10	7,17	7,08	7,17	7,10	7,18							
		CI Mean	[7,12; 7,16]	[7,03; 7,07]	[6,96; 7,00]	[7,01; 7,06]	[6,97; 7,01]	[7,08; 7,12]	[7,08; 7,13]	[7,14; 7,20]	[7,06; 7,11]	[7,14; 7,19]	[7,08; 7,13]	[7,15; 7,21]							
		Median	6,80	6,80	6,70	6,80	6,80	6,90	6,90	6,90	6,85	6,90	6,90	7,00							
		Fallbasis mittlere Differenz		12985	11917	10896	9969	9468	8976	8418	7946	7465	7103	6687							
		Mittlere Differenz zur ED		-0,08	-0,13	-0,07	-0,11	0,01	0,02	0,10	0,01	0,11	0,05	0,12							
		CI mittlere Differenz		[-0,10; -0,06]	[-0,15; -0,11]	[-0,10; -0,05]	[-0,13; -0,08]	[-0,01; -0,04]	[-0,01; -0,04]	[0,07; 0,13]	[-0,02; -0,04]	[0,08; 0,13]	[0,02; 0,08]	[0,09; 0,15]							
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20									
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18117	17190	16142	14666	13722	12823	12070	11283	10635	10034	9520								
	auswertbar	Anzahl	18107	16365	14921	13627	12863	12270	11582	10807	10200	9691	9168								
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,17	6,95	7,00	6,94	7,04	7,03	7,11	7,04	7,12	7,06	7,13								
		CI Mean	[7,15; 7,19]	[6,94; 6,97]	[6,98; 7,02]	[6,92; 6,96]	[7,02; 7,06]	[7,01; 7,05]	[7,09; 7,13]	[7,02; 7,06]	[7,09; 7,14]	[7,03; 7,08]	[7,10; 7,15]								
		Median	6,90	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,80	6,90								
		Fallbasis mittlere Differenz		16357	14914	13622	12859	12266	11578	10803	10196	9687	9165								
		Mittlere Differenz zur ED		-0,20	-0,14	-0,19	-0,09	-0,09	0,00	-0,06	0,02	-0,03	0,04								
		CI mittlere Differenz		[-0,22; -0,18]	[-0,16; -0,12]	[-0,21; -0,17]	[-0,11; -0,07]	[-0,11; -0,06]	[-0,03; -0,02]	[-0,09; -0,04]	[0,00; 0,05]	[-0,06; -0,00]	[0,02; 0,07]								
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10										
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10330	9940	9118	8435	7735	7205	6731	6317	5936	5626									
	auswertbar	Anzahl	10322	9301	8259	7770	7300	6855	6430	6050	5718	5386									
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,14	6,98	6,91	7,00	7,01	7,09	7,00	7,07	7,00	7,07									
		CI Mean	[7,11; 7,17]	[6,96; 7,01]	[6,89; 6,94]	[6,97; 7,03]	[6,98; 7,04]	[7,06; 7,12]	[6,97; 7,03]	[7,03; 7,10]	[6,97; 7,03]	[7,04; 7,10]									
		Median	6,80	6,70	6,70	6,80	6,80	6,80	6,70	6,80	6,70	6,80									
		Fallbasis mittlere Differenz		9295	8254	7765	7296	6850	6425	6045	5713	5381									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,15	-0,20	-0,10	-0,08	0,00	-0,08	-0,01	-0,06	0,01									
		CI mittlere Differenz		[-0,17; -0,12]	[-0,22; -0,17]	[-0,13; -0,07]	[-0,11; -0,05]	[-0,03; -0,03]	[-0,12; -0,05]	[-0,05; -0,02]	[-0,10; -0,02]	[-0,02; -0,05]									
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10											
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	9430	9074	8463	7733	7156	6701	6331	5959	5643										
	auswertbar	Anzahl	9420	8457	7867	7288	6821	6429	6062	5723	5425										
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,19	6,89	6,95	6,96	7,00	6,90	7,00	6,92	7,00										
		CI Mean	[7,16; 7,21]	[6,86; 6,91]	[6,92; 6,97]	[6,93; 6,99]	[6,97; 7,02]	[6,88; 6,93]	[6,97; 7,03]	[6,89; 6,95]	[6,97; 7,03]										
		Median	6,80	6,60	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80	6,70	6,70										
		Fallbasis mittlere Differenz		8447	7858	7279	6813	6421	6055	5716	5420										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,29	-0,20	-0,18	-0,13	-0,21	-0,11	-0,18	-0,09										
		CI mittlere Differenz		[-0,31; -0,26]	[-0,23; -0,18]	[-0,21; -0,15]	[-0,17; -0,10]	[-0,24; -0,18]	[-0,14; -0,08]	[-0,21; -0,14]	[-0,13; -0,05]										
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6552	6320	5851	5399	5008	4674	4394	4147												
	auswertbar	Anzahl	6544	5957	5489	5103	4800	4471	4202	3968												
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,12	6,96	6,96	7,01	6,92	6,99	6,91	6,98												
		CI Mean	[7,09; 7,16]	[6,93; 6,99]	[6,93; 6,99]	[6,98; 7,04]	[6,89; 6,96]	[6,95; 7,02]	[6,87; 6,94]	[6,95; 7,02]												
		Median	6,80	6,70	6,70	6,80	6,70	6,70	6,70	6,70												
		Fallbasis mittlere Differenz		5950	5483	5098	4795	4466	4197	3963												
		Mittlere Differenz zur ED		-0,14	-0,12	-0,05	-0,11	-0,05	-0,12	-0,03												
		CI mittlere Differenz		[-0,17; -0,11]	[-0,16; -0,09]	[-0,09; -0,02]	[-0,15; -0,08]	[-0,09; -0,01]	[-0,16; -0,08]	[-0,07; -0,01]												
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10												
	2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5527	5299	4907	4513	4221	3942	3724												
auswertbar		Anzahl	5516	5068	4638	4306	4042	3786	3610													
Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c		Mean	7,24	6,86	6,93	6,82	6,91	6,83	6,92													
		CI Mean	[7,19; 7,28]	[6,83; 6,89]	[6,90; 6,96]	[6,79; 6,85]	[6,88; 6,95]	[6,79; 6,86]	[6,89; 6,96]													
		Median	6,80	6,60	6,70	6,60	6,70	6,60	6,70													
		Fallbasis mittlere Differenz		5059	4629	4303	4040	3785	3609													
		Mittlere Differenz zur ED		-0,37	-0,27	-0,37	-0,27	-0,35	-0,25													
		CI mittlere Differenz		[-0,40; -0,33]	[-0,31; -0,23]	[-0,41; -0,32]	[-0,31; -0,22]	[-0,40; -0,30]	[-0,30; -0,20]													
		Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	0,00	-0,10	-0,10													
2009-2		Patienten insgesamt	Anzahl	5982	5705	5205	4802	4483	4208													
	auswertbar	Anzahl	5974	5419	4933	4606	4312	4063														
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,18	6,93	6,85	6,90	6,81	6,90														
		CI Mean	[7,14; 7,22]	[6,90; 6,96]	[6,82; 6,88]	[6,87; 6,94]	[6,78; 6,84]	[6,87; 6,94]														
		Median	6,80	6,70	6,60	6,70	6,60	6,70														
		Fallbasis mittlere Differenz		5412	4927	4599	4306	4057														
		Mittlere Differenz zur ED		-0,23	-0,29	-0,23	-0,31	-0,22														
		CI mittlere Differenz		[-0,26; -0,19]	[-0,33; -0,26]	[-0,27; -0,19]	[-0,35; -0,27]	[-0,27; -0,18]														
		Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10														
	2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6630	6363	5859	5409	5055														
auswertbar		Anzahl	6623	6132	5560	5164	4856															
Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c		Mean	7,25	6,84	6,88	6,82	6,89															
		CI Mean	[7,21; 7,28]	[6,81; 6,87]	[6,85; 6,90]	[6,79; 6,85]	[6,86; 6,92]															
		Median	6,80	6,60	6,60	6,60	6,60															
		Fallbasis mittlere Differenz		6126	5554	5158	4850															
		Mittlere Differenz zur ED		-0,39	-0,34	-0,38	-0,30															
		CI mittlere Differenz		[-0,42; -0,36]	[-0,37; -0,30]	[-0,41; -0,34]	[-0,33; -0,26]															
		Median mittlere Differenz		-0,20	-0,10	-0,20	-0,10															
2010-2		Patienten insgesamt	Anzahl	6682	6400	5912	5443															
	auswertbar	Anzahl	6676	6129	5570	5216																
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,13	6,90	6,80	6,88																
		CI Mean	[7,09; 7,16]	[6,87; 6,93]	[6,77; 6,83]	[6,85; 6,91]																
		Median	6,70	6,60	6,50	6,60																
		Fallbasis mittlere Differenz		6124	5565	5211																
		Mittlere Differenz zur ED		-0,21	-0,29	-0,20																
		CI mittlere Differenz		[-0,24; -0,18]	[-0,33; -0,26]	[-0,24; -0,17]																
		Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	-0,10																
	2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6352	6098	5609																
auswertbar		Anzahl	6347	5838	5296																	
Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c		Mean	7,20	6,81	6,86																	
		CI Mean	[7,16; 7,23]	[6,78; 6,84]	[6,83; 6,89]																	
		Median	6,80	6,50	6,60																	
		Fallbasis mittlere Differenz		5834	5292																	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,37	-0,30																	
		CI mittlere Differenz		[-0,40; -0,34]	[-0,33; -0,26]																	
		Median mittlere Differenz		-0,20	-0,10																	

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr					
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5365	5157																					
	auswertbar	Anzahl	5361	4944																					
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,18	6,93																					
		CI Mean	[7,14; 7,22]	[6,89; 6,96]																					
		Median	6,70	6,60																					
		Fallbasis mittlere Differenz		4940																					
		Mittlere Differenz zur ED			-0,25																				
		CI mittlere Differenz			[-0,28; -0,21]																				
		Median mittlere Differenz			-0,05																				
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5991																						
	auswertbar	Anzahl	5981																						
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,22																						
		CI Mean	[7,18; 7,26]																						
		Median	6,80																						
		Fallbasis mittlere Differenz																							
		Mittlere Differenz zur ED																							
		CI mittlere Differenz																							
		Median mittlere Differenz																							

In Tabelle 3.2.2 wird die Verteilung der Patienten auf die HbA1c-Kategorien dargestellt. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. In der Zeile „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr plausible Angaben zum HbA1c-Wert vorliegen. Anschließend wird für jedes Berichtshalbjahr dargestellt, wie sich diese auswertbaren Patienten auf die HbA1c-Kategorien verteilen.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitrittsjahr 18532 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 18524 Patienten lagen auswertbare Daten vor. 50,62 Prozent dieser Patienten lagen mit ihrem gemessenen HbA1c-Wert im „oberen Zielbereich“. Im letzten Berichtshalbjahr wurden dieser Kategorie 56,56 Prozent, der dann noch eingeschriebenen und auswertbaren Patienten zugeordnet.

Tabelle 3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18532	16919	15229	13819	12524	11575	10657	9051	8357	7654	7302	6797	6413	6084	5724	5377	5082	4817	4564
	auswertbar	Anzahl	18524	13497	14233	13472	12165	11330	10193	8758	8109	7496	6959	6517	6224	5882	5537	5245	4975	4725	4452
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	3812	3533	3150	3216	2439	2242	1949	1783	1477	1477	1182	1156	917	851	785	844	715	829	647
		Anteil in %	20,58	26,18	22,13	23,87	20,05	19,79	19,12	20,36	18,21	19,70	16,99	17,74	14,73	14,47	14,18	16,09	14,37	17,54	14,53
	CI Anteil in %	[20,00; 21,16]	[25,43; 26,92]	[21,45; 22,81]	[23,15; 24,59]	[19,34; 20,76]	[19,05; 20,52]	[18,36; 19,88]	[19,52; 21,20]	[17,37; 19,05]	[18,80; 20,60]	[16,10; 17,87]	[16,81; 18,67]	[13,85; 15,61]	[13,57; 15,37]	[13,26; 15,10]	[15,10; 17,09]	[13,40; 15,35]	[16,46; 18,63]	[13,50; 15,57]	
		CI Anteil in %	[20,00; 21,16]	[25,43; 26,92]	[21,45; 22,81]	[23,15; 24,59]	[19,34; 20,76]	[19,05; 20,52]	[18,36; 19,88]	[19,52; 21,20]	[17,37; 19,05]	[18,80; 20,60]	[16,10; 17,87]	[16,81; 18,67]	[13,85; 15,61]	[13,57; 15,37]	[13,26; 15,10]	[15,10; 17,09]	[13,40; 15,35]	[16,46; 18,63]	[13,50; 15,57]
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	9377	6933	7412	7236	6538	6353	5569	4911	4612	4280	3963	3800	3637	3411	3088	2990	2833	2669	2518
		Anteil in %	50,62	51,37	52,08	53,71	53,74	56,07	54,64	56,07	56,88	57,10	56,95	58,31	58,44	57,99	55,77	57,01	56,94	56,49	56,56
	CI Anteil in %	[49,90; 51,34]	[50,52; 52,21]	[51,26; 52,90]	[52,87; 54,55]	[52,86; 54,63]	[55,16; 56,99]	[53,67; 55,60]	[55,03; 57,11]	[55,80; 57,95]	[55,98; 58,22]	[55,78; 58,11]	[57,11; 59,51]	[57,21; 59,66]	[56,73; 59,25]	[54,46; 57,08]	[55,67; 58,35]	[55,57; 58,32]	[55,07; 57,90]	[55,10; 58,02]	
		CI Anteil in %	[49,90; 51,34]	[50,52; 52,21]	[51,26; 52,90]	[52,87; 54,55]	[52,86; 54,63]	[55,16; 56,99]	[53,67; 55,60]	[55,03; 57,11]	[55,80; 57,95]	[55,98; 58,22]	[55,78; 58,11]	[57,11; 59,51]	[57,21; 59,66]	[56,73; 59,25]	[54,46; 57,08]	[55,67; 58,35]	[55,57; 58,32]	[55,07; 57,90]	[55,10; 58,02]
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	3088	1910	2327	1926	2015	1740	1657	1347	1253	1097	1149	1021	1050	1035	1066	896	905	794	798
		Anteil in %	16,67	14,15	16,35	14,30	16,56	15,36	16,26	15,38	15,45	14,63	16,51	15,67	16,87	17,60	19,25	17,08	18,19	16,80	17,92
	CI Anteil in %	[16,13; 17,21]	[13,56; 14,74]	[15,74; 16,96]	[13,71; 14,89]	[15,90; 17,22]	[14,69; 16,02]	[15,54; 16,97]	[14,62; 16,14]	[14,67; 16,24]	[13,83; 15,43]	[15,64; 17,38]	[14,78; 16,55]	[15,94; 17,80]	[16,62; 18,57]	[18,21; 20,29]	[16,06; 18,10]	[17,12; 19,26]	[15,74; 17,87]	[16,80; 19,05]	
		CI Anteil in %	[16,13; 17,21]	[13,56; 14,74]	[15,74; 16,96]	[13,71; 14,89]	[15,90; 17,22]	[14,69; 16,02]	[15,54; 16,97]	[14,62; 16,14]	[14,67; 16,24]	[13,83; 15,43]	[15,64; 17,38]	[14,78; 16,55]	[15,94; 17,80]	[16,62; 18,57]	[18,21; 20,29]	[16,06; 18,10]	[17,12; 19,26]	[15,74; 17,87]	[16,80; 19,05]
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	1677	907	1062	873	922	797	799	557	607	508	518	434	482	460	474	409	417	345	385
		Anteil in %	9,05	6,72	7,46	6,48	7,58	7,03	7,84	6,36	7,49	6,78	7,44	6,66	7,74	7,82	8,56	7,80	8,38	7,30	8,65
CI Anteil in %	[8,64; 9,47]	[6,30; 7,14]	[7,03; 7,89]	[6,06; 6,90]	[7,11; 8,05]	[6,56; 7,51]	[7,32; 8,36]	[5,85; 6,87]	[6,91; 8,06]	[6,21; 7,35]	[6,83; 8,06]	[6,05; 7,26]	[7,08; 8,41]	[7,13; 8,51]	[7,82; 9,30]	[7,07; 8,52]	[7,61; 9,15]	[6,56; 8,04]	[7,82; 9,47]		
	CI Anteil in %	[8,64; 9,47]	[6,30; 7,14]	[7,03; 7,89]	[6,06; 6,90]	[7,11; 8,05]	[6,56; 7,51]	[7,32; 8,36]	[5,85; 6,87]	[6,91; 8,06]	[6,21; 7,35]	[6,83; 8,06]	[6,05; 7,26]	[7,08; 8,41]	[7,13; 8,51]	[7,82; 9,30]	[7,07; 8,52]	[7,61; 9,15]	[6,56; 8,04]	[7,82; 9,47]	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	570	214	282	221	251	198	219	160	160	134	147	106	138	125	124	106	105	88	104	
	Anteil in %	3,08	1,59	1,98	1,64	2,06	1,75	2,15	1,83	1,97	1,79	2,11	1,63	2,22	2,13	2,24	2,02	2,11	1,86	2,34	
CI Anteil in %	[2,83; 3,33]	[1,37; 1,80]	[1,75; 2,21]	[1,43; 1,85]	[1,81; 2,32]	[1,51; 1,99]	[1,87; 2,43]	[1,55; 2,11]	[1,67; 2,28]	[1,49; 2,09]	[1,77; 2,45]	[1,32; 1,93]	[1,85; 2,58]	[1,76; 2,49]	[1,85; 2,63]	[1,64; 2,40]	[1,71; 2,51]	[1,48; 2,25]	[1,89; 2,78]		
	CI Anteil in %	[2,83; 3,33]	[1,37; 1,80]	[1,75; 2,21]	[1,43; 1,85]	[1,81; 2,32]	[1,51; 1,99]	[1,87; 2,43]	[1,55; 2,11]	[1,67; 2,28]	[1,49; 2,09]	[1,77; 2,45]	[1,32; 1,93]	[1,85; 2,58]	[1,76; 2,49]	[1,85; 2,63]	[1,64; 2,40]	[1,71; 2,51]	[1,48; 2,25]	[1,89; 2,78]	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	15338	13264	11995	10737	9767	8914	8042	7361	6677	6381	5997	5700	5383	5096	4829	4575	4304	4094	
	auswertbar	Anzahl	15322	11899	11598	10439	9519	8573	7769	7008	6514	6085	5715	5433	5212	4932	4702	4435	4189	3972	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	3273	2725	2769	2216	1880	1619	1586	1319	1263	1103	1084	914	798	688	776	640	665	572	
		Anteil in %	21,36	22,90	23,87	21,23	19,75	18,88	20,41	18,82	19,39	18,13	18,97	16,82	15,31	13,95	16,50	14,43	15,87	14,40	
	CI Anteil in %	[20,71; 22,01]	[22,15; 23,66]	[23,10; 24,65]	[20,44; 22,01]	[18,95; 20,55]	[18,06; 19,71]	[19,52; 21,31]	[17,91; 19,74]	[18,43; 20,35]	[17,16; 19,09]	[17,95; 19,98]	[15,83; 17,82]	[14,33; 16,29]	[12,98; 14,92]	[15,44; 17,56]	[13,40; 15,46]	[14,77; 16,98]	[13,31; 15,49]		
		CI Anteil in %	[20,71; 22,01]	[22,15; 23,66]	[23,10; 24,65]	[20,44; 22,01]	[18,95; 20,55]	[18,06; 19,71]	[19,52; 21,31]	[17,91; 19,74]	[18,43; 20,35]	[17,16; 19,09]	[17,95; 19,98]	[15,83; 17,82]	[14,33; 16,29]	[12,98; 14,92]	[15,44; 17,56]	[13,40; 15,46]	[14,77; 16,98]	[13,31; 15,49]	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	7796	6144	6174	5597	5373	4739	4373	3899	3696	3452	3288	3030	3003	2763	2689	2533	2428	2209	
		Anteil in %	50,88	51,63	53,23	53,62	56,45	55,28	56,29	55,64	56,74	56,73	57,53	55,77	57,62	56,02	57,19	57,11	57,96	55,61	
	CI Anteil in %	[50,09; 51,67]	[50,74; 52,53]	[52,33; 54,14]	[52,66; 54,57]	[55,45; 57,44]	[54,23; 56,33]	[55,18; 57,39]	[54,47; 56,80]	[55,54; 57,94]	[55,48; 57,97]	[56,25; 58,81]	[54,45; 57,09]	[56,28; 58,96]	[54,64; 57,41]	[55,77; 58,60]	[55,66; 58,57]	[56,47; 59,46]	[54,07; 57,16]		
		CI Anteil in %	[50,09; 51,67]	[50,74; 52,53]	[52,33; 54,14]	[52,66; 54,57]	[55,45; 57,44]	[54,23; 56,33]	[55,18; 57,39]	[54,47; 56,80]	[55,54; 57,94]	[55,48; 57,97]	[56,25; 58,81]	[54,45; 57,09]	[56,28; 58,96]	[54,64; 57,41]	[55,77; 58,60]	[55,66; 58,57]	[56,47; 59,46]	[54,07; 57,16]	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	2436	1895	1757	1638	1439	1392	1164	1132	1013	990	868	910	897	926	790	794	731	726	
		Anteil in %	15,90	15,93	15,15	15,69	15,12	16,24	14,98	16,15	15,55	16,27	15,19	16,75	17,21	18,78	16,80	17,90	17,45	18,28	
	CI Anteil in %	[15,32; 16,48]	[15,27; 16,58]	[14,50; 15,80]	[14,99; 16,39]	[14,40; 15,84]	[15,46; 17,02]	[14,19; 15,78]	[15,29; 17,01]	[14,67; 16,43]	[15,34; 17,20]	[14,26; 16,12]	[15,76; 17,74]	[16,19; 18,24]	[17,69; 19,87]	[15,73; 17,87]	[16,77; 19,03]	[16,30; 18,60]	[17,08; 19,48]		
		CI Anteil in %	[15,32; 16,48]	[15,27; 16,58]	[14,50; 15,80]	[14,99; 16,39]	[14,40; 15,84]	[15,46; 17,02]	[14,19; 15,78]	[15,29; 17,01]	[14,67; 16,43]	[15,34; 17,20]	[14,26; 16,12]	[15,76; 17,74]	[16,19; 18,24]	[17,69; 19,87]	[15,73; 17,87]	[16,77; 19,03]	[16,30; 18,60]	[17,08; 19,48]	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	1296	898	716	772	657	645	510	510	428	428	374	450	409	429	370	358	287	368	
		Anteil in %	8,46	7,55	6,17	7,40	6,90	7,52	6,56	7,28	6,57	7,03	6,54	8,28	7,85	8,70	7,87	8,07	6,85	9,26	
CI Anteil in %	[8,02; 8,90]	[7,07; 8,02]	[5,74; 6,61]	[6,89; 7,90]	[6,39; 7,41]	[6,97; 8,08]	[6,01; 7,12]	[6,67; 7,89]	[5,97; 7,17]	[6,39; 7,68]	[5,90; 7,19]	[7,55; 9,02]	[7,12; 8,58]	[7,91; 9,48]	[7,10; 8,64]	[7,27; 8,87]	[6,09; 7,62]	[8,36; 10,17]			
	CI Anteil in %	[8,02; 8,90]	[7,07; 8,02]	[5,74; 6,61]	[6,89; 7,90]	[6,39; 7,41]	[6,97; 8,08]	[6,01; 7,12]	[6,67; 7,89]	[5,97; 7,17]	[6,39; 7,68]	[5,90; 7,19]	[7,55; 9,02]	[7,12; 8,58]	[7,91; 9,48]	[7,10; 8,64]	[7,27; 8,87]	[6,09; 7,62]	[8,36; 10,17]		
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	521	237	182	216	170	178	136	148	114	112	101	129	105	126	77	110	78	97		
	Anteil in %	3,40	1,99	1,57	2,07	1,79	2,08	1,75	2,11	1,75	1,84	1,77	2,37	2,01	2,55	1,64	2,48	1,86	2,44		
CI Anteil in %	[3,11; 3,69]	[1,74; 2,24]	[1,34; 1,80]	[1,80; 2,34]	[1,52; 2,05]	[1,77; 2,38]	[1,46; 2,04]	[1,78; 2,45]	[1,43; 2,07]	[1,50; 2,18]	[1,43; 2,11]	[1,97; 2,78]	[1,63; 2,40]	[2,11;							

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6722	5979	5294	4783	4296	3854	3572	3250	3080	2873	2690	2532	2401	2263	2147	2032	1951		
	auswertbar	Anzahl	6705	5644	5056	4616	4140	3730	3403	3133	2865	2701	2546	2408	2281	2171	2051	1962	1868		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1238	1335	1010	886	782	745	598	581	455	457	407	346	291	298	243	266	239		
		Anteil in %	18,46	23,65	19,98	19,19	18,89	19,97	17,57	18,54	15,88	16,92	15,99	14,37	12,76	13,73	11,85	13,56	12,79		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[17,54; 19,39]	[22,54; 24,76]	[18,87; 21,08]	[18,06; 20,33]	[17,70; 20,08]	[18,69; 21,26]	[16,29; 18,85]	[17,18; 19,91]	[14,54; 17,22]	[15,51; 18,33]	[14,56; 17,41]	[12,97; 15,77]	[11,39; 14,13]	[12,28; 15,17]	[10,45; 13,25]	[12,04; 15,07]	[12,04; 14,31]	[11,28; 14,31]	
		Anzahl	3133	2982	2745	2594	2240	2031	1860	1763	1609	1548	1413	1385	1313	1280	1199	1133	1041		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	46,73	52,83	54,29	56,20	54,11	54,45	54,66	56,27	56,16	57,31	55,50	57,52	57,56	58,96	58,46	57,75	55,73		
		CI Anteil in %	[45,53; 47,92]	[51,53; 54,14]	[52,92; 55,67]	[54,76; 57,63]	[52,59; 55,62]	[52,85; 56,05]	[52,98; 56,33]	[54,53; 58,01]	[54,34; 57,98]	[55,45; 59,18]	[53,57; 57,43]	[55,54; 59,49]	[55,53; 59,59]	[56,89; 61,03]	[56,33; 60,59]	[55,56; 59,93]	[53,47; 57,98]		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	1188	847	799	698	677	606	589	477	513	446	423	426	415	362	369	345	361		
		Anteil in %	17,72	15,01	15,80	15,12	16,35	16,25	17,31	15,23	17,91	16,51	16,61	17,69	18,19	16,67	17,99	17,58	19,33		
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[16,80; 18,63]	[14,08; 15,94]	[14,80; 16,81]	[14,09; 16,15]	[15,23; 17,48]	[15,06; 17,43]	[16,04; 18,58]	[13,97; 16,48]	[16,50; 19,31]	[15,11; 17,91]	[15,17; 18,06]	[16,17; 19,22]	[16,61; 19,78]	[15,11; 18,24]	[16,33; 19,65]	[15,90; 19,27]	[17,53; 21,12]		
		Anzahl	800	387	399	353	342	280	261	223	229	194	225	190	202	169	178	164	181		
		Anteil in %	11,93	6,86	7,89	7,65	8,26	7,51	7,67	7,12	7,99	7,18	8,84	7,89	8,86	7,78	8,68	8,36	9,69		
		CI Anteil in %	[11,16; 12,71]	[6,20; 7,52]	[7,15; 8,63]	[6,88; 8,41]	[7,42; 9,10]	[6,66; 8,35]	[6,78; 8,56]	[6,22; 8,02]	[7,00; 8,99]	[6,21; 8,16]	[7,73; 9,94]	[6,81; 8,97]	[7,69; 10,02]	[6,66; 8,91]	[7,46; 9,90]	[7,13; 9,58]	[8,35; 11,03]		
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5209	4715	4298	3897	3506	3261	3038	2910	2710	2571	2446	2321	2204	2102	2005	1906			
	auswertbar	Anzahl	5203	4453	4118	3748	3265	3018	2798	2588	2441	2312	2215	2078	1986	1878	1795	1696			
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1009	975	916	791	750	584	558	480	485	395	357	287	327	278	276	246			
		Anteil in %	19,39	21,90	22,24	21,10	22,97	19,35	19,94	18,55	19,87	17,08	16,12	13,81	16,47	14,80	15,38	14,50			
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[18,32; 20,47]	[20,68; 23,11]	[20,97; 23,51]	[19,80; 22,41]	[21,53; 24,41]	[17,94; 20,76]	[18,46; 21,42]	[17,05; 20,04]	[18,29; 21,45]	[15,55; 18,62]	[14,59; 17,65]	[12,33; 15,30]	[14,83; 18,10]	[13,20; 16,41]	[13,71; 17,05]	[12,83; 16,18]			
		Anzahl	2573	2399	2246	2057	1818	1747	1630	1465	1380	1307	1315	1219	1153	1104	1085	1001			
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	49,45	53,87	54,54	54,88	55,68	57,89	58,26	56,61	56,53	59,37	58,66	58,06	58,79	60,45	59,02				
		CI Anteil in %	[48,09; 50,81]	[52,41; 55,34]	[53,02; 56,06]	[53,29; 56,48]	[53,98; 57,39]	[56,12; 59,65]	[56,43; 60,08]	[54,70; 58,52]	[54,57; 58,50]	[54,51; 58,55]	[57,32; 61,41]	[56,54; 60,78]	[55,89; 60,23]	[56,56; 61,01]	[58,18; 62,71]	[56,68; 61,36]			
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	841	659	601	541	441	416	384	394	344	375	335	363	325	324	258	254			
		Anteil in %	16,16	14,80	14,59	14,43	13,51	13,78	13,72	15,22	14,09	16,22	15,12	17,47	16,36	17,25	14,37	14,98			
		CI Anteil in %	[15,16; 17,16]	[13,76; 15,84]	[13,52; 15,67]	[13,31; 15,56]	[12,33; 14,68]	[12,55; 15,01]	[12,45; 15,00]	[13,84; 16,61]	[12,71; 15,47]	[14,72; 17,72]	[13,63; 16,62]	[15,84; 19,10]	[14,74; 17,99]	[15,54; 18,96]	[12,75; 16,00]	[13,28; 16,68]			
		Anzahl	522	316	271	269	191	209	169	198	182	182	168	171	137	118	126	156			
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anteil in %	10,03	7,10	6,58	7,18	5,85	6,93	6,04	7,65	7,46	7,87	7,58	8,23	6,90	6,28	7,02	9,20			
		CI Anteil in %	[9,22; 10,85]	[6,34; 7,85]	[5,82; 7,34]	[6,35; 8,00]	[5,04; 6,66]	[6,02; 7,83]	[5,16; 6,92]	[6,63; 8,67]	[6,41; 8,50]	[6,77; 8,97]	[6,48; 8,69]	[7,05; 9,41]	[5,78; 8,01]	[5,19; 7,38]	[5,84; 8,20]	[7,82; 10,57]			
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7326	6819	6209	5519	4992	4584	4340	4066	3849	3623	3415	3216	3064	2915	2769				
	auswertbar	Anzahl	7313	6486	5861	5292	4767	4411	4097	3871	3663	3502	3296	3124	2955	2809	2688				
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1201	1336	1130	1108	920	891	757	734	621	561	465	539	446	454	411				
		Anteil in %	16,42	20,60	19,28	20,94	19,30	20,20	18,48	18,96	16,95	16,02	14,11	17,25	15,09	16,16	15,29				
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[15,57; 17,27]	[19,61; 21,58]	[18,27; 20,29]	[19,84; 22,03]	[18,18; 20,42]	[19,01; 21,38]	[17,29; 19,67]	[17,73; 20,20]	[15,74; 18,17]	[14,80; 17,23]	[12,92; 15,30]	[15,93; 18,58]	[13,80; 16,38]	[14,80; 17,52]	[13,93; 16,65]				
		Anzahl	3648	3615	3248	2952	2695	2519	2323	2223	2064	2044	1922	1805	1678	1589	1513				
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	49,88	55,74	55,42	55,78	56,53	57,11	56,70	57,43	56,35	58,37	58,31	57,78	56,79	56,57	56,29				
		CI Anteil in %	[48,74; 51,03]	[54,53; 56,94]	[54,14; 56,69]	[54,44; 57,12]	[55,13; 57,94]	[55,65; 58,57]	[55,18; 58,22]	[55,87; 58,98]	[54,74; 57,95]	[56,73; 60,00]	[56,63; 60,00]	[56,05; 59,51]	[55,00; 58,57]	[54,73; 58,40]	[54,41; 58,16]				
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	1236	932	914	781	721	619	625	571	591	545	542	500	513	483	453				
		Anteil in %	16,90	14,37	15,59	14,76	15,12	14,03	15,26	14,75	16,13	15,56	16,44	16,01	17,36	17,19	16,85				
		CI Anteil in %	[16,04; 17,76]	[13,52; 15,22]	[14,67; 16,52]	[13,80; 15,71]	[14,11; 16,14]	[13,01; 15,06]	[14,15; 16,36]	[13,63; 15,87]	[14,94; 17,33]	[14,36; 16,76]	[15,18; 17,71]	[14,72; 17,29]	[15,99; 18,73]	[15,80; 18,59]	[15,44; 18,27]				
		Anzahl	780	469	416	328	325	281	297	260	295	271	287	217	239	224	244				
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anteil in %	10,67	7,23	7,10	6,20	6,82	6,37	7,25	6,72	8,05	7,74	8,71	6,95	8,09	7,97	9,08				
		CI Anteil in %	[9,96; 11,37]	[6,60; 7,86]	[6,44; 7,76]	[5,55; 6,85]	[6,10; 7,53]	[5,65; 7,09]	[6,46; 8,04]	[5,93; 7,51]	[7,17; 8,93]	[6,85; 8,62]	[7,74; 9,67]	[6,05; 7,84]	[7,10; 9,07]	[6,97; 8,98]	[7,99; 10,16]				
	Anzahl	448	134	153	123	106	101	95	83	92	81	80	63	79	59	67					
	Anteil in %	6,13	2,07	2,61	2,32	2,22	2,29	2,32	2,14	2,51	2,31	2,43	2,02	2,67	2,10	2,49					
	CI Anteil in %	[5,58; 6,68]	[1,72; 2,41]	[2,20; 3,02]	[1,92; 2,73]	[1,80; 2,64]	[1,85; 2,73]	[1,86; 2,78]	[1,69; 2,60]	[2,00; 3,02]	[1,82; 2,81]	[1,90; 2,95]	[1,52; 2,51]	[2,09; 3,26]	[1,57; 2,63]	[1,90; 3,08]					

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	9778	8989	8164	7426	6790	6402	5933	5585	5240	4913	4579	4321	4101	3871						
	auswertbar	Anzahl	9768	8555	7805	7102	6507	6018	5581	5292	5017	4680	4420	4171	3956	3738						
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1559	1546	1539	1300	1265	1060	965	806	708	609	663	548	557	455						
		CI Anteil in %	[15,23; 16,69]	[17,26; 18,89]	[18,84; 20,60]	[17,41; 19,20]	[18,48; 20,40]	[16,65; 18,58]	[16,30; 18,28]	[14,26; 16,20]	[13,15; 15,08]	[12,05; 13,98]	[13,95; 16,05]	[12,11; 14,16]	[13,00; 15,16]	[11,12; 13,22]						
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	5142	4638	4283	3962	3634	3296	3197	2957	2865	2628	2529	2380	2293	2096						
		CI Anteil in %	[51,65; 53,63]	[53,16; 55,27]	[53,77; 55,98]	[54,63; 56,94]	[54,64; 57,05]	[53,51; 56,03]	[55,99; 58,58]	[54,54; 57,21]	[55,74; 58,48]	[54,73; 57,58]	[55,76; 58,68]	[55,56; 58,56]	[56,42; 59,50]	[54,48; 57,66]						
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1668	1453	1273	1117	998	1018	853	944	879	872	739	755	689	751						
		CI Anteil in %	[16,33; 17,82]	[16,19; 17,78]	[15,49; 17,13]	[14,88; 16,57]	[14,46; 16,21]	[15,97; 17,86]	[14,34; 16,23]	[16,81; 18,87]	[16,47; 18,57]	[17,52; 19,75]	[15,62; 17,82]	[16,93; 19,27]	[16,23; 18,60]	[18,81; 21,38]						
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	959	697	545	555	446	491	434	431	425	416	362	365	312	335						
		CI Anteil in %	[9,23; 10,41]	[7,57; 8,73]	[6,42; 7,55]	[7,19; 8,44]	[6,24; 7,47]	[7,47; 8,85]	[7,07; 8,48]	[7,41; 8,88]	[7,70; 9,24]	[8,07; 9,70]	[7,38; 9,00]	[7,89; 9,61]	[7,05; 8,73]	[8,05; 9,88]						
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	440	221	165	168	164	153	132	154	140	155	127	123	105	101						
		CI Anteil in %	[4,09; 4,92]	[2,25; 2,92]	[1,79; 2,43]	[2,01; 2,72]	[2,14; 2,90]	[2,14; 2,94]	[1,97; 2,76]	[2,46; 3,36]	[2,33; 3,25]	[2,80; 3,82]	[2,38; 3,37]	[2,44; 3,46]	[2,15; 3,16]	[2,18; 3,22]						
	2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	11195	10505	9553	8754	8293	7702	7289	6827	6435	6016	5692	5332	5084						
		auswertbar	Anzahl	11183	10136	9145	8493	7804	7309	6970	6588	6169	5845	5498	5174	4959						
normal: HbA1c ≤ 6,0		Anzahl	1660	1964	1598	1574	1304	1236	1030	854	753	835	681	741	647							
		CI Anteil in %	[14,18; 15,50]	[18,61; 20,15]	[16,70; 18,25]	[17,71; 19,36]	[15,88; 17,54]	[16,05; 17,77]	[13,94; 15,61]	[12,15; 13,77]	[11,39; 13,02]	[13,39; 15,18]	[11,52; 13,26]	[13,37; 15,28]	[12,11; 13,98]							
oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5		Anzahl	5717	5496	5065	4729	4344	4186	3881	3822	3515	3375	3191	2997	2840							
		CI Anteil in %	[50,20; 52,05]	[53,25; 55,19]	[54,37; 56,40]	[54,62; 56,74]	[54,56; 56,77]	[56,14; 58,41]	[54,52; 56,85]	[56,82; 59,21]	[55,74; 58,21]	[56,48; 59,01]	[56,73; 59,34]	[56,58; 59,27]	[55,89; 58,65]							
erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5		Anzahl	2002	1648	1537	1358	1339	1160	1201	1166	1146	1029	973	899	915							
		CI Anteil in %	[17,19; 18,61]	[15,54; 16,98]	[16,04; 17,57]	[15,21; 16,77]	[16,32; 17,99]	[15,03; 16,71]	[16,34; 18,12]	[16,78; 18,62]	[17,61; 19,55]	[16,63; 18,58]	[16,69; 18,71]	[16,34; 18,41]	[17,37; 19,53]							
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0		Anzahl	1187	771	727	620	631	567	637	538	570	465	507	420	439							
		CI Anteil in %	[10,04; 11,19]	[7,09; 8,12]	[7,40; 8,50]	[6,75; 7,85]	[7,48; 8,69]	[7,14; 8,37]	[8,46; 9,82]	[7,51; 8,83]	[8,52; 9,96]	[7,26; 8,65]	[8,46; 9,99]	[7,37; 8,86]	[8,06; 9,64]							
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0		Anzahl	617	257	218	212	186	160	221	208	185	141	146	117	118							
		CI Anteil in %	[5,09; 5,94]	[2,23; 2,84]	[2,07; 2,70]	[2,16; 2,83]	[2,04; 2,72]	[1,85; 2,52]	[2,76; 3,58]	[2,73; 3,58]	[2,57; 3,42]	[2,02; 2,81]	[2,23; 3,08]	[1,86; 2,67]	[1,96; 2,80]							
2006-2		Patienten insgesamt	Anzahl	14493	13791	12613	11771	10718	10080	9390	8865	8292	7821	7374	6965							
		auswertbar	Anzahl	14481	12996	11927	10904	9976	9473	8981	8423	7950	7468	7106	6690							
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	2511	2363	2293	1959	1797	1528	1375	1179	1226	1007	1060	884								
		CI Anteil in %	[16,72; 17,96]	[17,52; 18,85]	[18,52; 19,93]	[17,25; 18,69]	[17,26; 18,77]	[15,39; 16,87]	[14,57; 16,05]	[13,26; 14,74]	[14,63; 16,22]	[12,71; 14,26]	[14,09; 15,75]	[12,40; 14,03]								
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	7858	7226	6737	6085	5729	5332	5126	4761	4576	4271	4128	3808								
		CI Anteil in %	[53,45; 55,08]	[54,75; 56,46]	[55,60; 57,38]	[54,87; 56,74]	[56,46; 58,40]	[55,29; 57,29]	[56,05; 58,10]	[55,47; 57,58]	[56,47; 58,65]	[56,07; 58,31]	[56,94; 59,24]	[55,73; 58,11]								
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	2255	2035	1734	1765	1537	1556	1517	1459	1320	1350	1160	1221								
		CI Anteil in %	[14,98; 16,16]	[15,03; 16,28]	[13,91; 15,17]	[15,50; 16,88]	[14,70; 16,12]	[15,68; 17,17]	[16,12; 17,67]	[16,51; 18,13]	[15,79; 17,42]	[17,20; 18,95]	[15,46; 17,18]	[17,33; 19,18]								
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	1269	1020	879	822	703	786	719	785	635	644	585	605								
		CI Anteil in %	[8,30; 9,22]	[7,39; 8,31]	[6,90; 7,84]	[7,04; 8,03]	[6,54; 7,55]	[7,74; 8,85]	[7,44; 8,57]	[8,70; 9,94]	[7,39; 8,58]	[7,99; 9,26]	[7,59; 8,87]	[8,36; 9,73]								
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	588	352	284	273	210	271	244	239	193	196	173	172								
		CI Anteil in %	[3,74; 4,38]	[2,43; 2,99]	[2,11; 2,65]	[2,21; 2,80]	[1,82; 2,39]	[2,53; 3,20]	[2,38; 3,05]	[2,48; 3,19]	[2,09; 2,77]	[2,26; 2,99]	[2,08; 2,79]	[2,19; 2,95]								

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18117	17190	16142	14666	13722	12823	12070	11283	10635	10034	9520									
	auswertbar	Anzahl	18107	16365	14921	13627	12863	12270	11582	10807	10200	9691	9168									
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	3140	3406	2831	2790	2340	2127	1784	1841	1552	1606	1332									
		Anteil in %	17,34	20,81	18,97	20,47	18,19	17,33	15,40	17,04	15,22	16,57	14,53									
	CI Anteil in %	[16,79; 17,89]	[20,19; 21,43]	[18,34; 19,60]	[19,80; 21,15]	[17,53; 18,86]	[16,67; 18,00]	[14,75; 16,06]	[16,33; 17,74]	[14,52; 15,91]	[15,83; 17,31]	[13,81; 15,25]										
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	9771	9179	8377	7705	7189	7065	6564	6178	5816	5572	5252									
		Anteil in %	53,96	56,09	56,14	56,54	55,89	57,58	56,67	57,17	57,02	57,50	57,29									
	CI Anteil in %	[53,24; 54,69]	[55,33; 56,85]	[55,35; 56,94]	[55,71; 57,37]	[55,03; 56,75]	[56,70; 58,45]	[55,77; 57,58]	[56,23; 58,10]	[56,06; 57,98]	[56,51; 58,48]	[56,27; 58,30]										
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	2753	2259	2250	1905	1996	1880	2010	1722	1698	1560	1572									
		Anteil in %	15,20	13,80	15,08	13,98	15,52	15,32	17,35	15,93	16,65	16,10	17,15									
	CI Anteil in %	[14,68; 15,73]	[13,28; 14,33]	[14,51; 15,65]	[13,40; 14,56]	[14,89; 16,14]	[14,68; 15,96]	[16,66; 18,04]	[15,24; 16,62]	[15,92; 17,37]	[15,37; 16,83]	[16,38; 17,92]										
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	1573	1100	1103	928	981	886	907	803	865	717	772									
Anteil in %		8,69	6,72	7,39	6,81	7,63	7,22	7,83	7,43	8,48	7,40	8,42										
CI Anteil in %	[8,28; 9,10]	[6,34; 7,11]	[6,97; 7,81]	[6,39; 7,23]	[7,17; 8,09]	[6,76; 7,68]	[7,34; 8,32]	[6,94; 7,92]	[7,94; 9,02]	[6,88; 7,92]	[7,85; 8,99]											
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	870	421	360	299	357	312	317	263	269	236	240										
	Anteil in %	4,80	2,57	2,41	2,19	2,78	2,54	2,74	2,43	2,64	2,44	2,62										
CI Anteil in %	[4,49; 5,12]	[2,33; 2,82]	[2,17; 2,66]	[1,95; 2,44]	[2,49; 3,06]	[2,26; 2,82]	[2,44; 3,03]	[2,14; 2,72]	[2,33; 2,95]	[2,13; 2,74]	[2,29; 2,94]											
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10330	9940	9118	8435	7735	7205	6731	6317	5936	5626										
	auswertbar	Anzahl	10322	9301	8259	7770	7300	6855	6430	6050	5718	5386										
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1871	1831	1772	1439	1272	1115	1157	920	1009	884										
		Anteil in %	18,13	19,69	21,46	18,52	17,42	16,27	17,99	15,21	17,65	16,41										
	CI Anteil in %	[17,38; 18,87]	[18,88; 20,49]	[20,57; 22,34]	[17,66; 19,38]	[16,55; 18,29]	[15,39; 17,14]	[17,05; 18,93]	[14,30; 16,11]	[16,66; 18,63]	[15,42; 17,40]											
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	5627	5201	4669	4461	4288	3948	3755	3622	3341	3085										
		Anteil in %	54,51	55,92	56,53	57,41	58,74	57,59	58,40	59,87	58,43	57,28										
	CI Anteil in %	[53,55; 55,48]	[54,91; 56,93]	[55,46; 57,60]	[56,31; 58,51]	[57,61; 59,87]	[56,42; 58,76]	[57,19; 59,60]	[58,63; 61,10]	[57,15; 59,71]	[55,96; 58,60]											
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1459	1346	1096	1106	1046	1009	874	862	811	827										
		Anteil in %	14,13	14,47	13,27	14,23	14,33	14,72	13,59	14,25	14,18	15,35										
	CI Anteil in %	[13,46; 14,81]	[13,76; 15,19]	[12,54; 14,00]	[13,46; 15,01]	[13,52; 15,13]	[13,88; 15,56]	[12,75; 14,43]	[13,37; 15,13]	[13,28; 15,09]	[14,39; 16,32]											
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	851	658	535	548	502	568	467	464	406	440										
Anteil in %		8,24	7,07	6,48	7,05	6,88	8,29	7,26	7,67	7,10	8,17											
CI Anteil in %	[7,71; 8,78]	[6,55; 7,60]	[5,95; 7,01]	[6,48; 7,62]	[6,30; 7,46]	[7,63; 8,94]	[6,63; 7,90]	[7,00; 8,34]	[6,43; 7,77]	[7,44; 8,90]												
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	514	265	187	216	192	215	177	182	151	150											
	Anteil in %	4,98	2,85	2,26	2,78	2,63	3,14	2,75	3,01	2,64	2,78											
CI Anteil in %	[4,56; 5,40]	[2,51; 3,19]	[1,94; 2,59]	[2,41; 3,15]	[2,26; 3,00]	[2,72; 3,55]	[2,35; 3,15]	[2,58; 3,44]	[2,23; 3,06]	[2,35; 3,22]												
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	9430	9074	8463	7733	7156	6701	6331	5959	5643											
	auswertbar	Anzahl	9420	8457	7867	7288	6821	6429	6062	5723	5425											
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1622	1866	1592	1361	1198	1240	1030	1100	918											
		Anteil in %	17,22	22,06	20,24	18,67	17,56	19,29	16,99	19,22	16,92											
	CI Anteil in %	[16,46; 17,98]	[21,18; 22,95]	[19,35; 21,12]	[17,78; 19,57]	[16,66; 18,47]	[18,32; 20,25]	[16,05; 17,94]	[18,20; 20,24]	[15,92; 17,92]												
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	5144	4794	4474	4302	4002	3815	3559	3381	3140											
		Anteil in %	54,61	56,69	56,87	59,03	58,67	59,34	58,71	59,08	57,88											
	CI Anteil in %	[53,60; 55,61]	[55,63; 57,74]	[55,78; 57,96]	[57,90; 60,16]	[57,50; 59,84]	[58,14; 60,54]	[57,47; 59,95]	[57,80; 60,35]	[56,57; 59,19]												
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1366	1052	1090	970	974	866	905	794	881											
		Anteil in %	14,50	12,44	13,86	13,31	14,28	13,47	14,93	13,87	16,24											
	CI Anteil in %	[13,79; 15,21]	[11,74; 13,14]	[13,09; 14,62]	[12,53; 14,09]	[13,45; 15,11]	[12,64; 14,30]	[14,03; 15,83]	[12,98; 14,77]	[15,26; 17,22]												
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	783	551	523	478	488	385	422	336	368											
Anteil in %		8,31	6,52	6,65	6,56	7,15	5,99	6,96	5,87	6,78												
CI Anteil in %	[7,75; 8,87]	[5,99; 7,04]	[6,10; 7,20]	[5,99; 7,13]	[6,54; 7,77]	[5,41; 6,57]	[6,32; 7,60]	[5,26; 6,48]	[6,11; 7,45]													
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	505	194	188	177	159	123	146	112	118												
	Anteil in %	5,36	2,29	2,39	2,43	2,33	1,91	2,41	1,96	2,18												
CI Anteil in %	[4,91; 5,82]	[1,97; 2,61]	[2,05; 2,73]	[2,08; 2,78]	[1,97; 2,69]	[1,58; 2,25]	[2,02; 2,79]	[1,60; 2,32]	[1,79; 2,56]													

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6552	6320	5851	5399	5008	4674	4394	4147													
	auswertbar	Anzahl	6544	5957	5489	5103	4800	4471	4202	3968													
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1143	1160	986	859	915	755	861	719													
		Anteil in %	17,47	19,47	17,96	16,83	19,06	16,89	20,49	18,12													
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[16,55; 18,39]	[18,47; 20,48]	[16,95; 18,98]	[15,81; 17,86]	[17,95; 20,17]	[15,79; 17,98]	[19,27; 21,71]	[16,92; 19,32]													
		Anzahl	3662	3434	3278	3019	2855	2679	2449	2336													
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	55,96	57,65	59,72	59,16	59,48	59,92	58,28	58,87													
		CI Anteil in %	[54,76; 57,16]	[56,39; 58,90]	[58,42; 61,02]	[57,81; 60,51]	[58,09; 60,87]	[58,48; 61,36]	[56,79; 59,77]	[57,34; 60,40]													
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	915	820	717	748	627	634	536	561													
		Anteil in %	13,98	13,77	13,06	14,66	13,06	14,18	12,76	14,14													
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[13,14; 14,82]	[12,89; 14,64]	[12,17; 13,95]	[13,69; 15,63]	[12,11; 14,02]	[13,16; 15,20]	[11,75; 13,76]	[13,05; 15,22]													
		Anzahl	509	371	379	350	292	294	273	260													
		Anteil in %	7,78	6,23	6,90	6,86	6,08	6,58	6,50	6,55													
		CI Anteil in %	[7,13; 8,43]	[5,61; 6,84]	[6,23; 7,58]	[6,17; 7,55]	[5,41; 6,76]	[5,85; 7,30]	[5,75; 7,24]	[5,78; 7,32]													
	Anzahl	315	172	129	127	111	109	83	92														
	Anteil in %	4,81	2,89	2,35	2,49	2,31	2,44	1,98	2,32														
	CI Anteil in %	[4,29; 5,33]	[2,46; 3,31]	[1,95; 2,75]	[2,06; 2,92]	[1,89; 2,74]	[1,99; 2,89]	[1,55; 2,40]	[1,85; 2,79]														
	Anzahl	5527	5299	4907	4513	4221	3942	3724															
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5527	5299	4907	4513	4221	3942	3724														
	auswertbar	Anzahl	5516	5068	4638	4306	4042	3786	3610														
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	917	1063	875	960	742	799	682														
		Anteil in %	16,62	20,97	18,87	22,29	18,36	21,10	18,89														
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[15,64; 17,61]	[19,85; 22,10]	[17,74; 19,99]	[21,05; 23,54]	[17,16; 19,55]	[19,80; 22,40]	[17,61; 20,17]														
		Anzahl	3019	2981	2788	2575	2455	2283	2139														
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	54,73	58,82	60,11	59,80	60,74	60,30	59,25														
		CI Anteil in %	[53,42; 56,05]	[57,46; 60,18]	[58,70; 61,52]	[58,34; 61,26]	[59,23; 62,24]	[58,74; 61,86]	[57,65; 60,86]														
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	780	636	571	468	509	417	493														
		Anteil in %	14,14	12,55	12,31	10,87	12,59	11,01	13,66														
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[13,22; 15,06]	[11,64; 13,46]	[11,37; 13,26]	[9,94; 11,80]	[11,57; 13,62]	[10,02; 12,01]	[12,54; 14,78]														
		Anzahl	445	282	296	233	247	221	227														
		Anteil in %	8,07	5,56	6,38	5,41	6,11	5,84	6,29														
		CI Anteil in %	[7,35; 8,79]	[4,93; 6,20]	[5,68; 7,09]	[4,74; 6,09]	[5,37; 6,85]	[5,09; 6,58]	[5,50; 7,08]														
	Anzahl	355	106	108	70	89	66	69															
	Anteil in %	6,44	2,09	2,33	1,63	2,20	1,74	1,91															
	CI Anteil in %	[5,79; 7,08]	[1,70; 2,49]	[1,89; 2,76]	[1,25; 2,00]	[1,75; 2,65]	[1,33; 2,16]	[1,46; 2,36]															
	Anzahl	5982	5705	5205	4802	4483	4208																
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5982	5705	5205	4802	4483	4208															
	auswertbar	Anzahl	5974	5419	4933	4606	4312	4063															
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	899	1046	1049	894	919	785															
		Anteil in %	15,05	19,30	21,26	19,41	21,31	19,32															
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[14,14; 15,96]	[18,25; 20,35]	[20,12; 22,41]	[18,27; 20,55]	[20,09; 22,54]	[18,11; 20,53]															
		Anzahl	3497	3203	2909	2761	2634	2411															
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	58,54	59,11	58,97	59,94	61,09	59,34															
		CI Anteil in %	[57,29; 59,79]	[57,80; 60,42]	[57,60; 60,34]	[58,53; 61,36]	[59,63; 62,54]	[57,83; 60,85]															
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	774	678	607	574	454	538															
		Anteil in %	12,96	12,51	12,30	12,46	10,53	13,24															
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[12,10; 13,81]	[11,63; 13,39]	[11,39; 13,22]	[11,51; 13,42]	[9,61; 11,44]	[12,20; 14,28]															
		Anzahl	478	374	266	270	234	251															
		Anteil in %	8,00	6,90	5,39	5,86	5,43	6,18															
		CI Anteil in %	[7,31; 8,69]	[6,23; 7,58]	[4,76; 6,02]	[5,18; 6,54]	[4,75; 6,10]	[5,44; 6,92]															
	Anzahl	326	118	102	107	71	78																
	Anteil in %	5,46	2,18	2,07	2,32	1,65	1,92																
	CI Anteil in %	[4,88; 6,03]	[1,79; 2,57]	[1,67; 2,46]	[1,89; 2,76]	[1,27; 2,03]	[1,50; 2,34]																

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6630	6363	5859	5409	5055															
	auswertbar	Anzahl	6623	6132	5560	5164	4856															
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	900	1331	1056	1147	1014															
		Anteil in %	13,59	21,71	18,99	22,21	20,88															
	CI Anteil in %	[12,76; 14,41]	[20,67; 22,74]	[17,96; 20,02]	[21,08; 23,35]	[19,74; 22,02]																
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	3843	3618	3400	3070	2835															
		Anteil in %	58,03	59,00	61,15	59,45	58,38															
	CI Anteil in %	[56,84; 59,21]	[57,77; 60,23]	[59,87; 62,43]	[58,11; 60,79]	[56,99; 59,77]																
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	921	702	687	589	626															
		Anteil in %	13,91	11,45	12,36	11,41	12,89															
	CI Anteil in %	[13,07; 14,74]	[10,65; 12,25]	[11,49; 13,22]	[10,54; 12,27]	[11,95; 13,83]																
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	565	350	305	259	282															
Anteil in %		8,53	5,71	5,49	5,02	5,81																
CI Anteil in %	[7,86; 9,20]	[5,13; 6,29]	[4,89; 6,08]	[4,42; 5,61]	[5,15; 6,47]																	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	394	131	112	99	99																
	Anteil in %	5,95	2,14	2,01	1,92	2,04																
CI Anteil in %	[5,38; 6,52]	[1,77; 2,50]	[1,65; 2,38]	[1,54; 2,29]	[1,64; 2,44]																	
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6682	6400	5912	5443																
	auswertbar	Anzahl	6676	6129	5570	5216																
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1031	1126	1239	1069																
		Anteil in %	15,44	18,37	22,24	20,49																
	CI Anteil in %	[14,58; 16,31]	[17,40; 19,34]	[21,15; 23,34]	[19,40; 21,59]																	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	3956	3760	3306	3087																
		Anteil in %	59,26	61,35	59,35	59,18																
	CI Anteil in %	[58,08; 60,44]	[60,13; 62,57]	[58,06; 60,64]	[57,85; 60,52]																	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	848	741	647	653																
		Anteil in %	12,70	12,09	11,62	12,52																
	CI Anteil in %	[11,90; 13,50]	[11,27; 12,91]	[10,77; 12,46]	[11,62; 13,42]																	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	509	388	286	306																
Anteil in %		7,62	6,33	5,13	5,87																	
CI Anteil in %	[6,99; 8,26]	[5,72; 6,94]	[4,55; 5,71]	[5,23; 6,50]																		
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	332	114	92	101																	
	Anteil in %	4,97	1,86	1,65	1,94																	
CI Anteil in %	[4,45; 5,49]	[1,52; 2,20]	[1,32; 1,99]	[1,56; 2,31]																		
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6352	6098	5609																	
	auswertbar	Anzahl	6347	5838	5296																	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	862	1342	1105																	
		Anteil in %	13,58	22,99	20,86																	
	CI Anteil in %	[12,74; 14,42]	[21,91; 24,07]	[19,77; 21,96]																		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	3770	3416	3141																	
		Anteil in %	59,40	58,51	59,31																	
	CI Anteil in %	[58,19; 60,61]	[57,25; 59,78]	[57,99; 60,63]																		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	857	671	641																	
		Anteil in %	13,50	11,49	12,10																	
	CI Anteil in %	[12,66; 14,34]	[10,68; 12,31]	[11,22; 12,98]																		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	526	289	311																	
Anteil in %		8,29	4,95	5,87																		
CI Anteil in %	[7,61; 8,97]	[4,39; 5,51]	[5,24; 6,51]																			
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	332	120	98																		
	Anteil in %	5,23	2,06	1,85																		
CI Anteil in %	[4,68; 5,78]	[1,69; 2,42]	[1,49; 2,21]																			

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5365	5157																		
	auswertbar	Anzahl	5361	4944																		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	791	951																		
		Anteil in %		14,75	19,24																	
	CI Anteil in %		[13,81; 15,70]	[18,14; 20,33]																		
		Anzahl	3177	2923																		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %		59,26	59,12																	
		CI Anteil in %		[57,95; 60,58]	[57,75; 60,49]																	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	647	628																		
		Anteil in %		12,07	12,70																	
	CI Anteil in %		[11,20; 12,94]	[11,77; 13,63]																		
		Anzahl	429	312																		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %		8,00	6,31																	
		CI Anteil in %		[7,28; 8,73]	[5,63; 6,99]																	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	317	130																			
	Anteil in %		5,91	2,63																		
CI Anteil in %		[5,28; 6,54]	[2,18; 3,08]																			
	Patienten insgesamt	Anzahl	5991																			
2012-1	auswertbar	Anzahl	5981																			
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	903																			
		Anteil in %		15,10																		
	CI Anteil in %		[14,19; 16,01]																			
		Anzahl	3452																			
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %		57,72																		
		CI Anteil in %		[56,46; 58,97]																		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	770																			
		Anteil in %		12,87																		
	CI Anteil in %		[12,03; 13,72]																			
		Anzahl	491																			
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %		8,21																		
		CI Anteil in %		[7,51; 8,91]																		
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	365																			
Anteil in %			6,10																			
CI Anteil in %		[5,50; 6,71]																				

In der folgenden Tabelle 3.2.3 ist die Entwicklung der **Serum-Kreatinin-Werte** ausgewiesen. Zu beachten ist dabei, dass diese Werte erst im neuen Dokumentationsbogen nach der 9. Risikostrukturausgleichs-Änderungsverordnung erhoben wurden. Für jede Kohorte können die entsprechenden Werte daher erst ab dem Berichtshalbjahr 2004-2 ausgewiesen werden. Die ersten Zeilen beziehen sich auf die Unterteilung der Patienten in zwei spezifische Untergruppen. Zunächst wird unter „Patienten insgesamt“ die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. In der Zeile „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr plausible Angaben zur Serum-Kreatinin-Untersuchung vorliegen (erhobener und plausibler Wert gemäß Tabelle 0.1.2 bzw. die Angabe, dass keine Untersuchung erfolgte).

Diese „auswertbaren“ Patienten werden wiederum in zwei Gruppen unterteilt: Zunächst wird ausgewiesen, wie viele Patienten nicht auf Serum-Kreatinin untersucht wurden und welchen Anteil an den „auswertbaren“ Patienten diese Personengruppe ausmacht. Anschließend wird ausgewiesen, bei wie vielen Patienten die Serum-Kreatinin-Werte erhoben wurden und plausible

Ergebnisse dokumentiert sind („untersuchte Patienten“). Diese Anzahl entspricht der Fallbasis für Berechnung von arithmetischem Mittel und Median. Die patientenbezogenen mittlere Differenz zwischen dem Serum-Kreatinin-Wert im Berichtshalbjahr und Beitritts-halbjahr kann dabei erst für Kohorten ab dem Beitritts-halbjahr 2004-2 dargestellt werden und beträgt im Beitritts-halbjahr selbst definitionsgemäß Null. Zudem ist für diese Größe die Fallbasis gesondert angegeben: Da für diese Differenz Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen müssen, kann die Fallzahl geringer ausfallen als die Anzahl der untersuchten Patienten.

In der Kohorte 2004-2 waren im letzten Halbjahr 1906 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 1692 Patienten lagen auswertbare Angaben vor. Bei 1394 von diesen Patienten erfolgte eine Untersuchung auf Serum-Kreatinin und es wurden plausible Werte dokumentiert. Bei ihnen betrug der durchschnittliche Serum-Kreatinin-Wert 99,74 µmol/l; der Median lag bei 81,00 µmol/l.

Tabelle 3.2.3 Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5209	4715	4298	3897	3506	3261	3038	2910	2710	2571	2446	2321	2204	2102	2005	1906				
	auswertbar	Anzahl	5083	4392	4085	3720	3240	2991	2778	2561	2434	2303	2206	2073	1979	1873	1792	1692				
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1119	1025	1042	933	857	736	698	568	583	495	528	422	479	369	412	298				
		Anteil in %	22,01	23,34	25,51	25,08	26,45	24,61	25,13	22,18	23,95	21,49	23,93	20,36	24,20	19,70	22,99	17,61				
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[20,88; 23,15]	[22,09; 24,59]	[24,17; 26,84]	[23,69; 26,47]	[24,93; 27,97]	[23,06; 26,15]	[23,51; 26,74]	[20,57; 23,79]	[22,26; 25,65]	[19,82; 23,17]	[22,15; 25,72]	[18,62; 22,09]	[22,32; 26,09]	[17,90; 21,50]	[21,04; 24,94]	[15,80; 19,43]				
		Anzahl	3964	3367	3043	2787	2383	2255	2080	1993	1851	1808	1678	1651	1500	1504	1380	1394				
	Auswertungsergebnisse zum Serum-Kreatinin-Wert in µmol/l	Mean	109,97	115,10	92,75	91,12	93,24	94,55	90,36	92,43	92,65	92,15	93,42	91,45	95,30	92,04	92,81	99,74				
		CI Mean	[105,87; 114,07]	[110,23; 119,98]	[90,14; 95,37]	[88,72; 93,53]	[90,30; 96,19]	[91,28; 97,83]	[88,08; 92,64]	[89,53; 95,32]	[90,03; 95,26]	[89,66; 94,64]	[90,38; 96,47]	[88,63; 94,27]	[91,79; 98,82]	[89,28; 94,81]	[89,82; 95,80]	[95,01; 104,47]				
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	83,00	81,00	81,00	80,00	81,00	80,00	82,00	81,00				
		Fallbasis mittlere Differenz		2781	2557	2316	1979	1860	1706	1622	1504	1452	1374	1340	1220	1217	1121	1115				
		Mittlere Differenz zur ED		0,27	-13,45	-16,15	-16,36	-13,69	-22,01	-20,09	-22,00	-21,06	-21,52	-21,07	-20,33	-22,07	-20,55	-22,60				
		CI mittlere Differenz		[-5,27; 5,80]	[-18,38; -8,52]	[-21,36; -10,94]	[-22,48; -10,24]	[-19,87; -7,52]	[-28,88; -15,15]	[-27,37; -12,82]	[-29,76; -14,23]	[-28,80; -13,31]	[-29,55; -13,49]	[-29,17; -12,96]	[-29,40; -11,27]	[-30,77; -13,37]	[-29,42; -11,67]	[-31,69; -13,51]				
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7326	6819	6209	5519	4992	4584	4340	4066	3849	3623	3415	3216	3064	2915	2769					
	auswertbar	Anzahl	7228	6455	5853	5281	4752	4404	4083	3869	3656	3493	3284	3116	2952	2806	2668					
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1411	1435	1222	1185	931	1055	773	838	650	699	571	597	478	541	390					
		Anteil in %	19,52	22,23	20,88	22,44	19,59	23,96	18,93	21,66	17,78	20,01	17,39	19,16	16,19	19,28	14,62					
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[18,61; 20,44]	[21,22; 23,25]	[19,84; 21,92]	[21,31; 23,56]	[18,46; 20,72]	[22,69; 25,22]	[17,73; 20,13]	[20,36; 22,96]	[16,54; 19,02]	[18,68; 21,34]	[16,09; 18,68]	[17,78; 20,54]	[14,86; 17,52]	[17,82; 20,74]	[13,28; 15,96]					
		Anzahl	5817	5020	4631	4096	3821	3349	3310	3031	3006	2794	2713	2519	2474	2265	2278					
	Auswertungsergebnisse zum Serum-Kreatinin-Wert in µmol/l	Mean	102,13	94,30	97,06	97,16	92,87	89,27	90,33	91,69	91,49	91,25	91,58	93,44	91,06	93,51	93,36					
		CI Mean	[99,27; 104,98]	[92,01; 96,59]	[94,42; 99,70]	[94,41; 99,91]	[90,62; 95,11]	[87,65; 90,88]	[88,55; 92,12]	[89,78; 93,59]	[89,63; 93,35]	[89,53; 92,97]	[89,62; 93,53]	[91,23; 95,65]	[89,12; 92,99]	[91,03; 96,00]	[90,76; 95,95]					
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	81,00	81,00	81,00	80,00	81,00	80,00	81,00	81,00					
		Fallbasis mittlere Differenz		4224	3998	3505	3256	2861	2769	2528	2511	2320	2253	2090	2039	1849	1877					
		Mittlere Differenz zur ED		-10,37	-6,98	-7,24	-10,56	-13,25	-12,55	-10,54	-11,59	-10,71	-9,27	-8,00	-9,50	-7,25	-8,59					
		CI mittlere Differenz		[-14,01; -6,72]	[-10,90; -3,06]	[-11,60; -2,89]	[-14,68; -6,44]	[-17,54; -8,95]	[-17,18; -7,93]	[-15,39; -5,70]	[-16,41; -6,77]	[-15,65; -5,77]	[-14,24; -4,29]	[-13,35; -2,65]	[-14,70; -4,30]	[-13,11; -1,39]	[-14,24; -2,93]					
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	9778	8989	8164	7426	6790	6402	5933	5585	5240	4913	4579	4321	4101	3871						
	auswertbar	Anzahl	9603	8486	7726	7019	6445	5955	5573	5286	5009	4671	4408	4165	3951	3720						
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1933	1683	1848	1498	1517	1296	1206	1057	1022	857	944	707	802	608						
		Anteil in %	20,13	19,83	23,92	21,34	23,54	21,76	21,64	20,00	20,40	18,35	21,42	16,97	20,30	16,34						
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[19,33; 20,93]	[18,98; 20,68]	[22,97; 24,87]	[20,38; 22,30]	[22,50; 24,57]	[20,72; 22,81]	[20,56; 22,72]	[18,92; 21,07]	[19,29; 21,52]	[17,24; 19,46]	[20,20; 22,63]	[15,83; 18,12]	[19,04; 21,55]	[15,16; 17,53]						
		Anzahl	7670	6803	5878	5521	4928	4659	4367	4229	3987	3814	3464	3458	3149	3112						
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	98,44	95,81	96,24	95,28	94,42	91,39	93,48	93,07	93,49	92,13	93,25	92,12	93,77	92,39						
		CI Mean	[96,38; 100,49]	[93,89; 97,72]	[94,18; 98,29]	[93,24; 97,31]	[92,46; 96,39]	[90,03; 92,74]	[91,91; 95,05]	[91,50; 94,65]	[91,86; 95,12]	[90,64; 93,63]	[91,54; 94,96]	[90,46; 93,78]	[91,91; 95,63]	[90,66; 94,12]						
		Median	80,00	80,00	81,00	80,00	82,00	83,00	84,00	83,00	84,00	82,00	83,00	82,00	81,00	81,00						
		Fallbasis mittlere Differenz		5772	5180	4727	4250	3972	3698	3572	3328	3159	2905	2847	2609	2586						
		Mittlere Differenz zur ED		-2,35	-1,45	-1,65	-2,00	-2,71	-1,60	-0,06	0,08	-0,37	-0,16	-0,33	0,44	0,32						
		CI mittlere Differenz		[-4,68; - 0,03]	[-4,00; 1,10]	[-4,24; 0,94]	[-4,68; 0,69]	[-5,35; - 0,08]	[-4,58; 1,38]	[-2,86; 2,74]	[-2,88; 3,04]	[-3,31; 2,56]	[-3,50; 3,18]	[-3,58; 2,91]	[-3,20; 4,07]	[-3,13; 3,76]						
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	11195	10505	9553	8754	8293	7702	7289	6827	6435	6016	5692	5332	5084							
	auswertbar	Anzahl	11116	10087	9095	8471	7777	7289	6963	6581	6155	5833	5499	5167	4943							
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	2205	2200	1960	2327	1667	1767	1439	1579	1193	1404	936	1165	802							
		Anteil in %	19,84	21,81	21,55	27,47	21,44	24,24	20,67	23,99	19,38	24,07	17,02	22,55	16,22							
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[19,09; 20,58]	[21,00; 22,62]	[20,71; 22,40]	[26,52; 28,42]	[20,52; 22,35]	[23,26; 25,23]	[19,72; 21,62]	[22,96; 25,03]	[18,39; 20,37]	[22,97; 25,17]	[16,03; 18,01]	[21,41; 23,69]	[15,20; 17,25]							
		Anzahl	8911	7887	7135	6144	6110	5522	5524	5002	4962	4429	4563	4002	4141							
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	95,47	94,43	91,95	91,47	91,10	90,89	91,52	92,50	92,11	91,78	90,76	91,84	91,64							
		CI Mean	[93,73; 97,21]	[92,73; 96,12]	[90,44; 93,46]	[89,95; 93,00]	[89,78; 92,42]	[89,76; 92,01]	[90,22; 92,81]	[91,14; 93,86]	[90,71; 93,52]	[90,38; 93,18]	[89,43; 92,10]	[90,41; 93,27]	[90,12; 93,16]							
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	83,00	83,00	83,00	82,00	81,00	81,00	81,00	81,00							
		Fallbasis mittlere Differenz		6721	6267	5363	5285	4751	4750	4250	4220	3781	3854	3411	3500							
		Mittlere Differenz zur ED		-0,19	-1,88	-3,15	-2,19	-2,75	-1,49	-0,17	0,18	-0,11	0,06	1,11	1,92							
		CI mittlere Differenz		[-2,29; 1,92]	[-3,97; 0,20]	[-5,47; - 0,83]	[-4,54; 0,17]	[-5,13; - 0,37]	[-3,97; 0,99]	[-2,71; 2,36]	[-2,46; 2,81]	[-2,94; 2,71]	[-2,69; 2,82]	[-1,85; 4,08]	[-0,98; 4,82]							
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	14493	13791	12613	11771	10718	10080	9390	8865	8292	7821	7374	6965								
	auswertbar	Anzahl	14305	12865	11858	10843	9947	9445	8965	8404	7932	7457	7097	6668								
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	2709	2893	3106	2612	2268	2165	2013	1731	1723	1341	1429	1122								
		Anteil in %	18,94	22,49	26,19	24,09	22,80	22,92	22,45	20,60	21,72	17,98	20,14	16,83								
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[18,30; 19,58]	[21,77; 23,21]	[25,40; 26,98]	[23,28; 24,89]	[21,98; 23,63]	[22,07; 23,77]	[21,59; 23,32]	[19,73; 21,46]	[20,81; 22,63]	[17,11; 18,85]	[19,20; 21,07]	[15,93; 17,72]								
		Anzahl	11596	9972	8752	8231	7679	7280	6952	6673	6209	6116	5668	5546								
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	98,52	95,83	94,52	92,47	92,97	93,77	93,74	93,38	93,79	93,48	93,09	93,67								
		CI Mean	[96,84; 100,20]	[94,24; 97,41]	[93,04; 95,99]	[91,23; 93,70]	[91,71; 94,23]	[92,41; 95,14]	[92,34; 95,13]	[92,01; 94,76]	[92,37; 95,21]	[92,00; 94,95]	[91,75; 94,43]	[92,19; 95,15]								
		Median	80,00	80,00	80,00	81,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	81,00	82,00	82,00								
		Fallbasis mittlere Differenz		8570	7711	7073	6593	6156	5873	5569	5268	5065	4724	4600								
		Mittlere Differenz zur ED		-1,80	-2,76	-4,65	-4,19	-2,12	-1,86	-0,60	-0,90	-1,33	-1,14	-0,20								
		CI mittlere Differenz		[-3,46; - 0,14]	[-4,61; - 0,92]	[-6,75; - 2,55]	[-6,39; - 1,98]	[-4,51; 0,27]	[-4,23; 0,50]	[-2,97; 1,77]	[-3,40; 1,60]	[-3,89; 1,22]	[-3,85; 1,57]	[-3,07; 2,67]								
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18117	17190	16142	14666	13722	12823	12070	11283	10635	10034	9520									
	auswertbar	Anzahl	17852	16230	14775	13539	12866	12226	11547	10755	10169	9655	9123									
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	3115	3430	3019	2925	2532	2740	2057	2341	1672	1958	1384									
		Anteil in %	17,45	21,13	20,43	21,60	19,68	22,41	17,81	21,77	16,44	20,28	15,17									
	untersuchte Patienten	CI Anteil in %	[16,89; 18,01]	[20,51; 21,76]	[19,78; 21,08]	[20,91; 22,30]	[18,99; 20,37]	[21,67; 23,15]	[17,12; 18,51]	[20,99; 22,55]	[15,72; 17,16]	[19,48; 21,08]	[14,43; 15,91]									
		Anzahl	14737	12800	11756	10614	10334	9486	9490	8414	8497	7697	7739									
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	94,47	93,94	90,62	91,56	91,89	92,47	92,28	92,79	92,04	92,84	92,51									
		CI Mean	[93,23; 95,71]	[92,74; 95,14]	[89,69; 91,56]	[90,63; 92,49]	[90,92; 92,85]	[91,42; 93,52]	[91,18; 93,39]	[91,61; 93,97]	[90,92; 93,17]	[91,66; 94,02]	[91,35; 93,68]									
		Median	80,00	80,00	80,00	82,00	82,00	83,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00									
		Fallbasis mittlere Differenz		11079	10314	9151	8991	8167	8174	7218	7266	6574	6582									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,39	-3,07	-2,24	-1,05	-0,02	0,53	0,94	1,32	2,91	3,26									
		CI mittlere Differenz		[-1,80; 1,03]	[-4,49; - 1,64]	[-3,77; - 0,70]	[-2,59; 0,50]	[-1,70; 1,66]	[-1,16; 2,22]	[-0,86; 2,74]	[-0,44; 3,08]	[1,09; 4,73]	[1,46; 5,07]									
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10330	9940	9118	8435	7735	7205	6731	6317	5936	5626											
	auswertbar	Anzahl	10189	9246	8242	7762	7279	6836	6405	6033	5701	5372											
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	2072	2030	1910	1686	1625	1361	1383	1019	1157	827											
		Anteil in %	20,34	21,96	23,17	21,72	22,32	19,91	21,59	16,89	20,29	15,39											
	CI Anteil in %	[19,55; 21,12]	[21,11; 22,80]	[22,26; 24,08]	[20,80; 22,64]	[21,37; 23,28]	[18,96; 20,86]	[20,58; 22,60]	[15,94; 17,84]	[19,25; 21,34]	[14,43; 16,36]												
	untersuchte Patienten	Anzahl	8117	7216	6332	6076	5654	5475	5022	5014	4544	4545											
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	96,43	91,04	91,22	90,46	91,14	89,61	90,92	89,90	90,94	90,90											
		CI Mean	[94,64; 98,23]	[89,73; 92,35]	[89,99; 92,45]	[89,27; 91,66]	[89,90; 92,38]	[88,47; 90,76]	[89,54; 92,30]	[88,57; 91,23]	[89,46; 92,42]	[89,38; 92,43]											
		Median	80,00	80,00	81,00	81,00	81,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00											
		Fallbasis mittlere Differenz		6153	5462	5130	4836	4593	4277	4175	3818	3754											
		Mittlere Differenz zur ED		-4,86	-3,81	-3,23	-2,25	-2,42	-2,45	-3,15	-1,81	-1,89											
		CI mittlere Differenz		[-6,82; - 2,90]	[-5,83; - 1,79]	[-5,32; - 1,14]	[-4,47; - 0,02]	[-4,54; - 0,31]	[-4,98; 0,07]	[-5,78; - 0,53]	[-4,63; 1,01]	[-4,70; 0,92]											
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	9430	9074	8463	7733	7156	6701	6331	5959	5643												
	auswertbar	Anzahl	9331	8426	7845	7269	6799	6403	6038	5699	5400												
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1679	1646	1617	1571	1270	1338	979	1147	863												
		Anteil in %	17,99	19,53	20,61	21,61	18,68	20,90	16,21	20,13	15,98												
	CI Anteil in %	[17,21; 18,77]	[18,69; 20,38]	[19,72; 21,51]	[20,67; 22,56]	[17,75; 19,61]	[19,90; 21,89]	[15,28; 17,14]	[19,09; 21,17]	[15,00; 16,96]													
	untersuchte Patienten	Anzahl	7652	6780	6228	5698	5529	5065	5059	4552	4537												
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	90,24	89,54	89,96	89,86	87,79	89,32	88,41	89,67	88,91												
		CI Mean	[88,81; 91,67]	[88,31; 90,76]	[88,67; 91,25]	[88,58; 91,13]	[86,68; 88,89]	[87,98; 90,67]	[87,09; 89,72]	[88,17; 91,17]	[87,52; 90,31]												
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00											
		Fallbasis mittlere Differenz		5874	5459	4918	4837	4405	4375	3946	3911												
		Mittlere Differenz zur ED		-1,37	0,18	0,49	-1,31	0,13	0,12	1,59	1,99												
		CI mittlere Differenz		[-2,95; 0,22]	[-1,62; 1,97]	[-1,21; 2,20]	[-3,08; 0,47]	[-1,81; 2,08]	[-1,86; 2,11]	[-0,51; 3,68]	[0,11; 3,88]												
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6552	6320	5851	5399	5008	4674	4394	4147													
	auswertbar	Anzahl	6493	5945	5466	5049	4766	4440	4183	3950													
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1384	1136	1187	965	987	796	851	636													
		Anteil in %	21,32	19,11	21,72	19,11	20,71	17,93	20,34	16,10													
	CI Anteil in %	[20,32; 22,31]	[18,11; 20,11]	[20,62; 22,81]	[18,03; 20,20]	[19,56; 21,86]	[16,80; 19,06]	[19,12; 21,56]	[14,95; 17,25]														
	untersuchte Patienten	Anzahl	5109	4809	4279	4084	3779	3644	3332	3314													
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	89,63	89,92	89,17	89,34	90,03	89,06	89,94	89,11													
		CI Mean	[88,23; 91,03]	[88,51; 91,33]	[87,89; 90,45]	[87,97; 90,70]	[88,54; 91,52]	[87,56; 90,55]	[88,24; 91,63]	[87,52; 90,71]													
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00												
		Fallbasis mittlere Differenz		4094	3685	3485	3256	3078	2856	2783													
		Mittlere Differenz zur ED		0,95	1,40	2,59	4,41	4,09	4,18	4,33													
		CI mittlere Differenz		[-0,23; 2,13]	[0,15; 2,65]	[1,18; 3,99]	[3,00; 5,82]	[2,55; 5,62]	[2,59; 5,76]	[2,73; 5,94]													
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5527	5299	4907	4513	4221	3942	3724														
	auswertbar	Anzahl	5467	5029	4601	4275	4010	3758	3587														
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1236	1102	935	999	730	808	590														
		Anteil in %	22,61	21,91	20,32	23,37	18,20	21,50	16,45														
	CI Anteil in %	[21,50; 23,72]	[20,77; 23,06]	[19,16; 21,48]	[22,10; 24,64]	[17,01; 19,40]	[20,19; 22,81]	[15,23; 17,66]															
	untersuchte Patienten	Anzahl	4231	3927	3666	3276	3280	2950	2997														
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	88,90	89,80	87,89	88,65	87,82	88,07	86,69														
		CI Mean	[87,30; 90,51]	[88,03; 89,57]	[86,31; 89,48]	[86,84; 90,46]	[86,04; 89,61]	[86,28; 89,85]	[85,00; 88,39]														
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	79,00	80,00	80,00														
		Fallbasis mittlere Differenz		3259	3095	2735	2736	2454	2477														
		Mittlere Differenz zur ED		0,76	0,46	1,87	1,64	1,89	1,32														
		CI mittlere Differenz		[-0,91; 2,43]	[-0,99; 1,92]	[0,11; 3,63]	[-0,03; 3,32]	[0,06; 3,71]	[-0,51; 3,15]														
Median mittlere Differenz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5982	5705	5205	4802	4483	4208																
	auswertbar	Anzahl	5941	5401	4912	4591	4297	4049																
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1319	1011	1145	875	911	685																
		Anteil in %	22,20	18,72	23,31	19,06	21,20	16,92																
		CI Anteil in %	[21,14; 23,26]	[17,68; 19,76]	[22,13; 24,49]	[17,92; 20,20]	[19,98; 22,42]	[15,76; 18,07]																
		untersuchte Patienten	Anzahl	4622	4390	3767	3716	3386	3364															
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	88,28	87,90	88,54	86,95	87,01	85,76																
		CI Mean	[86,77; 89,79]	[86,39; 89,40]	[86,69; 90,39]	[85,35; 88,54]	[85,31; 88,70]	[84,35; 87,18]																
		Median	80,00	80,00	79,00	79,00	79,00	79,00																
		Fallbasis mittlere Differenz		3631	3216	3060	2864	2764																
		Mittlere Differenz zur ED		-0,66	1,73	0,33	0,78	-0,28																
		CI mittlere Differenz		[-2,23; 0,91]	[-0,10; 3,57]	[-1,51; 2,17]	[-1,09; 2,66]	[-2,04; 1,48]																
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6630	6363	5859	5409	5055																	
	auswertbar	Anzahl	6552	6093	5525	5143	4832																	
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1433	1333	997	1217	787																	
		Anteil in %	21,87	21,88	18,05	23,66	16,29																	
		CI Anteil in %	[20,87; 22,87]	[20,84; 22,92]	[17,03; 19,06]	[22,50; 24,82]	[15,25; 17,33]																	
		untersuchte Patienten	Anzahl	5119	4760	4528	3926	4045																
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	85,83	86,49	85,88	87,08	87,14																	
		CI Mean	[84,52; 87,13]	[85,09; 87,89]	[84,44; 87,32]	[85,55; 88,62]	[85,63; 88,65]																	
		Median	78,00	79,00	78,00	80,00	79,00																	
		Fallbasis mittlere Differenz		3951	3785	3303	3346																	
		Mittlere Differenz zur ED		1,00	1,13	2,42	2,76																	
		CI mittlere Differenz		[-0,30; 2,30]	[-0,12; 2,37]	[0,91; 3,93]	[1,20; 4,31]																	
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00																	
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6682	6400	5912	5443																		
	auswertbar	Anzahl	6615	6114	5551	5202																		
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1497	1060	1174	973																		
		Anteil in %	22,63	17,34	21,15	18,70																		
		CI Anteil in %	[21,62; 23,64]	[16,39; 18,29]	[20,07; 22,22]	[17,64; 19,76]																		
		untersuchte Patienten	Anzahl	5118	5054	4377	4229																	
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	86,68	86,25	86,00	87,94																		
		CI Mean	[85,32; 88,04]	[84,88; 87,62]	[84,64; 87,36]	[86,23; 89,65]																		
		Median	79,00	78,00	79,00	80,00																		
		Fallbasis mittlere Differenz		4169	3696	3461																		
		Mittlere Differenz zur ED		0,26	0,76	2,69																		
		CI mittlere Differenz		[-0,93; 1,44]	[-0,50; 2,02]	[1,20; 4,19]																		
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00																		
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6352	6098	5609																			
	auswertbar	Anzahl	6295	5815	5280																			
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1322	1104	911																			
		Anteil in %	21,00	18,99	17,25																			
		CI Anteil in %	[19,99; 22,01]	[17,98; 19,99]	[16,23; 18,27]																			
		untersuchte Patienten	Anzahl	4973	4711	4369																		
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean	85,14	85,08	84,25																			
		CI Mean	[83,84; 86,44]	[83,87; 86,30]	[83,10; 85,39]																			
		Median	78,00	79,00	78,00																			
		Fallbasis mittlere Differenz		3931	3689																			
		Mittlere Differenz zur ED		0,44	0,86																			
		CI mittlere Differenz		[-0,88; 1,76]	[-0,39; 2,11]																			
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00																			

EZ	Patienten und ihre Serum-Kreatinin-Werte		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5365	5157																			
	auswertbar	Anzahl	5309	4913																			
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1022	804																			
		Anteil in %		19,25	16,36																		
		CI Anteil in %		[18,19; 20,31]	[15,33; 17,40]																		
		untersuchte Patienten	Anzahl	4287	4109																		
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean		85,93	85,72																		
		CI Mean		[84,51; 87,35]	[84,33; 87,10]																		
		Median		79,00	79,00																		
		Fallbasis mittlere Differenz			3486																		
		Mittlere Differenz zur ED			-0,49																		
		CI mittlere Differenz			[-1,54; 0,55]																		
Median mittlere Differenz				0,00																			
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5991																				
	auswertbar	Anzahl	5921																				
	nicht untersuchte Patienten	Anzahl	1122																				
		Anteil in %		18,95																			
		CI Anteil in %		[17,95; 19,95]																			
		untersuchte Patienten	Anzahl	4799																			
	Auswertungs- ergebnisse zum Serum-Kreatinin- Wert in µmol/l	Mean		84,30																			
		CI Mean		[83,09; 85,50]																			
		Median		77,00																			
		Fallbasis mittlere Differenz																					
		Mittlere Differenz zur ED																					
		CI mittlere Differenz																					
Median mittlere Differenz																							

3.3 Medikation

Neben Gewichtsreduktion, Ernährungsumstellung sowie ausreichender Bewegung - wodurch ein Teil der Patienten potenziell keine Arzneimitteltherapie mehr benötigt - besteht die Therapie des Diabetes mellitus in der Anwendung von den Blutzuckerspiegel senkenden Arzneimitteln. Bei insulinpflichtigen Diabetikern muss der Insulinmangel mit Hilfe von subkutan zu spritzendem Insulin (Human- oder Schweineinsulin) oder mit gegenüber dem menschlichen oder tierischen Hormon leicht verändertem Insulin (Insulinanaloga) ausgeglichen werden. Weiterhin gibt es Medikamente, die die Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse anregen (Sulfonylharnstoffe, Glinide), die Verteilung von Glukose im Organismus (Biguanide) beeinflussen, die Wirkung von Insulin verstärken (Glitazone) oder den Kohlenhydratabbau im Darmtrakt (Glucosidasehemmer) verzögern bzw. verhindern. Diese Medikamentengruppen können in Tablettenform eingenommen werden und werden allesamt als orale Antidiabetika (OAD) bezeichnet. Metformin (Biguanid) ist dabei das Mittel der ersten Wahl bei übergewichtigen Diabetikern, bei normalgewichtigen Diabetikern sind dies die Sulfonylharnstoffe (z.B. Glibenclamid). Diese beiden Präparategruppen sind in diesem Bericht als "vorrangig empfohlene " OAD ausgewiesen. Neben der Verwendung einzelner Arzneimittel aus diesen Medikamentengruppen (Monotherapie) ist auch eine Kombinationstherapie aus zwei „vorrangig empfohlenen" Präparaten oder die Kombination von „vorrangig empfohlenen“ mit Arzneimitteln aus „nachrangig empfohlenen" Gruppen (Glinide, Glitazone, Glucosidasehemmer) als Kombinationstherapie möglich. Bei einem Teil der Patienten ist auch eine Kombinationstherapie sowohl mit dem ebenfalls vorrangig empfohlenen Insulin als auch mit OAD indiziert.

In der Tabelle 3.3.1 ist die Entwicklung der **Medikation** der Patienten ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu zunächst unter „Patienten insgesamt“ die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird - z.T. differenziert nach dem BMI der Patienten - ausgewiesen, bei wie vielen Patienten welche Medikation erfolgte und welchem Anteil an den „auswertbaren“ Patienten dies entspricht. Die solchermaßen gebildeten Kategorien sind nicht erschöpfend.

Zu beachten ist dabei, dass es durch die 9. Risikostrukturausgleichs-Änderungsverordnung zu einer Änderung im Dokumentationsbogen kam. Anstelle der medikamentösen Therapie mit „Metformin“ (ab 2004-2) wurden bis 2004-1 „Biguanide" erhoben; in der Auswertung ist jedoch in beiden Fällen die Kategorie „Metformin" zu verwenden. Da aus der Gruppe der Biguanide seit langer Zeit nur noch Metformin angewandt wird, verursacht diese Umformulierung jedoch keine Änderungen bei den Häufigkeiten bzw. bei der Vollständigkeit der Erfassung.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts-halbjahr 18532 Patienten in das Programm eingeschrieben. Es konnten 18505 Patienten in die Auswertung einbezogen werden.

Bei ihnen erfolgte in 24,43 Prozent der Fälle keine Diabetes-spezifische Medikation. Im letzten Berichtshalbjahr erfolgte in 18,16 Prozent der Fälle keine diabetes-spezifische Medikation.

Tabelle 3.3.1 Patienten und ihre Medikation

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18532	16919	15229	13819	12524	11575	10657	9051	8357	7654	7302	6797	6413	6084	5724	5377	5082	4817	4564
	auswertbar	Anzahl	18505	13496	14223	13475	12170	11333	10194	8758	8110	7497	6961	6514	6222	5879	5533	5240	4971	4722	4450
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	4520	3695	3788	3201	2807	2587	2317	2063	1856	1692	1490	1429	1289	1184	1071	998	940	882	808
		Anteil in %	24,43	27,38	26,63	23,76	23,06	22,83	22,73	23,56	22,89	22,57	21,40	21,94	20,72	20,14	19,36	19,05	18,91	18,68	18,16
		CI Anteil in %	[23,81; 25,04]	[26,63; 28,13]	[25,91; 27,36]	[23,04; 24,47]	[22,32; 23,81]	[22,05; 23,60]	[21,92; 23,54]	[22,67; 24,44]	[21,97; 23,80]	[21,62; 23,52]	[20,44; 22,37]	[20,93; 22,94]	[19,71; 21,72]	[19,11; 21,16]	[18,32; 20,40]	[17,98; 20,11]	[17,82; 20,00]	[17,57; 19,79]	[17,02; 19,29]
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	3770	2686	2874	2976	2707	2499	2223	1845	1692	1538	1487	1470	1390	1346	1277	1195	1145	1086	1025
		Anteil in %	20,37	19,90	20,21	22,09	22,24	22,05	21,81	21,07	20,86	20,51	21,36	22,57	22,34	22,90	23,08	22,81	23,03	23,00	23,03
		CI Anteil in %	[19,79; 20,95]	[19,23; 20,58]	[19,55; 20,87]	[21,38; 22,79]	[21,50; 22,98]	[21,29; 22,81]	[21,01; 22,61]	[20,21; 21,92]	[19,98; 21,75]	[19,60; 21,43]	[20,40; 22,32]	[21,55; 23,58]	[21,31; 23,38]	[21,82; 23,97]	[21,97; 24,19]	[21,67; 23,94]	[21,86; 24,20]	[21,80; 24,20]	[21,80; 24,27]
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	737	516	507	476	399	372	308	271	229	196	178	203	199	173	154	150	141	124	122
		Anteil in %	3,98	3,82	3,56	3,53	3,28	3,28	3,02	3,09	2,82	2,61	2,56	3,12	3,20	2,94	2,78	2,86	2,84	2,63	2,74
		CI Anteil in %	[3,70; 4,26]	[3,50; 4,15]	[3,26; 3,87]	[3,22; 3,84]	[2,96; 3,59]	[2,95; 3,61]	[2,69; 3,35]	[2,73; 3,46]	[2,46; 3,18]	[2,25; 2,98]	[2,19; 2,93]	[2,69; 3,54]	[2,76; 3,64]	[2,51; 3,37]	[2,35; 3,22]	[2,41; 3,31]	[2,37; 3,30]	[2,17; 3,08]	[2,26; 3,22]
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	630	409	405	374	326	290	262	192	185	172	146	165	139	125	126	111	97	93	83
		Anteil in %	3,40	3,03	2,85	2,78	2,68	2,56	2,57	2,19	2,28	2,29	2,10	2,53	2,23	2,13	2,28	2,12	1,95	1,97	1,87
		CI Anteil in %	[3,14; 3,67]	[2,74; 3,32]	[2,57; 3,12]	[2,50; 3,05]	[2,39; 2,97]	[2,27; 2,85]	[2,26; 2,88]	[1,89; 2,50]	[1,96; 2,61]	[1,96; 2,63]	[1,76; 2,43]	[2,15; 2,91]	[1,87; 2,60]	[1,76; 2,50]	[1,88; 2,67]	[1,73; 2,51]	[1,57; 2,34]	[1,57; 2,37]	[1,47; 2,26]
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	633	476	484	516	469	448	397	348	319	296	286	288	287	268	244	245	243	229	220
		Anteil in %	3,42	3,53	3,40	3,83	3,85	3,95	3,89	3,97	3,93	3,95	4,11	4,42	4,61	4,56	4,41	4,68	4,89	4,85	4,94
		CI Anteil in %	[3,16; 3,68]	[3,22; 3,84]	[3,10; 3,70]	[3,51; 4,15]	[3,51; 4,20]	[3,59; 4,31]	[3,52; 4,27]	[3,56; 4,38]	[3,51; 4,36]	[3,51; 4,39]	[3,64; 4,57]	[3,92; 4,92]	[4,09; 5,13]	[4,03; 5,09]	[3,87; 4,95]	[4,10; 5,25]	[4,29; 5,49]	[4,24; 5,46]	[4,31; 5,58]
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1086	778	812	790	747	700	612	511	482	457	414	430	394	394	376	352	334	320	288
		Anteil in %	5,87	5,76	5,71	5,86	6,14	6,18	6,00	5,83	5,94	6,10	5,95	6,60	6,33	6,70	6,80	6,72	6,72	6,78	6,47
		CI Anteil in %	[5,53; 6,21]	[5,37; 6,16]	[5,33; 6,09]	[5,47; 6,26]	[5,71; 6,56]	[5,73; 6,62]	[5,54; 6,46]	[5,34; 6,33]	[5,43; 6,46]	[5,55; 6,64]	[5,39; 6,50]	[6,00; 7,20]	[5,73; 6,94]	[6,06; 7,34]	[6,13; 7,46]	[6,04; 7,40]	[6,02; 7,41]	[6,06; 7,49]	[5,75; 7,19]
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Metformin)	Anzahl	723	453	518	560	505	485	440	353	346	310	291	334	314	288	264	252	219	201	182	
	Anteil in %	3,91	3,36	3,64	4,16	4,15	4,28	4,32	4,03	4,27	4,13	4,18	5,13	5,05	4,90	4,77	4,81	4,41	4,26	4,09	
	CI Anteil in %	[3,63; 4,19]	[3,05; 3,66]	[3,33; 3,95]	[3,82; 4,49]	[3,80; 4,50]	[3,91; 4,65]	[3,92; 4,71]	[3,62; 4,44]	[3,83; 4,71]	[3,68; 4,59]	[3,71; 4,65]	[4,59; 5,66]	[4,50; 5,59]	[4,35; 5,45]	[4,21; 5,33]	[4,23; 5,39]	[3,84; 4,98]	[3,68; 4,83]	[3,51; 4,67]	
Kombination aus einem „vorrangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	1282	932	1065	971	893	842	773	685	667	637	585	483	492	463	427	412	390	395	365	
	Anteil in %	6,93	6,91	7,49	7,21	7,34	7,43	7,58	7,82	8,22	8,50	8,40	7,41	7,91	7,88	7,72	7,86	7,85	8,37	8,20	
	CI Anteil in %	[6,56; 7,29]	[6,48; 7,33]	[7,06; 7,92]	[6,77; 7,64]	[6,87; 7,80]	[6,95; 7,91]	[7,07; 8,10]	[7,26; 8,38]	[7,63; 8,82]	[7,87; 9,13]	[7,75; 9,06]	[6,78; 8,05]	[7,24; 8,58]	[7,19; 8,56]	[7,01; 8,42]	[7,13; 8,59]	[7,10; 8,59]	[7,58; 9,15]	[7,40; 9,01]	
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	2823	2045	2228	2153	2071	1959	1805	1543	1483	1410	1367	1208	1232	1194	1169	1152	1138	1101	1077	
	Anteil in %	15,26	15,15	15,66	15,98	17,02	17,29	17,71	17,62	18,29	18,81	19,64	18,54	19,80	20,31	21,13	21,98	22,89	23,32	24,20	
	CI Anteil in %	[14,74; 15,77]	[14,55; 15,76]	[15,07; 16,26]	[15,36; 16,60]	[16,35; 17,68]	[16,59; 17,98]	[16,97; 18,45]	[16,82; 18,42]	[17,44; 19,13]	[17,92; 19,69]	[18,70; 20,57]	[17,60; 19,49]	[18,81; 20,79]	[19,28; 21,34]	[20,05; 22,20]	[20,86; 23,11]	[21,72; 24,06]	[22,11; 24,52]	[22,94; 25,46]	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	15338	13264	11995	10737	9767	8914	8042	7361	6677	6381	5997	5700	5383	5096	4829	4575	4304	4094
	auswertbar	Anzahl	15312	11887	11605	10448	9523	8573	7770	7011	6515	6085	5721	5435	5212	4932	4702	4434	4191	3970
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	3398	2810	2404	2161	1940	1712	1562	1362	1245	1130	1069	983	911	820	785	727	705	645
		Anteil in %	22,19	23,64	20,72	20,68	20,37	19,97	20,10	19,43	19,11	18,57	18,69	18,09	17,48	16,63	16,70	16,40	16,82	16,25
		CI Anteil in %	[21,53; 22,85]	[22,88; 24,40]	[19,98; 21,45]	[19,91; 21,46]	[19,56; 21,18]	[19,12; 20,82]	[19,21; 20,99]	[18,50; 20,35]	[18,15; 20,06]	[17,59; 19,55]	[17,68; 19,70]	[17,06; 19,11]	[16,45; 18,51]	[15,59; 17,67]	[15,63; 17,76]	[15,31; 17,49]	[15,69; 17,95]	[15,10; 17,39]
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	2885	2224	2358	2137	1956	1774	1601	1444	1358	1279	1281	1210	1148	1098	1035	986	938	878
		Anteil in %	18,84	18,71	20,32	20,45	20,54	20,69	20,60	20,60	20,84	21,02	22,39	22,26	22,03	22,26	22,01	22,24	22,38	22,12
		CI Anteil in %	[18,22; 19,46]	[18,01; 19,41]	[19,59; 21,05]	[19,68; 21,23]	[19,73; 21,35]	[19,84; 21,55]	[19,71; 21,50]	[19,65; 21,54]	[19,86; 21,83]	[20,00; 22,04]	[21,31; 23,47]	[21,16; 23,37]	[20,90; 23,15]	[21,10; 23,42]	[20,83; 23,20]	[21,01; 23,46]	[21,12; 23,64]	[20,82; 23,41]
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	662	467	453	406	354	293	262	242	222	209	220	198	180	164	145	118	108	101
		Anteil in %	4,32	3,93	3,90	3,89	3,72	3,42	3,37	3,45	3,41	3,43	3,85	3,64	3,45	3,33	3,08	2,66	2,58	2,54
		CI Anteil in %	[4,00; 4,65]	[3,58; 4,28]	[3,55; 4,26]	[3,52; 4,26]	[3,34; 4,10]	[3,03; 3,80]	[2,97; 3,77]	[3,02; 3,88]	[2,97; 3,85]	[2,98; 3,89]	[3,35; 4,34]	[3,14; 4,14]	[2,96; 3,95]	[2,82; 3,83]	[2,59; 3,58]	[2,19; 3,14]	[2,10; 3,06]	[2,05; 3,03]
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	602	443	449	366	309	258	214	179	158	143	159	156	145	139	124	114	100	91
		Anteil in %	3,93	3,73	3,87	3,50	3,24	3,01	2,75	2,55	2,43	2,35	2,78	2,87	2,78	2,82	2,64	2,57	2,39	2,29
		CI Anteil in %	[3,62; 4,24]	[3,39; 4,07]	[3,52; 4,22]	[3,15; 3,86]	[2,89; 3,60]	[2,65; 3,37]	[2,39; 3,12]	[2,18; 2,92]	[2,05; 2,80]	[1,97; 2,73]	[2,35; 3,21]	[2,43; 3,31]	[2,34; 3,23]	[2,36; 3,28]	[2,18; 3,10]	[2,11; 3,04]	[1,92; 2,85]	[1,83; 2,76]
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	566	429	451	415	389	348	323	284	268	238	267	258	245	236	229	222	206	198
		Anteil in %	3,70	3,61	3,89	3,97	4,08	4,06	4,16	4,05	4,11	3,91	4,67	4,75	4,70	4,79	4,87	5,01	4,92	4,99
		CI Anteil in %	[3,40; 4,00]	[3,27; 3,94]	[3,53; 4,24]	[3,60; 4,35]	[3,69; 4,48]	[3,64; 4,48]	[3,71; 4,60]	[3,59; 4,51]	[3,63; 4,60]	[3,42; 4,40]	[4,12; 5,21]	[4,18; 5,31]	[4,13; 5,28]	[4,19; 5,38]	[4,25; 5,49]	[4,36; 5,65]	[4,26; 5,57]	[4,31; 5,66]
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1076	833	847	782	685	642	551	519	468	455	444	396	376	365	332	313	292	273
		Anteil in %	7,03	7,01	7,30	7,48	7,19	7,49	7,09	7,40	7,18	7,48	7,76	7,29	7,21	7,40	7,06	7,06	6,97	6,88
		CI Anteil in %	[6,62; 7,43]	[6,55; 7,47]	[6,83; 7,77]	[6,98; 7,99]	[6,67; 7,71]	[6,93; 8,05]	[6,52; 7,66]	[6,79; 8,02]	[6,56; 7,81]	[6,82; 8,14]	[7,07; 8,45]	[6,60; 7,98]	[6,51; 7,92]	[6,67; 8,13]	[6,33; 7,79]	[6,31; 7,81]	[6,20; 7,74]	[6,09; 7,66]
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	721	532	552	508	487	436	388	364	339	316	345	317	301	273	256	229	205	186
		Anteil in %	4,71	4,48	4,76	4,86	5,11	5,09	4,99	5,19	5,20	5,19	6,03	5,83	5,78	5,54	5,44	5,16	4,89	4,69
		CI Anteil in %	[4,37; 5,04]	[4,10; 4,85]	[4,37; 5,14]	[4,45; 5,27]	[4,67; 5,56]	[4,62; 5,55]	[4,51; 5,48]	[4,67; 5,71]	[4,66; 5,74]	[4,64; 5,75]	[5,41; 6,65]	[5,21; 6,46]	[5,14; 6,41]	[4,90; 6,17]	[4,80; 6,09]	[4,51; 5,82]	[4,24; 5,54]	[4,03; 5,34]
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	1254	993	982	918	818	750	726	655	617	585	459	473	471	448	443	436	398	388
		Anteil in %	8,19	8,35	8,46	8,79	8,59	8,75	9,34	9,34	9,47	9,61	8,02	8,70	9,04	9,08	9,42	9,83	9,50	9,77
		CI Anteil in %	[7,76; 8,62]	[7,86; 8,85]	[7,96; 8,97]	[8,24; 9,33]	[8,03; 9,15]	[8,15; 9,35]	[8,70; 9,99]	[8,66; 10,02]	[8,76; 10,18]	[8,87; 10,35]	[7,32; 8,73]	[7,95; 9,45]	[8,26; 9,82]	[8,28; 9,89]	[8,59; 10,26]	[8,96; 10,71]	[8,61; 10,38]	[8,85; 10,70]
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	2124	1731	1760	1607	1496	1396	1288	1207	1154	1125	1029	1028	1040	1008	990	959	936	929
		Anteil in %	13,87	14,56	15,17	15,38	15,71	16,28	16,58	17,22	17,71	18,49	17,99	18,91	19,95	20,44	21,05	21,63	22,33	23,40
	CI Anteil in %	[13,32; 14,42]	[13,93; 15,20]	[14,51; 15,82]	[14,69; 16,07]	[14,98; 16,44]	[15,50; 17,07]	[15,75; 17,40]	[16,33; 18,10]	[16,79; 18,64]	[17,51; 19,46]	[16,99; 18,98]	[17,87; 19,96]	[18,87; 21,04]	[19,31; 21,56]	[19,89; 22,22]	[20,42; 22,84]	[21,07; 23,59]	[22,08; 24,72]	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6722	5979	5294	4783	4296	3854	3572	3250	3080	2873	2690	2532	2401	2263	2147	2032	1951	
	auswertbar	Anzahl	6711	5648	5062	4618	4141	3731	3404	3134	2866	2703	2547	2408	2281	2172	2052	1962	1870	
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	1535	1189	1058	933	822	732	650	603	541	502	468	426	403	384	340	321	294	
		Anteil in %	22,87	21,05	20,90	20,20	19,85	19,62	19,10	19,24	18,88	18,57	18,37	17,69	17,67	17,68	16,57	16,36	15,72	
		CI Anteil in %	[21,87; 23,88]	[19,99; 22,12]	[19,78; 22,02]	[19,05; 21,36]	[18,64; 21,07]	[18,34; 20,89]	[17,77; 20,42]	[17,86; 20,62]	[17,44; 20,31]	[17,11; 20,04]	[16,87; 19,88]	[16,17; 19,22]	[16,10; 19,23]	[16,07; 19,28]	[14,96; 18,18]	[14,72; 18,00]	[14,07; 17,37]	
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	1169	1116	997	909	796	721	643	594	553	567	527	475	443	420	392	370	336	
		Anteil in %	17,42	19,76	19,70	19,68	19,22	19,32	18,89	18,95	19,30	20,98	20,69	19,73	19,42	19,34	19,10	18,86	17,97	
		CI Anteil in %	[16,51; 18,33]	[18,72; 20,80]	[18,60; 20,79]	[18,54; 20,83]	[18,02; 20,42]	[18,06; 20,59]	[17,57; 20,20]	[17,58; 20,33]	[17,85; 20,74]	[19,44; 22,51]	[19,12; 22,26]	[18,14; 21,32]	[17,80; 21,05]	[17,68; 21,00]	[17,40; 20,80]	[17,13; 20,59]	[16,23; 19,71]	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	285	234	184	173	156	130	109	102	89	78	76	71	68	60	46	40	39	
		Anteil in %	4,25	4,14	3,63	3,75	3,77	3,48	3,20	3,25	3,11	2,89	2,98	2,95	2,98	2,76	2,24	2,04	2,09	
		CI Anteil in %	[3,76; 4,73]	[3,62; 4,66]	[3,12; 4,15]	[3,20; 4,29]	[3,19; 4,35]	[2,90; 4,07]	[2,61; 3,79]	[2,63; 3,88]	[2,47; 3,74]	[2,25; 3,52]	[2,32; 3,64]	[2,27; 3,62]	[2,28; 3,68]	[2,07; 3,45]	[1,60; 2,88]	[1,41; 2,66]	[1,44; 2,73]	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	292	236	205	177	153	135	123	115	102	85	70	63	61	49	46	51	43	
		Anteil in %	4,35	4,18	4,05	3,83	3,69	3,62	3,61	3,67	3,56	3,14	2,75	2,62	2,67	2,26	2,24	2,60	2,30	
		CI Anteil in %	[3,86; 4,84]	[3,66; 4,70]	[3,51; 4,59]	[3,28; 4,39]	[3,12; 4,27]	[3,02; 4,22]	[2,99; 4,24]	[3,01; 4,33]	[2,88; 4,24]	[2,49; 3,80]	[2,11; 3,38]	[1,98; 3,25]	[2,01; 3,34]	[1,63; 2,88]	[1,60; 2,88]	[1,90; 3,30]	[1,62; 2,98]	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	269	242	225	204	185	171	161	152	141	139	138	140	132	124	133	123	115	
		Anteil in %	4,01	4,28	4,44	4,42	4,47	4,58	4,73	4,85	4,92	5,14	5,42	5,81	5,79	5,71	6,48	6,27	6,15	
		CI Anteil in %	[3,54; 4,48]	[3,76; 4,81]	[3,88; 5,01]	[3,82; 5,01]	[3,84; 5,10]	[3,91; 5,25]	[4,02; 5,44]	[4,10; 5,60]	[4,13; 5,71]	[4,31; 5,98]	[4,54; 6,30]	[4,88; 6,75]	[4,83; 6,75]	[4,73; 6,69]	[5,42; 7,55]	[5,20; 7,34]	[5,06; 7,24]	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	508	438	411	386	350	300	271	250	221	226	191	175	163	147	155	156	148	
		Anteil in %	7,57	7,75	8,12	8,36	8,45	8,04	7,96	7,98	7,71	8,36	7,50	7,27	7,15	6,77	7,55	7,95	7,91	
		CI Anteil in %	[6,94; 8,20]	[7,06; 8,45]	[7,37; 8,87]	[7,56; 9,16]	[7,60; 9,30]	[7,17; 8,91]	[7,05; 8,87]	[7,03; 8,93]	[6,73; 8,69]	[7,32; 9,40]	[6,48; 8,52]	[6,23; 8,30]	[6,09; 8,20]	[5,71; 7,82]	[6,41; 8,70]	[6,75; 9,15]	[6,69; 9,14]	
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	281	255	225	202	178	169	155	128	115	159	149	132	118	113	111	98	95	
		Anteil in %	4,19	4,51	4,44	4,37	4,30	4,53	4,55	4,08	4,01	5,88	5,85	5,48	5,17	5,20	5,41	4,99	5,08	
		CI Anteil in %	[3,71; 4,67]	[3,97; 5,06]	[3,88; 5,01]	[3,78; 4,96]	[3,68; 4,92]	[3,86; 5,20]	[3,85; 5,25]	[3,39; 4,78]	[3,29; 4,73]	[5,00; 6,77]	[4,94; 6,76]	[4,57; 6,39]	[4,26; 6,08]	[4,27; 6,14]	[4,43; 6,39]	[4,03; 5,96]	[4,08; 6,08]	
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	544	451	425	400	363	346	326	301	283	224	227	221	213	222	217	200	194	
		Anteil in %	8,11	7,99	8,40	8,66	8,77	9,27	9,58	9,60	9,87	8,29	8,91	9,18	9,34	10,22	10,58	10,19	10,37	
		CI Anteil in %	[7,45; 8,76]	[7,28; 8,69]	[7,63; 9,16]	[7,85; 9,47]	[7,90; 9,63]	[8,34; 10,20]	[8,59; 10,57]	[8,57; 10,64]	[8,78; 10,97]	[7,25; 9,33]	[7,81; 10,02]	[8,02; 10,33]	[8,14; 10,53]	[8,95; 11,50]	[9,24; 11,91]	[8,85; 11,53]	[8,99; 11,76]	
	Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	916	859	798	757	707	637	630	606	564	527	518	526	507	500	473	469	481	
Anteil in %		13,65	15,21	15,76	16,39	17,07	17,07	18,51	19,34	19,68	19,50	20,34	21,84	22,23	23,02	23,05	23,90	25,72		
	CI Anteil in %	[12,83; 14,47]	[14,27; 16,15]	[14,76; 16,77]	[15,32; 17,46]	[15,93; 18,22]	[15,87; 18,28]	[17,20; 19,81]	[17,95; 20,72]	[18,22; 21,13]	[18,00; 20,99]	[18,77; 21,90]	[20,19; 23,49]	[20,52; 23,93]	[21,25; 24,79]	[21,23; 24,87]	[22,02; 25,79]	[23,74; 27,70]		

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5209	4715	4298	3897	3506	3261	3038	2910	2710	2571	2446	2321	2204	2102	2005	1906		
	auswertbar	Anzahl	5209	4455	4121	3748	3267	3020	2799	2588	2441	2312	2214	2077	1986	1879	1796	1698		
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	1291	1032	951	846	766	674	609	542	486	447	411	374	346	323	301	278		
		Anteil in %	24,78	23,16	23,08	22,57	23,45	22,32	21,76	20,94	19,91	19,33	18,56	18,01	17,42	17,19	16,76	16,37		
		CI Anteil in %	[23,61; 25,96]	[21,93; 24,40]	[21,79; 24,36]	[21,23; 23,91]	[21,99; 24,90]	[20,83; 23,80]	[20,23; 23,29]	[19,37; 22,51]	[18,33; 21,49]	[17,72; 20,94]	[16,94; 20,18]	[16,35; 19,66]	[15,75; 19,09]	[15,48; 18,90]	[15,03; 18,49]	[14,61; 18,13]		
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	955	819	747	687	583	550	495	458	485	456	427	392	358	355	335	322		
		Anteil in %	18,33	18,38	18,13	18,33	17,85	18,21	17,68	17,70	19,87	19,72	19,29	18,87	18,03	18,89	18,65	18,96		
		CI Anteil in %	[17,28; 19,38]	[17,25; 19,52]	[16,95; 19,30]	[17,09; 19,57]	[16,53; 19,16]	[16,84; 19,59]	[16,27; 19,10]	[16,23; 19,17]	[18,29; 21,45]	[18,10; 21,35]	[17,64; 20,93]	[17,19; 20,56]	[16,34; 19,72]	[17,12; 20,66]	[16,85; 20,45]	[17,10; 20,83]		
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	189	172	163	140	117	103	88	79	86	76	66	63	54	52	47	39		
		Anteil in %	3,63	3,86	3,96	3,74	3,58	3,41	3,14	3,05	3,52	3,29	2,98	3,03	2,72	2,77	2,62	2,30		
		CI Anteil in %	[3,12; 4,14]	[3,30; 4,43]	[3,36; 4,55]	[3,13; 4,34]	[2,94; 4,22]	[2,76; 4,06]	[2,50; 3,79]	[2,39; 3,72]	[2,79; 4,25]	[2,56; 4,01]	[2,27; 3,69]	[2,30; 3,77]	[2,00; 3,43]	[2,03; 3,51]	[1,88; 3,36]	[1,58; 3,01]		
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	165	156	134	123	106	103	79	73	67	67	62	53	51	38	39	39		
		Anteil in %	3,17	3,50	3,25	3,28	3,24	3,41	2,82	2,82	2,74	2,90	2,80	2,55	2,57	2,02	2,17	2,30		
		CI Anteil in %	[2,69; 3,64]	[2,96; 4,04]	[2,71; 3,79]	[2,71; 3,85]	[2,64; 3,85]	[2,76; 4,06]	[2,21; 3,44]	[2,18; 3,46]	[2,10; 3,39]	[2,21; 3,58]	[2,11; 3,49]	[1,87; 3,23]	[1,87; 3,26]	[1,39; 2,66]	[1,50; 2,85]	[1,58; 3,01]		
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	226	191	179	158	139	139	135	125	127	121	123	121	123	117	113	104		
		Anteil in %	4,34	4,29	4,34	4,22	4,25	4,60	4,82	4,83	5,20	5,23	5,56	5,83	6,19	6,23	6,29	6,12		
		CI Anteil in %	[3,79; 4,89]	[3,69; 4,88]	[3,72; 4,97]	[3,57; 4,86]	[3,56; 4,95]	[3,86; 5,35]	[4,03; 5,62]	[4,00; 5,66]	[4,32; 6,08]	[4,33; 6,14]	[4,60; 6,51]	[4,82; 6,83]	[5,13; 7,25]	[5,13; 7,32]	[5,17; 7,42]	[4,98; 7,27]		
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	460	416	380	355	290	274	246	218	228	211	210	200	189	177	166	158		
		Anteil in %	8,83	9,34	9,22	9,47	8,88	9,07	8,79	8,42	9,34	9,13	9,49	9,63	9,52	9,42	9,24	9,31		
		CI Anteil in %	[8,06; 9,60]	[8,48; 10,19]	[8,34; 10,10]	[8,53; 10,41]	[7,90; 9,85]	[8,05; 10,10]	[7,74; 9,84]	[7,35; 9,49]	[8,19; 10,50]	[7,95; 10,30]	[8,26; 10,71]	[8,36; 10,90]	[8,23; 10,81]	[8,10; 10,74]	[7,90; 10,58]	[7,92; 10,69]		
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	229	196	181	169	156	141	128	117	136	128	119	108	111	106	92	87			
	Anteil in %	4,40	4,40	4,39	4,51	4,78	4,67	4,57	4,52	5,57	5,54	5,37	5,20	5,59	5,64	5,12	5,12			
	CI Anteil in %	[3,84; 4,95]	[3,80; 5,00]	[3,77; 5,02]	[3,84; 5,17]	[4,04; 5,51]	[3,92; 5,42]	[3,80; 5,35]	[3,72; 5,32]	[4,66; 6,48]	[4,60; 6,47]	[4,44; 6,31]	[4,24; 6,15]	[4,58; 6,60]	[4,60; 6,68]	[4,10; 6,14]	[4,07; 6,17]			
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	409	339	316	274	251	228	240	234	210	208	208	196	194	188	186	185			
	Anteil in %	7,85	7,61	7,67	7,31	7,68	7,55	8,57	9,04	8,60	9,00	9,39	9,44	9,77	10,01	10,36	10,90			
	CI Anteil in %	[7,12; 8,58]	[6,83; 8,39]	[6,86; 8,48]	[6,48; 8,14]	[6,77; 8,60]	[6,61; 8,49]	[7,54; 9,61]	[7,94; 10,15]	[7,49; 9,72]	[7,83; 10,16]	[8,18; 10,61]	[8,18; 10,69]	[8,46; 11,07]	[8,65; 11,36]	[8,95; 11,77]	[9,41; 12,38]			
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	659	654	624	579	489	464	464	468	418	424	429	408	413	394	394	363			
	Anteil in %	12,65	14,68	15,14	15,45	14,97	15,36	16,58	18,08	17,12	18,34	19,38	19,64	20,80	20,97	21,94	21,38			
	CI Anteil in %	[11,75; 13,55]	[13,64; 15,72]	[14,05; 16,24]	[14,29; 16,61]	[13,74; 16,19]	[14,08; 16,65]	[15,20; 17,96]	[16,60; 19,57]	[15,63; 18,62]	[16,76; 19,92]	[17,73; 21,02]	[17,93; 21,35]	[19,01; 22,58]	[19,13; 22,81]	[20,02; 23,85]	[19,43; 23,33]			

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7326	6819	6209	5519	4992	4584	4340	4066	3849	3623	3415	3216	3064	2915	2769			
	auswertbar	Anzahl	7326	6492	5862	5292	4767	4412	4097	3873	3663	3501	3295	3125	2954	2814	2687			
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	1746	1485	1307	1212	1065	943	842	788	756	699	623	579	548	521	475			
		Anteil in %	23,83	22,87	22,30	22,90	22,34	21,37	20,55	20,35	20,64	19,97	18,91	18,53	18,55	18,51	17,68			
		CI Anteil in %	[22,86; 24,81]	[21,85; 23,90]	[21,23; 23,36]	[21,77; 24,03]	[21,16; 23,52]	[20,16; 22,58]	[19,31; 21,79]	[19,08; 21,61]	[19,33; 21,95]	[18,64; 21,29]	[17,57; 20,24]	[17,17; 19,89]	[17,15; 19,95]	[17,08; 19,95]	[16,24; 19,12]			
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	1352	1180	1064	963	853	792	744	792	741	713	658	619	590	553	520			
		Anteil in %	18,45	18,18	18,15	18,20	17,89	17,95	18,16	20,45	20,23	20,37	19,97	19,81	19,97	19,65	19,35			
		CI Anteil in %	[17,57; 19,34]	[17,24; 19,11]	[17,16; 19,14]	[17,16; 19,24]	[16,81; 18,98]	[16,82; 19,08]	[16,98; 19,34]	[19,18; 21,72]	[18,93; 21,53]	[19,03; 21,70]	[18,60; 21,33]	[18,41; 21,21]	[18,53; 21,41]	[18,18; 21,12]	[17,86; 20,85]			
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	219	190	161	146	127	114	98	101	84	75	75	63	53	50	45			
		Anteil in %	2,99	2,93	2,75	2,76	2,66	2,58	2,39	2,61	2,29	2,14	2,28	2,02	1,79	1,78	1,67			
		CI Anteil in %	[2,60; 3,38]	[2,52; 3,34]	[2,33; 3,16]	[2,32; 3,20]	[2,21; 3,12]	[2,12; 3,05]	[1,92; 2,86]	[2,11; 3,11]	[1,81; 2,78]	[1,66; 2,62]	[1,77; 2,79]	[1,52; 2,51]	[1,32; 2,27]	[1,29; 2,27]	[1,19; 2,16]			
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	243	216	188	152	127	118	104	103	94	82	69	62	62	56	49			
		Anteil in %	3,32	3,33	3,21	2,87	2,66	2,67	2,54	2,66	2,57	2,34	2,09	1,98	2,10	1,99	1,82			
		CI Anteil in %	[2,91; 3,73]	[2,89; 3,76]	[2,76; 3,66]	[2,42; 3,32]	[2,21; 3,12]	[2,20; 3,15]	[2,06; 3,02]	[2,15; 3,17]	[2,05; 3,08]	[1,84; 2,84]	[1,61; 2,58]	[1,49; 2,47]	[1,58; 2,62]	[1,47; 2,51]	[1,32; 2,33]			
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	330	300	275	266	241	235	235	229	212	207	200	203	204	201	185			
		Anteil in %	4,50	4,62	4,69	5,03	5,06	5,33	5,74	5,91	5,79	5,91	6,07	6,50	6,91	7,14	6,89			
		CI Anteil in %	[4,03; 4,98]	[4,11; 5,13]	[4,15; 5,23]	[4,44; 5,62]	[4,43; 5,68]	[4,66; 5,99]	[5,02; 6,45]	[5,17; 6,66]	[5,03; 6,54]	[5,13; 6,69]	[5,25; 6,89]	[5,63; 7,36]	[5,99; 7,82]	[6,19; 8,09]	[5,93; 7,84]			
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	703	628	555	506	446	423	385	376	347	340	334	315	299	275	272			
		Anteil in %	9,60	9,67	9,47	9,56	9,36	9,59	9,40	9,71	9,47	9,71	10,14	10,08	10,12	9,77	10,12			
		CI Anteil in %	[8,92; 10,27]	[8,95; 10,39]	[8,72; 10,22]	[8,77; 10,35]	[8,53; 10,18]	[8,72; 10,46]	[8,50; 10,29]	[8,78; 10,64]	[8,52; 10,42]	[8,73; 10,69]	[9,11; 11,17]	[9,02; 11,14]	[9,03; 11,21]	[8,68; 10,87]	[8,98; 11,26]			
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	329	292	272	236	232	212	183	201	192	176	150	132	122	117	106				
	Anteil in %	4,49	4,50	4,64	4,46	4,87	4,81	4,47	5,19	5,24	5,03	4,55	4,22	4,13	4,16	3,94				
	CI Anteil in %	[4,02; 4,97]	[3,99; 5,00]	[4,10; 5,18]	[3,90; 5,02]	[4,26; 5,48]	[4,17; 5,44]	[3,83; 5,10]	[4,49; 5,89]	[4,52; 5,96]	[4,30; 5,75]	[3,84; 5,26]	[3,52; 4,93]	[3,41; 4,85]	[3,42; 4,90]	[3,21; 4,68]				
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	586	506	460	426	410	398	381	337	339	334	331	327	294	290	281				
	Anteil in %	8,00	7,79	7,85	8,05	8,60	9,02	9,30	8,70	9,25	9,54	10,05	10,46	9,95	10,31	10,46				
	CI Anteil in %	[7,38; 8,62]	[7,14; 8,45]	[7,16; 8,54]	[7,32; 8,78]	[7,80; 9,40]	[8,18; 9,87]	[8,41; 10,19]	[7,81; 9,59]	[8,32; 10,19]	[8,57; 10,51]	[9,02; 11,07]	[9,39; 11,54]	[8,87; 11,03]	[9,18; 11,43]	[9,30; 11,62]				
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	951	960	936	830	775	741	719	622	614	590	590	581	571	559	551				
	Anteil in %	12,98	14,79	15,97	15,68	16,26	16,80	17,55	16,06	16,76	16,85	17,91	18,59	19,33	19,86	20,51				
	CI Anteil in %	[12,21; 13,75]	[13,92; 15,65]	[15,03; 16,91]	[14,70; 16,66]	[15,21; 17,31]	[15,69; 17,90]	[16,38; 18,71]	[14,90; 17,22]	[15,55; 17,97]	[15,61; 18,09]	[16,60; 19,22]	[17,23; 19,96]	[17,91; 20,75]	[18,39; 21,34]	[18,98; 22,03]				

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	9778	8989	8164	7426	6790	6402	5933	5585	5240	4913	4579	4321	4101	3871				
	auswertbar	Anzahl	9778	8556	7806	7103	6508	6021	5587	5296	5015	4680	4419	4173	3956	3736				
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	1868	1568	1449	1276	1139	1008	909	838	793	705	660	612	562	538				
		Anteil in %	19,10	18,33	18,56	17,96	17,50	16,74	16,27	15,82	15,81	15,06	14,94	14,67	14,21	14,40				
	CI Anteil in %	[18,32; 19,88]	[17,51; 19,15]	[17,70; 19,43]	[17,07; 18,86]	[16,58; 18,42]	[15,80; 17,68]	[15,30; 17,24]	[14,84; 16,81]	[14,80; 16,82]	[14,04; 16,09]	[13,88; 15,99]	[13,59; 15,74]	[13,12; 15,29]	[13,27; 15,53]					
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	2024	1819	1588	1406	1328	1213	1220	1140	1038	977	906	878	831	761				
		Anteil in %	20,70	21,26	20,34	19,79	20,41	20,15	21,84	21,53	20,70	20,88	20,50	21,04	21,01	20,37				
	CI Anteil in %	[19,90; 21,50]	[20,39; 22,13]	[19,45; 21,24]	[18,87; 20,72]	[19,43; 21,38]	[19,13; 21,16]	[20,75; 22,92]	[20,42; 22,63]	[19,58; 21,82]	[19,71; 22,04]	[19,31; 21,69]	[19,80; 22,28]	[19,74; 22,28]	[19,08; 21,66]					
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	360	309	278	244	220	191	206	191	174	151	144	118	111	97				
		Anteil in %	3,68	3,61	3,56	3,44	3,38	3,17	3,69	3,61	3,47	3,23	3,26	2,83	2,81	2,60				
	CI Anteil in %	[3,31; 4,06]	[3,22; 4,01]	[3,15; 3,97]	[3,01; 3,86]	[2,94; 3,82]	[2,73; 3,61]	[3,19; 4,18]	[3,10; 4,11]	[2,96; 3,98]	[2,72; 3,73]	[2,74; 3,78]	[2,32; 3,33]	[2,29; 3,32]	[2,09; 3,11]					
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	346	295	259	227	201	179	159	137	125	114	110	90	76	80				
		Anteil in %	3,54	3,45	3,32	3,20	3,09	2,97	2,85	2,59	2,49	2,44	2,49	2,16	1,92	2,14				
	CI Anteil in %	[3,17; 3,90]	[3,06; 3,83]	[2,92; 3,72]	[2,79; 3,60]	[2,67; 3,51]	[2,54; 3,40]	[2,41; 3,28]	[2,16; 3,01]	[2,06; 2,92]	[1,99; 2,88]	[2,03; 2,95]	[1,72; 2,60]	[1,49; 2,35]	[1,68; 2,61]					
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	424	350	340	317	281	272	267	259	252	244	240	234	227	213				
		Anteil in %	4,34	4,09	4,36	4,46	4,32	4,52	4,78	4,89	5,02	5,21	5,43	5,61	5,74	5,70				
CI Anteil in %	[3,93; 4,74]	[3,67; 4,51]	[3,90; 4,81]	[3,98; 4,94]	[3,82; 4,81]	[3,99; 5,04]	[4,22; 5,34]	[4,31; 5,47]	[4,42; 5,63]	[4,58; 5,85]	[4,76; 6,10]	[4,91; 6,31]	[5,01; 6,46]	[4,96; 6,44]						
Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	882	754	684	638	571	535	507	491	448	427	394	384	354	325					
	Anteil in %	9,02	8,81	8,76	8,98	8,77	8,89	9,07	9,27	8,93	9,12	8,92	9,20	8,95	8,70					
CI Anteil in %	[8,45; 9,59]	[8,21; 9,41]	[8,14; 9,39]	[8,32; 9,65]	[8,09; 9,46]	[8,17; 9,60]	[8,32; 9,83]	[8,49; 10,05]	[8,14; 9,72]	[8,30; 9,95]	[8,08; 9,76]	[8,32; 10,08]	[8,06; 9,84]	[7,80; 9,60]						
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	498	428	396	379	335	304	346	329	329	283	256	244	219	191					
	Anteil in %	5,09	5,00	5,07	5,34	5,15	5,05	6,19	6,21	6,56	6,05	5,79	5,85	5,54	5,11					
CI Anteil in %	[4,66; 5,53]	[4,54; 5,46]	[4,59; 5,56]	[4,81; 5,86]	[4,61; 5,68]	[4,50; 5,60]	[5,56; 6,83]	[5,56; 6,86]	[5,88; 7,25]	[5,36; 6,73]	[5,10; 6,48]	[5,14; 6,56]	[4,82; 6,25]	[4,41; 5,82]						
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	724	673	632	601	574	543	481	475	461	450	427	388	387	387					
	Anteil in %	7,40	7,87	8,10	8,46	8,82	9,02	8,61	8,97	9,19	9,62	9,66	9,30	9,78	10,36					
CI Anteil in %	[6,89; 7,92]	[7,30; 8,44]	[7,49; 8,70]	[7,81; 9,11]	[8,13; 9,51]	[8,29; 9,74]	[7,87; 9,34]	[8,20; 9,74]	[8,39; 9,99]	[8,77; 10,46]	[8,79; 10,53]	[8,42; 10,18]	[8,86; 10,71]	[9,38; 11,34]						
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	1440	1345	1259	1185	1126	1104	977	973	977	945	930	893	877	858					
	Anteil in %	14,73	15,72	16,13	16,68	17,30	18,34	17,49	18,37	19,48	20,19	21,05	21,40	22,17	22,97					
CI Anteil in %	[14,02; 15,43]	[14,95; 16,49]	[15,31; 16,94]	[15,82; 17,55]	[16,38; 18,22]	[17,36; 19,31]	[16,49; 18,48]	[17,33; 19,42]	[18,39; 20,58]	[19,04; 21,34]	[19,84; 22,25]	[20,15; 22,64]	[20,87; 23,46]	[21,62; 24,31]						

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	11195	10505	9553	8754	8293	7702	7289	6827	6435	6016	5692	5332	5084					
	auswertbar	Anzahl	11195	10138	9147	8494	7805	7309	6972	6588	6169	5845	5501	5174	4957					
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2360	2128	1837	1665	1455	1299	1193	1116	1007	940	864	806	749					
		Anteil in %	21,08	20,99	20,08	19,60	18,64	17,77	17,11	16,94	16,32	16,08	15,71	15,58	15,11					
	CI Anteil in %		[20,33; 21,84]	[20,20; 21,78]	[19,26; 20,90]	[18,76; 20,45]	[17,78; 19,51]	[16,90; 18,65]	[16,23; 18,00]	[16,03; 17,85]	[15,40; 17,25]	[15,14; 17,02]	[14,74; 16,67]	[14,59; 16,57]	[14,11; 16,11]					
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	2347	2156	1889	1733	1588	1518	1420	1338	1228	1173	1107	1038	993					
		Anteil in %	20,96	21,27	20,65	20,40	20,35	20,77	20,37	20,31	19,91	20,07	20,12	20,06	20,03					
	CI Anteil in %		[20,21; 21,72]	[20,47; 22,06]	[19,82; 21,48]	[19,55; 21,26]	[19,45; 21,24]	[19,84; 21,70]	[19,42; 21,31]	[19,34; 21,28]	[18,91; 20,90]	[19,04; 21,10]	[19,06; 21,18]	[18,97; 21,15]	[18,92; 21,15]					
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	370	325	290	255	237	222	201	178	149	153	132	119	109					
		Anteil in %	3,31	3,21	3,17	3,00	3,04	3,04	2,88	2,70	2,42	2,62	2,40	2,30	2,20					
	CI Anteil in %		[2,97; 3,64]	[2,86; 3,55]	[2,81; 3,53]	[2,64; 3,37]	[2,66; 3,42]	[2,64; 3,43]	[2,49; 3,28]	[2,31; 3,09]	[2,03; 2,80]	[2,21; 3,03]	[2,00; 2,80]	[1,89; 2,71]	[1,79; 2,61]					
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	344	301	287	247	219	198	168	167	149	128	120	105	97					
		Anteil in %	3,07	2,97	3,14	2,91	2,81	2,71	2,41	2,53	2,42	2,19	2,18	2,03	1,96					
	CI Anteil in %		[2,75; 3,39]	[2,64; 3,30]	[2,78; 3,49]	[2,55; 3,27]	[2,44; 3,17]	[2,34; 3,08]	[2,05; 2,77]	[2,16; 2,91]	[2,03; 2,80]	[1,81; 2,57]	[1,80; 2,57]	[1,65; 2,41]	[1,57; 2,34]					
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	496	477	431	424	392	391	371	356	333	328	330	313	297					
		Anteil in %	4,43	4,71	4,71	4,99	5,02	5,35	5,32	5,40	5,40	5,61	6,00	6,05	5,99					
CI Anteil in %		[4,05; 4,81]	[4,29; 5,12]	[4,28; 5,15]	[4,53; 5,45]	[4,54; 5,51]	[4,83; 5,87]	[4,79; 5,85]	[4,86; 5,95]	[4,83; 5,96]	[5,02; 6,20]	[5,37; 6,63]	[5,40; 6,70]	[5,33; 6,65]						
Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	997	843	787	720	686	667	653	601	583	537	519	489	466						
	Anteil in %	8,91	8,32	8,60	8,48	8,79	9,13	9,37	9,12	9,45	9,19	9,43	9,45	9,40						
CI Anteil in %		[8,38; 9,43]	[7,78; 8,85]	[8,03; 9,18]	[7,88; 9,07]	[8,16; 9,42]	[8,47; 9,79]	[8,68; 10,05]	[8,43; 9,82]	[8,72; 10,18]	[8,45; 9,93]	[8,66; 10,21]	[8,65; 10,25]	[8,59; 10,21]						
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	443	389	364	337	320	399	380	355	304	290	262	245	228						
	Anteil in %	3,96	3,84	3,98	3,97	4,10	5,46	5,45	5,39	4,93	4,96	4,76	4,74	4,60						
CI Anteil in %		[3,60; 4,32]	[3,46; 4,21]	[3,58; 4,38]	[3,55; 4,38]	[3,66; 4,54]	[4,94; 5,98]	[4,92; 5,98]	[4,84; 5,93]	[4,39; 5,47]	[4,40; 5,52]	[4,20; 5,33]	[4,16; 5,31]	[4,02; 5,18]						
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	852	817	791	730	695	581	609	587	578	561	524	515	498						
	Anteil in %	7,61	8,06	8,65	8,59	8,90	7,95	8,73	8,91	9,37	9,60	9,53	9,95	10,05						
CI Anteil in %		[7,12; 8,10]	[7,53; 8,59]	[8,07; 9,22]	[8,00; 9,19]	[8,27; 9,54]	[7,33; 8,57]	[8,07; 9,40]	[8,22; 9,60]	[8,64; 10,10]	[8,84; 10,35]	[8,75; 10,30]	[9,14; 10,77]	[9,21; 10,88]						
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	1739	1649	1543	1478	1401	1334	1321	1292	1290	1243	1189	1151	1141						
	Anteil in %	15,53	16,27	16,87	17,40	17,95	18,25	18,95	19,61	20,91	21,27	21,61	22,25	23,02						
CI Anteil in %		[14,86; 16,20]	[15,55; 16,98]	[16,10; 17,64]	[16,59; 18,21]	[17,10; 18,80]	[17,37; 19,14]	[18,03; 19,87]	[18,65; 20,57]	[19,90; 21,93]	[20,22; 22,32]	[20,53; 22,70]	[21,11; 23,38]	[21,85; 24,19]						

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	14493	13791	12613	11771	10718	10080	9390	8865	8292	7821	7374	6965									
	auswertbar	Anzahl	14493	12998	11930	10906	9971	9469	8980	8420	7949	7467	7103	6685									
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2777	2486	2235	1963	1794	1625	1523	1389	1312	1202	1134	1027									
		Anteil in %	19,16	19,13	18,73	18,00	17,99	17,16	16,96	16,50	16,51	16,10	15,97	15,36									
		CI Anteil in %	[18,52; 19,80]	[18,45; 19,80]	[18,03; 19,43]	[17,28; 18,72]	[17,24; 18,75]	[16,40; 17,92]	[16,18; 17,74]	[15,70; 17,29]	[15,69; 17,32]	[15,26; 16,93]	[15,11; 16,82]	[14,50; 16,23]									
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	2972	2573	2285	2088	1883	1795	1654	1552	1436	1357	1275	1210									
		Anteil in %	20,51	19,80	19,15	19,15	18,88	18,96	18,42	18,43	18,07	18,17	17,95	18,10									
		CI Anteil in %	[19,85; 21,16]	[19,11; 20,48]	[18,45; 19,86]	[18,41; 19,88]	[18,12; 19,65]	[18,17; 19,75]	[17,62; 19,22]	[17,60; 19,26]	[17,22; 18,91]	[17,30; 19,05]	[17,06; 18,84]	[17,18; 19,02]									
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	527	449	419	346	361	316	298	253	253	218	205	196									
		Anteil in %	3,64	3,45	3,51	3,17	3,62	3,34	3,32	3,00	3,18	2,92	2,89	2,93									
		CI Anteil in %	[3,33; 3,94]	[3,14; 3,77]	[3,18; 3,84]	[2,84; 3,50]	[3,25; 3,99]	[2,98; 3,70]	[2,95; 3,69]	[2,64; 3,37]	[2,80; 3,57]	[2,54; 3,30]	[2,50; 3,28]	[2,53; 3,34]									
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	570	475	409	369	343	324	278	259	235	210	192	166									
		Anteil in %	3,93	3,65	3,43	3,38	3,44	3,42	3,10	3,08	2,96	2,81	2,70	2,48									
		CI Anteil in %	[3,62; 4,25]	[3,33; 3,98]	[3,10; 3,75]	[3,04; 3,72]	[3,08; 3,80]	[3,06; 3,79]	[2,74; 3,45]	[2,71; 3,44]	[2,58; 3,33]	[2,44; 3,19]	[2,33; 3,08]	[2,11; 2,86]									
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	717	661	626	598	548	514	518	492	466	447	435	419									
		Anteil in %	4,95	5,09	5,25	5,48	5,50	5,43	5,77	5,84	5,86	5,99	6,12	6,27									
		CI Anteil in %	[4,59; 5,30]	[4,71; 5,46]	[4,85; 5,65]	[5,06; 5,91]	[5,05; 5,94]	[4,97; 5,88]	[5,29; 6,25]	[5,34; 6,34]	[5,35; 6,38]	[5,45; 6,52]	[5,57; 6,68]	[5,69; 6,85]									
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1355	1192	1108	1009	961	887	834	793	746	706	650	621									
		Anteil in %	9,35	9,17	9,29	9,25	9,64	9,37	9,29	9,42	9,38	9,45	9,15	9,29									
		CI Anteil in %	[8,88; 9,82]	[8,67; 9,67]	[8,77; 9,81]	[8,71; 9,80]	[9,06; 10,22]	[8,78; 9,95]	[8,69; 9,89]	[8,79; 10,04]	[8,74; 10,03]	[8,79; 10,12]	[8,48; 9,82]	[8,59; 9,99]									
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	710	630	608	542	629	568	536	492	460	423	391	348										
	Anteil in %	4,90	4,85	5,10	4,97	6,31	6,00	5,97	5,84	5,79	5,66	5,50	5,21										
	CI Anteil in %	[4,55; 5,25]	[4,48; 5,22]	[4,70; 5,49]	[4,56; 5,38]	[5,83; 6,79]	[5,52; 6,48]	[5,48; 6,46]	[5,34; 6,34]	[5,27; 6,30]	[5,14; 6,19]	[4,97; 6,04]	[4,67; 5,74]										
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	1216	1145	1058	998	874	880	880	844	812	794	761	731										
	Anteil in %	8,39	8,81	8,87	9,15	8,77	9,29	9,80	10,02	10,22	10,63	10,71	10,93										
	CI Anteil in %	[7,94; 8,84]	[8,32; 9,30]	[8,36; 9,38]	[8,61; 9,69]	[8,21; 9,32]	[8,71; 9,88]	[9,18; 10,41]	[9,38; 10,67]	[9,55; 10,88]	[9,93; 11,33]	[9,99; 11,43]	[10,19; 11,68]										
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	1994	1948	1895	1811	1660	1683	1645	1581	1546	1479	1474	1416										
	Anteil in %	13,76	14,99	15,88	16,61	16,65	17,77	18,32	18,78	19,45	19,81	20,75	21,18										
	CI Anteil in %	[13,20; 14,32]	[14,37; 15,60]	[15,23; 16,54]	[15,91; 17,30]	[15,92; 17,38]	[17,00; 18,54]	[17,52; 19,12]	[17,94; 19,61]	[18,58; 20,32]	[18,90; 20,71]	[19,81; 21,69]	[20,20; 22,16]										

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18117	17190	16142	14666	13722	12823	12070	11283	10635	10034	9520										
	auswertbar	Anzahl	18117	16372	14928	13628	12917	12271	11581	10803	10196	9685	9165										
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	3903	3496	3074	2755	2532	2343	2139	1998	1870	1739	1612										
		Anteil in %	21,54	21,35	20,59	20,22	19,60	19,09	18,47	18,49	18,34	17,96	17,59										
		CI Anteil in %	[20,94; 22,14]	[20,73; 21,98]	[19,94; 21,24]	[19,54; 20,89]	[18,92; 20,29]	[18,40; 19,79]	[17,76; 19,18]	[17,76; 19,23]	[17,59; 18,72]	[17,19; 18,37]	[16,81; 18,37]										
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	3156	2737	2485	2227	2101	2000	1900	1752	1621	1584	1487										
		Anteil in %	17,42	16,72	16,65	16,34	16,27	16,30	16,41	16,22	15,90	16,36	16,22										
		CI Anteil in %	[16,87; 17,97]	[16,15; 17,29]	[16,05; 17,24]	[15,72; 16,96]	[15,63; 16,90]	[15,65; 16,95]	[15,73; 17,08]	[15,52; 16,91]	[15,19; 16,61]	[15,62; 17,09]	[15,47; 16,98]										
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	679	606	530	517	487	444	398	375	317	280	248										
		Anteil in %	3,75	3,70	3,55	3,79	3,77	3,62	3,44	3,47	3,11	2,89	2,71										
		CI Anteil in %	[3,47; 4,02]	[3,41; 3,99]	[3,25; 3,85]	[3,47; 4,11]	[3,44; 4,10]	[3,29; 3,95]	[3,10; 3,77]	[3,13; 3,82]	[2,77; 3,45]	[2,56; 3,22]	[2,37; 3,04]										
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	636	532	471	423	360	323	300	251	243	217	181										
		Anteil in %	3,51	3,25	3,16	3,10	2,79	2,63	2,59	2,32	2,38	2,24	1,97										
		CI Anteil in %	[3,24; 3,78]	[2,98; 3,52]	[2,87; 3,44]	[2,81; 3,40]	[2,50; 3,07]	[2,35; 2,92]	[2,30; 2,88]	[2,04; 2,61]	[2,09; 2,68]	[1,95; 2,54]	[1,69; 2,26]										
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	975	933	853	835	800	792	761	712	675	634	629										
		Anteil in %	5,38	5,70	5,71	6,13	6,19	6,45	6,57	6,59	6,62	6,55	6,86										
		CI Anteil in %	[5,05; 5,71]	[5,34; 6,05]	[5,34; 6,09]	[5,72; 6,53]	[5,78; 6,61]	[6,02; 6,89]	[6,12; 7,02]	[6,12; 7,06]	[6,14; 7,10]	[6,05; 7,04]	[6,35; 7,38]										
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1903	1705	1557	1458	1349	1291	1219	1119	1087	1016	957										
		Anteil in %	10,50	10,41	10,43	10,70	10,44	10,52	10,36	10,36	10,66	10,49	10,44										
		CI Anteil in %	[10,06; 10,95]	[9,95; 10,88]	[9,94; 10,92]	[10,18; 11,22]	[9,92; 10,97]	[9,98; 11,06]	[9,97; 11,08]	[9,78; 10,93]	[10,06; 11,26]	[9,88; 11,10]	[9,82; 11,07]										
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	921	806	747	775	700	679	607	564	524	495	449										
Anteil in %		5,08	4,92	5,00	5,69	5,42	5,53	5,24	5,22	5,14	5,11	4,90											
CI Anteil in %		[4,76; 5,40]	[4,59; 5,25]	[4,65; 5,35]	[5,30; 6,08]	[5,03; 5,81]	[5,13; 5,94]	[4,84; 5,65]	[4,80; 5,64]	[4,71; 5,57]	[4,67; 5,55]	[4,46; 5,34]											
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	1458	1389	1304	1218	1226	1221	1201	1164	1121	1074	1036											
	Anteil in %	8,05	8,48	8,74	8,94	9,49	9,95	10,37	10,77	10,99	11,09	11,30											
	CI Anteil in %	[7,65; 8,44]	[8,06; 8,91]	[8,28; 9,19]	[8,46; 9,42]	[8,99; 10,00]	[9,42; 10,48]	[9,82; 10,93]	[10,19; 11,36]	[10,39; 11,60]	[10,46; 11,71]	[10,66; 11,95]											
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	2325	2276	2191	2017	2013	1980	1916	1851	1837	1793	1758											
	Anteil in %	12,83	13,90	14,68	14,80	15,58	16,14	16,54	17,13	18,02	18,51	19,18											
	CI Anteil in %	[12,35; 13,32]	[13,37; 14,43]	[14,11; 15,24]	[14,20; 15,40]	[14,96; 16,21]	[15,48; 16,79]	[15,87; 17,22]	[16,42; 17,84]	[17,27; 18,76]	[17,74; 19,29]	[18,38; 19,99]											

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10330	9940	9118	8435	7735	7205	6731	6317	5936	5626									
	auswertbar	Anzahl	10330	9306	8258	7781	7297	6855	6429	6051	5716	5386									
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2555	2252	1869	1732	1579	1453	1343	1251	1179	1097									
		Anteil in %	24,73	24,20	22,63	22,26	21,64	21,20	20,89	20,67	20,63	20,37									
		CI Anteil in %	[23,90; 25,57]	[23,33; 25,07]	[21,73; 23,54]	[21,33; 23,18]	[20,69; 22,58]	[20,23; 22,16]	[19,90; 21,88]	[19,65; 21,69]	[19,58; 21,68]	[19,29; 21,44]									
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	1738	1575	1344	1248	1121	1041	955	902	848	778									
		Anteil in %	16,82	16,92	16,28	16,04	15,36	15,19	14,85	14,91	14,84	14,44									
		CI Anteil in %	[16,10; 17,55]	[16,16; 17,69]	[15,48; 17,07]	[15,22; 16,85]	[14,54; 16,19]	[14,34; 16,04]	[13,99; 15,72]	[14,01; 15,80]	[13,91; 15,76]	[13,51; 15,38]									
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	329	258	248	214	193	161	145	132	113	101									
		Anteil in %	3,18	2,77	3,00	2,75	2,64	2,35	2,26	2,18	1,98	1,88									
		CI Anteil in %	[2,85; 3,52]	[2,44; 3,11]	[2,64; 3,37]	[2,39; 3,11]	[2,28; 3,01]	[1,99; 2,71]	[1,89; 2,62]	[1,81; 2,55]	[1,62; 2,34]	[1,51; 2,24]									
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	289	256	229	202	188	175	152	127	119	107									
		Anteil in %	2,80	2,75	2,77	2,60	2,58	2,55	2,36	2,10	2,08	1,99									
		CI Anteil in %	[2,48; 3,12]	[2,42; 3,08]	[2,42; 3,13]	[2,24; 2,95]	[2,21; 2,94]	[2,18; 2,93]	[1,99; 2,74]	[1,74; 2,46]	[1,71; 2,45]	[1,61; 2,36]									
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	630	595	563	546	532	494	476	462	423	395									
		Anteil in %	6,10	6,39	6,82	7,02	7,29	7,21	7,40	7,64	7,40	7,33									
		CI Anteil in %	[5,64; 6,56]	[5,90; 6,89]	[6,27; 7,36]	[6,45; 7,58]	[6,69; 7,89]	[6,59; 7,82]	[6,76; 8,04]	[6,97; 8,30]	[6,72; 8,08]	[6,64; 8,03]									
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1184	1081	977	900	844	811	757	721	653	615									
		Anteil in %	11,46	11,62	11,83	11,57	11,57	11,83	11,77	11,92	11,42	11,42									
		CI Anteil in %	[10,85; 12,08]	[10,97; 12,27]	[11,13; 12,53]	[10,86; 12,28]	[10,83; 12,30]	[11,07; 12,60]	[10,99; 12,56]	[11,10; 12,73]	[10,60; 12,25]	[10,57; 12,27]									
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	462	390	429	402	376	352	329	312	294	272										
	Anteil in %	4,47	4,19	5,19	5,17	5,15	5,13	5,12	5,16	5,14	5,05										
	CI Anteil in %	[4,07; 4,87]	[3,78; 4,60]	[4,72; 5,67]	[4,67; 5,66]	[4,65; 5,66]	[4,61; 5,66]	[4,58; 5,66]	[4,60; 5,71]	[4,57; 5,72]	[4,47; 5,64]										
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	738	710	678	699	695	680	658	636	612	571										
	Anteil in %	7,14	7,63	8,21	8,98	9,52	9,92	10,23	10,51	10,71	10,60										
	CI Anteil in %	[6,65; 7,64]	[7,09; 8,17]	[7,62; 8,80]	[8,35; 9,62]	[8,85; 10,20]	[9,21; 10,63]	[9,49; 10,98]	[9,74; 11,28]	[9,91; 11,51]	[9,78; 11,42]										
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	1201	1125	1048	1028	1015	1007	993	958	944	948										
	Anteil in %	11,63	12,09	12,69	13,21	13,91	14,69	15,45	15,83	16,52	17,60										
	CI Anteil in %	[11,01; 12,24]	[11,43; 12,75]	[11,97; 13,41]	[12,46; 13,96]	[13,12; 14,70]	[13,85; 15,53]	[14,56; 16,33]	[14,91; 16,75]	[15,55; 17,48]	[16,58; 18,62]										

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	9430	9074	8463	7733	7156	6701	6331	5959	5643											
	auswertbar	Anzahl	9430	8431	7869	7285	6818	6425	6060	5721	5422											
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2604	2139	1945	1790	1644	1548	1431	1337	1256											
		Anteil in %	27,61	25,37	24,72	24,57	24,11	24,09	23,61	23,37	23,16											
		CI Anteil in %	[26,71; 28,52]	[24,44; 26,30]	[23,76; 25,67]	[23,58; 25,56]	[23,10; 25,13]	[23,05; 25,14]	[22,54; 24,68]	[22,27; 24,47]	[22,04; 24,29]											
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	1466	1272	1163	1054	956	896	851	788	739											
		Anteil in %	15,55	15,09	14,78	14,47	14,02	13,95	14,04	13,77	13,63											
		CI Anteil in %	[14,81; 16,28]	[14,32; 15,85]	[14,00; 15,56]	[13,66; 15,28]	[13,20; 14,85]	[13,10; 14,79]	[13,17; 14,92]	[12,88; 14,67]	[12,72; 14,54]											
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	282	256	238	216	181	167	129	127	113											
		Anteil in %	2,99	3,04	3,02	2,96	2,65	2,60	2,13	2,22	2,08											
		CI Anteil in %	[2,65; 3,33]	[2,67; 3,40]	[2,65; 3,40]	[2,58; 3,35]	[2,27; 3,04]	[2,21; 2,99]	[1,77; 2,49]	[1,84; 2,60]	[1,70; 2,46]											
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	264	217	208	190	166	140	123	112	100											
		Anteil in %	2,80	2,57	2,64	2,61	2,43	2,18	2,03	1,96	1,84											
		CI Anteil in %	[2,47; 3,13]	[2,24; 2,91]	[2,29; 3,00]	[2,24; 2,97]	[2,07; 2,80]	[1,82; 2,54]	[1,67; 2,38]	[1,60; 2,32]	[1,49; 2,20]											
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	635	559	557	524	513	500	482	472	444											
		Anteil in %	6,73	6,63	7,08	7,19	7,52	7,78	7,95	8,25	8,19											
		CI Anteil in %	[6,23; 7,24]	[6,10; 7,16]	[6,51; 7,65]	[6,60; 7,79]	[6,90; 8,15]	[7,13; 8,44]	[7,27; 8,64]	[7,54; 8,96]	[7,46; 8,92]											
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1229	1077	1020	963	917	858	817	766	719											
		Anteil in %	13,03	12,77	12,96	13,22	13,45	13,35	13,48	13,39	13,26											
		CI Anteil in %	[12,35; 13,71]	[12,06; 13,49]	[12,22; 13,70]	[12,44; 14,00]	[12,64; 14,26]	[12,52; 14,19]	[12,62; 14,34]	[12,51; 14,27]	[12,36; 14,16]											
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	347	345	345	310	289	255	245	231	218												
	Anteil in %	3,68	4,09	4,38	4,26	4,24	3,97	4,04	4,04	4,02												
	CI Anteil in %	[3,30; 4,06]	[3,67; 4,51]	[3,93; 4,84]	[3,79; 4,72]	[3,76; 4,72]	[3,49; 4,45]	[3,55; 4,54]	[3,53; 4,55]	[3,50; 4,54]												
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	635	688	657	622	620	631	614	592	573												
	Anteil in %	6,73	8,16	8,35	8,54	9,09	9,82	10,13	10,35	10,57												
	CI Anteil in %	[6,23; 7,24]	[7,58; 8,74]	[7,74; 8,96]	[7,90; 9,18]	[8,41; 9,78]	[9,09; 10,55]	[9,37; 10,89]	[9,56; 11,14]	[9,75; 11,39]												
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	1017	1044	1005	951	946	911	881	861	832												
	Anteil in %	10,78	12,38	12,77	13,05	13,88	14,18	14,54	15,05	15,34												
	CI Anteil in %	[10,16; 11,41]	[11,68; 13,09]	[12,03; 13,51]	[12,28; 13,83]	[13,05; 14,70]	[13,33; 15,03]	[13,65; 15,43]	[14,12; 15,98]	[14,39; 16,30]												

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6552	6320	5851	5399	5008	4674	4394	4147												
	auswertbar	Anzahl	6545	5959	5486	5098	4795	4470	4202	3966												
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	1851	1589	1439	1310	1211	1110	1034	947												
		Anteil in %	28,28	26,67	26,23	25,70	25,26	24,83	24,61	23,88												
		CI Anteil in %	[27,19; 29,37]	[25,54; 27,79]	[25,07; 27,39]	[24,50; 26,90]	[24,03; 26,49]	[23,57; 26,10]	[23,30; 25,91]	[22,55; 25,21]												
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	1011	924	821	755	683	611	569	523												
		Anteil in %	15,45	15,51	14,97	14,81	14,24	13,67	13,54	13,19												
		CI Anteil in %	[14,57; 16,32]	[14,59; 16,43]	[14,02; 15,91]	[13,83; 15,78]	[13,25; 15,23]	[12,66; 14,68]	[12,51; 14,58]	[12,13; 14,24]												
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	190	144	139	121	102	101	87	75												
		Anteil in %	2,90	2,42	2,53	2,37	2,13	2,26	2,07	1,89												
		CI Anteil in %	[2,50; 3,31]	[2,03; 2,81]	[2,12; 2,95]	[1,96; 2,79]	[1,72; 2,54]	[1,82; 2,70]	[1,64; 2,50]	[1,47; 2,32]												
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	153	141	121	111	94	83	75	60												
		Anteil in %	2,34	2,37	2,21	2,18	1,96	1,86	1,78	1,51												
		CI Anteil in %	[1,97; 2,70]	[1,98; 2,75]	[1,82; 2,59]	[1,78; 2,58]	[1,57; 2,35]	[1,46; 2,25]	[1,38; 2,19]	[1,13; 1,89]												
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	478	435	407	387	383	360	338	324												
		Anteil in %	7,30	7,30	7,42	7,59	7,99	8,05	8,04	8,17												
		CI Anteil in %	[6,67; 7,93]	[6,64; 7,96]	[6,73; 8,11]	[6,86; 8,32]	[7,22; 8,75]	[7,26; 8,85]	[7,22; 8,87]	[7,32; 9,02]												
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	840	814	757	718	674	622	587	557												
		Anteil in %	12,83	13,66	13,80	14,08	14,06	13,91	13,97	14,04												
		CI Anteil in %	[12,02; 13,64]	[12,79; 14,53]	[12,89; 14,71]	[13,13; 15,04]	[13,07; 15,04]	[12,90; 14,93]	[12,92; 15,02]	[12,96; 15,13]												
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	254	233	226	212	195	182	174	157													
	Anteil in %	3,88	3,91	4,12	4,16	4,07	4,07	4,14	3,96													
	CI Anteil in %	[3,41; 4,35]	[3,42; 4,40]	[3,59; 4,65]	[3,61; 4,71]	[3,51; 4,63]	[3,49; 4,65]	[3,54; 4,74]	[3,35; 4,57]													
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	447	460	445	449	451	433	424	413													
	Anteil in %	6,83	7,72	8,11	8,81	9,41	9,69	10,09	10,41													
	CI Anteil in %	[6,22; 7,44]	[7,04; 8,40]	[7,39; 8,83]	[8,03; 9,59]	[8,58; 10,23]	[8,82; 10,55]	[9,18; 11,00]	[9,46; 11,36]													
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	720	695	638	586	584	587	569	596													
	Anteil in %	11,00	11,66	11,63	11,49	12,18	13,13	13,54	15,03													
	CI Anteil in %	[10,24; 11,76]	[10,85; 12,48]	[10,78; 12,48]	[10,62; 12,37]	[11,25; 13,11]	[12,14; 14,12]	[12,51; 14,58]	[13,92; 16,14]													

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5527	5299	4907	4513	4221	3942	3724													
	auswertbar	Anzahl	5523	5070	4636	4304	4044	3781	3601													
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	1772	1556	1376	1293	1178	1089	1007													
		Anteil in %	32,08	30,69	29,68	30,04	29,13	28,80	27,96													
		CI Anteil in %	[30,85; 33,32]	[29,42; 31,96]	[28,37; 31,00]	[28,67; 31,41]	[27,73; 30,53]	[27,36; 30,25]	[26,50; 29,43]													
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	783	688	625	548	528	492	449													
		Anteil in %	14,18	13,57	13,48	12,73	13,06	13,01	12,47													
		CI Anteil in %	[13,26; 15,10]	[12,63; 14,51]	[12,50; 14,46]	[11,74; 13,73]	[12,02; 14,09]	[11,94; 14,08]	[11,39; 13,55]													
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	118	103	93	86	81	71	66													
		Anteil in %	2,14	2,03	2,01	2,00	2,00	1,88	1,83													
		CI Anteil in %	[1,76; 2,52]	[1,64; 2,42]	[1,60; 2,41]	[1,58; 2,42]	[1,57; 2,43]	[1,45; 2,31]	[1,39; 2,27]													
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	124	106	96	82	79	64	57													
		Anteil in %	2,25	2,09	2,07	1,91	1,95	1,69	1,58													
		CI Anteil in %	[1,85; 2,64]	[1,70; 2,48]	[1,66; 2,48]	[1,50; 2,31]	[1,53; 2,38]	[1,28; 2,10]	[1,18; 1,99]													
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	357	359	347	329	324	295	282													
		Anteil in %	6,46	7,08	7,48	7,64	8,01	7,80	7,83													
		CI Anteil in %	[5,82; 7,11]	[6,37; 7,79]	[6,73; 8,24]	[6,85; 8,44]	[7,18; 8,85]	[6,95; 8,66]	[6,95; 8,71]													
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	781	724	691	643	593	557	545													
		Anteil in %	14,14	14,28	14,91	14,94	14,66	14,73	15,13													
		CI Anteil in %	[13,22; 15,06]	[13,32; 15,24]	[13,88; 15,93]	[13,87; 16,00]	[13,57; 15,75]	[13,60; 15,86]	[13,96; 16,31]													
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	194	168	155	142	126	132	122														
	Anteil in %	3,51	3,31	3,34	3,30	3,12	3,49	3,39														
	CI Anteil in %	[3,03; 4,00]	[2,82; 3,81]	[2,83; 3,86]	[2,77; 3,83]	[2,58; 3,65]	[2,91; 4,08]	[2,80; 3,98]														
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	385	403	365	340	332	334	321														
	Anteil in %	6,97	7,95	7,87	7,90	8,21	8,83	8,91														
	CI Anteil in %	[6,30; 7,64]	[7,20; 8,69]	[7,10; 8,65]	[7,09; 8,71]	[7,36; 9,06]	[7,93; 9,74]	[7,98; 9,85]														
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	526	521	489	486	476	459	477														
	Anteil in %	9,52	10,28	10,55	11,29	11,77	12,14	13,25														
	CI Anteil in %	[8,75; 10,30]	[9,44; 11,11]	[9,66; 11,43]	[10,35; 12,24]	[10,78; 12,76]	[11,10; 13,18]	[12,14; 14,35]														

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5982	5705	5205	4802	4483	4208														
	auswertbar	Anzahl	5976	5416	4929	4605	4308	4056														
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	1968	1684	1496	1362	1249	1140														
		Anteil in %	32,93	31,09	30,35	29,58	28,99	28,11														
		CI Anteil in %	[31,74; 34,12]	[29,86; 32,33]	[29,07; 31,63]	[28,26; 30,89]	[27,64; 30,35]	[26,72; 29,49]														
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	831	707	563	505	452	416														
		Anteil in %	13,91	13,05	11,42	10,97	10,49	10,26														
		CI Anteil in %	[13,03; 14,78]	[12,16; 13,95]	[10,53; 12,31]	[10,06; 11,87]	[9,58; 11,41]	[9,32; 11,19]														
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	140	119	107	86	75	75														
		Anteil in %	2,34	2,20	2,17	1,87	1,74	1,85														
		CI Anteil in %	[1,96; 2,73]	[1,81; 2,59]	[1,76; 2,58]	[1,48; 2,26]	[1,35; 2,13]	[1,43; 2,26]														
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	106	86	76	69	50	43														
		Anteil in %	1,77	1,59	1,54	1,50	1,16	1,06														
		CI Anteil in %	[1,44; 2,11]	[1,25; 1,92]	[1,20; 1,89]	[1,15; 1,85]	[0,84; 1,48]	[0,74; 1,38]														
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	432	422	412	406	397	379														
		Anteil in %	7,23	7,79	8,36	8,82	9,22	9,34														
		CI Anteil in %	[6,57; 7,89]	[7,08; 8,51]	[7,59; 9,13]	[8,00; 9,64]	[8,35; 10,08]	[8,45; 10,24]														
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	832	756	700	661	631	596														
		Anteil in %	13,92	13,96	14,20	14,35	14,65	14,69														
		CI Anteil in %	[13,04; 14,80]	[13,04; 14,88]	[13,23; 15,18]	[13,34; 15,37]	[13,59; 15,70]	[13,60; 15,78]														
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	205	194	180	165	156	144															
	Anteil in %	3,43	3,58	3,65	3,58	3,62	3,55															
	CI Anteil in %	[2,97; 3,89]	[3,09; 4,08]	[3,13; 4,18]	[3,05; 4,12]	[3,06; 4,18]	[2,98; 4,12]															
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	395	423	416	412	428	416															
	Anteil in %	6,61	7,81	8,44	8,95	9,94	10,26															
	CI Anteil in %	[5,98; 7,24]	[7,10; 8,52]	[7,66; 9,22]	[8,12; 9,77]	[9,04; 10,83]	[9,32; 11,19]															
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	570	563	554	544	536	530															
	Anteil in %	9,54	10,40	11,24	11,81	12,44	13,07															
	CI Anteil in %	[8,79; 10,28]	[9,58; 11,21]	[10,36; 12,12]	[10,88; 12,75]	[11,46; 13,43]	[12,03; 14,10]															

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6630	6363	5859	5409	5055															
	auswertbar	Anzahl	6628	6131	5558	5167	4851															
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2177	1890	1712	1559	1435															
		Anteil in %	32,85	30,83	30,80	30,17	29,58															
	CI Anteil in %	[31,71; 33,98]	[29,67; 31,98]	[29,59; 32,02]	[28,92; 31,42]	[28,30; 30,87]																
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	844	750	660	601	552															
		Anteil in %	12,73	12,23	11,87	11,63	11,38															
	CI Anteil in %	[11,93; 13,54]	[11,41; 13,05]	[11,02; 12,73]	[10,76; 12,51]	[10,49; 12,27]																
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	135	111	94	76	67															
		Anteil in %	2,04	1,81	1,69	1,47	1,38															
	CI Anteil in %	[1,70; 2,38]	[1,48; 2,14]	[1,35; 2,03]	[1,14; 1,80]	[1,05; 1,71]																
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	93	85	73	59	48															
		Anteil in %	1,40	1,39	1,31	1,14	0,99															
	CI Anteil in %	[1,12; 1,69]	[1,09; 1,68]	[1,01; 1,61]	[0,85; 1,43]	[0,71; 1,27]																
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	481	507	453	440	430															
		Anteil in %	7,26	8,27	8,15	8,52	8,86															
CI Anteil in %	[6,63; 7,88]	[7,58; 8,96]	[7,43; 8,87]	[7,75; 9,28]	[8,06; 9,66]																	
Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	981	908	838	784	738																
	Anteil in %	14,80	14,81	15,08	15,17	15,21																
CI Anteil in %	[13,95; 15,66]	[13,92; 15,70]	[14,14; 16,02]	[14,19; 16,15]	[14,20; 16,22]																	
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	227	209	179	163	159																
	Anteil in %	3,42	3,41	3,22	3,15	3,28																
CI Anteil in %	[2,99; 3,86]	[2,95; 3,86]	[2,76; 3,68]	[2,68; 3,63]	[2,78; 3,78]																	
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	447	469	446	422	423																
	Anteil in %	6,74	7,65	8,02	8,17	8,72																
CI Anteil in %	[6,14; 7,35]	[6,98; 8,32]	[7,31; 8,74]	[7,42; 8,91]	[7,93; 9,51]																	
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	727	744	696	679	655																
	Anteil in %	10,97	12,14	12,52	13,14	13,50																
CI Anteil in %	[10,22; 11,72]	[11,32; 12,95]	[11,65; 13,39]	[12,22; 14,06]	[12,54; 14,46]																	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6682	6400	5912	5443															
	auswertbar	Anzahl	6676	6123	5571	5213															
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	2018	1751	1548	1417															
		Anteil in %	30,23	28,60	27,79	27,18															
		CI Anteil in %	[29,13; 31,33]	[27,47; 29,73]	[26,61; 28,96]	[25,97; 28,39]															
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	871	777	662	608															
		Anteil in %	13,05	12,69	11,88	11,66															
		CI Anteil in %	[12,24; 13,85]	[11,86; 13,52]	[11,03; 12,73]	[10,79; 12,53]															
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	121	107	90	80															
		Anteil in %	1,81	1,75	1,62	1,53															
		CI Anteil in %	[1,49; 2,13]	[1,42; 2,08]	[1,28; 1,95]	[1,20; 1,87]															
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	115	112	98	80															
		Anteil in %	1,72	1,83	1,76	1,53															
		CI Anteil in %	[1,41; 2,03]	[1,49; 2,16]	[1,41; 2,10]	[1,20; 1,87]															
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	621	577	544	518															
		Anteil in %	9,30	9,42	9,76	9,94															
		CI Anteil in %	[8,61; 10,00]	[8,69; 10,16]	[8,99; 10,54]	[9,12; 10,75]															
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1042	949	866	833															
		Anteil in %	15,61	15,50	15,54	15,98															
		CI Anteil in %	[14,74; 16,48]	[14,59; 16,41]	[14,59; 16,50]	[14,98; 16,97]															
	Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	207	190	166	158															
		Anteil in %	3,10	3,10	2,98	3,03															
		CI Anteil in %	[2,68; 3,52]	[2,67; 3,54]	[2,53; 3,43]	[2,57; 3,50]															
	Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	547	545	529	525															
Anteil in %		8,19	8,90	9,50	10,07																
CI Anteil in %		[7,54; 8,85]	[8,19; 9,61]	[8,73; 10,27]	[9,25; 10,89]																
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	630	653	631	609																
	Anteil in %	9,44	10,66	11,33	11,68																
	CI Anteil in %	[8,74; 10,14]	[9,89; 11,44]	[10,49; 12,16]	[10,81; 12,55]																

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6352	6098	5609																	
	auswertbar	Anzahl	6343	5833	5293																	
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	1950	1698	1500																	
		Anteil in %		30,74	29,11	28,34																
		CI Anteil in %		[29,61; 31,88]	[27,94; 30,28]	[27,13; 29,55]																
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	782	713	601																	
		Anteil in %		12,33	12,22	11,35																
		CI Anteil in %		[11,52; 13,14]	[11,38; 13,06]	[10,50; 12,21]																
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	103	95	72																	
		Anteil in %		1,62	1,63	1,36																
		CI Anteil in %		[1,31; 1,93]	[1,30; 1,95]	[1,05; 1,67]																
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	81	60	62																	
		Anteil in %		1,28	1,03	1,17																
		CI Anteil in %		[1,00; 1,55]	[0,77; 1,29]	[0,88; 1,46]																
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	576	557	509																	
		Anteil in %		9,08	9,55	9,62																
		CI Anteil in %		[8,37; 9,79]	[8,79; 10,30]	[8,82; 10,41]																
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	1064	968	917																	
		Anteil in %		16,77	16,60	17,32																
		CI Anteil in %		[15,85; 17,69]	[15,64; 17,55]	[16,31; 18,34]																
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	196	165	145																		
	Anteil in %		3,09	2,83	2,74																	
	CI Anteil in %		[2,66; 3,52]	[2,40; 3,25]	[2,30; 3,18]																	
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	503	505	476																		
	Anteil in %		7,93	8,66	8,99																	
	CI Anteil in %		[7,26; 8,60]	[7,94; 9,38]	[8,22; 9,76]																	
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	655	677	654																		
	Anteil in %		10,33	11,61	12,36																	
	CI Anteil in %		[9,58; 11,08]	[10,78; 12,43]	[11,47; 13,24]																	

EZ	Patienten und ihre Medikation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5365	5157																		
	auswertbar	Anzahl	5356	4937																		
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	1608	1420																		
		Anteil in %		30,02	28,76																	
		CI Anteil in %		[28,79; 31,25]	[27,50; 30,03]																	
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anzahl	645	575																		
		Anteil in %		12,04	11,65																	
		CI Anteil in %		[11,17; 12,91]	[10,75; 12,54]																	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	85	75																		
		Anteil in %		1,59	1,52																	
		CI Anteil in %		[1,25; 1,92]	[1,18; 1,86]																	
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	78	72																		
		Anteil in %		1,46	1,46																	
		CI Anteil in %		[1,14; 1,78]	[1,12; 1,79]																	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	500	463																		
		Anteil in %		9,34	9,38																	
		CI Anteil in %		[8,56; 10,11]	[8,56; 10,19]																	
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anzahl	873	823																		
		Anteil in %		16,30	16,67																	
		CI Anteil in %		[15,31; 17,29]	[15,63; 17,71]																	
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	155	135																			
	Anteil in %		2,89	2,73																		
	CI Anteil in %		[2,44; 3,34]	[2,28; 3,19]																		
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anzahl	427	432																			
	Anteil in %		7,97	8,75																		
	CI Anteil in %		[7,25; 8,70]	[7,96; 9,54]																		
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	586	602																			
	Anteil in %		10,94	12,19																		
	CI Anteil in %		[10,10; 11,78]	[11,28; 13,11]																		

EZ	Patienten und ihre Medikation		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2012-1	Patienten insgesamt		Anzahl	5991																		
	auswertbar		Anzahl	5981																		
	keine diabetes-spezifische Medikation	Anzahl	1944																			
		Anteil in %	32,50																			
		CI Anteil in %	[31,32; 33,69]																			
		Anzahl	724																			
	ausschließlich Insulin oder Insulin-Analoga	Anteil in %	12,10																			
		CI Anteil in %	[11,28; 12,93]																			
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	61																			
		Anteil in %	1,02																			
		CI Anteil in %	[0,77; 1,27]																			
		Anzahl	60																			
	Glibenclamid-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anteil in %	1,00																			
		CI Anteil in %	[0,75; 1,26]																			
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI ≤ 29	Anzahl	519																			
		Anteil in %	8,68																			
		CI Anteil in %	[7,96; 9,39]																			
		Anzahl	983																			
	Metformin-Monotherapie bei einem BMI > 29	Anteil in %	16,44																			
		CI Anteil in %	[15,50; 17,37]																			
Kombination aus „vorrangigen“ OAD (Glibenclamid und Met- formin)	Anzahl	161																				
	Anteil in %	2,69																				
	CI Anteil in %	[2,28; 3,10]																				
	Anzahl	513																				
Kombination aus einem „vor- rangigen“ und einem oder mehr „nachrangigen“ OAD	Anteil in %	8,58																				
	CI Anteil in %	[7,87; 9,29]																				
Kombination aus OAD und Insulin oder Insulin-Analoga (allgemein)	Anzahl	661																				
	Anteil in %	11,05																				
	CI Anteil in %	[10,26; 11,85]																				

3.4 Prozessparameter

Zur Erhöhung der Lebensqualität der Patienten sowie zur Erhaltung ihrer Autonomie ist eine Schulung über die Ursachen, Auswirkungen und Therapiemodalitäten eines Diabetes mellitus empfehlenswert. Zum einen, weil hierdurch oftmals bei den Diabetikern dauerhafte Verhaltens- und Verhältnisänderungen in den Bereichen Ernährung und Bewegung eingeleitet werden können, die positive Effekte auf den Krankheitsverlauf ausüben. Zum anderen aber auch, weil vor allem bei der Insulintherapie eine kontinuierliche Kontrolle der verzehrten Lebensmittel (Broteinheiten) sowie der zu injizierenden Insulinmenge durch wiederholte Blutzuckerselbstmessungen erfolgen muss. Hierzu ist ein hohes Maß an Selbstorganisationsfähigkeit der Betroffenen erforderlich, welches u.a. in den Schulungen intensiv erlernt wird.

Gefürchtete Langzeitkomplikationen des Diabetes bestehen in der Schädigung von kleinen Gefäßen (sog. Mikroangiopathien). Betroffen sind grundsätzlich alle Gefäße, besonders gravierend sind jedoch Schädigungen der Gefäße der Netzhaut (Retina) des Auges mit der Gefahr der Erblindung, der Nieren mit der Gefahr des Nierenversagens sowie des Herzens mit der Gefahr des Herzinfarktes.

In der Tabelle 3.4.1 ist für die Berichtshalbjahre ausgewiesen, inwieweit die Patienten seit der letzten Dokumentation entweder an einer **empfohlenen Diabetes-Schulung** teilgenommen haben, aktuell keine Möglichkeit zur Teilnahme hatten oder nicht teilgenommen haben. Diese Darstellung kann folglich als Indikator für die *Compliance der Patienten*- also als kooperatives Verhalten des Patienten im Rahmen der vorgeschlagenen Therapien - interpretiert werden. Für das Beitrittsjahr können – mangels einer vorherigen Dokumentation – keine Werte ausgewiesen werden.

Zu beachten ist bei dieser Auswertung, dass es durch die 9. Risikostrukturausgleich-Änderungsverordnung zu einer Änderung im Dokumentationsbogen kam, die keine direkte Vergleichbarkeit mehr zulässt. Gemäß den Kriterien des BVA sind die Schulungsdaten aus „alten“ und „neuen“ Dokumentationsbögen in einer gemeinsamen Zeile darzustellen. Folglich sind bei der Interpretation der Tabellenzeilen „Schulung wahrgenommen“, „Schulung aktuell nicht möglich“ und „Schulung nicht wahrgenommen“ entsprechende Einschränkungen für die Vergleichbarkeit über die Berichtshalbjahre gegeben.⁷

Zunächst wird unter „Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar)“ die auswertbare Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und denen laut aktueller Dokumentation im Vorgängerhalbjahr eine Diabetesschulung empfohlen wurde. Schließlich wird dargestellt, wie viele dieser Patienten mit empfohlener Diabetesschulung die Schulung wahrgenommen haben, eine empfohlene Schulung ohne plausible Begründung nicht wahrgenommen haben bzw. bei wie vielen Patienten eine Teilnahme an der Schulung aktuell nicht möglich war.

⁷ Für den Berichtszeitraum *vor* der Änderung, d.h. Berichtshalbjahre bis einschließlich 2004-1, ist auszuweisen, ob eine Schulung durchgeführt wurde oder aus plausiblen Grund aktuell nicht möglich war oder aus plausiblen Grund nicht wahrgenommen wurde (“Compliance”) oder ob sie ohne Begründung abgelehnt wurde. Weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeiten waren veranlasste und nicht erforderliche Schulungen. Für den Berichtszeitraum *nach* der Änderung, d.h. ab dem Berichtshalbjahr 2004-2, ist auszuweisen, ob eine empfohlene Schulung wahrgenommen wurde oder die Wahrnehmung aktuell nicht möglich war (“Compliance”) oder ob keine Teilnahme an der Schulung erfolgte. Eine weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeit war, dass bei der letzten Dokumentation keine Schulung empfohlen wurde.

In der Kohorte 2003-1 lagen zu Beginn des zweiten Beitrittsjahres für 8049 Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung auswertbare Angaben zur Wahrnehmung einer Schulung vor. 5650 dieser auswertbaren Patienten nahmen die empfohlene Schulung wahr, dagegen hatten 25,43 Prozent keine Möglichkeit zur Teilnahme. 4,37 Prozent nahmen die Schulung ohne plausiblen Grund nicht wahr.

Tabelle 3.4.1 Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen

* Auswertbar sind diejenigen Patienten, denen im vorangegangenen Halbjahr eine Schulung empfohlen wurde. Davon wird dann ausgegangen, wenn in der Folgedokumentation mindestens eine der Angaben „ja“, „nein“ oder „war aktuell nicht möglich“ zur Wahrnehmung empfohlener Schulungen dokumentiert war.

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-1	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	8049	8290	3539	2321	1857	1494	1174	1037	958	942	1076	901	936	818	743	747	665	603
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	5650	6019	1625	1113	976	841	697	633	586	523	526	468	438	372	384	397	344	283
		Anteil in %	70,20	72,61	45,92	47,95	52,56	56,29	59,37	61,04	61,17	55,52	48,88	51,94	46,79	45,48	51,68	53,15	51,73	46,93
		CI Anteil in %	[69,20; 71,19]	[71,65; 73,57]	[44,27; 47,56]	[45,92; 49,99]	[50,29; 54,83]	[53,78; 58,81]	[56,56; 62,18]	[58,07; 64,01]	[58,08; 64,26]	[52,34; 58,70]	[45,90; 51,87]	[48,68; 55,21]	[43,60; 49,99]	[42,06; 48,89]	[48,09; 55,28]	[49,56; 56,73]	[47,93; 55,53]	[42,95; 50,92]
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	2047	1958	1246	665	512	401	210	192	180	152	207	204	191	176	156	158	141	170
		Anteil in %	25,43	23,62	35,21	28,65	27,57	26,84	17,89	18,51	18,79	16,14	19,24	22,64	20,41	21,52	21,00	21,15	21,20	28,19
		CI Anteil in %	[24,48; 26,38]	[22,70; 24,53]	[33,63; 36,78]	[26,81; 30,49]	[25,54; 29,60]	[24,59; 29,09]	[15,69; 20,08]	[16,15; 20,88]	[16,31; 21,26]	[13,79; 18,49]	[16,88; 21,59]	[19,91; 25,38]	[17,82; 22,99]	[18,70; 24,33]	[18,07; 23,93]	[18,22; 24,08]	[18,09; 24,31]	[24,60; 31,79]
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	352	313	668	543	369	252	267	212	192	267	343	229	307	270	203	192	180	150
		Anteil in %	4,37	3,78	18,88	23,40	19,87	16,87	22,74	20,44	20,04	28,34	31,88	25,42	32,80	33,01	27,32	25,70	27,07	24,88
		CI Anteil in %	[3,93; 4,82]	[3,37; 4,19]	[17,59; 20,16]	[21,67; 25,12]	[18,06; 21,69]	[14,97; 18,77]	[20,34; 25,14]	[17,99; 22,90]	[17,51; 22,58]	[25,46; 31,22]	[29,09; 34,66]	[22,57; 28,26]	[29,79; 35,81]	[29,78; 36,23]	[24,12; 30,53]	[22,57; 28,84]	[23,69; 30,45]	[21,42; 28,33]
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18532</i>	<i>16919</i>	<i>15229</i>	<i>13819</i>	<i>12524</i>	<i>11575</i>	<i>10657</i>	<i>9051</i>	<i>8357</i>	<i>7654</i>	<i>7302</i>	<i>6797</i>	<i>6413</i>	<i>6084</i>	<i>5724</i>	<i>5377</i>	<i>5082</i>	<i>4817</i>	<i>4564</i>
2003-2	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	7261	3745	2568	2071	1618	1333	1148	968	889	1079	908	789	741	690	636	592	559	
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	4867	1492	1019	914	724	608	579	513	479	450	364	336	314	301	307	278	263	
		Anteil in %	67,03	39,84	39,68	44,13	44,75	45,61	50,44	53,00	53,88	41,71	40,09	42,59	42,38	43,62	48,27	46,96	47,05	
		CI Anteil in %	[65,95; 68,11]	[38,27; 41,41]	[37,79; 41,57]	[41,99; 46,27]	[42,32; 47,17]	[42,94; 48,29]	[47,54; 53,33]	[49,85; 56,14]	[50,60; 57,16]	[38,76; 44,65]	[36,90; 43,28]	[39,13; 46,04]	[38,81; 45,94]	[39,92; 47,33]	[44,38; 52,16]	[42,94; 50,98]	[42,91; 51,19]	
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	2197	1363	902	648	461	444	304	316	278	347	281	257	246	258	245	234	214	
		Anteil in %	30,26	36,40	35,12	31,29	28,49	33,31	26,48	32,64	31,27	32,16	30,95	32,57	33,20	37,39	38,52	39,53	38,28	
		CI Anteil in %	[29,20; 31,31]	[34,85; 37,94]	[33,28; 36,97]	[29,29; 33,29]	[26,29; 30,69]	[30,78; 35,84]	[23,93; 29,03]	[29,69; 35,60]	[28,22; 34,32]	[29,37; 34,95]	[27,94; 33,96]	[29,30; 35,85]	[29,81; 36,59]	[33,78; 41,00]	[34,74; 42,31]	[35,59; 43,47]	[34,25; 42,32]	
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	197	890	647	509	433	281	265	139	132	282	263	196	181	131	84	80	82	
		Anteil in %	2,71	23,77	25,19	24,58	26,76	21,08	23,08	14,36	14,85	26,14	28,96	24,84	24,43	18,99	13,21	13,51	14,67	
		CI Anteil in %	[2,34; 3,09]	[22,40; 25,13]	[23,52; 26,87]	[22,72; 26,43]	[24,60; 28,92]	[18,89; 23,27]	[20,65; 25,52]	[12,15; 16,57]	[12,51; 17,19]	[23,51; 28,76]	[26,01; 31,92]	[21,82; 27,86]	[21,33; 27,52]	[16,06; 21,91]	[10,57; 15,84]	[10,76; 16,27]	[11,73; 17,60]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15338</i>	<i>13264</i>	<i>11995</i>	<i>10737</i>	<i>9767</i>	<i>8914</i>	<i>8042</i>	<i>7361</i>	<i>6677</i>	<i>6381</i>	<i>5997</i>	<i>5700</i>	<i>5383</i>	<i>5096</i>	<i>4829</i>	<i>4575</i>	<i>4304</i>	<i>4094</i>	
2004-1	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	3178	1641	1217	852	738	626	497	417	693	499	427	376	362	372	347	329		
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1645	701	524	378	346	341	279	204	233	173	149	137	126	159	133	130		
		Anteil in %	51,76	42,72	43,06	44,37	46,88	54,47	56,14	48,92	33,62	34,67	34,89	36,44	34,81	42,74	38,33	39,51		
		CI Anteil in %	[50,02; 53,50]	[40,32; 45,11]	[40,27; 45,84]	[41,03; 47,70]	[43,28; 50,49]	[50,57; 58,38]	[51,77; 60,50]	[44,12; 53,72]	[30,10; 37,14]	[30,49; 38,85]	[30,37; 39,42]	[31,57; 41,31]	[29,89; 39,72]	[37,71; 47,78]	[33,21; 43,45]	[34,22; 44,80]		
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	941	475	313	259	244	150	121	104	153	133	126	109	105	119	107	98		
		Anteil in %	29,61	28,95	25,72	30,40	33,06	23,96	24,35	24,94	22,08	26,65	29,51	28,99	29,01	31,99	30,84	29,79		
		CI Anteil in %	[28,02; 31,20]	[26,75; 31,14]	[23,26; 28,18]	[27,31; 33,49]	[29,67; 36,46]	[20,62; 27,31]	[20,57; 28,12]	[20,78; 29,10]	[18,99; 25,17]	[22,77; 30,54]	[25,18; 33,84]	[24,40; 33,58]	[24,32; 33,69]	[27,24; 36,74]	[25,97; 35,70]	[24,84; 34,74]		
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	592	465	380	215	148	135	97	109	307	193	152	130	131	94	107	101		
		Anteil in %	18,63	28,34	31,22	25,23	20,05	21,57	19,52	26,14	44,30	38,68	35,60	34,57	36,19	25,27	30,84	30,70		
		CI Anteil in %	[17,27; 19,98]	[26,16; 30,52]	[28,62; 33,83]	[22,32; 28,15]	[17,16; 22,95]	[18,34; 24,79]	[16,03; 23,01]	[21,92; 30,36]	[40,60; 48,00]	[34,40; 42,95]	[31,05; 40,14]	[29,76; 39,39]	[31,23; 41,15]	[20,85; 29,69]	[25,97; 35,70]	[25,71; 35,69]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6722</i>	<i>5979</i>	<i>5294</i>	<i>4783</i>	<i>4296</i>	<i>3854</i>	<i>3572</i>	<i>3250</i>	<i>3080</i>	<i>2873</i>	<i>2690</i>	<i>2532</i>	<i>2401</i>	<i>2263</i>	<i>2147</i>	<i>2032</i>	<i>1951</i>		

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2004-2	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	2145	1129	839	650	596	503	428	556	482	408	364	400	360	296	289				
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1222	473	333	245	218	208	160	195	157	139	134	143	142	114	116				
		Anteil in %	56,97	41,90	39,69	37,69	36,58	41,35	37,38	35,07	32,57	34,07	36,81	35,75	39,44	38,51	40,14				
		CI Anteil in %	[54,87; 59,07]	[39,02; 44,77]	[36,38; 43,00]	[33,96; 41,42]	[32,71; 40,45]	[37,04; 45,66]	[32,79; 41,97]	[31,10; 39,04]	[28,38; 36,76]	[29,46; 38,67]	[31,85; 41,77]	[31,05; 40,45]	[34,39; 44,50]	[32,96; 44,07]	[34,48; 45,80]				
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	562	339	239	200	150	171	148	158	155	146	128	151	134	113	106				
		Anteil in %	26,20	30,03	28,49	30,77	25,17	34,00	34,58	28,42	32,16	35,78	35,16	37,75	37,22	38,18	36,68				
		CI Anteil in %	[24,34; 28,06]	[27,35; 32,70]	[25,43; 31,54]	[27,22; 34,32]	[21,68; 28,65]	[29,85; 38,14]	[30,07; 39,09]	[24,66; 32,17]	[27,98; 36,33]	[31,13; 40,44]	[30,25; 40,08]	[32,99; 42,51]	[32,22; 42,22]	[32,63; 43,72]	[31,11; 42,24]				
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	361	317	267	205	228	124	120	203	170	123	102	106	84	69	67				
		Anteil in %	16,83	28,08	31,82	31,54	38,26	24,65	28,04	36,51	35,27	30,15	28,02	26,50	23,33	23,31	23,18				
		CI Anteil in %	[15,25; 18,41]	[25,46; 30,70]	[28,67; 34,98]	[27,96; 35,11]	[34,35; 42,16]	[20,88; 28,42]	[23,78; 32,30]	[32,51; 40,52]	[31,00; 39,54]	[25,69; 34,61]	[23,40; 32,64]	[22,17; 30,83]	[18,96; 27,71]	[18,49; 28,14]	[18,31; 28,06]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5209</i>	<i>4715</i>	<i>4298</i>	<i>3897</i>	<i>3506</i>	<i>3261</i>	<i>3038</i>	<i>2910</i>	<i>2710</i>	<i>2571</i>	<i>2446</i>	<i>2321</i>	<i>2204</i>	<i>2102</i>	<i>2005</i>	<i>1906</i>				
2005-1	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	2814	1477	1049	832	744	686	758	589	517	459	446	421	363	361					
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1656	680	442	360	381	314	304	255	253	257	238	226	182	190					
		Anteil in %	58,85	46,04	42,14	43,27	51,21	45,77	40,11	43,29	48,94	55,99	53,36	53,68	50,14	52,63					
		CI Anteil in %	[57,03; 60,67]	[43,50; 48,58]	[39,15; 45,12]	[39,90; 46,64]	[47,62; 54,80]	[42,04; 49,50]	[36,61; 43,60]	[39,29; 47,30]	[44,62; 53,25]	[51,45; 60,54]	[48,73; 58,00]	[48,91; 58,45]	[44,99; 55,29]	[47,47; 57,79]					
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	724	387	271	217	158	158	175	149	128	115	150	141	135	119					
		Anteil in %	25,73	26,20	25,83	26,08	21,24	23,03	23,09	25,30	24,76	25,05	33,63	33,49	37,19	32,96					
		CI Anteil in %	[24,11; 27,34]	[23,96; 28,45]	[23,18; 28,48]	[23,10; 29,07]	[18,30; 24,18]	[19,88; 26,19]	[20,09; 26,09]	[21,78; 28,81]	[21,03; 28,48]	[21,09; 29,02]	[29,24; 38,02]	[28,98; 38,01]	[32,21; 42,17]	[28,11; 37,82]					
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	434	410	336	255	205	214	279	185	136	87	58	54	46	52					
		Anteil in %	15,42	27,76	32,03	30,65	27,55	31,20	36,81	31,41	26,31	18,95	13,00	12,83	12,67	14,40					
		CI Anteil in %	[14,09; 16,76]	[25,47; 30,04]	[29,21; 34,86]	[27,51; 33,78]	[24,34; 30,77]	[27,73; 34,66]	[33,37; 40,24]	[27,66; 35,16]	[22,51; 30,10]	[15,36; 22,54]	[9,88; 16,13]	[9,63; 16,02]	[9,25; 16,10]	[10,78; 18,03]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7326</i>	<i>6819</i>	<i>6209</i>	<i>5519</i>	<i>4992</i>	<i>4584</i>	<i>4340</i>	<i>4066</i>	<i>3849</i>	<i>3623</i>	<i>3415</i>	<i>3216</i>	<i>3064</i>	<i>2915</i>	<i>2769</i>					
2005-2	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	2992	1771	1371	1092	984	1230	981	880	773	745	686	612	515						
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1632	760	597	482	426	468	335	296	289	323	278	275	234						
		Anteil in %	54,55	42,91	43,54	44,14	43,29	38,05	34,15	33,64	37,39	43,36	40,52	44,93	45,44						
		CI Anteil in %	[52,76; 56,33]	[40,61; 45,22]	[40,92; 46,17]	[41,19; 47,09]	[40,20; 46,39]	[35,33; 40,76]	[31,18; 37,12]	[30,51; 36,76]	[33,97; 40,80]	[39,79; 46,92]	[36,85; 44,20]	[40,99; 48,88]	[41,13; 49,74]						
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	811	599	460	384	336	379	341	302	306	280	269	218	179						
		Anteil in %	27,11	33,82	33,55	35,16	34,15	30,81	34,76	34,32	39,59	37,58	39,21	35,62	34,76						
		CI Anteil in %	[25,51; 28,70]	[31,62; 36,03]	[31,05; 36,05]	[32,33; 38,00]	[31,18; 37,11]	[28,23; 33,39]	[31,78; 37,74]	[31,18; 37,46]	[36,14; 43,04]	[34,10; 41,06]	[35,56; 42,87]	[31,82; 39,42]	[30,64; 38,87]						
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	549	412	314	226	222	383	305	282	178	142	139	119	102						
		Anteil in %	18,35	23,26	22,90	20,70	22,56	31,14	31,09	32,05	23,03	19,06	20,26	19,44	19,81						
		CI Anteil in %	[16,96; 19,74]	[21,30; 25,23]	[20,68; 25,13]	[18,29; 23,10]	[19,95; 25,17]	[28,55; 33,73]	[28,19; 33,99]	[28,96; 35,13]	[20,06; 26,00]	[16,24; 21,88]	[17,25; 23,27]	[16,31; 22,58]	[16,36; 23,25]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9778</i>	<i>8989</i>	<i>8164</i>	<i>7426</i>	<i>6790</i>	<i>6402</i>	<i>5933</i>	<i>5585</i>	<i>5240</i>	<i>4913</i>	<i>4579</i>	<i>4321</i>	<i>4101</i>	<i>3871</i>						
2006-1	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	3445	2010	1604	1443	1622	1332	1184	1001	1050	1015	865	745							
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1806	871	745	669	621	512	454	391	417	394	358	316							
		Anteil in %	52,42	43,33	46,45	46,36	38,29	38,44	38,34	39,06	39,71	38,82	41,39	42,42							
		CI Anteil in %	[50,76; 54,09]	[41,17; 45,50]	[44,00; 48,89]	[43,79; 48,94]	[35,92; 40,65]	[35,83; 41,05]	[35,57; 41,12]	[36,04; 42,08]	[36,75; 42,68]	[35,82; 41,82]	[38,10; 44,67]	[38,86; 45,97]							
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1029	697	512	448	451	415	374	334	406	407	305	274							
		Anteil in %	29,87	34,68	31,92	31,05	27,81	31,16	31,59	33,37	38,67	40,10	35,26	36,78							
		CI Anteil in %	[28,34; 31,40]	[32,60; 36,76]	[29,64; 34,20]	[28,66; 33,43]	[25,62; 29,99]	[28,67; 33,64]	[28,94; 34,24]	[30,44; 36,29]	[35,72; 41,61]	[37,08; 43,12]	[32,07; 38,45]	[33,31; 40,24]							
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	610	442	347	326	550	405	356	276	227	214	202	155							
		Anteil in %	17,71	21,99	21,63	22,59	33,91	30,41	30,07	27,57	21,62	21,08	23,35	20,81							
		CI Anteil in %	[16,43; 18,98]	[20,18; 23,80]	[19,62; 23,65]	[20,43; 24,75]	[31,60; 36,21]	[27,93; 32,88]	[27,45; 32,68]	[24,80; 30,34]	[19,13; 24,11]	[18,57; 23,59]	[20,53; 26,17]	[17,89; 23,72]							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11195</i>	<i>10505</i>	<i>9553</i>	<i>8754</i>	<i>8293</i>	<i>7702</i>	<i>7289</i>	<i>6827</i>	<i>6435</i>	<i>6016</i>	<i>5692</i>	<i>5332</i>	<i>5084</i>							

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2006-2	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	3587	2310	1818	2241	1836	1604	1387	1322	1199	1074	984									
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1712	1052	770	750	617	555	504	472	412	402	360									
		Anteil in %	47,73	45,54	42,35	33,47	33,61	34,60	36,34	35,70	34,36	37,43	36,59									
		CI Anteil in %	[46,09; 49,36]	[43,51; 47,57]	[40,08; 44,63]	[31,51; 35,42]	[31,44; 35,77]	[32,27; 36,93]	[33,81; 38,87]	[33,12; 38,29]	[31,67; 37,05]	[34,53; 40,33]	[33,57; 39,60]									
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1062	700	607	590	535	456	408	471	465	362	335									
		Anteil in %	29,61	30,30	33,39	26,33	29,14	28,43	29,42	35,63	38,78	33,71	34,04									
		CI Anteil in %	[28,11; 31,10]	[28,43; 32,18]	[31,22; 35,56]	[24,50; 28,15]	[27,06; 31,22]	[26,22; 30,64]	[27,02; 31,81]	[33,05; 38,21]	[36,02; 41,54]	[30,88; 36,53]	[31,08; 37,01]									
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	813	558	441	901	684	593	475	379	322	310	289									
		Anteil in %	22,67	24,16	24,26	40,21	37,25	36,97	34,25	28,67	26,86	28,86	29,37									
		CI Anteil in %	[21,29; 24,04]	[22,41; 25,90]	[22,29; 26,23]	[38,17; 42,24]	[35,04; 39,47]	[34,61; 39,33]	[31,75; 36,74]	[26,23; 31,11]	[24,35; 29,37]	[26,15; 31,58]	[26,52; 32,22]									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>13791</i>	<i>12613</i>	<i>11771</i>	<i>10718</i>	<i>10080</i>	<i>9390</i>	<i>8865</i>	<i>8292</i>	<i>7821</i>	<i>7374</i>	<i>6965</i>									
2007-1	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	4195	2538	3008	2383	2097	1907	1720	1505	1303	1189										
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	2126	1095	1021	840	786	694	668	550	513	478										
		Anteil in %	50,68	43,14	33,94	35,25	37,48	36,39	38,84	36,54	39,37	40,20										
		CI Anteil in %	[49,17; 52,19]	[41,22; 45,07]	[32,25; 35,64]	[33,33; 37,17]	[35,41; 39,55]	[34,23; 38,55]	[36,53; 41,14]	[34,11; 38,98]	[36,72; 42,02]	[37,41; 42,99]										
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1139	768	748	635	529	475	534	490	354	327										
		Anteil in %	27,15	30,26	24,87	26,65	25,23	24,91	31,05	32,56	27,17	27,50										
		CI Anteil in %	[25,81; 28,50]	[28,47; 32,05]	[23,32; 26,41]	[24,87; 28,42]	[23,37; 27,09]	[22,97; 26,85]	[28,86; 33,23]	[30,19; 34,93]	[24,75; 29,58]	[24,96; 30,04]										
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	930	675	1239	908	782	738	518	465	436	384										
		Anteil in %	22,17	26,60	41,19	38,10	37,29	38,70	30,12	30,90	33,46	32,30										
		CI Anteil in %	[20,91; 23,43]	[24,88; 28,32]	[39,43; 42,95]	[36,15; 40,05]	[35,22; 39,36]	[36,51; 40,89]	[27,95; 32,29]	[28,56; 33,23]	[30,90; 36,02]	[29,64; 34,96]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>17190</i>	<i>16142</i>	<i>14666</i>	<i>13722</i>	<i>12823</i>	<i>12070</i>	<i>11283</i>	<i>10635</i>	<i>10034</i>	<i>9520</i>										
2007-2	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	2440	1731	1233	1112	971	876	861	744	640											
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1386	595	432	396	347	331	300	283	237											
		Anteil in %	56,80	34,37	35,04	35,61	35,74	37,79	34,84	38,04	37,03											
		CI Anteil in %	[54,84; 58,77]	[32,14; 36,61]	[32,37; 37,70]	[32,80; 38,43]	[32,72; 38,75]	[34,57; 41,00]	[31,66; 38,03]	[34,55; 41,53]	[33,29; 40,78]											
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	623	531	380	336	290	273	287	233	216											
		Anteil in %	25,53	30,68	30,82	30,22	29,87	31,16	33,33	31,32	33,75											
		CI Anteil in %	[23,80; 27,26]	[28,50; 32,85]	[28,24; 33,40]	[27,52; 32,92]	[26,99; 32,75]	[28,10; 34,23]	[30,18; 36,48]	[27,98; 34,65]	[30,08; 37,42]											
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	431	605	421	380	334	272	274	228	187											
		Anteil in %	17,66	34,95	34,14	34,17	34,40	31,05	31,82	30,65	29,22											
		CI Anteil in %	[16,15; 19,18]	[32,70; 37,20]	[31,50; 36,79]	[31,38; 36,96]	[31,41; 37,39]	[27,98; 34,12]	[28,71; 34,94]	[27,33; 33,96]	[25,69; 32,74]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>9940</i>	<i>9118</i>	<i>8435</i>	<i>7735</i>	<i>7205</i>	<i>6731</i>	<i>6317</i>	<i>5936</i>	<i>5626</i>											
2008-1	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	2724	1613	1338	1148	1080	985	856	763												
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1332	618	492	440	429	380	334	340												
		Anteil in %	48,90	38,31	36,77	38,33	39,72	38,58	39,02	44,56												
		CI Anteil in %	[47,02; 50,78]	[35,94; 40,69]	[34,19; 39,36]	[35,51; 41,14]	[36,80; 42,64]	[35,54; 41,62]	[35,75; 42,29]	[41,03; 48,09]												
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	816	592	508	388	403	364	297	243												
		Anteil in %	29,96	36,70	37,97	33,80	37,31	36,95	34,70	31,85												
		CI Anteil in %	[28,24; 31,68]	[34,35; 39,05]	[35,37; 40,57]	[31,06; 36,54]	[34,43; 40,20]	[33,94; 39,97]	[31,51; 37,89]	[28,54; 35,16]												
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	576	403	338	320	248	241	225	180												
		Anteil in %	21,15	24,98	25,26	27,87	22,96	24,47	26,29	23,59												
		CI Anteil in %	[19,61; 22,68]	[22,87; 27,10]	[22,93; 27,59]	[25,28; 30,47]	[20,45; 25,47]	[21,78; 27,15]	[23,33; 29,24]	[20,58; 26,61]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>9074</i>	<i>8463</i>	<i>7733</i>	<i>7156</i>	<i>6701</i>	<i>6331</i>	<i>5959</i>	<i>5643</i>												

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2008-2	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	1798	1055	841	788	739	597	538												
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	865	401	308	272	278	202	196												
		Anteil in %	48,11	38,01	36,62	34,52	37,62	33,84	36,43												
		CI Anteil in %	[45,80; 50,42]	[35,08; 40,94]	[33,37; 39,88]	[31,20; 37,84]	[34,12; 41,11]	[30,04; 37,63]	[32,36; 40,50]												
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	552	384	263	296	250	229	186												
		Anteil in %	30,70	36,40	31,27	37,56	33,83	38,36	34,57												
		CI Anteil in %	[28,57; 32,83]	[33,49; 39,30]	[28,14; 34,41]	[34,18; 40,95]	[30,42; 37,24]	[34,45; 42,26]	[30,55; 38,60]												
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	381	270	220	220	211	166	156												
		Anteil in %	21,19	25,59	32,10	27,92	28,55	27,81	29,00												
		CI Anteil in %	[19,30; 23,08]	[22,96; 28,23]	[28,95; 35,26]	[24,78; 31,05]	[25,29; 31,81]	[24,21; 31,40]	[25,16; 32,83]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>6320</i>	<i>5851</i>	<i>5399</i>	<i>5008</i>	<i>4674</i>	<i>4394</i>	<i>4147</i>												
2009-1	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	1659	971	907	800	724	629													
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	855	338	305	283	267	232													
		Anteil in %	51,54	34,81	33,63	35,38	36,88	36,88													
		CI Anteil in %	[49,13; 53,94]	[31,81; 37,81]	[30,55; 36,70]	[32,06; 38,69]	[33,36; 40,40]	[33,11; 40,66]													
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	509	361	372	321	255	226													
		Anteil in %	30,68	37,18	41,01	40,13	35,22	35,93													
		CI Anteil in %	[28,46; 32,90]	[34,14; 40,22]	[37,81; 44,22]	[36,73; 43,52]	[31,74; 38,70]	[32,18; 39,68]													
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	295	272	230	196	202	171													
		Anteil in %	17,78	28,01	25,36	24,50	27,90	27,19													
		CI Anteil in %	[15,94; 19,62]	[25,19; 30,84]	[22,53; 28,19]	[21,52; 27,48]	[24,63; 31,17]	[23,71; 30,67]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>5299</i>	<i>4907</i>	<i>4513</i>	<i>4221</i>	<i>3942</i>	<i>3724</i>													
2009-2	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	1602	956	835	722	674														
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	805	372	300	264	280														
		Anteil in %	50,25	38,91	35,93	36,57	41,54														
		CI Anteil in %	[47,80; 52,70]	[35,82; 42,00]	[32,67; 39,18]	[33,05; 40,08]	[37,82; 45,27]														
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	484	356	310	244	199														
		Anteil in %	30,21	37,24	37,13	33,80	29,53														
		CI Anteil in %	[27,96; 32,46]	[34,17; 40,30]	[33,85; 40,40]	[30,34; 37,25]	[26,08; 32,97]														
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	313	228	225	214	195														
		Anteil in %	19,54	23,85	26,95	29,64	28,93														
		CI Anteil in %	[17,60; 21,48]	[21,15; 26,55]	[23,93; 29,96]	[26,31; 32,97]	[25,51; 32,36]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>5705</i>	<i>5205</i>	<i>4802</i>	<i>4483</i>	<i>4208</i>														
2010-1	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	1907	1141	918	772															
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	1014	508	397	325															
		Anteil in %	53,17	44,52	43,25	42,10															
		CI Anteil in %	[50,93; 55,41]	[41,64; 47,41]	[40,04; 46,45]	[38,61; 45,58]															
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	594	433	331	263															
		Anteil in %	31,15	37,95	36,06	34,07															
		CI Anteil in %	[29,07; 33,23]	[35,13; 40,77]	[32,95; 39,16]	[30,72; 37,41]															
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	299	200	190	184															
		Anteil in %	15,68	17,53	20,70	23,83															
		CI Anteil in %	[14,05; 17,31]	[15,32; 19,74]	[18,07; 23,32]	[20,83; 26,84]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>6363</i>	<i>5859</i>	<i>5409</i>	<i>5055</i>															

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Diabetes-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-2	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	1822	997	887																
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	927	387	360																
		Anteil in %		50,88	38,82	40,59															
		CI Anteil in %		[48,58; 53,17]	[35,79; 41,84]	[37,35; 43,82]															
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	575	385	299																
		Anteil in %		31,56	38,62	33,71															
		CI Anteil in %		[29,42; 33,69]	[35,59; 41,64]	[30,60; 36,82]															
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	320	225	228																
		Anteil in %		17,56	22,57	25,70															
		CI Anteil in %		[15,82; 19,31]	[19,97; 25,16]	[22,83; 28,58]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>	<i>6400</i>	<i>5912</i>	<i>5443</i>																
2011-1	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	1752	990																	
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	957	429																	
		Anteil in %		54,62	43,33																
		CI Anteil in %		[52,29; 56,96]	[40,24; 46,42]																
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	432	286																	
		Anteil in %		24,66	28,89																
		CI Anteil in %		[22,64; 26,68]	[26,06; 31,71]																
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	363	275																	
		Anteil in %		20,72	27,78																
		CI Anteil in %		[18,82; 22,62]	[24,99; 30,57]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>	<i>6098</i>	<i>5609</i>																	
2011-2	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	1313																		
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	692																		
		Anteil in %		52,70																	
		CI Anteil in %		[50,00; 55,41]																	
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	337																		
		Anteil in %		25,67																	
		CI Anteil in %		[23,30; 28,03]																	
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	284																		
		Anteil in %		21,63																	
		CI Anteil in %		[19,40; 23,86]																	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>	<i>5157</i>																		
2012-1	Patienten mit empfohlener Diabetes-Schulung (auswertbar*)	Anzahl																			
	Schulung wahrgenommen	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl																			
		Anteil in %																			
		CI Anteil in %																			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>																			

In der Tabelle 3.4.2 ist für die Berichtshalbjahre ausgewiesen, inwieweit die Patienten seit der letzten Dokumentation entweder an einer **empfohlener Hypertonie-Schulung** teilgenommen haben (oder aktuell keine Möglichkeit zur Teilnahme hatten) oder nicht teilgenommen haben. Diese Darstellung kann folglich als Indikator für die *Compliance der Patienten* - also als kooperatives Verhalten des Patienten im Rahmen der vorgeschlagenen Therapien - interpretiert werden. Für das Beitrittsjahr können – mangels einer vorherigen Dokumentation – keine Werte ausgewiesen werden.

Zu beachten ist bei dieser Auswertung, dass es durch die 9. Risikostrukturausgleich-Änderungsverordnung zu einer Änderung im Dokumentationsbogen kam, die keine direkte Vergleichbarkeit mehr zulässt. Gemäß den Kriterien des BVA sind die Schulungsdaten aus „alten“ und „neuen“ Dokumentationsbögen in einer gemeinsamen Zeile darzustellen. Folglich sind bei der Interpretation der Tabellenzeilen „Schulung wahrgenommen“, „Schulung aktuell nicht möglich“ und „Schulung nicht wahrgenommen“ entsprechende Einschränkungen für die Vergleichbarkeit über die Berichtshalbjahre gegeben.⁸

Zunächst wird unter „Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar)“ die auswertbare Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und denen laut aktueller Dokumentation im Vorgängerhalbjahr eine Hypertonieschulung empfohlen wurde. Schließlich wird dargestellt, wie viele dieser Patienten mit empfohlener Hypertonieschulung die Schulung wahrgenommen haben, eine empfohlene Schulung ohne plausible Begründung nicht wahrgenommen haben bzw. bei wie vielen Patienten eine Teilnahme an der Schulung aktuell nicht möglich war.

⁸ Für den Berichtszeitraum *vor* der Änderung, d.h. Berichtshalbjahre bis einschließlich 2004-1, ist auszuweisen, ob eine Schulung durchgeführt wurde oder aus plausiblen Grund aktuell nicht möglich war oder aus plausiblen Grund nicht wahrgenommen wurde (“Compliance”) oder ob sie ohne Begründung abgelehnt wurde. Weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeiten waren veranlasste und nicht erforderliche Schulungen. Für den Berichtszeitraum *nach* der Änderung, d.h. ab dem Berichtshalbjahr 2004-2, ist auszuweisen, ob eine empfohlene Schulung wahrgenommen wurde oder die Wahrnehmung aktuell nicht möglich war (“Compliance”) oder ob keine Teilnahme an der Schulung erfolgte. Eine weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeit war, dass bei der letzten Dokumentation keine Schulung empfohlen wurde.

In der Kohorte 2003-1 lagen zu Beginn des zweiten Beitrittsjahres für 4443 Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung auswertbare Angaben zur Wahrnehmung einer Schulung vor. 497 dieser auswertbaren Patienten nahmen die empfohlene Schulung wahr, dagegen hatten 82,35 Prozent keine Möglichkeit zur Teilnahme. 6,46 Prozent nahmen die Schulung ohne plausiblen Grund nicht wahr.

Tabelle 3.4.2 Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen

* Auswertbar sind diejenigen Patienten, denen im vorangegangenen Halbjahr eine Schulung empfohlen wurde. Davon wird dann ausgegangen, wenn in der Folgedokumentation mindestens eine der Angaben „ja“, „nein“ oder „war aktuell nicht möglich“ zur Wahrnehmung empfohlener Schulungen dokumentiert war.

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	4443	4441	3181	2063	1581	1139	898	753	716	688	800	602	671	546	506	484	467	445	
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	497	664	450	392	309	256	190	190	191	162	164	219	174	175	127	158	164	164	141
		Anteil in %	11,19	14,95	14,15	19,00	19,54	22,48	21,16	25,37	22,63	23,84	27,38	28,90	26,08	23,26	31,23	33,88	35,12	31,69	
		CI Anteil in %	[10,26; 12,11]	[13,90; 16,00]	[12,94; 15,36]	[17,31; 20,69]	[17,59; 21,50]	[20,05; 24,90]	[18,49; 23,83]	[22,26; 28,48]	[19,56; 25,69]	[20,65; 27,02]	[24,28; 30,47]	[25,28; 32,53]	[22,76; 29,41]	[19,71; 26,81]	[27,18; 35,27]	[29,66; 38,11]	[30,78; 39,45]	[27,36; 36,01]	
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3659	3564	1560	822	580	422	234	202	148	139	180	168	150	141	141	125	117	115	142
		Anteil in %	82,35	80,25	49,04	39,84	36,69	37,05	26,06	26,83	20,67	20,20	22,50	27,91	22,35	25,82	24,70	24,17	24,63	31,91	
		CI Anteil in %	[81,23; 83,48]	[79,08; 81,42]	[47,30; 50,78]	[37,73; 41,96]	[34,31; 39,06]	[34,24; 39,86]	[23,19; 28,93]	[23,66; 29,99]	[17,70; 23,64]	[17,20; 23,21]	[19,60; 25,40]	[24,32; 31,49]	[19,20; 25,51]	[22,15; 29,50]	[20,94; 28,47]	[20,36; 27,99]	[20,71; 28,54]	[27,57; 36,25]	
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	287	213	1171	849	692	461	474	360	406	385	401	260	346	278	223	203	188	162	
		Anteil in %	6,46	4,80	36,81	41,15	43,77	40,47	52,78	47,81	56,70	55,96	50,13	43,19	51,56	50,92	44,07	41,94	40,26	36,40	
		CI Anteil in %	[5,74; 7,18]	[4,17; 5,42]	[35,14; 38,49]	[39,03; 43,28]	[41,32; 46,22]	[37,62; 43,33]	[49,52; 56,05]	[44,24; 51,38]	[53,07; 60,34]	[52,25; 59,67]	[46,66; 53,59]	[39,23; 47,15]	[47,78; 55,35]	[46,72; 55,11]	[39,74; 48,40]	[37,54; 46,34]	[35,80; 44,71]	[31,93; 40,88]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18532</i>	<i>16919</i>	<i>15229</i>	<i>13819</i>	<i>12524</i>	<i>11575</i>	<i>10657</i>	<i>9051</i>	<i>8357</i>	<i>7654</i>	<i>7302</i>	<i>6797</i>	<i>6413</i>	<i>6084</i>	<i>5724</i>	<i>5377</i>	<i>5082</i>	<i>4817</i>	<i>4564</i>	
2003-2	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	4124	3309	2194	1681	1269	1035	904	782	687	851	684	598	490	452	408	389	373		
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	677	302	213	179	197	140	134	121	141	128	85	88	75	75	110	98	83		
		Anteil in %	16,42	9,13	9,71	10,65	15,52	13,53	14,82	15,47	20,52	15,04	12,43	14,72	15,31	16,59	26,96	25,19	22,25		
		CI Anteil in %	[15,29; 17,55]	[8,15; 10,11]	[8,47; 10,95]	[9,17; 12,12]	[13,53; 17,52]	[11,44; 15,61]	[12,51; 17,14]	[12,94; 18,01]	[17,50; 23,55]	[12,64; 17,44]	[9,95; 14,90]	[11,87; 17,56]	[12,11; 18,50]	[13,16; 20,03]	[22,65; 31,27]	[20,87; 29,51]	[18,03; 26,48]		
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	3242	1556	948	733	535	440	311	262	218	330	261	241	220	232	208	196	207		
		Anteil in %	78,61	47,02	43,21	43,60	42,16	42,51	34,40	33,50	31,73	38,78	38,16	40,30	44,90	51,33	50,98	50,39	55,50		
		CI Anteil in %	[77,36; 79,86]	[45,32; 48,72]	[41,14; 45,28]	[41,23; 45,98]	[39,44; 44,88]	[39,50; 45,53]	[31,30; 37,50]	[30,19; 36,81]	[28,25; 35,22]	[35,50; 42,05]	[34,51; 41,80]	[36,37; 44,24]	[40,49; 49,31]	[46,71; 55,94]	[46,12; 55,84]	[45,41; 55,36]	[50,45; 60,55]		
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	205	1451	1033	769	537	455	459	399	328	393	338	269	195	145	90	95	83		
		Anteil in %	4,97	43,85	47,08	45,75	42,32	43,96	50,77	51,02	47,74	46,18	49,42	44,98	39,80	32,08	22,06	24,42	22,25		
		CI Anteil in %	[4,31; 5,63]	[42,16; 45,54]	[44,99; 49,17]	[43,36; 48,13]	[39,60; 45,04]	[40,94; 46,99]	[47,51; 54,04]	[47,52; 54,53]	[44,01; 51,48]	[42,83; 49,53]	[45,67; 53,16]	[40,99; 48,97]	[35,46; 44,13]	[27,77; 36,39]	[18,03; 26,09]	[20,15; 28,70]	[18,03; 26,48]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15338</i>	<i>13264</i>	<i>11995</i>	<i>10737</i>	<i>9767</i>	<i>8914</i>	<i>8042</i>	<i>7361</i>	<i>6677</i>	<i>6381</i>	<i>5997</i>	<i>5700</i>	<i>5383</i>	<i>5096</i>	<i>4829</i>	<i>4575</i>	<i>4304</i>	<i>4094</i>		
2004-1	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	2315	1374	1004	728	629	489	389	347	563	369	316	266	249	241	242	227			
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	237	118	91	107	114	83	66	71	65	46	31	33	28	52	42	40			
		Anteil in %	10,24	8,59	9,06	14,70	18,12	16,97	16,97	20,46	11,55	12,47	9,81	12,41	11,24	21,58	17,36	17,62			
		CI Anteil in %	[9,00; 11,47]	[7,11; 10,07]	[7,29; 10,84]	[12,12; 17,27]	[15,11; 21,14]	[13,64; 20,30]	[13,23; 20,70]	[16,21; 24,71]	[8,90; 14,19]	[9,09; 15,84]	[6,53; 13,09]	[8,44; 16,38]	[7,31; 15,18]	[16,37; 26,78]	[12,57; 22,14]	[12,65; 22,59]			
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	1166	623	434	319	287	183	167	137	154	121	121	97	87	85	84	80			
		Anteil in %	50,37	45,34	43,23	43,82	45,63	37,42	42,93	39,48	27,35	32,79	38,29	36,47	34,94	35,27	34,71	35,24			
		CI Anteil in %	[48,33; 52,40]	[42,71; 47,98]	[40,16; 46,29]	[40,21; 47,43]	[41,73; 49,52]	[33,13; 41,72]	[38,01; 47,86]	[34,33; 44,63]	[23,67; 31,04]	[27,99; 37,59]	[32,92; 43,66]	[30,67; 42,26]	[29,01; 40,87]	[29,22; 41,31]	[28,70; 40,72]	[29,01; 41,47]			
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	912	633	479	302	228	223	156	139	344	202	164	136	134	104	116	107			
		Anteil in %	39,40	46,07	47,71	41,48	36,25	45,60	40,10	40,06	61,10	54,74	51,90	51,13	53,82	43,15	47,93	47,14			
		CI Anteil in %	[37,40; 41,39]	[43,43; 48,71]	[44,62; 50,80]	[37,90; 45,07]	[32,49; 40,01]	[41,18; 50,02]	[35,23; 44,98]	[34,89; 45,22]	[57,07; 65,13]	[49,66; 59,83]	[46,38; 57,42]	[45,11; 57,15]	[47,61; 60,02]	[36,89; 49,42]	[41,63; 54,24]	[40,63; 53,64]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6722</i>	<i>5979</i>	<i>5294</i>	<i>4783</i>	<i>4296</i>	<i>3854</i>	<i>3572</i>	<i>3250</i>	<i>3080</i>	<i>2873</i>	<i>2690</i>	<i>2532</i>	<i>2401</i>	<i>2263</i>	<i>2147</i>	<i>2032</i>	<i>1951</i>			

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2004-2	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	1400	914	705	538	481	393	361	440	381	308	259	316	269	224	219				
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	194	108	91	91	65	62	50	66	60	51	48	58	61	50	51				
		Anteil in %	13,86	11,82	12,91	16,91	13,51	15,78	13,85	15,00	15,75	16,56	18,53	18,35	22,68	22,32	23,29				
		CI Anteil in %	[12,05; 15,67]	[9,72; 13,91]	[10,43; 15,38]	[13,74; 20,09]	[10,46; 16,57]	[12,17; 19,38]	[10,28; 17,42]	[11,66; 18,34]	[12,09; 19,41]	[12,40; 20,72]	[13,79; 23,27]	[14,08; 22,63]	[17,66; 27,69]	[16,86; 27,79]	[17,68; 28,90]				
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	502	328	248	179	142	109	96	141	130	123	106	143	119	102	97				
		Anteil in %	35,86	35,89	35,18	33,27	29,52	27,74	26,59	32,05	34,12	39,94	40,93	45,25	44,24	45,54	44,29				
		CI Anteil in %	[33,34; 38,37]	[32,77; 39,00]	[31,65; 38,70]	[29,29; 37,26]	[25,44; 33,60]	[23,30; 32,17]	[22,03; 31,16]	[27,68; 36,41]	[29,35; 38,89]	[34,46; 45,41]	[34,93; 46,93]	[39,76; 50,75]	[38,29; 50,18]	[39,00; 52,07]	[37,70; 50,89]				
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	704	478	366	268	274	222	215	233	191	134	105	115	89	72	71				
		Anteil in %	50,29	52,30	51,91	49,81	56,96	56,49	59,56	52,95	50,13	43,51	40,54	36,39	33,09	32,14	32,42				
		CI Anteil in %	[47,67; 52,91]	[49,06; 55,54]	[48,22; 55,61]	[45,59; 54,04]	[52,54; 61,39]	[51,58; 61,40]	[54,49; 64,63]	[48,29; 57,62]	[45,10; 55,16]	[37,96; 49,05]	[34,55; 46,53]	[31,08; 41,71]	[27,45; 38,72]	[26,01; 38,27]	[26,21; 38,63]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5209</i>	<i>4715</i>	<i>4298</i>	<i>3897</i>	<i>3506</i>	<i>3261</i>	<i>3038</i>	<i>2910</i>	<i>2710</i>	<i>2571</i>	<i>2446</i>	<i>2321</i>	<i>2204</i>	<i>2102</i>	<i>2005</i>	<i>1906</i>				
2005-1	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	1941	1194	876	629	540	521	611	411	344	264	264	249	216	211					
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	248	147	135	77	99	94	101	70	73	66	71	85	61	63					
		Anteil in %	12,78	12,31	15,41	12,24	18,33	18,04	16,53	17,03	21,22	25,00	26,89	34,14	28,24	29,86					
		CI Anteil in %	[11,29; 14,26]	[10,45; 14,18]	[13,02; 17,80]	[9,68; 14,81]	[15,07; 21,60]	[14,74; 21,35]	[13,58; 19,48]	[13,39; 20,67]	[16,89; 25,55]	[19,77; 30,23]	[21,53; 32,25]	[28,24; 40,04]	[22,22; 34,26]	[23,67; 36,05]					
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	680	400	249	189	141	122	132	106	96	73	93	91	91	84					
		Anteil in %	35,03	33,50	28,42	30,05	26,11	23,42	21,60	25,79	27,91	27,65	35,23	36,55	42,13	39,81					
		CI Anteil in %	[32,91; 37,16]	[30,82; 36,18]	[25,44; 31,41]	[26,46; 33,63]	[22,40; 29,82]	[19,78; 27,06]	[18,34; 24,87]	[21,56; 30,03]	[23,16; 32,65]	[22,25; 33,06]	[29,45; 41,00]	[30,55; 42,54]	[35,53; 48,73]	[33,19; 46,43]					
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1013	647	492	363	300	305	378	235	175	125	100	73	64	64					
		Anteil in %	52,19	54,19	56,16	57,71	55,56	58,54	61,87	57,18	50,87	47,35	37,88	29,32	29,63	30,33					
		CI Anteil in %	[49,97; 54,41]	[51,36; 57,01]	[52,88; 59,45]	[53,85; 61,57]	[51,36; 59,75]	[54,31; 62,78]	[58,01; 65,72]	[52,39; 61,97]	[45,58; 56,16]	[41,31; 53,38]	[32,02; 43,74]	[23,65; 34,98]	[23,53; 35,73]	[24,11; 36,55]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7326</i>	<i>6819</i>	<i>6209</i>	<i>5519</i>	<i>4992</i>	<i>4584</i>	<i>4340</i>	<i>4066</i>	<i>3849</i>	<i>3623</i>	<i>3415</i>	<i>3216</i>	<i>3064</i>	<i>2915</i>	<i>2769</i>					
2005-2	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	2009	1352	1014	833	731	953	732	671	491	451	449	404	363						
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	278	173	140	105	104	135	99	89	75	75	94	87	95						
		Anteil in %	13,84	12,80	13,81	12,61	14,23	14,17	13,52	13,26	15,27	16,63	20,94	21,53	26,17						
		CI Anteil in %	[12,33; 15,35]	[11,01; 14,58]	[11,68; 15,93]	[10,35; 14,86]	[11,69; 16,76]	[11,95; 16,38]	[11,05; 16,00]	[10,70; 15,83]	[12,09; 18,46]	[13,19; 20,07]	[17,17; 24,70]	[17,52; 25,55]	[21,64; 30,70]						
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	722	529	414	364	286	330	257	250	209	184	185	172	136						
		Anteil in %	35,94	39,13	40,83	43,70	39,12	34,63	35,11	37,26	42,57	40,80	41,20	42,57	37,47						
		CI Anteil in %	[33,84; 38,04]	[36,52; 41,73]	[37,80; 43,86]	[40,33; 47,07]	[35,58; 42,66]	[31,61; 37,65]	[31,65; 38,57]	[33,60; 40,92]	[38,19; 46,94]	[36,26; 45,34]	[36,64; 45,76]	[37,75; 47,40]	[32,48; 42,45]						
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1009	650	460	364	341	488	376	332	207	192	170	145	132						
		Anteil in %	50,22	48,08	45,36	43,70	46,65	51,21	51,37	49,48	42,16	42,57	37,86	35,89	36,36						
		CI Anteil in %	[48,04; 52,41]	[45,41; 50,74]	[42,30; 48,43]	[40,33; 47,07]	[43,03; 50,27]	[48,03; 54,38]	[47,74; 54,99]	[45,69; 53,26]	[37,79; 46,53]	[38,00; 47,14]	[33,37; 42,35]	[31,21; 40,57]	[31,41; 41,32]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9778</i>	<i>8989</i>	<i>8164</i>	<i>7426</i>	<i>6790</i>	<i>6402</i>	<i>5933</i>	<i>5585</i>	<i>5240</i>	<i>4913</i>	<i>4579</i>	<i>4321</i>	<i>4101</i>	<i>3871</i>						
2006-1	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	2350	1433	1159	1078	1271	974	862	693	698	669	597	525							
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	386	249	216	236	171	134	99	107	97	117	108	96							
		Anteil in %	16,43	17,38	18,64	21,89	13,45	13,76	11,48	15,44	13,90	17,49	18,09	18,29							
		CI Anteil in %	[14,93; 17,92]	[15,41; 19,34]	[16,39; 20,88]	[19,42; 24,36]	[11,58; 15,33]	[11,59; 15,92]	[9,36; 13,61]	[12,75; 18,13]	[11,33; 16,46]	[14,61; 20,37]	[15,00; 21,18]	[14,98; 21,60]							
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	896	520	381	346	385	307	290	232	272	253	210	197							
		Anteil in %	38,13	36,29	32,87	32,10	30,29	31,52	33,64	33,48	38,97	37,82	35,18	37,52							
		CI Anteil in %	[36,16; 40,09]	[33,80; 38,78]	[30,17; 35,58]	[29,31; 34,88]	[27,76; 32,82]	[28,60; 34,44]	[30,49; 36,80]	[29,96; 36,99]	[35,35; 42,59]	[34,14; 41,50]	[31,34; 39,01]	[33,38; 41,67]							
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1068	664	562	496	715	533	473	354	329	299	279	232							
		Anteil in %	45,45	46,34	48,49	46,01	56,25	54,72	54,87	51,08	47,13	44,69	46,73	44,19							
		CI Anteil in %	[43,43; 47,46]	[43,75; 48,92]	[45,61; 51,37]	[43,03; 48,99]	[53,53; 58,98]	[51,60; 57,85]	[51,55; 58,20]	[47,36; 54,81]	[43,43; 50,84]	[40,92; 48,46]	[42,73; 50,74]	[39,94; 48,44]							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11195</i>	<i>10505</i>	<i>9553</i>	<i>8754</i>	<i>8293</i>	<i>7702</i>	<i>7289</i>	<i>6827</i>	<i>6435</i>	<i>6016</i>	<i>5692</i>	<i>5332</i>	<i>5084</i>							

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr		
2006-2	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	2188	1511	1214	1748	1352	1197	950	912	793	704	651									
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	251	160	133	151	110	102	88	99	101	91	81									
		Anteil in %	11,47	10,59	10,96	8,64	8,14	8,52	9,26	10,86	12,74	12,93	12,44									
		CI Anteil in %	[10,14; 12,81]	[9,04; 12,14]	[9,20; 12,71]	[7,32; 9,96]	[6,68; 9,59]	[6,94; 10,10]	[7,42; 11,11]	[8,84; 12,88]	[10,41; 15,06]	[10,45; 15,41]	[9,90; 14,98]									
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	691	411	329	515	421	376	320	332	308	257	236									
		Anteil in %	31,58	27,20	27,10	29,46	31,14	31,41	33,68	36,40	38,84	36,51	36,25									
		CI Anteil in %	[29,63; 33,53]	[24,96; 29,45]	[24,60; 29,60]	[27,32; 31,60]	[28,67; 33,61]	[28,78; 34,04]	[30,68; 36,69]	[33,28; 39,53]	[35,45; 42,23]	[32,95; 40,06]	[32,56; 39,95]									
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1246	940	752	1082	821	719	542	481	384	356	334									
		Anteil in %	56,95	62,21	61,94	61,90	60,72	60,07	57,05	52,74	48,42	50,57	51,31									
		CI Anteil in %	[54,87; 59,02]	[59,76; 64,66]	[59,21; 64,68]	[59,62; 64,18]	[58,12; 63,33]	[57,29; 62,84]	[53,90; 60,20]	[49,50; 55,98]	[44,94; 51,90]	[46,87; 54,26]	[47,46; 55,15]									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>13791</i>	<i>12613</i>	<i>11771</i>	<i>10718</i>	<i>10080</i>	<i>9390</i>	<i>8865</i>	<i>8292</i>	<i>7821</i>	<i>7374</i>	<i>6965</i>									
2007-1	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	2421	1628	2224	1679	1517	1361	1232	1086	921	815										
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	310	186	183	175	171	154	135	162	150	130										
		Anteil in %	12,80	11,43	8,23	10,42	11,27	11,32	10,96	14,92	16,29	15,95										
		CI Anteil in %	[11,47; 14,14]	[9,88; 12,97]	[7,09; 9,37]	[8,96; 11,88]	[9,68; 12,86]	[9,63; 13,00]	[9,21; 12,70]	[12,80; 17,04]	[13,90; 18,67]	[13,44; 18,47]										
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	632	416	538	453	421	344	427	362	256	245										
		Anteil in %	26,10	25,55	24,19	26,98	27,75	25,28	34,66	33,33	27,80	30,06										
		CI Anteil in %	[24,35; 27,85]	[23,43; 27,67]	[22,41; 25,97]	[24,86; 29,10]	[25,50; 30,01]	[22,97; 27,59]	[32,00; 37,32]	[30,53; 36,14]	[24,90; 30,69]	[26,91; 33,21]										
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	1479	1026	1503	1051	925	863	670	562	515	440										
		Anteil in %	61,09	63,02	67,58	62,60	60,98	63,41	54,38	51,75	55,92	53,99										
		CI Anteil in %	[59,15; 63,03]	[60,68; 65,37]	[65,64; 69,53]	[60,28; 64,91]	[58,52; 63,43]	[60,85; 65,97]	[51,60; 57,17]	[48,78; 54,72]	[52,71; 59,13]	[50,56; 57,41]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>17190</i>	<i>16142</i>	<i>14666</i>	<i>13722</i>	<i>12823</i>	<i>12070</i>	<i>11283</i>	<i>10635</i>	<i>10034</i>	<i>9520</i>										
2007-2	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	1361	1289	884	808	673	622	612	520	459											
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	214	123	97	89	85	75	93	94	76											
		Anteil in %	15,72	9,54	10,97	11,01	12,63	12,06	15,20	18,08	16,56											
		CI Anteil in %	[13,79; 17,66]	[7,94; 11,15]	[8,91; 13,03]	[8,85; 13,17]	[10,12; 15,14]	[9,50; 14,62]	[12,35; 18,04]	[14,77; 21,39]	[13,15; 19,96]											
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	380	424	280	284	202	212	207	166	163											
		Anteil in %	27,92	32,89	31,67	35,15	30,01	34,08	33,82	31,92	35,51											
		CI Anteil in %	[25,54; 30,30]	[30,33; 35,46]	[28,61; 34,74]	[31,85; 38,44]	[26,55; 33,48]	[30,36; 37,81]	[30,07; 37,57]	[27,91; 35,93]	[31,13; 39,89]											
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	767	742	507	435	386	335	312	260	220											
		Anteil in %	56,36	57,56	57,35	53,84	57,36	53,86	50,98	50,00	47,93											
		CI Anteil in %	[53,72; 58,99]	[54,86; 60,26]	[54,09; 60,62]	[50,40; 57,28]	[53,62; 61,09]	[49,94; 57,78]	[47,02; 54,94]	[45,70; 54,30]	[43,35; 52,51]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>9940</i>	<i>9118</i>	<i>8435</i>	<i>7735</i>	<i>7205</i>	<i>6731</i>	<i>6317</i>	<i>5936</i>	<i>5626</i>											
2008-1	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	1623	1017	912	742	707	692	609	535												
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	193	119	113	101	114	136	128	150												
		Anteil in %	11,89	11,70	12,39	13,61	16,12	19,65	21,02	28,04												
		CI Anteil in %	[10,32; 13,47]	[9,72; 13,68]	[10,25; 14,53]	[11,14; 16,08]	[13,41; 18,84]	[16,69; 22,62]	[17,78; 24,26]	[24,23; 31,85]												
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	576	386	373	278	288	274	210	171												
		Anteil in %	35,49	37,95	40,90	37,47	40,74	39,60	34,48	31,96												
		CI Anteil in %	[33,16; 37,82]	[34,97; 40,94]	[37,71; 44,09]	[33,98; 40,95]	[37,11; 44,36]	[35,95; 43,24]	[30,70; 38,26]	[28,01; 35,92]												
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	854	512	426	363	305	282	271	214												
		Anteil in %	52,62	50,34	46,71	48,92	43,14	40,75	44,50	40,00												
		CI Anteil in %	[50,19; 55,05]	[47,27; 53,42]	[43,47; 49,95]	[45,32; 52,52]	[39,49; 46,79]	[37,09; 44,42]	[40,55; 48,45]	[35,84; 44,16]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>9074</i>	<i>8463</i>	<i>7733</i>	<i>7156</i>	<i>6701</i>	<i>6331</i>	<i>5959</i>	<i>5643</i>												

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr		
2008-2	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	1011	738	590	551	486	419	381													
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	108	63	76	66	83	67	63													
		Anteil in %	10,68	8,54	12,88	11,98	17,08	15,99	16,54													
		CI Anteil in %	[8,78; 12,59]	[6,52; 10,55]	[10,18; 15,59]	[9,26; 14,69]	[13,73; 20,43]	[12,48; 19,50]	[12,80; 20,27]													
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	409	304	199	216	170	161	141													
		Anteil in %	40,45	41,19	33,73	39,20	34,98	38,42	37,01													
		CI Anteil in %	[37,43; 43,48]	[37,64; 44,75]	[29,91; 37,55]	[35,12; 43,28]	[30,74; 39,22]	[33,76; 43,09]	[32,15; 41,86]													
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	494	371	315	269	233	191	177													
		Anteil in %	48,86	50,27	53,39	48,82	47,94	45,58	46,46													
		CI Anteil in %	[45,78; 51,95]	[46,66; 53,88]	[49,36; 57,42]	[44,64; 53,00]	[43,50; 52,39]	[40,81; 50,36]	[41,44; 51,47]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>6320</i>	<i>5851</i>	<i>5399</i>	<i>5008</i>	<i>4674</i>	<i>4394</i>	<i>4147</i>													
2009-1	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	888	631	615	553	510	442														
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	102	58	55	71	68	54														
		Anteil in %	11,49	9,19	8,94	12,84	13,33	12,22														
		CI Anteil in %	[9,39; 13,58]	[6,94; 11,45]	[6,69; 11,20]	[10,05; 15,63]	[10,38; 16,29]	[9,16; 15,27]														
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	409	257	287	249	212	190														
		Anteil in %	46,06	40,73	46,67	45,03	41,57	42,99														
		CI Anteil in %	[42,78; 49,34]	[36,89; 44,57]	[42,72; 50,61]	[40,88; 49,18]	[37,29; 45,85]	[38,37; 47,61]														
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	377	316	273	233	230	198														
		Anteil in %	42,45	50,08	44,39	42,13	45,10	44,80														
		CI Anteil in %	[39,20; 45,71]	[46,17; 53,98]	[40,46; 48,32]	[38,01; 46,25]	[40,78; 49,42]	[40,16; 49,44]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>5299</i>	<i>4907</i>	<i>4513</i>	<i>4221</i>	<i>3942</i>	<i>3724</i>														
2009-2	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	805	620	577	501	448															
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	102	77	79	77	62															
		Anteil in %	12,67	12,42	13,69	15,37	13,84															
		CI Anteil in %	[10,37; 14,97]	[9,82; 15,02]	[10,88; 16,50]	[12,21; 18,53]	[10,64; 17,04]															
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	299	258	231	174	166															
		Anteil in %	37,14	41,61	40,03	34,73	37,05															
		CI Anteil in %	[33,80; 40,48]	[37,73; 45,50]	[36,03; 44,04]	[30,56; 38,90]	[32,58; 41,53]															
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	404	285	267	250	220															
		Anteil in %	50,19	45,97	46,27	49,90	49,11															
		CI Anteil in %	[46,73; 53,64]	[42,04; 49,89]	[42,20; 50,35]	[45,52; 54,28]	[44,47; 53,74]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>5705</i>	<i>5205</i>	<i>4802</i>	<i>4483</i>	<i>4208</i>															
2010-1	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl	1014	718	618	549																
	Schulung wahrgenommen	Anzahl	183	125	102	104																
		Anteil in %	18,05	17,41	16,50	18,94																
		CI Anteil in %	[15,68; 20,42]	[14,63; 20,19]	[13,58; 19,43]	[15,66; 22,22]																
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl	414	311	265	209																
		Anteil in %	40,83	43,31	42,88	38,07																
		CI Anteil in %	[37,80; 43,86]	[39,69; 46,94]	[38,98; 46,79]	[34,00; 42,13]																
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl	417	282	251	236																
		Anteil in %	41,12	39,28	40,61	42,99																
		CI Anteil in %	[38,09; 44,15]	[35,70; 42,85]	[36,74; 44,49]	[38,84; 47,13]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>6363</i>	<i>5859</i>	<i>5409</i>	<i>5055</i>																

EZ	Patienten und ihre Wahrnehmung empfohlener Hypertonie-Schulungen	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-2	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl		878	645	591																
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		138	99	106																
		Anteil in %			15,72	15,35	17,94															
		CI Anteil in %			[13,31; 18,13]	[12,56; 18,13]	[14,84; 21,03]															
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		336	272	216																
		Anteil in %			38,27	42,17	36,55															
		CI Anteil in %			[35,05; 41,49]	[38,36; 45,98]	[32,66; 40,43]															
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		404	274	269																
		Anteil in %			46,01	42,48	45,52															
		CI Anteil in %			[42,71; 49,31]	[38,66; 46,30]	[41,50; 49,53]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>	<i>6400</i>	<i>5912</i>	<i>5443</i>																	
2011-1	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl		882	636																	
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		133	98																	
		Anteil in %			15,08	15,41																
		CI Anteil in %			[12,72; 17,44]	[12,60; 18,22]																
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		303	229																	
		Anteil in %			34,35	36,01																
		CI Anteil in %			[31,22; 37,49]	[32,27; 39,74]																
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		446	309																	
		Anteil in %			50,57	48,58																
		CI Anteil in %			[47,27; 53,87]	[44,70; 52,47]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>	<i>6098</i>	<i>5609</i>																		
2011-2	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl		714																		
	Schulung wahrgenommen	Anzahl		122																		
		Anteil in %			17,09																	
		CI Anteil in %			[14,32; 19,85]																	
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl		253																		
		Anteil in %			35,43																	
		CI Anteil in %			[31,92; 38,95]																	
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl		339																		
		Anteil in %			47,48																	
		CI Anteil in %			[43,81; 51,14]																	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>	<i>5157</i>																			
2012-1	Patienten mit empfohlener Hypertonie-Schulung (auswertbar*)	Anzahl																				
	Schulung wahrgenommen	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
	Schulung aktuell nicht möglich	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
	Schulung nicht wahrgenommen	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>																				

In Tabelle 3.4.3 wird untersucht, bei wie vielen Patienten bzw. welchem Anteil eine **jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung** erfolgte. Die Auswertungen erfolgen also nicht im üblichen Halbjahresbezug. Da die Angaben aus der Erstdokumentation sich über einen unbekanntem Zeitraum erstrecken, können die Angaben des Beitrittsjahres nicht für die jährliche Betrachtungsweise verwendet werden. Der Jahresbezug wird folgendermaßen definiert: Eine jährliche Untersuchung gilt als gegeben, wenn eine Untersuchung im zweiten und/oder dritten Halbjahr dokumentiert ist bzw. im vierten und/oder fünften Halbjahr, etc. Betrachtet werden dabei alle Versicherten, die jeweils in beiden Halbjahren Programmteilnehmer waren.

In Tabelle 3.4.3. wird unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr bzw. im Untersuchungsjahr (noch) Programmteilnehmer waren. Da eine **jährliche** Auswertung vorgenommen werden soll, wird ausgewiesen, wie viele Patienten in der zweiten Hälfte des untersuchten Jahreszeitraumes (zweites/drittes Halbjahr, viertes/fünftes Halbjahr, etc.) noch Programmteilnehmer waren. Patienten, die lediglich in der ersten Jahreshälfte im Programm waren, werden nicht berücksichtigt. Anschließend wird dargestellt, wie viele der „auswertbaren“ Patienten bzw. welcher Anteil im interessierenden Jahreszeitraum (= aktuelles Halbjahrespaar) eine augenärztliche Untersuchung erfolgte.

Bei der Interpretation der Tabelle ist zu beachten, dass es durch die 9. Risikostrukturausgleich-Änderungsverordnung zu einer Änderung im Dokumentationsbogen kam, die keine direkte Vergleichbarkeit mehr zulässt. Gemäß den Kriterien des BVA sind die Daten zu augenärztlichen Untersuchungen aus „alten“ und „neuen“ Dokumentationsbögen in einer gemeinsamen Zeile darzustellen. Folglich sind bei der Interpretation der Tabellenzeile „mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)“ entsprechende Einschränkungen für die Vergleichbarkeit im Zeitverlauf gegeben.

Für den Berichtszeitraum *vor* der Änderung (Berichtshalbjahre bis einschließlich 2004-1) ist die Dokumentation „veranlasste Funduskopien“ als neue ophthalmologische Netzhautuntersuchungen auszuweisen. Weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeiten waren der Funduskopie-Status sowie die Einschätzung „Funduskopie nicht erforderlich“. Für den Berichtszeitraum *nach* der Änderung (Berichtshalbjahre ab 2004-2) sind in der entsprechenden Tabellenzeile dokumentierte „durchgeführte ophthalmologische Netzhautuntersuchungen“ auszuweisen. Weitere, nicht ausgewiesene Dokumentationsmöglichkeiten zur Netzhautuntersuchung waren „nicht durchgeführt“ und „veranlasst“.

In der Kohorte 2003-1 waren im letzten Untersuchungsjahr 4564 Patienten in das Programm eingeschrieben; sie waren damit sowohl im ersten als auch im zweiten Halbjahr dieses Untersuchungsjahres Programmteilnehmer. Für 4559 Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei 77,52 Prozent von ihnen erfolgte im entsprechenden Jahreszeitraum eine augenärztliche Untersuchung.

Tabelle 3.4.3 Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung

EZ	Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung	Teilnehmer im Beitritts-halbjahr	Im 1. Untersuchungs-jahr	Im 2. Untersuchungs-jahr	Im 3. Untersuchungs-jahr	Im 4. Untersuchungs-jahr	Im 5. Untersuchungs-jahr	Im 6. Untersuchungs-jahr	Im 7. Untersuchungs-jahr	Im 8. Untersuchungs-jahr	Im 9. Untersuchungs-jahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18532	15229	12524	10657	8357	7302	6413	5724	5082	4564
	auswertbar	Anzahl		14022	12506	10633	8344	7280	6388	5691	5078	4559
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		8040	9906	8286	6528	5639	4966	4280	3914	3534
		Anteil in %		57,34	79,21	77,93	78,24	77,46	77,74	75,21	77,08	77,52
	CI Anteil in %		[56,52; 58,16]	[78,50; 79,92]	[77,14; 78,72]	[77,35; 79,12]	[76,50; 78,42]	[76,72; 78,76]	[74,08; 76,33]	[75,92; 78,23]	[76,31; 78,73]	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	15338	11995	9767	8042	6677	5997	5383	4829	4304	
	auswertbar	Anzahl		11914	9751	8015	6664	5973	5354	4813	4289	
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		8783	7594	6173	5046	4594	3948	3584	3230	
		Anteil in %		73,72	77,88	77,02	75,72	76,91	73,74	74,46	75,31	
	CI Anteil in %		[72,93; 74,51]	[77,06; 78,70]	[76,10; 77,94]	[74,69; 76,75]	[75,84; 77,98]	[72,56; 74,92]	[73,23; 75,70]	[74,02; 76,60]		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6722	5294	4296	3572	3080	2690	2401	2147	1951	
	auswertbar	Anzahl		5278	4272	3542	3031	2639	2363	2116	1920	
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		3845	3138	2634	2266	2015	1722	1598	1443	
		Anteil in %		72,85	73,46	74,36	74,76	76,35	72,87	75,52	75,16	
	CI Anteil in %		[71,65; 74,05]	[72,13; 74,78]	[72,93; 75,80]	[73,21; 76,31]	[74,73; 77,98]	[71,08; 74,67]	[73,69; 77,35]	[73,22; 77,09]		
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5209	4298	3506	3038	2710	2446	2204	2005		
	auswertbar	Anzahl		4260	3486	2882	2533	2275	2039	1845		
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		3055	2424	2051	1872	1576	1419	1307		
		Anteil in %		71,71	69,54	71,17	73,90	69,27	69,59	70,84		
	CI Anteil in %		[70,36; 73,07]	[68,01; 71,06]	[69,51; 72,82]	[72,19; 75,62]	[67,38; 71,17]	[67,60; 71,59]	[68,77; 72,91]			
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7326	6209	4992	4340	3849	3415	3064	2769		
	auswertbar	Anzahl		6166	4969	4300	3816	3398	3050	2757		
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		4281	3399	2988	2849	2381	2180	1963		
		Anteil in %		69,43	68,40	69,49	74,66	70,07	71,48	71,20		
	CI Anteil in %		[68,28; 70,58]	[67,11; 69,70]	[68,11; 70,86]	[73,28; 76,04]	[68,53; 71,61]	[69,87; 73,08]	[69,51; 72,89]			
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	9778	8164	6790	5933	5240	4579	4101			
	auswertbar	Anzahl		8098	6766	5888	5199	4557	4078			
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		5714	4532	4168	3621	3172	2852			
		Anteil in %		70,56	66,98	70,79	69,65	69,61	69,94			
	CI Anteil in %		[69,57; 71,55]	[65,86; 68,10]	[69,63; 71,95]	[68,40; 70,90]	[68,27; 70,94]	[68,53; 71,34]				
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	11195	9553	8293	7289	6435	5692	5084			
	auswertbar	Anzahl		9508	8239	7228	6408	5677	5066			
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		6706	5624	5297	4571	3976	3543			
		Anteil in %		70,53	68,26	73,28	71,33	70,04	69,94			
	CI Anteil in %		[69,61; 71,45]	[67,26; 69,27]	[72,26; 74,30]	[70,23; 72,44]	[68,85; 71,23]	[68,67; 71,20]				
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	14493	12613	10718	9390	8292	7374				
	auswertbar	Anzahl		12500	10590	9307	8237	7314				
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		8017	7137	5998	5362	4816				
		Anteil in %		64,14	67,39	64,45	65,10	65,85				
	CI Anteil in %		[63,30; 64,98]	[66,50; 68,29]	[63,47; 65,42]	[64,07; 66,13]	[64,76; 66,93]					

EZ	Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung	Teilnehmer im Beitritts-halbjahr	Im 1. Untersu-chungs-jahr	Im 2. Untersu-chungs-jahr	Im 3. Untersu-chungs-jahr	Im 4. Untersu-chungs-jahr	Im 5. Untersu-chungs-jahr	Im 6. Untersu-chungs-jahr	Im 7. Untersu-chungs-jahr	Im 8. Untersu-chungs-jahr	Im 9. Untersu-chungs-jahr
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	18117	16142	13722	12070	10635	9520			
	auswertbar	Anzahl		15865	13522	11999	10572	9457			
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		9937	9074	7697	7052	6452			
		Anteil in %		62,63	67,11	64,15	66,70	68,22			
	CI Anteil in %		[61,88; 63,39]	[66,31; 67,90]	[63,29; 65,01]	[65,81; 67,60]	[67,29; 69,16]				
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10330	9118	7735	6731	5936				
	auswertbar	Anzahl		8916	7642	6686	5896				
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		5673	4763	4282	3921				
		Anteil in %		63,63	62,33	64,04	66,50				
	CI Anteil in %		[62,63; 64,63]	[61,24; 63,41]	[62,89; 65,19]	[65,30; 67,71]					
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	9430	8463	7156	6331	5643				
	auswertbar	Anzahl		8299	7108	6280	5601				
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		5326	4450	4180	3813				
		Anteil in %		64,18	62,61	66,56	68,08				
	CI Anteil in %		[63,14; 65,21]	[61,48; 63,73]	[65,39; 67,73]	[66,86; 69,30]					
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6552	5851	5008	4394					
	auswertbar	Anzahl		5769	4958	4356					
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		3492	3012	2779					
		Anteil in %		60,53	60,75	63,80					
	CI Anteil in %		[59,27; 61,79]	[59,39; 62,11]	[62,37; 65,22]						
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5527	4907	4221	3724					
	auswertbar	Anzahl		4869	4189	3710					
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		2891	2603	2398					
		Anteil in %		59,38	62,14	64,64					
	CI Anteil in %		[58,00; 60,76]	[60,67; 63,61]	[63,10; 66,17]						
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5982	5205	4483						
	auswertbar	Anzahl		5159	4459						
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		3165	2804						
		Anteil in %		61,35	62,88						
	CI Anteil in %		[60,02; 62,68]	[61,47; 64,30]							
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6630	5859	5055						
	auswertbar	Anzahl		5813	5027						
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		3571	3159						
		Anteil in %		61,43	62,84						
	CI Anteil in %		[60,18; 62,68]	[61,50; 64,18]							
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6682	5912							
	auswertbar	Anzahl		5853							
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		3600							
		Anteil in %		61,51							
	CI Anteil in %		[60,26; 62,75]								
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	6352	5609							
	auswertbar	Anzahl		5570							
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl		3414							
		Anteil in %		61,29							
	CI Anteil in %		[60,01; 62,57]								
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5365								
	auswertbar	Anzahl									
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)	Anzahl									
		Anteil in %									
	CI Anteil in %										

EZ	Patienten und ihre jährliche ophthalmologische Netzhautuntersuchung		Teilnehmer im Beitritts-halbjahr	Im 1. Untersuchungs-jahr	Im 2. Untersuchungs-jahr	Im 3. Untersuchungs-jahr	Im 4. Untersuchungs-jahr	Im 5. Untersuchungs-jahr	Im 6. Untersuchungs-jahr	Im 7. Untersuchungs-jahr	Im 8. Untersuchungs-jahr	Im 9. Untersuchungs-jahr
2012-1	Patienten insgesamt		Anzahl	5991								
	auswertbar		Anzahl									
	mindestens einmal im Jahr untersucht (aktuelles und/oder vorangegangenes Berichtshalbjahr)		Anzahl									
			Anteil in %									
		CI Anteil in %										

3.5 Ereigniszeitanalysen bei Begleit- und Folgeerkrankungen, primären und sekundären Endpunkten

Die durch langjährige diabetische Stoffwechsellage verursachten Begleit- oder Folgeerkrankungen des Diabetes sind durch Makro- und Mikroangiopathie sowie Neuropathie, allesamt schwerwiegende Erkrankungen an Gefäßen und Nerven, bedingt und können zu schweren Organschädigungen bzw. Organversagen führen. Eine frühzeitige Erkennung und Therapie kann die Progredienz deutlich verlangsamen. Eine gefürchtete Folge des Diabetes mellitus besteht in der Schädigung der Nieren durch Veränderung der Nierengefäße in Form der diabetischen Nephropathie, die zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion führt. Eine weitere Schädigung besteht in Form des diabetischen Fußes, bei dessen fortgeschrittenen Stadien Amputationen von Zehen, des Vorfusses oder gar des Unterschenkels notwendig werden können. Ein weiteres von Gefäßveränderungen betroffenes Organ ist das Herz, bei dem es in ausgeprägten Stadien zu so genannten (durch die gleichzeitige Schädigung der Nerven) „stummen Infarkten“, bei denen die Patienten keine oder kaum Schmerzen verspüren, kommen kann. Durch ausgeprägte Schädigung der Gefäße des Zentralnervensystems können weiterhin Schlaganfälle verursacht werden. In den folgenden Tabellen wird das neue Auftreten von Endpunkten dokumentiert; d.h. es werden erstmalig auftretende Endpunkte ausgewiesen. Folgeerkrankungen an den Augen und Nieren sind typische Schäden, die sich mit zunehmender Erkrankungsdauer ausbilden können. Das frühzeitige Erkennen und eine frühzeitig einsetzende Behandlung ist ein wichtiges Ziel.

Die folgenden Tabellen beinhalten **Ereigniszeitanalysen** zum Erstauftreten der eben beschriebenen Ereignisse sowie die Angaben zur kumulierten „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach **Kaplan-Meier**. Diese gibt die Wahrscheinlichkeit in Prozent

wieder, mit der für Patienten des Basiskollektivs ohne Ereignis zur ED im jeweiligen Halbjahr (noch) keines der im Einzelnen betrachteten Ereignisse eingetreten ist. Bezugsgröße im Halbjahr ist das Restkollektiv und entspricht dem Basiskollektiv, reduziert um ausgeschriebene Patienten sowie Patienten, bei denen im Verlauf bereits ein Ereignis eingetreten ist. Pro Halbjahr fließen also die verbleibenden Patienten unter Risiko in die Auswertung ein.

Die kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit wird in jeder der folgenden Tabellen in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

In Tabelle 3.5.1 wird dokumentiert, wie viele Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren vom **Erstaufreten einer Erblindungen** betroffen waren. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen laut Erstdokumentation keine Erblindung vermerkt war. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach **Kaplan-Meier** dargestellt.

Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine Erblindung dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die Folgedokumentation vorlag. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil eine erstmalig aufgetretene Erblindung dokumentiert ist.

In der Kohorte 2003-1 waren anfangs 18532 Patienten eingeschrieben, bei 18469 dieser Personen war laut Erstdokumentation keine Erblindung dokumentiert. Dieses Kollektiv umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch 4553 Mitglieder. Für 4442 Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei 0,00 Prozent dieser auswertbaren Patienten wurde im letzten Berichtshalbjahr eine erstmalig aufgetretene Erblindung dokumentiert.

Tabelle 3.5.1 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation

EZ	Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2003-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	18469	16863	15180	13773	12481	11535	10622	9018	8330	7629	7275	6772	6386	6061	5701	5358	5067	4803	4553	
	auswertbar	Anzahl		13469	14192	13431	12129	11297	10163	8725	8084	7473	6934	6493	6201	5861	5518	5227	4961	4712	4442	
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		6	4	2	3	2	5	0	1	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %		0,04	0,03	0,01	0,02	0,02	0,05	0,00	0,01	0,03	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CI Anteil in %		[0,01; 0,08]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,04]	[0,01; 0,09]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,96	99,94	99,92	99,90	99,88	99,83	99,83	99,82	99,79	99,79	99,75	99,75	99,73	99,73	99,73	99,73	99,73	99,73	99,73
		CI		[99,93; 99,99]	[99,90; 99,98]	[99,88; 99,96]	[99,85; 99,95]	[99,82; 99,94]	[99,76; 99,90]	[99,76; 99,90]	[99,74; 99,90]	[99,71; 99,87]	[99,71; 99,87]	[99,65; 99,85]	[99,65; 99,85]	[99,63; 99,83]	[99,63; 99,83]	[99,63; 99,83]	[99,63; 99,83]	[99,63; 99,83]	[99,63; 99,83]	[99,63; 99,83]
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>18532</i>	<i>16919</i>	<i>15229</i>	<i>13819</i>	<i>12524</i>	<i>11575</i>	<i>10657</i>	<i>9051</i>	<i>8357</i>	<i>7654</i>	<i>7302</i>	<i>6797</i>	<i>6413</i>	<i>6084</i>	<i>5724</i>	<i>5377</i>	<i>5082</i>	<i>4817</i>	<i>4564</i>	
2003-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	15283	13223	11956	10698	9724	8879	8011	7335	6654	6357	5975	5678	5362	5076	4809	4556	4287	4077		
	auswertbar	Anzahl		11866	11567	10409	9481	8541	7741	6987	6492	6062	5699	5415	5191	4913	4684	4416	4176	3956		
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		4	7	4	0	1	1	0	1	1	4	0	0	1	1	1	1	1	1	
		Anteil in %		0,03	0,06	0,04	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	
		CI Anteil in %		[0,00; 0,07]	[0,02; 0,11]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,03]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,07]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,97	99,91	99,87	99,87	99,86	99,85	99,85	99,83	99,82	99,75	99,75	99,75	99,73	99,71	99,68	99,66	99,64	99,64	
		CI		[99,94; 100,00]	[99,86; 99,96]	[99,81; 99,93]	[99,81; 99,93]	[99,79; 99,93]	[99,78; 99,92]	[99,78; 99,92]	[99,75; 99,91]	[99,73; 99,91]	[99,64; 99,86]	[99,64; 99,86]	[99,64; 99,86]	[99,61; 99,85]	[99,59; 99,83]	[99,55; 99,81]	[99,52; 99,80]	[99,49; 99,79]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>15338</i>	<i>13264</i>	<i>11995</i>	<i>10737</i>	<i>9767</i>	<i>8914</i>	<i>8042</i>	<i>7361</i>	<i>6677</i>	<i>6381</i>	<i>5997</i>	<i>5700</i>	<i>5383</i>	<i>5096</i>	<i>4829</i>	<i>4575</i>	<i>4304</i>	<i>4094</i>		
2004-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6705	5966	5280	4770	4284	3842	3561	3241	3070	2861	2680	2523	2390	2252	2138	2024	1944			
	auswertbar	Anzahl		5636	5049	4607	4129	3720	3393	3125	2856	2693	2538	2399	2270	2163	2043	1955	1864			
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		2	1	1	1	0	0	1	2	1	0	2	0	0	1	1	1	0		
		Anteil in %		0,04	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,03	0,03	0,07	0,04	0,00	0,08	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00		
		CI Anteil in %		[0,00; 0,08]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,00]		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,97	99,95	99,93	99,90	99,90	99,90	99,87	99,80	99,76	99,76	99,68	99,68	99,68	99,63	99,58	99,58	99,58		
		CI		[99,92; 100,00]	[99,89; 100,00]	[99,86; 100,00]	[99,81; 100,00]	[99,81; 100,00]	[99,81; 99,99]	[99,81; 99,99]	[99,76; 99,98]	[99,66; 99,94]	[99,60; 99,92]	[99,60; 99,92]	[99,48; 99,88]	[99,48; 99,88]	[99,48; 99,88]	[99,41; 99,85]	[99,34; 99,82]	[99,34; 99,82]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6722</i>	<i>5979</i>	<i>5294</i>	<i>4783</i>	<i>4296</i>	<i>3854</i>	<i>3572</i>	<i>3250</i>	<i>3080</i>	<i>2873</i>	<i>2690</i>	<i>2532</i>	<i>2401</i>	<i>2263</i>	<i>2147</i>	<i>2032</i>	<i>1951</i>			
2004-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5186	4696	4280	3880	3491	3247	3024	2896	2698	2560	2435	2310	2194	2094	1998	1899				
	auswertbar	Anzahl		4439	4105	3732	3253	3006	2786	2576	2429	2301	2204	2068	1977	1874	1789	1691				
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1				
		Anteil in %		0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06				
		CI Anteil in %		[0,00; 0,11]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,18]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,96	99,96	99,90	99,90	99,90	99,87	99,87	99,83	99,83	99,83	99,83	99,83	99,83	99,83	99,77				
		CI		[99,90; 100,00]	[99,90; 100,00]	[99,80; 100,00]	[99,80; 100,00]	[99,80; 100,00]	[99,75; 99,99]	[99,75; 99,99]	[99,69; 99,97]	[99,69; 99,97]	[99,69; 99,97]	[99,69; 99,97]	[99,69; 99,97]	[99,69; 99,97]	[99,69; 99,97]	[99,59; 99,95]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5209</i>	<i>4715</i>	<i>4298</i>	<i>3897</i>	<i>3506</i>	<i>3261</i>	<i>3038</i>	<i>2910</i>	<i>2710</i>	<i>2571</i>	<i>2446</i>	<i>2321</i>	<i>2204</i>	<i>2102</i>	<i>2005</i>	<i>1906</i>				
2005-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	7298	6793	6186	5500	4976	4569	4327	4054	3836	3612	3405	3207	3056	2907	2761					
	auswertbar	Anzahl		6467	5843	5274	4752	4399	4085	3862	3653	3492	3286	3118	2948	2808	2682					
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		1	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0					
		Anteil in %		0,02	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00					
		CI Anteil in %		[0,00; 0,05]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,98	99,95	99,93	99,93	99,93	99,93	99,91	99,91	99,85	99,85	99,85	99,82	99,82	99,82					
		CI		[99,95; 100,00]	[99,89; 100,00]	[99,86; 100,00]	[99,86; 100,00]	[99,86; 100,00]	[99,86; 100,00]	[99,83; 99,99]	[99,83; 99,99]	[99,74; 99,96]	[99,74; 99,96]	[99,74; 99,96]	[99,69; 99,95]	[99,69; 99,95]	[99,69; 99,95]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>7326</i>	<i>6819</i>	<i>6209</i>	<i>5519</i>	<i>4992</i>	<i>4584</i>	<i>4340</i>	<i>4066</i>	<i>3849</i>	<i>3623</i>	<i>3415</i>	<i>3216</i>	<i>3064</i>	<i>2915</i>	<i>2769</i>					
2005-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9739	8954	8131	7396	6763	6375	5906	5557	5215	4889	4558	4301	4080	3851						
	auswertbar	Anzahl		8522	7773	7073	6482	5995	5563	5272	4995	4661	4402	4155	3937	3720						
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		5	1	1	0	0	2	0	1	0	2	2	0	1						
		Anteil in %		0,06	0,01	0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,05	0,05	0,00	0,03						
		CI Anteil in %		[0,01; 0,11]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,08]						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,94	99,93	99,92	99,92	99,92	99,88	99,88	99,86	99,86	99,82	99,77	99,77	99,74						
		CI		[99,89; 99,99]	[99,87; 99,99]	[99,86; 99,98]	[99,86; 99,98]	[99,86; 99,98]	[99,80; 99,96]	[99,80; 99,96]	[99,77; 99,95]	[99,77; 99,95]	[99,71; 99,93]	[99,64; 99,90]	[99,64; 99,90]	[99,60; 99,88]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>9778</i>	<i>8989</i>	<i>8164</i>	<i>7426</i>	<i>6790</i>	<i>6402</i>	<i>5933</i>	<i>5585</i>	<i>5240</i>	<i>4913</i>	<i>4579</i>	<i>4321</i>	<i>4101</i>	<i>3871</i>						

EZ	Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	11154	10468	9515	8720	8264	7675	7264	6808	6416	5998	5675	5315	5069					
	auswertbar	Anzahl		10102	9110	8463	7778	7285	6949	6572	6152	5828	5485	5160	4946					
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		4	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0					
		Anteil in %		0,04	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		CI Anteil in %		[0,00; 0,08]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]					
		kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,96	99,96	99,94	99,94	99,91	99,91	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90					
		CI		[99,92; 100,00]	[99,92; 100,00]	[99,89; 99,99]	[99,89; 99,99]	[99,85; 99,97]	[99,85; 99,97]	[99,83; 99,97]	[99,83; 99,97]	[99,83; 99,97]	[99,83; 99,97]	[99,83; 99,97]						
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11195</i>	<i>10505</i>	<i>9553</i>	<i>8754</i>	<i>8293</i>	<i>7702</i>	<i>7289</i>	<i>6827</i>	<i>6435</i>	<i>6016</i>	<i>5692</i>	<i>5332</i>	<i>5084</i>					
2006-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	14441	13741	12569	11733	10682	10044	9354	8832	8264	7794	7350	6941						
	auswertbar	Anzahl		12952	11887	10868	9947	9439	8950	8394	7926	7443	7084	6668						
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		3	0	1	7	3	2	0	1	0	0	0						
		Anteil in %		0,02	0,00	0,01	0,07	0,03	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00						
		CI Anteil in %		[0,00; 0,05]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,03]	[0,02; 0,12]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]						
		kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,98	99,98	99,97	99,90	99,87	99,85	99,85	99,83	99,83	99,83	99,83					
		CI		[99,95; 100,00]	[99,95; 100,00]	[99,94; 100,00]	[99,84; 99,96]	[99,80; 99,94]	[99,77; 99,93]	[99,77; 99,93]	[99,75; 99,91]	[99,75; 99,91]	[99,75; 99,91]	[99,75; 99,91]						
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>13791</i>	<i>12613</i>	<i>11771</i>	<i>10718</i>	<i>10080</i>	<i>9390</i>	<i>8865</i>	<i>8292</i>	<i>7821</i>	<i>7374</i>	<i>6965</i>						
2007-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	18048	17122	16077	14604	13663	12773	12022	11239	10589	9994	9481							
	auswertbar	Anzahl		16307	14866	13577	12864	12225	11542	10767	10159	9652	9136							
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		2	3	4	0	4	1	5	0	1	0							
		Anteil in %		0,01	0,02	0,03	0,00	0,03	0,01	0,05	0,00	0,01	0,00							
		CI Anteil in %		[0,00; 0,03]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,03]	[0,01; 0,09]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,03]	[0,00; 0,00]							
		kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,99	99,97	99,94	99,94	99,91	99,90	99,85	99,85	99,84	99,84						
		CI		[99,97; 100,00]	[99,94; 100,00]	[99,90; 99,98]	[99,90; 99,98]	[99,86; 99,96]	[99,85; 99,95]	[99,78; 99,92]	[99,78; 99,92]	[99,77; 99,91]	[99,77; 99,91]							
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>17190</i>	<i>16142</i>	<i>14666</i>	<i>13722</i>	<i>12823</i>	<i>12070</i>	<i>11283</i>	<i>10635</i>	<i>10034</i>	<i>9520</i>							
2007-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	10289	9901	9083	8402	7704	7175	6701	6289	5915	5607								
	auswertbar	Anzahl		9270	8231	7756	7276	6830	6403	6029	5700	5373								
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		1	1	2	2	2	0	2	0	1								
		Anteil in %		0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02								
		CI Anteil in %		[0,00; 0,03]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,06]								
		kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,99	99,98	99,95	99,93	99,90	99,90	99,86	99,86	99,85							
		CI		[99,97; 100,00]	[99,95; 100,00]	[99,90; 100,00]	[99,87; 99,99]	[99,83; 99,97]	[99,83; 99,97]	[99,77; 99,95]	[99,77; 99,95]	[99,76; 99,94]								
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>9940</i>	<i>9118</i>	<i>8435</i>	<i>7735</i>	<i>7205</i>	<i>6731</i>	<i>6317</i>	<i>5936</i>	<i>5626</i>								
2008-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9405	9051	8436	7706	7132	6679	6310	5941	5627									
	auswertbar	Anzahl		8437	7850	7267	6802	6412	6046	5711	5412									
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		6	3	1	0	1	1	0	0									
		Anteil in %		0,07	0,04	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00									
		CI Anteil in %		[0,01; 0,13]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,04]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]									
		kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,93	99,89	99,88	99,88	99,86	99,85	99,85	99,85								
		CI		[99,87; 99,99]	[99,82; 99,96]	[99,81; 99,95]	[99,81; 99,95]	[99,78; 99,94]	[99,76; 99,94]	[99,76; 99,94]	[99,76; 99,94]									
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>9074</i>	<i>8463</i>	<i>7733</i>	<i>7156</i>	<i>6701</i>	<i>6331</i>	<i>5959</i>	<i>5643</i>									
2008-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6537	6306	5837	5387	4996	4660	4381	4135										
	auswertbar	Anzahl		5951	5478	5093	4788	4460	4191	3958										
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		1	0	1	2	1	0	0										
		Anteil in %		0,02	0,00	0,02	0,04	0,02	0,00	0,00										
		CI Anteil in %		[0,00; 0,05]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]										
		kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,98	99,98	99,96	99,92	99,90	99,90	99,90									
		CI		[99,95; 100,00]	[99,95; 100,00]	[99,91; 100,00]	[99,84; 100,00]	[99,81; 99,99]	[99,81; 99,99]	[99,81; 99,99]										
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>6320</i>	<i>5851</i>	<i>5399</i>	<i>5008</i>	<i>4674</i>	<i>4394</i>	<i>4147</i>										

EZ	Erstauftreten einer Erblindung im Kollektiv der nicht erblindeten Patienten laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2009-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5518	5290	4899	4504	4210	3933	3716											
	auswertbar	Anzahl		5062	4630	4297	4035	3778	3604											
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		0	1	2	1	0	0											
		Anteil in %		0,00	0,02	0,05	0,02	0,00	0,00											
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		100,00	99,98	99,93	99,91	99,91	99,91	99,91										
CI			[100,00; 100,00]	[99,94; 100,00]	[99,85; 100,00]	[99,82; 100,00]	[99,82; 100,00]	[99,82; 100,00]	[99,82; 100,00]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5527</i>	<i>5299</i>	<i>4907</i>	<i>4513</i>	<i>4221</i>	<i>3942</i>	<i>3724</i>											
2009-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5973	5697	5197	4794	4475	4197												
	auswertbar	Anzahl		5413	4927	4601	4305	4052												
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		1	1	1	3	1												
		Anteil in %		0,02	0,02	0,02	0,07	0,02												
		CI Anteil in %		[0,00; 0,05]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,07]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,98	99,96	99,94	99,87	99,85	99,85											
CI			[99,94; 100,00]	[99,91; 100,00]	[99,87; 100,00]	[99,77; 99,97]	[99,74; 99,96]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5982</i>	<i>5705</i>	<i>5205</i>	<i>4802</i>	<i>4483</i>	<i>4208</i>												
2010-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6622	6356	5853	5403	5050													
	auswertbar	Anzahl		6126	5555	5164	4852													
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		0	0	0	0													
		Anteil in %		0,00	0,00	0,00	0,00													
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
CI			[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6630</i>	<i>6363</i>	<i>5859</i>	<i>5409</i>	<i>5055</i>													
2010-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6675	6394	5908	5440														
	auswertbar	Anzahl		6124	5571	5218														
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		0	0	1														
		Anteil in %		0,00	0,00	0,02														
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,06]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		100,00	100,00	99,98														
CI			[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[99,94; 100,00]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6682</i>	<i>6400</i>	<i>5912</i>	<i>5443</i>														
2011-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6349	6095	5606															
	auswertbar	Anzahl		5836	5296															
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		2	0															
		Anteil in %		0,03	0,00															
		CI Anteil in %		[0,00; 0,08]	[0,00; 0,00]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,97	99,97															
CI			[99,92; 100,00]	[99,92; 100,00]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6352</i>	<i>6098</i>	<i>5609</i>															
2011-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5360	5152																
	auswertbar	Anzahl		4941																
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl		1																
		Anteil in %		0,02																
		CI Anteil in %		[0,00; 0,06]																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,98																
CI			[99,94; 100,00]																	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5365</i>	<i>5157</i>																
2012-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5989																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmalig aufgetretene Erblindung	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																		
CI																				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5991</i>																	

Das Endstadium einer diabetischen Nephropathie führt zum lebensbedrohenden Ausfall der Filterfunktion der Nieren, dem Nierenversagen (terminale Niereninsuffizienz) und damit zur Notwendigkeit der Dialyse oder gar einer Nierentransplantation.

In Tabelle 3.5.2 wird dokumentiert, wie viele Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren von einer **erstmalig aufgetretenen diabetischen Nephropathie** betroffen waren. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen laut Erstdokumentation keine Nephropathie vermerkt war. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier dargestellt.

Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine diabetische Nephropathie dokumentiert war.

Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die Folgedokumentation vorlag. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil eine erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie dokumentiert ist.

In der Kohorte 2003-1 waren anfangs 18532 Patienten eingeschrieben. Bei 17386 dieser Personen war laut Erstdokumentation keine Nephropathie dokumentiert. Dieses Kollektiv umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch 3480 Mitglieder. Bei 3400 Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei 1,32 Prozent dieser auswertbaren Patienten wurde im letzten Berichtshalbjahr eine erstmalig aufgetretene Nephropathie dokumentiert.

Tabelle 3.5.2 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation

EZ	Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	17386	15866	14197	12827	11491	10544	9652	8174	7527	6869	6511	6030	5451	5078	4707	4325	4029	3708	3480
	auswertbar	Anzahl		12680	13258	12503	11168	10322	9255	7917	7304	6735	6207	5802	5299	4919	4544	4220	3947	3646	3400
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		111	110	155	101	67	57	61	46	51	46	286	111	96	113	75	119	65	45
		Anteil in %		0,88	0,83	1,24	0,90	0,65	0,62	0,77	0,63	0,76	0,74	4,93	2,09	1,95	2,49	1,78	3,01	1,78	1,32
		CI Anteil in %		[0,71; 1,04]	[0,68; 0,98]	[1,05; 1,43]	[0,73; 1,08]	[0,49; 0,80]	[0,46; 0,78]	[0,58; 0,96]	[0,45; 0,81]	[0,55; 0,96]	[0,53; 0,95]	[4,37; 5,49]	[1,71; 2,48]	[1,57; 2,34]	[2,03; 2,94]	[1,38; 2,18]	[2,48; 3,55]	[1,35; 2,21]	[0,94; 1,71]
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,27	98,49	97,29	96,43	95,81	95,22	94,49	93,90	93,19	92,51	87,99	86,16	84,49	82,40	80,95	78,51	77,12	76,10
CI			[99,13; 99,41]	[98,29; 98,69]	[97,02; 97,56]	[96,11; 96,75]	[95,46; 96,16]	[94,84; 95,60]	[94,07; 94,91]	[93,45; 94,35]	[92,71; 93,67]	[91,99; 93,03]	[87,28; 88,70]	[85,39; 86,93]	[83,66; 85,32]	[81,51; 83,29]	[80,01; 81,89]	[77,51; 79,51]	[76,08; 78,16]	[75,03; 77,17]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18532</i>	<i>16919</i>	<i>15229</i>	<i>13819</i>	<i>12524</i>	<i>11575</i>	<i>10657</i>	<i>9051</i>	<i>8357</i>	<i>7654</i>	<i>7302</i>	<i>6797</i>	<i>6413</i>	<i>6084</i>	<i>5724</i>	<i>5377</i>	<i>5082</i>	<i>4817</i>	<i>4564</i>	
2003-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	14510	12570	11289	9993	9011	8194	7362	6276	6075	5792	5420	4938	4587	4275	3968	3689	3397	3190	
	auswertbar	Anzahl		11254	10915	9719	8793	7895	7123	6409	5929	5523	5185	4703	4442	4142	3868	3578	3305	3102	
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		102	125	87	62	54	41	37	26	31	249	89	95	98	90	100	50	41	
		Anteil in %		0,91	1,15	0,90	0,71	0,68	0,58	0,58	0,44	0,56	4,80	1,89	2,14	2,37	2,33	2,79	1,51	1,32	
		CI Anteil in %		[0,73; 1,08]	[0,95; 1,34]	[0,71; 1,08]	[0,53; 0,88]	[0,50; 0,87]	[0,40; 0,75]	[0,39; 0,76]	[0,27; 0,61]	[0,36; 0,76]	[4,22; 5,38]	[1,50; 2,28]	[1,71; 2,56]	[1,90; 2,83]	[1,85; 2,80]	[2,25; 3,34]	[1,10; 1,93]	[0,92; 1,72]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,18	98,07	97,21	96,53	95,87	95,32	94,77	94,36	93,84	89,41	87,75	85,89	83,88	81,94	79,66	78,46	77,43	
CI			[99,02; 99,34]	[97,82; 98,32]	[96,90; 97,52]	[96,18; 96,88]	[95,48; 96,26]	[94,90; 95,74]	[94,32; 95,22]	[93,88; 94,84]	[93,33; 94,35]	[88,69; 90,13]	[86,96; 88,54]	[85,03; 86,75]	[82,96; 84,80]	[80,95; 82,93]	[78,61; 80,71]	[77,37; 79,55]	[76,31; 78,55]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15338</i>	<i>13264</i>	<i>11995</i>	<i>10737</i>	<i>9767</i>	<i>8914</i>	<i>8042</i>	<i>7361</i>	<i>6677</i>	<i>6381</i>	<i>5997</i>	<i>5700</i>	<i>5383</i>	<i>5096</i>	<i>4829</i>	<i>4575</i>	<i>4304</i>	<i>4094</i>		
2004-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6438	5730	5009	4491	4022	3595	3320	3009	2841	2633	2350	2190	2048	1904	1780	1652	1563		
	auswertbar	Anzahl		5409	4792	4340	3879	3486	3162	2904	2650	2480	2229	2088	1945	1833	1704	1599	1500		
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		81	52	33	24	20	17	16	19	135	36	40	33	38	41	30	11		
		Anteil in %		1,50	1,09	0,76	0,62	0,57	0,54	0,55	0,72	5,44	1,62	1,92	1,70	2,07	2,41	1,88	0,73		
		CI Anteil in %		[1,17; 1,82]	[0,79; 1,38]	[0,50; 1,02]	[0,37; 0,87]	[0,32; 0,82]	[0,28; 0,79]	[0,28; 0,82]	[0,40; 1,04]	[4,55; 6,34]	[1,09; 2,14]	[1,33; 2,50]	[1,12; 2,27]	[1,42; 2,73]	[1,68; 3,13]	[1,21; 2,54]	[0,30; 1,17]		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,57	97,53	96,80	96,20	95,65	95,14	94,62	93,96	88,93	87,51	85,86	84,41	82,68	80,72	79,21	78,63		
CI			[98,26; 98,88]	[97,11; 97,95]	[96,32; 97,28]	[95,67; 96,73]	[95,07; 96,23]	[94,51; 95,77]	[93,95; 95,29]	[93,23; 94,69]	[87,85; 90,01]	[86,35; 88,67]	[84,62; 87,10]	[83,09; 85,73]	[81,28; 84,08]	[79,23; 82,21]	[77,65; 80,77]	[77,05; 80,21]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6722</i>	<i>5979</i>	<i>5294</i>	<i>4783</i>	<i>4296</i>	<i>3854</i>	<i>3572</i>	<i>3250</i>	<i>3080</i>	<i>2873</i>	<i>2690</i>	<i>2532</i>	<i>2401</i>	<i>2263</i>	<i>2147</i>	<i>2032</i>	<i>1951</i>			
2004-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4865	4413	3979	3589	3211	2978	2755	2630	2434	2214	2078	1958	1828	1728	1620	1530			
	auswertbar	Anzahl		4171	3816	3461	3000	2761	2547	2343	2199	1988	1882	1754	1648	1539	1445	1351			
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		58	32	26	14	15	13	17	114	35	27	40	23	33	18	12			
		Anteil in %		1,39	0,84	0,75	0,47	0,54	0,51	0,73	5,18	1,76	1,43	2,28	1,40	2,14	1,25	0,89			
		CI Anteil in %		[1,04; 1,75]	[0,55; 1,13]	[0,46; 1,04]	[0,22; 0,71]	[0,27; 0,82]	[0,23; 0,79]	[0,38; 1,07]	[4,26; 6,11]	[1,18; 2,34]	[0,90; 1,97]	[1,58; 2,98]	[0,83; 1,96]	[1,42; 2,87]	[0,67; 1,82]	[0,39; 1,39]			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,67	97,85	97,12	96,67	96,15	95,67	94,98	90,13	88,57	87,31	85,34	84,16	82,38	81,36	80,64			
CI			[98,33; 99,01]	[97,41; 98,29]	[96,60; 97,64]	[96,10; 97,24]	[95,53; 96,77]	[95,00; 96,34]	[94,24; 95,72]	[89,01; 91,25]	[87,36; 89,78]	[86,03; 88,59]	[83,95; 86,73]	[82,71; 85,61]	[80,83; 83,93]	[79,76; 82,96]	[79,01; 82,27]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5209</i>	<i>4715</i>	<i>4298</i>	<i>3897</i>	<i>3506</i>	<i>3261</i>	<i>3038</i>	<i>2910</i>	<i>2710</i>	<i>2571</i>	<i>2446</i>	<i>2321</i>	<i>2204</i>	<i>2102</i>	<i>2005</i>	<i>1906</i>				
2005-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6820	6351	5733	5082	4575	4196	3968	3709	3387	3134	2919	2715	2558	2401	2252				
	auswertbar	Anzahl		6050	5409	4871	4376	4046	3745	3535	3224	3034	2822	2646	2470	2323	2196				
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		61	31	34	24	15	12	143	53	50	49	47	42	37	30				
		Anteil in %		1,01	0,57	0,70	0,55	0,37	0,32	4,05	1,64	1,65	1,74	1,78	1,70	1,59	1,37				
		CI Anteil in %		[0,76; 1,26]	[0,37; 0,77]	[0,46; 0,93]	[0,33; 0,77]	[0,18; 0,56]	[0,14; 0,50]	[3,40; 4,69]	[1,20; 2,08]	[1,19; 2,10]	[1,25; 2,22]	[1,27; 2,28]	[1,19; 2,21]	[1,08; 2,10]	[0,88; 1,85]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,02	98,46	97,78	97,25	96,90	96,59	92,76	91,25	89,76	88,22	86,66	85,20	83,86	82,72				
CI			[98,77; 99,27]	[98,15; 98,77]	[97,40; 98,16]	[96,81; 97,69]	[96,43; 97,37]	[96,09; 97,09]	[91,98; 93,54]	[90,38; 92,12]	[88,81; 90,71]	[87,20; 89,24]	[85,56; 87,76]	[84,03; 86,37]	[82,64; 85,08]	[81,45; 83,99]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7326</i>	<i>6819</i>	<i>6209</i>	<i>5519</i>	<i>4992</i>	<i>4584</i>	<i>4340</i>	<i>4066</i>	<i>3849</i>	<i>3623</i>	<i>3415</i>	<i>3216</i>	<i>3064</i>	<i>2915</i>	<i>2769</i>					

EZ	Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2005-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9147	8428	7614	6870	6245	5877	5429	4899	4505	4169	3848	3583	3344	3126				
	auswertbar	Anzahl		8028	7277	6582	5982	5534	5116	4647	4322	3986	3726	3454	3227	3035				
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		67	58	49	32	35	241	113	70	67	58	65	47	37				
		Anteil in %		0,83	0,80	0,74	0,53	0,63	4,71	2,43	1,62	1,68	1,56	1,88	1,46	1,22				
		CI Anteil in %		[0,64; 1,03]	[0,59; 1,00]	[0,54; 0,95]	[0,35; 0,72]	[0,42; 0,84]	[4,13; 5,29]	[1,99; 2,87]	[1,24; 2,00]	[1,28; 2,08]	[1,16; 1,95]	[1,43; 2,34]	[1,04; 1,87]	[0,83; 1,61]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,19	98,41	97,68	97,17	96,56	92,13	89,93	88,49	87,03	85,68	84,09	82,88	81,87				
	CI		[99,00; 99,38]	[98,13; 98,69]	[97,34; 98,02]	[96,79; 97,55]	[96,13; 96,99]	[91,45; 92,81]	[89,15; 90,71]	[87,65; 89,33]	[86,14; 87,92]	[84,74; 86,62]	[83,09; 85,09]	[81,83; 83,93]	[80,79; 82,95]					
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9778</i>	<i>8989</i>	<i>8164</i>	<i>7426</i>	<i>6790</i>	<i>6402</i>	<i>5933</i>	<i>5585</i>	<i>5240</i>	<i>4913</i>	<i>4579</i>	<i>4321</i>	<i>4101</i>	<i>3871</i>				
2006-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	10365	9717	8776	8003	7574	7015	6390	5890	5476	5075	4735	4359	4116					
	auswertbar	Anzahl		9383	8416	7777	7131	6670	6121	5696	5256	4948	4591	4234	4025					
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		94	65	33	35	286	133	101	75	86	107	60	52					
		Anteil in %		1,00	0,77	0,42	0,49	4,29	2,17	1,77	1,43	1,74	2,33	1,42	1,29					
		CI Anteil in %		[0,80; 1,20]	[0,59; 0,96]	[0,28; 0,57]	[0,33; 0,65]	[3,80; 4,77]	[1,81; 2,54]	[1,43; 2,12]	[1,11; 1,75]	[1,37; 2,10]	[1,89; 2,77]	[1,06; 1,77]	[0,94; 1,64]					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,01	98,26	97,84	97,37	93,28	91,28	89,68	88,41	86,88	84,87	83,68	82,60					
	CI		[98,81; 99,21]	[97,99; 98,53]	[97,54; 98,14]	[97,03; 97,71]	[92,71; 93,85]	[90,63; 91,93]	[88,97; 90,39]	[87,66; 89,16]	[86,07; 87,69]	[84,00; 85,74]	[82,77; 84,59]	[81,65; 83,55]						
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11195</i>	<i>10505</i>	<i>9553</i>	<i>8754</i>	<i>8293</i>	<i>7702</i>	<i>7289</i>	<i>6827</i>	<i>6435</i>	<i>6016</i>	<i>5692</i>	<i>5332</i>	<i>5084</i>					
2006-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	13414	12769	11589	10774	9800	8902	8175	7630	7053	6592	6117	5711						
	auswertbar	Anzahl		12029	10971	9991	9129	8384	7831	7258	6791	6304	5912	5502						
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		106	65	46	342	169	130	117	100	128	95	55						
		Anteil in %		0,88	0,59	0,46	3,75	2,02	1,66	1,61	1,47	2,03	1,61	1,00						
		CI Anteil in %		[0,71; 1,05]	[0,45; 0,74]	[0,33; 0,59]	[3,36; 4,14]	[1,71; 2,32]	[1,38; 1,94]	[1,32; 1,90]	[1,19; 1,76]	[1,68; 2,38]	[1,29; 1,93]	[0,74; 1,26]						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,14	98,57	98,12	94,54	92,67	91,16	89,71	88,41	86,64	85,26	84,40						
	CI		[98,98; 99,30]	[98,36; 98,78]	[97,87; 98,37]	[94,10; 94,98]	[92,15; 93,19]	[90,59; 91,73]	[89,09; 90,33]	[87,75; 89,07]	[85,93; 87,35]	[84,51; 86,01]	[83,62; 85,18]							
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>13791</i>	<i>12613</i>	<i>11771</i>	<i>10718</i>	<i>10080</i>	<i>9390</i>	<i>8865</i>	<i>8292</i>	<i>7821</i>	<i>7374</i>	<i>6965</i>						
2007-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	16856	16015	14946	13534	12306	11289	10462	9694	9045	8405	7870							
	auswertbar	Anzahl		15241	13820	12599	11614	10804	10061	9313	8688	8124	7593							
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		124	80	414	272	200	132	152	184	149	118							
		Anteil in %		0,81	0,58	3,29	2,34	1,85	1,31	1,63	2,12	1,83	1,55							
		CI Anteil in %		[0,67; 0,96]	[0,45; 0,71]	[2,97; 3,60]	[2,07; 2,62]	[1,60; 2,11]	[1,09; 1,53]	[1,37; 1,89]	[1,82; 2,42]	[1,54; 2,13]	[1,28; 1,83]							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,20	98,64	95,49	93,30	91,60	90,41	88,96	87,10	85,51	84,18							
	CI		[99,06; 99,34]	[98,45; 98,83]	[95,14; 95,84]	[92,87; 93,73]	[91,12; 92,08]	[89,90; 90,92]	[88,40; 89,52]	[86,49; 87,71]	[84,86; 86,16]	[83,50; 84,86]								
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>17190</i>	<i>16142</i>	<i>14666</i>	<i>13722</i>	<i>12823</i>	<i>12070</i>	<i>11283</i>	<i>10635</i>	<i>10034</i>	<i>9520</i>							
2007-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9540	9195	8381	7534	6812	6272	5815	5414	5011	4696								
	auswertbar	Anzahl		8619	7602	6970	6436	5998	5580	5198	4831	4508								
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		70	255	133	107	102	79	106	74	68								
		Anteil in %		0,81	3,35	1,91	1,66	1,70	1,42	2,04	1,53	1,51								
		CI Anteil in %		[0,62; 1,00]	[2,95; 3,76]	[1,59; 2,23]	[1,35; 1,97]	[1,37; 2,03]	[1,11; 1,73]	[1,65; 2,42]	[1,19; 1,88]	[1,15; 1,86]								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,20	95,98	94,19	92,66	91,10	89,83	88,02	86,68	85,38								
	CI		[99,01; 99,39]	[95,55; 96,41]	[93,67; 94,71]	[92,07; 93,25]	[90,45; 91,75]	[89,13; 90,53]	[87,26; 88,78]	[85,87; 87,49]	[84,52; 86,24]									
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>9940</i>	<i>9118</i>	<i>8435</i>	<i>7735</i>	<i>7205</i>	<i>6731</i>	<i>6317</i>	<i>5936</i>	<i>5626</i>								
2008-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	8791	8467	7693	6900	6316	5840	5461	5050	4734									
	auswertbar	Anzahl		7904	7172	6514	6036	5613	5230	4848	4566									
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		234	166	102	106	72	110	70	57									
		Anteil in %		2,96	2,31	1,57	1,76	1,28	2,10	1,44	1,25									
		CI Anteil in %		[2,59; 3,33]	[1,97; 2,66]	[1,26; 1,87]	[1,42; 2,09]	[0,99; 1,58]	[1,71; 2,49]	[1,11; 1,78]	[0,93; 1,57]									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,13	94,91	93,46	91,84	90,67	88,78	87,52	86,43									
	CI		[96,77; 97,49]	[94,42; 95,40]	[92,90; 94,02]	[91,21; 92,47]	[90,00; 91,34]	[88,03; 89,53]	[86,73; 88,31]	[85,60; 87,26]										
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>9074</i>	<i>8463</i>	<i>7733</i>	<i>7156</i>	<i>6701</i>	<i>6331</i>	<i>5959</i>	<i>5643</i>									

EZ	Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2008-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6215	5999	5370	4884	4459	4105	3784	3519										
	auswertbar	Anzahl		5656	5050	4607	4275	3922	3620	3369										
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		203	99	81	77	82	69	49										
		Anteil in %		3,59	1,96	1,76	1,80	2,09	1,91	1,45										
		CI Anteil in %		[3,10; 4,07]	[1,58; 2,34]	[1,38; 2,14]	[1,40; 2,20]	[1,64; 2,54]	[1,46; 2,35]	[1,05; 1,86]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,48	94,62	92,99	91,33	89,44	87,75	86,48										
	CI		[96,00; 96,96]	[94,03; 95,21]	[92,31; 93,67]	[90,57; 92,09]	[88,59; 90,29]	[86,83; 88,67]	[85,51; 87,45]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6552</i>	<i>6320</i>	<i>5851</i>	<i>5399</i>	<i>5008</i>	<i>4674</i>	<i>4394</i>	<i>4147</i>										
2009-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5269	5062	4584	4166	3865	3547	3308											
	auswertbar	Anzahl		4846	4338	3986	3703	3407	3211											
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		123	71	49	68	52	34											
		Anteil in %		2,54	1,64	1,23	1,84	1,53	1,06											
		CI Anteil in %		[2,10; 2,98]	[1,26; 2,01]	[0,89; 1,57]	[1,40; 2,27]	[1,11; 1,94]	[0,70; 1,41]											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,50	95,92	94,76	93,04	91,63	90,66											
	CI		[97,06; 97,94]	[95,36; 96,48]	[94,12; 95,40]	[92,29; 93,79]	[90,80; 92,46]	[89,78; 91,54]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5527</i>	<i>5299</i>	<i>4907</i>	<i>4513</i>	<i>4221</i>	<i>3942</i>	<i>3724</i>											
2009-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5670	5414	4824	4395	4047	3756												
	auswertbar	Anzahl		5140	4587	4225	3899	3628												
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		135	75	73	60	49												
		Anteil in %		2,63	1,64	1,73	1,54	1,35												
		CI Anteil in %		[2,19; 3,06]	[1,27; 2,00]	[1,33; 2,12]	[1,15; 1,93]	[0,97; 1,73]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,42	95,85	94,21	92,77	91,52												
	CI		[96,99; 97,85]	[95,30; 96,40]	[93,55; 94,87]	[92,03; 93,51]	[90,71; 92,33]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5982</i>	<i>5705</i>	<i>5205</i>	<i>4802</i>	<i>4483</i>	<i>4208</i>												
2010-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6288	6044	5451	4929	4555													
	auswertbar	Anzahl		5830	5171	4713	4386													
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		134	107	50	62													
		Anteil in %		2,30	2,07	1,06	1,41													
		CI Anteil in %		[1,91; 2,68]	[1,68; 2,46]	[0,77; 1,35]	[1,06; 1,76]													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,72	95,72	94,71	93,37													
	CI		[97,34; 98,10]	[95,19; 96,25]	[94,12; 95,30]	[92,70; 94,04]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6630</i>	<i>6363</i>	<i>5859</i>	<i>5409</i>	<i>5055</i>													
2010-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6314	6051	5431	4932														
	auswertbar	Anzahl		5798	5127	4739														
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		188	93	61														
		Anteil in %		3,24	1,81	1,29														
		CI Anteil in %		[2,79; 3,70]	[1,45; 2,18]	[0,97; 1,61]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,80	95,06	93,84														
	CI		[96,35; 97,25]	[94,50; 95,62]	[93,21; 94,47]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6682</i>	<i>6400</i>	<i>5912</i>	<i>5443</i>														
2011-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5993	5754	5166															
	auswertbar	Anzahl		5511	4888															
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		153	78															
		Anteil in %		2,78	1,60															
		CI Anteil in %		[2,34; 3,21]	[1,24; 1,95]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,26	95,70															
	CI		[96,83; 97,69]	[95,16; 96,24]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6352</i>	<i>6098</i>	<i>5609</i>															

EZ	Erstauftreten einer diabetischen Nephropathie im Kollektiv der Patienten ohne diabetische Nephropathie laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2011-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5022	4832																	
	auswertbar	Anzahl		4633																	
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl		112																	
		Anteil in %		2,42																	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	CI Anteil in %		[1,98; 2,86]																	
		Rate		97,58																	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5365</i>	<i>5157</i>																	
2012-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5640																		
	auswertbar	Anzahl																			
	erstmalig aufgetretene diabetische Nephropathie	Anzahl																			
		Anteil in %																			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	CI Anteil in %																			
		Rate																			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5991</i>																		

In Tabelle 3.5.3 wird dokumentiert, bei wie vielen Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren **ein erheblich auffälliger Fußstatus** (definiert als erstmalig vermerkte Wagner-Stadien 2 bis 5 oder Armstrong-Stadien C bis D) dokumentiert war. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation kein auffälliger oder ein leicht auffälliger Fußstatus vorlag. Dieser Status ist wie folgt definiert: Keine Amputationen und unauffälliger Fußstatus und keine Angaben zu Wagner-oder Armstrong-Stadien oder Wagner-Stadien 0 bis 1 oder Armstrong-Stadien A bis B. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier“ dargestellt.

Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch kein erheblich auffälliger Fußstatus dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die benötigten Angaben vorlagen. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. bei welchem Anteil im Berichtshalbjahr ein erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus dokumentiert ist (Wagner-Stadium 2 bis 5 oder Armstrong-Stadium C bis D).

In der Kohorte 2003-1 waren anfangs 18532 Patienten eingeschrieben. Bei 18212 dieser Personen war laut Erstdokumentation kein auffälliger oder nur ein leicht auffälliger Fußstatus dokumentiert. Dieses Kollektiv umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch 4443 Mitglieder. Bei 3385 Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei 0,18 Prozent dieser auswertbaren Patienten wurde im letzten Berichtshalbjahr ein erheblich auffälliger Fußstatus (Wagner-Stadien 2 bis 5 oder Armstrong-Stadien C bis D) dokumentiert.

Tabelle 3.5.3 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	18212	16644	14980	13592	12300	11359	10435	8851	8172	7481	7129	6639	6263	5937	5587	5246	4959	4696	4443
	auswertbar	Anzahl		13316	14005	11220	10202	9601	8588	7333	6775	6104	5734	5169	4823	4571	4189	4048	3851	3696	3385
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		29	30	46	23	32	21	13	11	8	6	8	6	4	10	7	9	8	6
		Anteil in %		0,22	0,21	0,41	0,23	0,33	0,24	0,18	0,16	0,13	0,10	0,15	0,12	0,09	0,24	0,17	0,23	0,22	0,18
		CI Anteil in %		[0,14; 0,30]	[0,14; 0,29]	[0,29; 0,53]	[0,13; 0,32]	[0,22; 0,45]	[0,14; 0,35]	[0,08; 0,27]	[0,07; 0,26]	[0,04; 0,22]	[0,02; 0,19]	[0,05; 0,26]	[0,02; 0,22]	[0,00; 0,17]	[0,09; 0,39]	[0,04; 0,30]	[0,08; 0,39]	[0,07; 0,37]	[0,04; 0,32]
	davon Wagner-Stadium 2 bis 5	Anzahl		29	30	36	18	28	18	11	10	8	6	7	4	4	8	6	7	5	4
		Anteil in %		100,00	100,00	78,26	78,26	87,50	85,71	84,62	90,91	100,00	100,00	87,50	66,67	100,00	80,00	85,71	77,78	62,50	66,67
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[66,21; 90,31]	[61,02; 95,50]	[75,86; 99,14]	[70,38; 100,00]	[64,20; 100,00]	[73,09; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[63,00; 100,00]	[25,35; 100,00]	[100,00; 100,00]	[53,87; 100,00]	[57,71; 100,00]	[48,97; 100,00]	[26,64; 98,36]	[25,35; 100,00]
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		0	0	18	10	10	7	7	4	3	2	4	3	1	3	1	5	5	5
		Anteil in %		0,00	0,00	39,13	43,48	31,25	33,33	53,85	36,36	37,50	33,33	50,00	50,00	25,00	30,00	14,29	55,56	62,50	83,33
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[24,87; 53,39]	[22,76; 64,19]	[14,93; 47,57]	[12,67; 53,99]	[25,64; 82,05]	[6,55; 66,18]	[1,64; 73,36]	[0,00; 74,65]	[12,96; 87,04]	[6,17; 93,83]	[0,00; 74,00]	[0,06; 59,94]	[0,00; 42,29]	[21,12; 89,99]	[26,64; 98,36]	[50,67; 100,00]
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,82	99,62	99,26	99,07	98,77	98,56	98,40	98,26	98,15	98,06	97,93	97,82	97,75	97,55	97,40	97,20	97,00	96,83
		CI		[99,75; 99,89]	[99,52; 99,72]	[99,12; 99,40]	[98,91; 99,23]	[98,58; 98,96]	[98,35; 98,77]	[98,17; 98,63]	[98,02; 98,50]	[97,90; 98,40]	[97,80; 98,32]	[97,65; 98,21]	[97,53; 98,11]	[97,45; 98,05]	[97,23; 97,87]	[97,06; 97,74]	[96,84; 97,56]	[96,61; 97,39]	[96,42; 97,24]
	Patienten insgesamt	Anzahl	18532	16919	15229	13819	12524	11575	10657	9051	8357	7654	7302	6797	6413	6084	5724	5377	5082	4817	4564
2003-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	15033	13036	11760	10516	9566	8723	7865	7197	6524	6224	5844	5553	5244	4963	4705	4463	4195	3981	
	auswertbar	Anzahl		11694	9716	8852	8018	7205	6546	5871	5291	5066	4562	4231	4069	3822	3679	3443	3293	3066	
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		40	39	19	18	17	13	10	9	13	9	8	7	7	7	9	10	3	
		Anteil in %		0,34	0,40	0,21	0,22	0,24	0,20	0,17	0,17	0,26	0,20	0,19	0,17	0,18	0,19	0,26	0,30	0,10	
		CI Anteil in %		[0,24; 0,45]	[0,28; 0,53]	[0,12; 0,31]	[0,12; 0,33]	[0,12; 0,35]	[0,09; 0,31]	[0,06; 0,28]	[0,06; 0,28]	[0,12; 0,40]	[0,07; 0,33]	[0,06; 0,32]	[0,04; 0,30]	[0,05; 0,32]	[0,05; 0,33]	[0,09; 0,43]	[0,12; 0,49]	[0,00; 0,21]	
	davon Wagner-Stadium 2 bis 5	Anzahl		40	24	13	15	14	11	9	7	10	8	5	7	3	5	7	6	2	
		Anteil in %		100,00	61,54	68,42	83,33	82,35	84,62	90,00	77,78	76,92	88,89	62,50	100,00	42,86	71,43	77,78	60,00	66,67	
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[46,07; 77,01]	[46,95; 89,90]	[65,62; 100,00]	[63,67; 100,00]	[64,20; 100,00]	[70,40; 100,00]	[48,97; 100,00]	[53,08; 100,00]	[67,11; 100,00]	[26,64; 98,36]	[100,00; 100,00]	[3,26; 82,46]	[35,28; 100,00]	[48,97; 100,00]	[27,99; 92,01]	[1,33; 100,00]	
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		0	23	13	5	4	6	3	3	5	4	4	5	5	4	4	6	1	
		Anteil in %		0,00	58,97	68,42	27,78	23,53	46,15	30,00	33,33	38,46	44,44	50,00	71,43	71,43	57,14	44,44	60,00	33,33	
		CI Anteil in %		[0,00; 0,00]	[43,33; 74,61]	[46,95; 89,90]	[6,49; 49,07]	[2,74; 44,31]	[17,95; 74,36]	[0,06; 59,94]	[0,67; 66,00]	[10,93; 65,99]	[10,01; 78,88]	[12,96; 87,04]	[35,28; 100,00]	[35,28; 100,00]	[17,54; 96,74]	[10,01; 78,88]	[27,99; 92,01]	[0,00; 98,67]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,69	99,34	99,15	98,96	98,75	98,58	98,43	98,29	98,07	97,90	97,75	97,60	97,45	97,29	97,07	96,80	96,70	
		CI		[99,59; 99,79]	[99,20; 99,48]	[98,98; 99,32]	[98,77; 99,15]	[98,54; 98,96]	[98,35; 98,81]	[98,18; 98,68]	[98,02; 98,56]	[97,78; 98,36]	[97,59; 98,21]	[97,42; 98,08]	[97,26; 97,94]	[97,09; 97,81]	[96,91; 97,67]	[96,66; 97,48]	[96,36; 97,24]	[96,25; 97,15]	
	Patienten insgesamt	Anzahl	15338	13264	11995	10737	9767	8914	8042	7361	6677	6381	5997	5700	5383	5096	4829	4575	4304	4094	

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2004-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6616	5889	5206	4698	4215	3774	3497	3181	3013	2804	2625	2470	2342	2203	2091	1982	1903		
	auswertbar	Anzahl		4905	4219	3912	3499	3147	2840	2605	2362	2213	2052	1936	1807	1705	1640	1543	1492		
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		23	12	8	9	4	5	8	5	5	4	3	6	2	0	2	2		
		Anteil in %		0,47	0,28	0,20	0,26	0,13	0,18	0,31	0,21	0,23	0,19	0,15	0,33	0,12	0,00	0,13	0,13		
		CI Anteil in %		[0,28; 0,66]	[0,12; 0,45]	[0,06; 0,35]	[0,09; 0,43]	[0,00; 0,25]	[0,02; 0,33]	[0,09; 0,52]	[0,03; 0,40]	[0,03; 0,42]	[0,00; 0,39]	[0,00; 0,33]	[0,07; 0,60]	[0,00; 0,28]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,31]	[0,00; 0,32]		
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		19	11	8	8	4	3	5	4	5	3	3	6	2		1	2		
		Anteil in %		82,61	91,67	100,00	88,89	100,00	60,00	62,50	80,00	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00		50,00	100,00	
		CI Anteil in %		[66,77; 98,45]	[75,33; 100,00]	[100,00; 100,00]	[67,11; 100,00]	[100,00; 100,00]	[11,99; 100,00]	[26,64; 98,36]	[40,80; 100,00]	[100,00; 100,00]	[26,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]		[0,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		10	5	1	3	1	3	5	2	0	3	0	3	0		1	1		
		Anteil in %		43,48	41,67	12,50	33,33	25,00	60,00	62,50	40,00	0,00	75,00	0,00	50,00	0,00		50,00	50,00		
		CI Anteil in %		[22,76; 64,19]	[12,53; 70,80]	[0,00; 37,00]	[0,67; 66,00]	[0,00; 74,00]	[11,99; 100,00]	[26,64; 98,36]	[0,00; 88,01]	[0,00; 0,00]	[26,00; 100,00]	[0,00; 0,00]	[6,17; 93,83]	[0,00; 0,00]		[0,00; 100,00]	[0,00; 100,00]		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,59	99,35	99,17	98,94	98,83	98,67	98,41	98,23	98,04	97,87	97,74	97,46	97,36	97,36	97,25	97,12		
		CI		[99,42; 99,76]	[99,13; 99,57]	[98,92; 99,42]	[98,65; 99,23]	[98,52; 99,14]	[98,33; 99,01]	[98,03; 98,79]	[98,03; 98,82]	[97,59; 98,49]	[97,40; 98,34]	[97,24; 98,24]	[96,92; 98,00]	[96,80; 97,92]	[96,80; 97,92]	[96,67; 97,83]	[96,51; 97,73]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6722</i>	<i>5979</i>	<i>5294</i>	<i>4783</i>	<i>4296</i>	<i>3854</i>	<i>3572</i>	<i>3250</i>	<i>3080</i>	<i>2873</i>	<i>2690</i>	<i>2532</i>	<i>2401</i>	<i>2263</i>	<i>2147</i>	<i>2032</i>	<i>1951</i>		
2004-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4549	4123	3750	3383	3040	2831	2645	2530	2351	2221	2111	2005	1900	1816	1731	1640			
	auswertbar	Anzahl		3373	3149	2775	2434	2228	2096	1888	1746	1593	1520	1397	1322	1284	1189	1120			
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		14	10	7	1	4	7	3	7	4	0	2	0	3	4	0			
		Anteil in %		0,42	0,32	0,25	0,04	0,18	0,33	0,16	0,40	0,25	0,00	0,14	0,00	0,23	0,34	0,00			
		CI Anteil in %		[0,20; 0,63]	[0,12; 0,51]	[0,07; 0,44]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,36]	[0,09; 0,58]	[0,00; 0,34]	[0,10; 0,70]	[0,01; 0,50]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,34]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,50]	[0,01; 0,67]	[0,00; 0,00]			
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		10	9	6	1	3	4	2	6	4		2		3	4				
		Anteil in %		71,43	90,00	85,71	100,00	75,00	57,14	66,67	85,71	100,00		100,00		100,00	100,00				
		CI Anteil in %		[46,87; 95,99]	[70,40; 100,00]	[57,71; 100,00]	[100,00; 100,00]	[26,00; 100,00]	[17,54; 96,74]	[1,33; 100,00]	[57,71; 100,00]	[100,00; 100,00]		[100,00; 100,00]		[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]				
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		6	4	2	0	2	3	1	4	2		1		2	2				
		Anteil in %		42,86	40,00	28,57	0,00	50,00	42,86	33,33	57,14	50,00		50,00		66,67	50,00				
		CI Anteil in %		[15,96; 69,76]	[7,99; 72,01]	[0,00; 64,72]	[0,00; 0,00]	[0,00; 100,00]	[3,26; 82,46]	[0,00; 98,67]	[17,54; 96,74]	[0,00; 100,00]		[0,00; 100,00]		[1,33; 100,00]	[0,00; 100,00]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,65	99,36	99,14	99,11	98,95	98,66	98,52	98,18	97,98	97,98	97,86	97,86	97,67	97,38	97,38			
		CI		[99,46; 99,84]	[99,11; 99,61]	[98,84; 99,44]	[98,80; 99,42]	[98,61; 99,29]	[98,25; 99,07]	[98,09; 98,95]	[97,68; 98,68]	[97,44; 98,52]	[97,44; 98,52]	[97,30; 98,42]	[97,30; 98,42]	[97,07; 98,27]	[96,72; 98,04]	[96,72; 98,04]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5209</i>	<i>4715</i>	<i>4298</i>	<i>3897</i>	<i>3506</i>	<i>3261</i>	<i>3038</i>	<i>2910</i>	<i>2710</i>	<i>2571</i>	<i>2446</i>	<i>2321</i>	<i>2204</i>	<i>2102</i>	<i>2005</i>	<i>1906</i>			
2005-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6007	5612	5095	4523	4083	3737	3537	3303	3118	2923	2740	2570	2449	2325	2201				
	auswertbar	Anzahl		4648	4190	3717	3311	3028	2824	2579	2401	2225	2069	1959	1880	1744	1669				
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		15	17	6	3	5	5	6	7	4	1	2	1	2	4				
		Anteil in %		0,32	0,41	0,16	0,09	0,17	0,18	0,23	0,29	0,18	0,05	0,10	0,05	0,11	0,24				
		CI Anteil in %		[0,16; 0,49]	[0,21; 0,60]	[0,03; 0,29]	[0,00; 0,19]	[0,02; 0,31]	[0,02; 0,33]	[0,05; 0,42]	[0,08; 0,51]	[0,00; 0,36]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,24]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,27]	[0,01; 0,47]				
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		13	15	4	3	4	5	3	6	1	1	2	1	1	2				
		Anteil in %		86,67	88,24	66,67	100,00	80,00	100,00	50,00	85,71	25,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00				
		CI Anteil in %		[68,86; 100,00]	[72,45; 100,00]	[25,35; 100,00]	[100,00; 100,00]	[40,80; 100,00]	[100,00; 100,00]	[6,17; 93,83]	[57,71; 100,00]	[0,00; 74,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[0,00; 100,00]	[0,00; 100,00]				
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		7	9	3	1	3	2	4	3	4	0	1	0	1	3				
		Anteil in %		46,67	52,94	50,00	33,33	60,00	40,00	66,67	42,86	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	75,00				
		CI Anteil in %		[20,53; 72,80]	[28,48; 77,40]	[6,17; 93,83]	[0,00; 98,67]	[11,99; 100,00]	[0,00; 88,01]	[25,35; 100,00]	[3,26; 82,46]	[100,00; 100,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 100,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 100,00]	[26,00; 100,00]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,72	99,36	99,22	99,14	99,00	98,85	98,65	98,41	98,26	98,13	98,09	97,99	97,75					
		CI		[99,58; 99,86]	[99,14; 99,58]	[98,97; 99,47]	[98,88; 99,40]	[98,71; 99,29]	[98,53; 99,17]	[98,30; 99,00]	[98,01; 98,81]	[97,84; 98,68]	[97,79; 98,65]	[97,68; 98,58]	[97,63; 98,55]	[97,51; 98,47]	[97,22; 98,28]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>7326</i>	<i>6819</i>	<i>6209</i>	<i>5519</i>	<i>4992</i>	<i>4584</i>	<i>4340</i>	<i>4066</i>	<i>3849</i>	<i>3623</i>	<i>3415</i>	<i>3216</i>	<i>3064</i>	<i>2915</i>	<i>2769</i>				

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2005-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	8198	7551	6854	6241	5704	5370	4986	4683	4387	4101	3827	3608	3427	3223					
	auswertbar	Anzahl		6542	6002	5273	4838	4490	4036	3763	3505	3259	3045	2861	2707	2522					
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		18	11	9	8	7	16	17	9	6	6	5	4	9					
		Anteil in %		0,28	0,18	0,17	0,17	0,16	0,40	0,45	0,26	0,18	0,20	0,17	0,15	0,36					
		CI Anteil in %		[0,15; 0,40]	[0,08; 0,29]	[0,06; 0,28]	[0,05; 0,28]	[0,04; 0,27]	[0,20; 0,59]	[0,24; 0,67]	[0,09; 0,42]	[0,04; 0,33]	[0,04; 0,35]	[0,02; 0,33]	[0,00; 0,29]	[0,12; 0,59]					
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		15	10	8	5	6	12	14	9	5	4	2	3	9					
		Anteil in %		83,33	90,91	88,89	62,50	85,71	75,00	82,35	100,00	83,33	66,67	40,00	75,00	100,00					
		CI Anteil in %		[65,62; 100,00]	[73,09; 100,00]	[67,11; 100,00]	[26,64; 98,36]	[57,71; 100,00]	[53,09; 96,91]	[63,67; 100,00]	[100,00; 100,00]	[50,67; 100,00]	[25,35; 100,00]	[0,00; 88,01]	[26,00; 100,00]	[100,00; 100,00]					
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		6	3	3	5	4	7	4	1	3	3	4	1	5					
		Anteil in %		33,33	27,27	33,33	62,50	57,14	43,75	23,53	11,11	50,00	50,00	80,00	25,00	55,56					
		CI Anteil in %		[10,92; 55,74]	[0,00; 54,88]	[0,67; 66,00]	[26,64; 98,36]	[17,54; 96,74]	[18,64; 68,86]	[2,74; 44,31]	[0,00; 32,89]	[6,17; 93,83]	[6,17; 93,83]	[40,80; 100,00]	[0,00; 74,00]	[21,12; 89,99]					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,75	99,58	99,43	99,28	99,14	98,80	98,41	98,18	98,03	97,86	97,70	97,57	97,22					
		CI		[99,63; 99,87]	[99,43; 99,73]	[99,25; 99,61]	[99,07; 99,49]	[98,91; 99,37]	[98,51; 99,09]	[98,07; 98,75]	[97,81; 98,55]	[97,64; 98,42]	[97,45; 98,27]	[97,27; 98,13]	[97,12; 98,02]	[96,72; 97,72]					
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>9778</i>	<i>8989</i>	<i>8164</i>	<i>7426</i>	<i>6790</i>	<i>6402</i>	<i>5933</i>	<i>5585</i>	<i>5240</i>	<i>4913</i>	<i>4579</i>	<i>4321</i>	<i>4101</i>	<i>3871</i>				
2006-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9194	8662	7887	7259	6885	6416	6057	5669	5337	4982	4713	4420	4209						
	auswertbar	Anzahl		7457	6722	5970	5628	4984	4764	4349	4088	3884	3671	3398	3249						
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		24	18	13	4	17	17	11	9	7	8	6	8						
		Anteil in %		0,32	0,27	0,22	0,07	0,34	0,36	0,25	0,22	0,18	0,22	0,18	0,25						
		CI Anteil in %		[0,19; 0,45]	[0,14; 0,39]	[0,10; 0,34]	[0,00; 0,14]	[0,18; 0,50]	[0,19; 0,53]	[0,10; 0,40]	[0,08; 0,36]	[0,05; 0,31]	[0,07; 0,37]	[0,04; 0,32]	[0,08; 0,42]						
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		22	17	12	4	14	12	9	6	5	6	6	7						
		Anteil in %		91,67	94,44	92,31	100,00	82,35	70,59	81,82	66,67	71,43	75,00	100,00	87,50						
		CI Anteil in %		[80,37; 100,00]	[83,56; 100,00]	[77,23; 100,00]	[100,00; 100,00]	[63,67; 100,00]	[48,26; 92,91]	[57,91; 100,00]	[34,00; 99,33]	[35,28; 100,00]	[42,92; 100,00]	[100,00; 100,00]	[63,00; 100,00]						
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		10	5	5	1	8	9	5	5	4	3	0	4						
		Anteil in %		41,67	27,78	38,46	25,00	47,06	52,94	45,45	55,56	57,14	37,50	0,00	50,00						
		CI Anteil in %		[21,52; 61,82]	[6,49; 49,07]	[10,93; 65,99]	[0,00; 74,00]	[22,60; 71,52]	[28,48; 77,40]	[14,59; 76,32]	[21,12; 89,99]	[17,54; 96,74]	[1,64; 73,36]	[0,00; 0,00]	[12,96; 87,04]						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,71	99,47	99,28	99,22	98,93	98,63	98,41	98,23	98,08	97,89	97,73	97,49						
		CI		[99,59; 99,83]	[99,31; 99,63]	[99,09; 99,47]	[99,02; 99,42]	[98,69; 99,17]	[98,35; 98,91]	[98,10; 98,72]	[97,90; 98,56]	[97,73; 98,43]	[97,52; 98,26]	[97,34; 98,12]	[97,07; 97,91]						
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>11195</i>	<i>10505</i>	<i>9553</i>	<i>8754</i>	<i>8293</i>	<i>7702</i>	<i>7289</i>	<i>6827</i>	<i>6435</i>	<i>6016</i>	<i>5692</i>	<i>5332</i>	<i>5084</i>					
2006-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	11819	11285	10327	9637	8751	8201	7633	7206	6746	6347	5977	5647							
	auswertbar	Anzahl		9458	8564	7676	6931	6392	6061	5603	5329	4946	4677	4294							
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		25	20	12	27	21	19	11	12	7	9	7							
		Anteil in %		0,26	0,23	0,16	0,39	0,33	0,31	0,20	0,23	0,14	0,19	0,16							
		CI Anteil in %		[0,16; 0,37]	[0,13; 0,34]	[0,07; 0,24]	[0,24; 0,54]	[0,19; 0,47]	[0,17; 0,45]	[0,08; 0,31]	[0,10; 0,35]	[0,04; 0,25]	[0,07; 0,32]	[0,04; 0,28]							
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		22	17	11	25	15	16	7	7	5	8	6							
		Anteil in %		88,00	85,00	91,67	92,59	71,43	84,21	63,64	58,33	71,43	88,89	85,71							
		CI Anteil in %		[75,00; 100,00]	[68,94; 100,00]	[75,33; 100,00]	[82,53; 100,00]	[51,63; 91,23]	[67,36; 100,00]	[33,82; 93,45]	[29,20; 87,47]	[35,28; 100,00]	[67,11; 100,00]	[57,71; 100,00]							
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		8	9	6	12	10	8	7	7	5	3	2							
		Anteil in %		32,00	45,00	50,00	44,44	47,62	42,11	63,64	58,33	71,43	33,33	28,57							
		CI Anteil in %		[13,34; 50,66]	[22,63; 67,37]	[20,45; 79,55]	[25,34; 63,54]	[25,73; 69,51]	[19,30; 64,91]	[33,82; 93,45]	[29,20; 87,47]	[35,28; 100,00]	[0,67; 66,00]	[0,00; 64,72]							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,77	99,56	99,42	99,08	98,80	98,53	98,36	98,17	98,04	97,87	97,71							
		CI		[99,68; 99,86]	[99,43; 99,69]	[99,27; 99,57]	[98,88; 99,28]	[98,57; 99,03]	[98,27; 98,79]	[98,08; 98,64]	[97,87; 98,47]	[97,73; 98,35]	[97,54; 98,20]	[97,36; 98,06]							
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>14493</i>	<i>13791</i>	<i>12613</i>	<i>11771</i>	<i>10718</i>	<i>10080</i>	<i>9390</i>	<i>8865</i>	<i>8292</i>	<i>7821</i>	<i>7374</i>	<i>6965</i>						

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2007-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	14440	13748	12909	11719	10922	10211	9609	9037	8521	8029	7616								
	auswertbar	Anzahl		11584	10764	9244	8793	8159	7682	7195	6897	6344	5967								
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		35	15	30	23	20	13	13	16	14	16								
		Anteil in %		0,30	0,14	0,32	0,26	0,25	0,17	0,18	0,23	0,22	0,27								
		CI Anteil in %		[0,20; 0,40]	[0,07; 0,21]	[0,21; 0,44]	[0,15; 0,37]	[0,14; 0,35]	[0,08; 0,26]	[0,08; 0,28]	[0,12; 0,35]	[0,11; 0,34]	[0,14; 0,40]								
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		34	15	25	20	16	12	11	10	12	15								
		Anteil in %		97,14	100,00	83,33	86,96	80,00	92,31	84,62	62,50	85,71	93,75								
		CI Anteil in %		[91,54; 100,00]	[100,00; 100,00]	[69,77; 96,90]	[72,88; 100,00]	[62,01; 97,99]	[77,23; 100,00]	[64,20; 100,00]	[38,00; 87,00]	[66,69; 100,00]	[81,50; 100,00]								
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		9	8	13	7	9	10	9	10	8	8								
		Anteil in %		25,71	53,33	43,33	30,43	45,00	76,92	69,23	62,50	57,14	50,00								
		CI Anteil in %		[11,02; 40,41]	[27,20; 79,47]	[25,30; 61,37]	[11,21; 49,66]	[22,63; 67,37]	[53,08; 100,00]	[43,12; 95,34]	[38,00; 87,00]	[30,24; 84,04]	[24,70; 75,30]								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,73	99,61	99,33	99,10	98,89	98,74	98,59	98,38	98,18	97,92								
		CI		[99,64; 99,82]	[99,50; 99,72]	[99,18; 99,48]	[98,93; 99,27]	[98,69; 99,09]	[98,53; 98,95]	[98,36; 98,82]	[98,13; 98,63]	[97,91; 98,45]	[97,62; 98,22]								
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>17190</i>	<i>16142</i>	<i>14666</i>	<i>13722</i>	<i>12823</i>	<i>12070</i>	<i>11283</i>	<i>10635</i>	<i>10034</i>	<i>9520</i>								
2007-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	8176	7889	7256	6726	6167	5747	5369	5053	4745	4495									
	auswertbar	Anzahl		6589	5749	5278	4918	4500	4306	3986	3794	3423									
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		23	11	12	7	2	7	3	9	8									
		Anteil in %		0,35	0,19	0,23	0,14	0,04	0,16	0,08	0,24	0,23									
		CI Anteil in %		[0,21; 0,49]	[0,08; 0,30]	[0,10; 0,36]	[0,04; 0,25]	[0,00; 0,11]	[0,04; 0,28]	[0,00; 0,16]	[0,08; 0,39]	[0,07; 0,40]									
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		21	10	12	6	0	5	2	7	6									
		Anteil in %		91,30	90,91	100,00	85,71	0,00	71,43	66,67	77,78	75,00									
		CI Anteil in %		[79,53; 100,00]	[73,09; 100,00]	[100,00; 100,00]	[57,71; 100,00]	[0,00; 0,00]	[35,28; 100,00]	[1,33; 100,00]	[48,97; 100,00]	[42,92; 100,00]									
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		11	4	4	1	2	3	3	5	5									
		Anteil in %		47,83	36,36	33,33	14,29	100,00	42,86	100,00	55,56	62,50									
		CI Anteil in %		[26,95; 68,70]	[6,55; 66,18]	[5,48; 61,19]	[0,00; 42,29]	[100,00; 100,00]	[3,26; 82,46]	[100,00; 100,00]	[21,12; 89,99]	[26,64; 98,36]									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,69	99,52	99,32	99,20	99,16	99,02	98,95	98,73	98,50									
		CI		[99,56; 99,82]	[99,36; 99,68]	[99,12; 99,52]	[98,98; 99,42]	[98,94; 99,38]	[98,77; 99,27]	[98,69; 99,21]	[98,44; 99,02]	[98,17; 98,83]									
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>9940</i>	<i>9118</i>	<i>8435</i>	<i>7735</i>	<i>7205</i>	<i>6731</i>	<i>6317</i>	<i>5936</i>	<i>5626</i>									
2008-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	7309	7052	6568	6012	5562	5200	4913	4628	4371										
	auswertbar	Anzahl		5745	5206	4704	4397	4070	3894	3575	3338										
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		22	25	18	8	18	6	5	3										
		Anteil in %		0,38	0,48	0,38	0,18	0,44	0,15	0,14	0,09										
		CI Anteil in %		[0,22; 0,54]	[0,29; 0,67]	[0,21; 0,56]	[0,06; 0,31]	[0,24; 0,65]	[0,03; 0,28]	[0,02; 0,26]	[0,00; 0,19]										
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		19	13	10	6	6	3	4	3										
		Anteil in %		86,36	52,00	55,56	75,00	33,33	50,00	80,00	100,00										
		CI Anteil in %		[71,69; 100,00]	[32,01; 71,99]	[31,93; 79,18]	[42,92; 100,00]	[10,92; 55,74]	[6,17; 93,83]	[40,80; 100,00]	[100,00; 100,00]										
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		8	15	12	2	16	3	2	1										
		Anteil in %		36,36	60,00	66,67	25,00	88,89	50,00	40,00	33,33										
		CI Anteil in %		[15,79; 56,94]	[40,40; 79,60]	[44,26; 89,08]	[0,00; 57,08]	[73,95; 100,00]	[6,17; 93,83]	[0,00; 88,01]	[0,00; 98,67]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,66	99,25	98,92	98,76	98,38	98,25	98,12	98,03										
		CI		[99,52; 99,80]	[99,03; 99,47]	[98,66; 99,18]	[98,48; 99,04]	[98,48; 98,71]	[98,05; 98,60]	[97,90; 98,49]	[97,65; 98,41]										
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>9074</i>	<i>8463</i>	<i>7733</i>	<i>7156</i>	<i>6701</i>	<i>6331</i>	<i>5959</i>	<i>5643</i>										

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2008-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5074	4903	4543	4194	3883	3635	3419	3222										
	auswertbar	Anzahl		4061	3771	3360	3215	2950	2704	2456										
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		13	12	16	13	8	3	4										
		Anteil in %		0,32	0,32	0,48	0,40	0,27	0,11	0,16										
		CI Anteil in %		[0,15; 0,49]	[0,14; 0,50]	[0,24; 0,71]	[0,18; 0,62]	[0,08; 0,46]	[0,00; 0,24]	[0,00; 0,32]										
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		12	11	10	3	4	3	4										
		Anteil in %		92,31	91,67	62,50	23,08	50,00	100,00	100,00										
		CI Anteil in %		[77,23; 100,00]	[75,33; 100,00]	[38,00; 87,00]	[0,00; 46,92]	[12,96; 87,04]	[100,00; 100,00]	[100,00; 100,00]										
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		6	2	10	11	4	2	1										
		Anteil in %		46,15	16,67	62,50	84,62	50,00	66,67	25,00										
		CI Anteil in %		[17,95; 74,36]	[0,00; 38,69]	[38,00; 87,00]	[64,20; 100,00]	[12,96; 87,04]	[1,33; 100,00]	[0,00; 74,00]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,72	99,43	99,02	98,65	98,41	98,31	98,15										
		CI		[99,57; 99,87]	[99,21; 99,65]	[98,72; 99,32]	[98,29; 99,01]	[98,02; 98,80]	[97,90; 98,72]	[97,71; 98,59]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6552</i>	<i>6320</i>	<i>5851</i>	<i>5399</i>	<i>5008</i>	<i>4674</i>	<i>4394</i>	<i>4147</i>										
2009-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4202	4038	3750	3464	3234	3020	2859											
	auswertbar	Anzahl		3379	3147	2836	2730	2468	2327											
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		9	4	3	6	3	4											
		Anteil in %		0,27	0,13	0,11	0,22	0,12	0,17											
		CI Anteil in %		[0,09; 0,44]	[0,00; 0,25]	[0,00; 0,23]	[0,04; 0,40]	[0,00; 0,26]	[0,00; 0,34]											
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		8	2	0	5	2	4											
		Anteil in %		88,89	50,00	0,00	83,33	66,67	100,00											
		CI Anteil in %		[67,11; 100,00]	[0,00; 100,00]	[0,00; 0,00]	[50,67; 100,00]	[1,33; 100,00]	[100,00; 100,00]											
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		5	3	3	4	3	1											
		Anteil in %		55,56	75,00	100,00	66,67	100,00	25,00											
		CI Anteil in %		[21,12; 89,99]	[26,00; 100,00]	[100,00; 100,00]	[25,35; 100,00]	[100,00; 100,00]	[0,00; 74,00]											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,76	99,65	99,55	99,35	99,24	99,07											
		CI		[99,61; 99,91]	[99,46; 99,84]	[99,33; 99,77]	[99,08; 99,62]	[98,94; 99,54]	[98,73; 99,41]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5527</i>	<i>5299</i>	<i>4907</i>	<i>4513</i>	<i>4221</i>	<i>3942</i>	<i>3724</i>											
2009-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4465	4284	3922	3622	3383	3166												
	auswertbar	Anzahl		3604	3232	2978	2814	2494												
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		8	4	11	5	4												
		Anteil in %		0,22	0,12	0,37	0,18	0,16												
		CI Anteil in %		[0,07; 0,38]	[0,00; 0,24]	[0,15; 0,59]	[0,02; 0,33]	[0,00; 0,32]												
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		8	2	9	4	3												
		Anteil in %		100,00	50,00	81,82	80,00	75,00												
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[0,00; 100,00]	[57,91; 100,00]	[40,80; 100,00]	[26,00; 100,00]												
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		4	2	5	1	1												
		Anteil in %		50,00	50,00	45,45	20,00	25,00												
		CI Anteil in %		[12,96; 87,04]	[0,00; 100,00]	[14,59; 76,32]	[0,00; 59,20]	[0,00; 74,00]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,80	99,69	99,36	99,19	99,03												
		CI		[99,66; 99,94]	[99,51; 99,87]	[99,10; 99,62]	[98,89; 99,49]	[98,69; 99,37]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5982</i>	<i>5705</i>	<i>5205</i>	<i>4802</i>	<i>4483</i>	<i>4208</i>												

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4761	4574	4219	3894	3640														
	auswertbar	Anzahl		3907	3599	3183	3043														
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		13	8	4	4														
		Anteil in %		0,33	0,22	0,13	0,13														
		CI Anteil in %		[0,15; 0,51]	[0,07; 0,38]	[0,00; 0,25]	[0,00; 0,26]														
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		11	7	2	3														
		Anteil in %		84,62	87,50	50,00	75,00														
		CI Anteil in %		[64,20; 100,00]	[63,00; 100,00]	[0,00; 100,00]	[26,00; 100,00]														
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		7	4	2	4														
		Anteil in %		53,85	50,00	50,00	100,00														
		CI Anteil in %		[25,64; 82,05]	[12,96; 87,04]	[0,00; 100,00]	[100,00; 100,00]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,70	99,49	99,38	99,25														
		CI		[99,54; 99,86]	[99,27; 99,71]	[99,14; 99,62]	[98,97; 99,53]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6630</i>	<i>6363</i>	<i>5859</i>	<i>5409</i>															
2010-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4807	4618	4272	3931															
	auswertbar	Anzahl		3915	3537	3210															
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		6	7	3															
		Anteil in %		0,15	0,20	0,09															
		CI Anteil in %		[0,03; 0,28]	[0,05; 0,34]	[0,00; 0,20]															
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		6	6	3															
		Anteil in %		100,00	85,71	100,00															
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[57,71; 100,00]	[100,00; 100,00]															
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		5	3	0															
		Anteil in %		83,33	42,86	0,00															
		CI Anteil in %		[50,67; 100,00]	[3,26; 82,46]	[0,00; 0,00]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,86	99,68	99,58															
		CI		[99,75; 99,97]	[99,50; 99,86]	[99,37; 99,79]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6682</i>	<i>6400</i>	<i>5912</i>	<i>5443</i>															
2011-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4576	4397	4063																
	auswertbar	Anzahl		3682	3356																
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		11	4																
		Anteil in %		0,30	0,12																
		CI Anteil in %		[0,12; 0,48]	[0,00; 0,24]																
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		11	3																
		Anteil in %		100,00	75,00																
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[26,00; 100,00]																
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		3	2																
		Anteil in %		27,27	50,00																
		CI Anteil in %		[0,00; 54,88]	[0,00; 100,00]																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,72	99,60																
		CI		[99,56; 99,88]	[99,40; 99,80]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6352</i>	<i>6098</i>	<i>5609</i>																

EZ	Erstauftreten eines erheblich auffälligen Fußstatus bei Patienten mit unauffälligem bzw. nur leicht auffälligem Fußstatus laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2011-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	3890	3763																			
	auswertbar	Anzahl		3162																			
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl		12																			
		Anteil in %		0,38																			
		CI Anteil in %		[0,17; 0,59]																			
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl		8																			
		Anteil in %		66,67																			
		CI Anteil in %		[38,81; 94,52]																			
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl		5																			
		Anteil in %		41,67																			
		CI Anteil in %		[12,53; 70,80]																			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,62																			
		CI		[99,41; 99,83]																			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5365</i>	<i>5157</i>																			
2012-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4187																				
	auswertbar	Anzahl																					
	erstmalig aufgetretener erheblich auffälliger Fußstatus	Anzahl																					
		Anteil in %																					
		CI Anteil in %																					
	davon Wagner- Stadium 2 bis 5	Anzahl																					
		Anteil in %																					
		CI Anteil in %																					
	davon Armstrong Stadium C bis D	Anzahl																					
		Anteil in %																					
		CI Anteil in %																					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																					
		CI																					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5991</i>																				

In Tabelle 3.5.4 wird dokumentiert, bei wie vielen Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren **erstmalig eine Amputation** durchgeführt wurde. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Amputation erfolgt war.

Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine Amputation durchgeführt wurde. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die benötigten Angaben vorlagen. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil eine

erstmalig vorgenommene Amputation dokumentiert ist. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierten „Rate der ereignisfreien Zeit“ nach Kaplan-Meier dargestellt.

In der Kohorte 2003-1 waren anfangs 18532 Patienten eingeschrieben. Bei 18357 dieser Personen war laut Erstdokumentation keine Amputation durchgeführt wurden. Dieses Kollektiv umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch 4486 Mitglieder. Bei 4375 Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei 0,07 Prozent dieser auswertbaren Patienten wurde im letzten Berichtshalbjahr erstmalig eine Amputation durchgeführt.

Tabelle 3.5.4 Ereigniszeitanalyse: Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation

EZ	Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	18357	16763	15074	13645	12360	11417	10505	8914	8232	7537	7184	6690	6310	5978	5627	5288	4997	4736	4486
	auswertbar	Anzahl		13393	14087	13304	12009	11179	10050	8627	7986	7383	6853	6416	6125	5781	5442	5159	4894	4647	4375
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		30	59	12	15	13	8	5	3	5	5	8	6	3	4	4	4	3	3
		Anteil in %		0,22	0,42	0,09	0,12	0,12	0,08	0,06	0,04	0,07	0,07	0,12	0,10	0,05	0,07	0,08	0,08	0,06	0,07
		CI Anteil in %		[0,14; 0,30]	[0,31; 0,53]	[0,04; 0,14]	[0,06; 0,19]	[0,05; 0,18]	[0,02; 0,13]	[0,01; 0,11]	[0,00; 0,08]	[0,01; 0,13]	[0,01; 0,14]	[0,04; 0,21]	[0,02; 0,18]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,15]
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,81	99,42	99,33	99,21	99,09	99,02	98,96	98,92	98,85	98,78	98,66	98,57	98,51	98,44	98,37	98,29	98,22	98,16
CI			[99,74; 99,88]	[99,30; 99,54]	[99,20; 99,46]	[99,07; 99,35]	[98,93; 99,25]	[98,85; 99,19]	[98,79; 99,13]	[98,74; 99,10]	[98,66; 99,04]	[98,58; 98,98]	[98,45; 98,87]	[98,34; 98,80]	[98,28; 98,74]	[98,20; 98,68]	[98,11; 98,63]	[98,02; 98,56]	[97,94; 98,50]	[97,87; 98,45]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18532</i>	<i>16919</i>	<i>15229</i>	<i>13819</i>	<i>12524</i>	<i>11575</i>	<i>10657</i>	<i>9051</i>	<i>8357</i>	<i>7654</i>	<i>7302</i>	<i>6797</i>	<i>6413</i>	<i>6084</i>	<i>5724</i>	<i>5377</i>	<i>5082</i>	<i>4817</i>	<i>4564</i>	
2003-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	15149	13118	11805	10573	9619	8777	7917	7242	6565	6272	5895	5595	5278	4995	4730	4484	4217	4009	
	auswertbar	Anzahl		11766	11421	10293	9382	8442	7648	6898	6405	5982	5626	5333	5109	4839	4606	4346	4109	3891	
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		69	10	8	11	7	7	5	4	5	12	7	3	8	5	3	6	3	
		Anteil in %		0,59	0,09	0,08	0,12	0,08	0,09	0,07	0,06	0,08	0,21	0,13	0,06	0,17	0,11	0,07	0,15	0,08	
		CI Anteil in %		[0,45; 0,72]	[0,03; 0,14]	[0,02; 0,13]	[0,05; 0,19]	[0,02; 0,14]	[0,02; 0,16]	[0,01; 0,14]	[0,00; 0,12]	[0,01; 0,16]	[0,09; 0,33]	[0,03; 0,23]	[0,00; 0,13]	[0,05; 0,28]	[0,01; 0,20]	[0,00; 0,15]	[0,03; 0,26]	[0,00; 0,16]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,47	99,38	99,30	99,19	99,11	99,02	98,95	98,88	98,80	98,60	98,47	98,41	98,25	98,14	98,08	97,93	97,86	
CI			[99,34; 99,60]	[99,24; 99,52]	[99,15; 99,45]	[99,03; 99,35]	[98,94; 99,28]	[98,84; 99,20]	[98,76; 99,14]	[98,68; 99,08]	[98,58; 99,02]	[98,36; 98,84]	[98,21; 98,73]	[98,14; 98,68]	[97,96; 98,54]	[97,83; 98,45]	[97,77; 98,39]	[97,60; 98,26]	[97,52; 98,20]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15338</i>	<i>13264</i>	<i>11995</i>	<i>10737</i>	<i>9767</i>	<i>8914</i>	<i>8042</i>	<i>7361</i>	<i>6677</i>	<i>6381</i>	<i>5997</i>	<i>5700</i>	<i>5383</i>	<i>5096</i>	<i>4829</i>	<i>4575</i>	<i>4304</i>	<i>4094</i>		
2004-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6657	5924	5242	4733	4252	3813	3535	3216	3048	2844	2658	2505	2371	2232	2119	2004	1922		
	auswertbar	Anzahl		5597	5013	4571	4100	3692	3371	3101	2836	2676	2520	2381	2251	2145	2027	1934	1842		
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		14	4	5	2	2	3	2	1	6	1	4	3	4	3	1	3		
		Anteil in %		0,25	0,08	0,11	0,05	0,05	0,09	0,06	0,04	0,22	0,04	0,17	0,13	0,19	0,15	0,05	0,16		
		CI Anteil in %		[0,12; 0,38]	[0,00; 0,16]	[0,01; 0,21]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,19]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,10]	[0,04; 0,40]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,33]	[0,00; 0,28]	[0,00; 0,37]	[0,00; 0,32]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,35]		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,76	99,68	99,58	99,53	99,47	99,39	99,32	99,29	99,07	99,03	98,87	98,74	98,55	98,41	98,36	98,20		
CI			[99,63; 99,89]	[99,53; 99,83]	[99,41; 99,75]	[99,34; 99,72]	[99,27; 99,67]	[99,17; 99,61]	[99,08; 99,56]	[99,04; 99,54]	[98,77; 99,37]	[98,72; 99,34]	[98,52; 99,22]	[98,36; 99,12]	[98,13; 98,97]	[97,96; 98,86]	[97,90; 98,82]	[97,71; 98,69]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6722</i>	<i>5979</i>	<i>5294</i>	<i>4783</i>	<i>4296</i>	<i>3854</i>	<i>3572</i>	<i>3250</i>	<i>3080</i>	<i>2873</i>	<i>2690</i>	<i>2532</i>	<i>2401</i>	<i>2263</i>	<i>2147</i>	<i>2032</i>	<i>1951</i>			
2004-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5157	4671	4259	3855	3468	3226	3005	2874	2676	2534	2410	2285	2170	2072	1974	1873			
	auswertbar	Anzahl		4417	4083	3708	3233	2989	2771	2556	2412	2278	2182	2047	1960	1854	1768	1669			
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		5	6	5	2	3	5	1	6	1	0	1	1	3	3	2			
		Anteil in %		0,11	0,15	0,13	0,06	0,10	0,18	0,04	0,25	0,04	0,00	0,05	0,05	0,16	0,17	0,12			
		CI Anteil in %		[0,01; 0,21]	[0,03; 0,26]	[0,02; 0,25]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,21]	[0,02; 0,34]	[0,00; 0,12]	[0,05; 0,45]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,34]	[0,00; 0,36]	[0,00; 0,29]			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,89	99,75	99,61	99,55	99,45	99,28	99,24	98,99	98,95	98,95	98,90	98,85	98,70	98,53	98,41			
CI			[99,79; 99,99]	[99,60; 99,90]	[99,42; 99,80]	[99,34; 99,76]	[99,21; 99,69]	[99,00; 99,56]	[98,95; 99,53]	[98,64; 99,34]	[98,59; 99,31]	[98,59; 99,31]	[98,53; 99,27]	[98,47; 99,23]	[98,28; 99,12]	[98,07; 98,99]	[97,92; 98,90]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5209</i>	<i>4715</i>	<i>4298</i>	<i>3897</i>	<i>3506</i>	<i>3261</i>	<i>3038</i>	<i>2910</i>	<i>2710</i>	<i>2571</i>	<i>2446</i>	<i>2321</i>	<i>2204</i>	<i>2102</i>	<i>2005</i>	<i>1906</i>				
2005-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	7254	6751	6138	5458	4938	4535	4292	4022	3802	3580	3377	3179	3030	2883	2737				
	auswertbar	Anzahl		6428	5800	5233	4715	4365	4054	3833	3623	3464	3259	3092	2924	2784	2659				
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		12	3	7	2	4	3	6	3	2	5	3	3	2	2				
		Anteil in %		0,19	0,05	0,13	0,04	0,09	0,07	0,16	0,08	0,06	0,15	0,10	0,10	0,07					
		CI Anteil in %		[0,08; 0,29]	[0,00; 0,11]	[0,03; 0,23]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,16]	[0,03; 0,28]	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,14]	[0,02; 0,29]	[0,00; 0,21]	[0,00; 0,22]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,18]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,82	99,77	99,64	99,59	99,50	99,43	99,28	99,20	99,14	98,99	98,89	98,79	98,72	98,65				
CI			[99,72; 99,92]	[99,65; 99,89]	[99,49; 99,79]	[99,43; 99,75]	[99,31; 99,69]	[99,23; 99,63]	[99,04; 99,52]	[98,95; 99,45]	[98,87; 99,41]	[98,69; 99,29]	[98,58; 99,20]	[98,46; 99,12]	[98,37; 99,07]	[98,29; 99,01]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7326</i>	<i>6819</i>	<i>6209</i>	<i>5519</i>	<i>4992</i>	<i>4584</i>	<i>4340</i>	<i>4066</i>	<i>3849</i>	<i>3623</i>	<i>3415</i>	<i>3216</i>	<i>3064</i>	<i>2915</i>	<i>2769</i>					

EZ	Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2005-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9680	8898	8079	7350	6723	6337	5870	5515	5173	4856	4525	4273	4050	3823				
	auswertbar	Anzahl		8473	7726	7034	6445	5958	5528	5237	4962	4629	4372	4130	3910	3693				
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		8	5	9	6	8	12	10	4	2	2	7	2	6				
		Anteil in %		0,09	0,06	0,13	0,09	0,13	0,22	0,19	0,08	0,04	0,05	0,17	0,05	0,16				
		CI Anteil in %		[0,03; 0,16]	[0,01; 0,12]	[0,04; 0,21]	[0,02; 0,17]	[0,04; 0,23]	[0,09; 0,34]	[0,07; 0,31]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,11]	[0,04; 0,29]	[0,00; 0,12]	[0,03; 0,29]				
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,91	99,84	99,72	99,63	99,49	99,28	99,10	99,02	98,98	98,93	98,77	98,72	98,56					
	CI		[99,85; 99,97]	[99,76; 99,92]	[99,60; 99,84]	[99,49; 99,77]	[99,32; 99,66]	[99,08; 99,48]	[98,87; 99,33]	[98,77; 99,27]	[98,73; 99,23]	[98,67; 99,19]	[98,48; 99,06]	[98,42; 99,02]	[98,24; 98,88]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9778</i>	<i>8989</i>	<i>8164</i>	<i>7426</i>	<i>6790</i>	<i>6402</i>	<i>5933</i>	<i>5585</i>	<i>5240</i>	<i>4913</i>	<i>4579</i>	<i>4321</i>	<i>4101</i>	<i>3871</i>					
2006-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	11084	10406	9460	8663	8209	7620	7201	6741	6351	5945	5623	5276	5030					
	auswertbar	Anzahl		10040	9057	8406	7730	7234	6893	6507	6094	5777	5442	5125	4909					
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		10	12	5	10	14	10	8	3	4	3	7	6					
		Anteil in %		0,10	0,13	0,06	0,13	0,19	0,15	0,12	0,05	0,07	0,06	0,14	0,12					
		CI Anteil in %		[0,04; 0,16]	[0,06; 0,21]	[0,01; 0,11]	[0,05; 0,21]	[0,09; 0,29]	[0,06; 0,23]	[0,04; 0,21]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,12]	[0,04; 0,24]	[0,02; 0,22]					
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,90	99,77	99,71	99,59	99,40	99,25	99,13	99,08	99,02	98,96	98,83	98,71						
	CI		[99,84; 99,96]	[99,67; 99,87]	[99,60; 99,82]	[99,46; 99,72]	[99,23; 99,57]	[99,06; 99,44]	[98,92; 99,34]	[98,87; 99,29]	[98,80; 99,24]	[98,73; 99,19]	[98,58; 99,08]	[98,44; 98,98]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11195</i>	<i>10505</i>	<i>9553</i>	<i>8754</i>	<i>8293</i>	<i>7702</i>	<i>7289</i>	<i>6827</i>	<i>6435</i>	<i>6016</i>	<i>5692</i>	<i>5332</i>	<i>5084</i>						
2006-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	14321	13630	12462	11623	10586	9941	9254	8730	8168	7703	7264	6854						
	auswertbar	Anzahl		12852	11792	10772	9863	9354	8859	8300	7837	7359	7005	6591						
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		21	10	11	22	15	15	5	8	7	12	15						
		Anteil in %		0,16	0,08	0,10	0,22	0,16	0,17	0,06	0,10	0,10	0,17	0,23						
		CI Anteil in %		[0,09; 0,23]	[0,03; 0,14]	[0,04; 0,16]	[0,13; 0,32]	[0,08; 0,24]	[0,08; 0,25]	[0,01; 0,11]	[0,03; 0,17]	[0,02; 0,17]	[0,07; 0,27]	[0,11; 0,34]						
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,84	99,76	99,66	99,44	99,28	99,12	99,06	98,96	98,87	98,70	98,47							
	CI		[99,77; 99,91]	[99,67; 99,85]	[99,56; 99,76]	[99,30; 99,58]	[99,12; 99,44]	[98,94; 99,30]	[98,87; 99,25]	[98,76; 99,16]	[98,66; 99,08]	[98,47; 98,93]	[98,21; 98,73]							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>13791</i>	<i>12613</i>	<i>11771</i>	<i>10718</i>	<i>10080</i>	<i>9390</i>	<i>8865</i>	<i>8292</i>	<i>7821</i>	<i>7374</i>	<i>6965</i>							
2007-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	17924	17014	15966	14496	13541	12659	11909	11128	10489	9890	9384							
	auswertbar	Anzahl		16201	14764	13478	12761	12123	11439	10660	10069	9559	9051							
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		20	16	38	20	11	14	9	16	12	9							
		Anteil in %		0,12	0,11	0,28	0,16	0,09	0,12	0,08	0,16	0,13	0,10							
		CI Anteil in %		[0,07; 0,18]	[0,06; 0,16]	[0,19; 0,37]	[0,09; 0,23]	[0,04; 0,14]	[0,06; 0,19]	[0,03; 0,14]	[0,08; 0,24]	[0,05; 0,20]	[0,03; 0,16]							
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,88	99,77	99,50	99,35	99,26	99,14	99,06	98,90	98,78	98,68								
	CI		[99,83; 99,93]	[99,70; 99,84]	[99,39; 99,61]	[99,22; 99,48]	[99,12; 99,40]	[98,98; 99,30]	[98,90; 99,22]	[98,72; 99,08]	[98,59; 98,97]	[98,48; 98,88]								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>17190</i>	<i>16142</i>	<i>14666</i>	<i>13722</i>	<i>12823</i>	<i>12070</i>	<i>11283</i>	<i>10635</i>	<i>10034</i>	<i>9520</i>								
2007-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	10210	9830	9011	8323	7645	7112	6649	6242	5862	5552								
	auswertbar	Anzahl		9208	8173	7687	7220	6773	6355	5983	5648	5322								
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		11	17	6	12	4	5	6	5	6								
		Anteil in %		0,12	0,21	0,08	0,17	0,06	0,08	0,10	0,09	0,11								
		CI Anteil in %		[0,05; 0,19]	[0,11; 0,31]	[0,02; 0,14]	[0,07; 0,26]	[0,00; 0,12]	[0,01; 0,15]	[0,02; 0,18]	[0,01; 0,17]	[0,02; 0,20]								
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,88	99,68	99,61	99,44	99,38	99,31	99,21	99,12	99,01									
	CI		[99,81; 99,95]	[99,56; 99,80]	[99,48; 99,74]	[99,28; 99,60]	[99,21; 99,55]	[99,13; 99,49]	[99,01; 99,41]	[98,91; 99,33]	[98,78; 99,24]									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>9940</i>	<i>9118</i>	<i>8435</i>	<i>7735</i>	<i>7205</i>	<i>6731</i>	<i>6317</i>	<i>5936</i>	<i>5626</i>									
2008-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9335	8987	8374	7641	7066	6617	6246	5881	5570									
	auswertbar	Anzahl		8375	7795	7211	6738	6353	5992	5656	5362									
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		16	15	11	10	9	4	6	4									
		Anteil in %		0,19	0,19	0,15	0,15	0,14	0,07	0,11	0,07									
		CI Anteil in %		[0,10; 0,28]	[0,10; 0,29]	[0,06; 0,24]	[0,06; 0,24]	[0,05; 0,23]	[0,00; 0,13]	[0,02; 0,19]	[0,00; 0,15]									
kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,81	99,63	99,48	99,33	99,19	99,13	99,02	98,95										
	CI		[99,72; 99,90]	[99,50; 99,76]	[99,32; 99,64]	[99,15; 99,51]	[99,09; 99,39]	[98,99; 99,34]	[98,79; 99,25]	[98,71; 99,19]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>9074</i>	<i>8463</i>	<i>7733</i>	<i>7156</i>	<i>6701</i>	<i>6331</i>	<i>5959</i>	<i>5643</i>										

EZ	Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2008-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6484	6256	5784	5337	4946	4618	4339	4091										
	auswertbar	Anzahl		5902	5436	5047	4744	4422	4152	3919										
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		10	7	9	3	2	8	2										
		Anteil in %		0,17	0,13	0,18	0,06	0,05	0,19	0,05										
		CI Anteil in %		[0,06; 0,27]	[0,03; 0,22]	[0,06; 0,29]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,11]	[0,06; 0,33]	[0,00; 0,12]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,83	99,71	99,53	99,47	99,43	99,24	99,19										
	CI		[99,73; 99,93]	[99,57; 99,85]	[99,35; 99,71]	[99,28; 99,66]	[99,23; 99,63]	[99,00; 99,48]	[98,94; 99,44]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6552</i>	<i>6320</i>	<i>5851</i>	<i>5399</i>	<i>5008</i>	<i>4674</i>	<i>4394</i>	<i>4147</i>										
2009-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5482	5258	4864	4477	4185	3909	3693											
	auswertbar	Anzahl		5031	4599	4271	4011	3756	3581											
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		6	3	2	2	1	2											
		Anteil in %		0,12	0,07	0,05	0,05	0,03	0,06											
		CI Anteil in %		[0,02; 0,21]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,08]	[0,00; 0,13]											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,88	99,82	99,77	99,72	99,70	99,64											
	CI		[99,79; 99,97]	[99,70; 99,94]	[99,64; 99,90]	[99,57; 99,87]	[99,54; 99,86]	[99,46; 99,82]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5527</i>	<i>5299</i>	<i>4907</i>	<i>4513</i>	<i>4221</i>	<i>3942</i>	<i>3724</i>											
2009-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5928	5655	5155	4761	4450	4173												
	auswertbar	Anzahl		5374	4888	4569	4280	4030												
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		12	3	2	4	8												
		Anteil in %		0,22	0,06	0,04	0,09	0,20												
		CI Anteil in %		[0,10; 0,35]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,19]	[0,06; 0,34]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,78	99,72	99,68	99,58	99,39												
	CI		[99,66; 99,90]	[99,58; 99,86]	[99,53; 99,83]	[99,40; 99,76]	[99,17; 99,61]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5982</i>	<i>5705</i>	<i>5205</i>	<i>4802</i>	<i>4483</i>	<i>4208</i>												
2010-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6577	6314	5805	5359	5002													
	auswertbar	Anzahl		6085	5510	5122	4806													
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		8	5	5	2													
		Anteil in %		0,13	0,09	0,10	0,04													
		CI Anteil in %		[0,04; 0,22]	[0,01; 0,17]	[0,01; 0,18]	[0,00; 0,10]													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,87	99,78	99,68	99,64													
	CI		[99,78; 99,96]	[99,66; 99,90]	[99,53; 99,83]	[99,48; 99,80]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6630</i>	<i>6363</i>	<i>5859</i>	<i>5409</i>	<i>5055</i>													
2010-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6640	6361	5874	5411														
	auswertbar	Anzahl		6092	5541	5191														
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		7	3	3														
		Anteil in %		0,11	0,05	0,06														
		CI Anteil in %		[0,03; 0,20]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,12]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,89	99,83	99,78														
	CI		[99,81; 99,97]	[99,73; 99,93]	[99,66; 99,90]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6682</i>	<i>6400</i>	<i>5912</i>	<i>5443</i>														
2011-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6315	6063	5564															
	auswertbar	Anzahl		5804	5257															
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		10	4															
		Anteil in %		0,17	0,08															
		CI Anteil in %		[0,07; 0,28]	[0,00; 0,15]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,83	99,75															
	CI		[99,72; 99,94]	[99,62; 99,88]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6352</i>	<i>6098</i>	<i>5609</i>															

EZ	Erstmalige Durchführung einer Amputation im Kollektiv der Patienten ohne Amputationen laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2011-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5322	5119																			
	auswertbar	Anzahl		4909																			
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl		6																			
		Anteil in %			0,12																		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	CI Anteil in %			[0,02; 0,22]																		
		Rate			99,88																		
	CI			[99,78; 99,98]																			
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>	<i>5157</i>																			
2012-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5950																				
	auswertbar	Anzahl																					
	erstmalig durchgeführte Amputation	Anzahl																					
		Anteil in %																					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	CI Anteil in %																					
		Rate																					
	CI																						
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>																				

In Tabelle 3.5.5 wird dokumentiert, wie viele Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren von einem **erstmalig auftretendem Herzinfarkt** betroffen waren. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keinen Herzinfarkt hatten.

Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine Herzinfarkt dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die Folgedokumentation vorlag. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil ein erstmalig

aufgetretener Herzinfarkt dokumentiert ist. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „Rate der ereignisfreien Zeit“ nach Kaplan-Meier dargestellt.

In der Kohorte 2003-1 waren anfangs 18532 Patienten eingeschrieben. Bei 17079 dieser Personen war laut Erstdokumentation kein Herzinfarkt dokumentiert. Dieses Kollektiv umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch 4200 Mitglieder. Bei 4096 Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei 0,15 Prozent dieser auswertbaren Patienten wurde im letzten Berichtshalbjahr ein erstmalig aufgetretener Herzinfarkt dokumentiert.

Tabelle 3.5.5 Ereigniszeitanalyse: Erstauffreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation

EZ	Erstauffreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	17079	15618	14029	12713	11486	10609	9765	8288	7652	7020	6699	6247	5900	5603	5264	4946	4677	4426	4200
	auswertbar	Anzahl		12466	13095	12391	11168	10388	9344	8019	7436	6884	6398	5998	5731	5426	5092	4819	4580	4343	4096
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		44	42	50	35	16	19	12	9	13	9	26	6	9	9	9	9	1	6
		Anteil in %		0,35	0,32	0,40	0,31	0,15	0,20	0,15	0,12	0,19	0,14	0,43	0,10	0,17	0,18	0,19	0,20	0,02	0,15
		CI Anteil in %		[0,25; 0,46]	[0,22; 0,42]	[0,29; 0,52]	[0,21; 0,42]	[0,08; 0,23]	[0,11; 0,29]	[0,07; 0,23]	[0,04; 0,20]	[0,09; 0,29]	[0,05; 0,23]	[0,27; 0,60]	[0,02; 0,19]	[0,06; 0,27]	[0,06; 0,29]	[0,06; 0,31]	[0,07; 0,32]	[0,00; 0,07]	[0,03; 0,26]
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,71	99,40	99,01	98,71	98,55	98,35	98,21	98,09	97,91	97,77	97,35	97,25	97,09	96,92	96,74	96,55	96,53	96,38
CI			[99,62; 99,80]	[99,27; 99,53]	[98,84; 99,18]	[98,52; 98,90]	[98,34; 98,76]	[98,12; 98,58]	[97,97; 98,45]	[97,84; 98,34]	[97,64; 98,18]	[97,49; 98,05]	[97,02; 97,68]	[96,91; 97,59]	[96,74; 97,44]	[96,55; 97,29]	[96,36; 97,12]	[96,15; 96,95]	[96,12; 96,94]	[95,96; 96,80]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18532</i>	<i>16919</i>	<i>15229</i>	<i>13819</i>	<i>12524</i>	<i>11575</i>	<i>10657</i>	<i>9051</i>	<i>8357</i>	<i>7654</i>	<i>7302</i>	<i>6797</i>	<i>6413</i>	<i>6084</i>	<i>5724</i>	<i>5377</i>	<i>5082</i>	<i>4817</i>	<i>4564</i>	
2003-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	14183	12285	11045	9849	8932	8148	7358	6733	6086	5815	5472	5182	4895	4634	4385	4158	3913	3717	
	auswertbar	Anzahl		11001	10683	9586	8716	7834	7111	6411	5940	5548	5215	4941	4737	4491	4272	4036	3812	3615	
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		62	33	36	20	22	11	18	10	12	27	9	8	5	7	3	8	1	
		Anteil in %		0,56	0,31	0,38	0,23	0,28	0,15	0,28	0,17	0,22	0,52	0,18	0,17	0,11	0,16	0,07	0,21	0,03	
		CI Anteil in %		[0,42; 0,70]	[0,20; 0,41]	[0,25; 0,50]	[0,13; 0,33]	[0,16; 0,40]	[0,06; 0,25]	[0,15; 0,41]	[0,06; 0,27]	[0,09; 0,34]	[0,32; 0,71]	[0,06; 0,30]	[0,05; 0,29]	[0,01; 0,21]	[0,04; 0,29]	[0,00; 0,16]	[0,06; 0,36]	[0,00; 0,08]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,49	99,19	98,82	98,60	98,32	98,17	97,90	97,73	97,52	97,03	96,86	96,69	96,59	96,43	96,36	96,16	96,13	
CI			[99,36; 99,62]	[99,03; 99,35]	[98,62; 99,02]	[98,38; 98,82]	[98,07; 98,57]	[97,90; 98,44]	[97,61; 98,19]	[97,42; 98,04]	[97,19; 97,85]	[96,65; 97,41]	[96,47; 97,25]	[96,28; 97,10]	[96,17; 97,01]	[96,00; 96,86]	[95,92; 96,80]	[95,80; 96,62]	[95,70; 96,62]	[95,66; 96,60]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15338</i>	<i>13264</i>	<i>11995</i>	<i>10737</i>	<i>9767</i>	<i>8914</i>	<i>8042</i>	<i>7361</i>	<i>6677</i>	<i>6381</i>	<i>5997</i>	<i>5700</i>	<i>5383</i>	<i>5096</i>	<i>4829</i>	<i>4575</i>	<i>4304</i>	<i>4094</i>		
2004-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6228	5537	4885	4403	3945	3533	3278	2987	2830	2641	2470	2321	2203	2068	1961	1861	1787		
	auswertbar	Anzahl		5229	4675	4254	3807	3421	3126	2878	2632	2488	2339	2211	2091	1984	1877	1799	1715		
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		20	23	14	5	2	5	4	4	8	3	5	6	3	0	2	2		
		Anteil in %		0,38	0,49	0,33	0,13	0,06	0,16	0,14	0,15	0,32	0,13	0,23	0,29	0,15	0,00	0,11	0,12		
		CI Anteil in %		[0,22; 0,55]	[0,29; 0,69]	[0,16; 0,50]	[0,02; 0,25]	[0,00; 0,14]	[0,02; 0,30]	[0,00; 0,28]	[0,00; 0,30]	[0,10; 0,54]	[0,00; 0,27]	[0,03; 0,42]	[0,06; 0,52]	[0,00; 0,32]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,27]	[0,00; 0,28]		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,63	99,16	98,84	98,71	98,65	98,49	98,36	98,21	97,90	97,78	97,56	97,28	97,14	97,14	97,03	96,92		
CI			[99,47; 99,79]	[98,91; 99,41]	[98,54; 99,14]	[98,39; 99,03]	[98,32; 98,98]	[98,13; 98,85]	[97,98; 98,74]	[97,80; 98,62]	[97,44; 98,36]	[97,30; 98,26]	[97,05; 98,07]	[96,72; 97,84]	[96,56; 97,72]	[96,56; 97,72]	[96,43; 97,63]	[96,30; 97,54]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6722</i>	<i>5979</i>	<i>5294</i>	<i>4783</i>	<i>4296</i>	<i>3854</i>	<i>3572</i>	<i>3250</i>	<i>3080</i>	<i>2873</i>	<i>2690</i>	<i>2532</i>	<i>2401</i>	<i>2263</i>	<i>2147</i>	<i>2032</i>	<i>1951</i>			
2004-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4837	4376	3980	3613	3244	3018	2805	2683	2498	2359	2245	2135	2029	1940	1842	1750			
	auswertbar	Anzahl		4130	3815	3476	3031	2799	2592	2400	2258	2124	2041	1920	1836	1741	1653	1564			
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		17	7	11	5	9	6	4	15	5	1	3	1	5	1	5			
		Anteil in %		0,41	0,18	0,32	0,16	0,32	0,23	0,17	0,66	0,24	0,05	0,16	0,05	0,29	0,06	0,32			
		CI Anteil in %		[0,22; 0,61]	[0,05; 0,32]	[0,13; 0,50]	[0,02; 0,31]	[0,11; 0,53]	[0,05; 0,42]	[0,00; 0,33]	[0,33; 1,00]	[0,03; 0,44]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,33]	[0,00; 0,16]	[0,04; 0,54]	[0,00; 0,18]	[0,04; 0,60]			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,61	99,43	99,11	98,95	98,64	98,41	98,25	97,60	97,38	97,33	97,18	97,13	96,85	96,79	96,48			
CI			[99,42; 99,80]	[99,20; 99,66]	[98,82; 99,40]	[98,62; 99,28]	[98,26; 99,02]	[97,99; 98,83]	[97,80; 98,70]	[97,05; 98,15]	[96,79; 97,97]	[96,74; 97,92]	[96,56; 97,80]	[96,50; 97,76]	[96,18; 97,52]	[96,11; 97,47]	[95,75; 97,21]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5209</i>	<i>4715</i>	<i>4298</i>	<i>3897</i>	<i>3506</i>	<i>3261</i>	<i>3038</i>	<i>2910</i>	<i>2710</i>	<i>2571</i>	<i>2446</i>	<i>2321</i>	<i>2204</i>	<i>2102</i>	<i>2005</i>	<i>1906</i>				
2005-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6919	6447	5842	5193	4693	4316	4084	3829	3610	3397	3197	3014	2871	2724	2589				
	auswertbar	Anzahl		6133	5527	4979	4482	4158	3862	3653	3442	3286	3092	2937	2775	2636	2521				
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		17	12	7	12	4	4	20	6	3	3	6	10	3	6				
		Anteil in %		0,28	0,22	0,14	0,27	0,10	0,10	0,55	0,17	0,09	0,10	0,20	0,36	0,11	0,24				
		CI Anteil in %		[0,15; 0,41]	[0,09; 0,34]	[0,04; 0,24]	[0,12; 0,42]	[0,00; 0,19]	[0,00; 0,21]	[0,31; 0,79]	[0,03; 0,31]	[0,00; 0,19]	[0,00; 0,21]	[0,04; 0,37]	[0,14; 0,58]	[0,00; 0,24]	[0,05; 0,43]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,73	99,52	99,38	99,12	99,02	98,92	98,39	98,22	98,13	98,04	97,84	97,49	97,38					
CI			[99,60; 99,86]	[99,34; 99,70]	[99,18; 99,58]	[98,87; 99,37]	[98,75; 99,29]	[98,64; 99,20]	[98,02; 98,76]	[97,83; 98,61]	[97,73; 98,53]	[97,62; 98,46]	[97,40; 98,28]	[97,00; 97,98]	[96,87; 97,69]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7326</i>	<i>6819</i>	<i>6209</i>	<i>5519</i>	<i>4992</i>	<i>4584</i>	<i>4340</i>	<i>4066</i>	<i>3849</i>	<i>3623</i>	<i>3415</i>	<i>3216</i>	<i>3064</i>	<i>2915</i>	<i>2769</i>					

EZ	Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2005-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9201	8465	7669	6969	6369	5995	5563	5221	4895	4592	4274	4033	3828	3630				
	auswertbar	Anzahl		8060	7334	6676	6098	5638	5241	4951	4690	4375	4127	3896	3699	3506				
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		19	17	19	11	5	19	9	6	9	9	5	1	7				
		Anteil in %		0,24	0,23	0,28	0,18	0,09	0,36	0,18	0,13	0,21	0,22	0,13	0,03	0,20				
		CI Anteil in %		[0,13; 0,34]	[0,12; 0,34]	[0,16; 0,41]	[0,07; 0,29]	[0,01; 0,17]	[0,20; 0,53]	[0,06; 0,30]	[0,03; 0,23]	[0,07; 0,34]	[0,08; 0,36]	[0,02; 0,24]	[0,00; 0,08]	[0,05; 0,35]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,77	99,54	99,26	99,08	99,00	98,65	98,47	98,35	98,15	97,94	97,81	97,79	97,59				
CI			[99,67; 99,87]	[99,39; 99,69]	[99,06; 99,46]	[98,86; 99,30]	[98,77; 99,23]	[98,37; 98,93]	[98,17; 98,77]	[98,03; 98,67]	[97,81; 98,49]	[97,57; 98,31]	[97,43; 98,19]	[97,40; 98,18]	[97,18; 98,00]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>9778</i>	<i>8989</i>	<i>8164</i>	<i>7426</i>	<i>6790</i>	<i>6402</i>	<i>5933</i>	<i>5585</i>	<i>5240</i>	<i>4913</i>	<i>4579</i>	<i>4321</i>	<i>4101</i>	<i>3871</i>				
2006-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	10564	9912	8983	8233	7796	7247	6840	6406	6023	5632	5319	4984	4747					
	auswertbar	Anzahl		9566	8605	7993	7343	6881	6557	6188	5772	5477	5145	4846	4632					
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		37	20	14	9	29	17	17	6	16	9	10	6					
		Anteil in %		0,39	0,23	0,18	0,12	0,42	0,26	0,27	0,10	0,29	0,17	0,21	0,13					
		CI Anteil in %		[0,26; 0,51]	[0,13; 0,33]	[0,08; 0,27]	[0,04; 0,20]	[0,27; 0,57]	[0,14; 0,38]	[0,14; 0,41]	[0,02; 0,19]	[0,15; 0,44]	[0,06; 0,29]	[0,08; 0,33]	[0,03; 0,23]					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,62	99,39	99,22	99,10	98,69	98,44	98,17	98,07	97,78	97,61	97,41	97,29					
CI			[99,50; 99,74]	[99,23; 99,55]	[99,04; 99,40]	[98,90; 99,30]	[98,44; 98,94]	[98,17; 98,71]	[97,87; 98,47]	[97,76; 98,38]	[97,44; 98,12]	[97,25; 97,97]	[97,03; 97,79]	[96,90; 97,68]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>11195</i>	<i>10505</i>	<i>9553</i>	<i>8754</i>	<i>8293</i>	<i>7702</i>	<i>7289</i>	<i>6827</i>	<i>6435</i>	<i>6016</i>	<i>5692</i>	<i>5332</i>	<i>5084</i>					
2006-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	13692	13029	11892	11090	10089	9477	8819	8337	7797	7357	6934	6550						
	auswertbar	Anzahl		12299	11251	10282	9407	8910	8450	7925	7480	7028	6690	6295						
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		38	20	12	41	18	12	10	9	6	9	15						
		Anteil in %		0,31	0,18	0,12	0,44	0,20	0,14	0,13	0,12	0,09	0,13	0,24						
		CI Anteil in %		[0,21; 0,41]	[0,10; 0,26]	[0,05; 0,18]	[0,30; 0,57]	[0,11; 0,30]	[0,06; 0,22]	[0,05; 0,20]	[0,04; 0,20]	[0,02; 0,15]	[0,05; 0,22]	[0,12; 0,36]						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,70	99,53	99,41	98,99	98,79	98,65	98,53	98,42	98,33	98,20	97,97						
CI			[99,60; 99,80]	[99,41; 99,65]	[99,27; 99,55]	[98,80; 99,18]	[98,58; 99,00]	[98,43; 98,87]	[98,30; 98,76]	[98,17; 98,67]	[98,07; 98,59]	[97,93; 98,47]	[97,68; 98,26]							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>14493</i>	<i>13791</i>	<i>12613</i>	<i>11771</i>	<i>10718</i>	<i>10080</i>	<i>9390</i>	<i>8865</i>	<i>8292</i>	<i>7821</i>	<i>7374</i>	<i>6965</i>						
2007-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	17247	16378	15351	13928	13002	12150	11414	10659	10035	9461	8986							
	auswertbar	Anzahl		15598	14206	12953	12255	11642	10966	10224	9649	9143	8667							
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		48	34	51	31	25	18	18	21	16	19							
		Anteil in %		0,31	0,24	0,39	0,25	0,21	0,16	0,18	0,22	0,17	0,22							
		CI Anteil in %		[0,22; 0,39]	[0,16; 0,32]	[0,29; 0,50]	[0,16; 0,34]	[0,13; 0,30]	[0,09; 0,24]	[0,09; 0,26]	[0,12; 0,31]	[0,09; 0,26]	[0,12; 0,32]							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,70	99,46	99,08	98,84	98,63	98,47	98,30	98,09	97,92	97,70							
CI			[99,61; 99,79]	[99,34; 99,58]	[98,92; 99,24]	[98,66; 99,02]	[98,43; 98,83]	[98,26; 98,68]	[98,08; 98,52]	[97,85; 98,33]	[97,67; 98,17]	[97,43; 97,97]								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>18117</i>	<i>17190</i>	<i>16142</i>	<i>14666</i>	<i>13722</i>	<i>12823</i>	<i>12070</i>	<i>11283</i>	<i>10635</i>	<i>10034</i>	<i>9520</i>							
2007-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9866	9501	8704	8039	7373	6865	6408	6005	5633	5332								
	auswertbar	Anzahl		8897	7898	7434	6976	6543	6134	5759	5441	5116								
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		23	26	15	14	11	13	10	11	6								
		Anteil in %		0,26	0,33	0,20	0,20	0,17	0,21	0,17	0,20	0,12								
		CI Anteil in %		[0,15; 0,36]	[0,20; 0,46]	[0,10; 0,30]	[0,10; 0,31]	[0,07; 0,27]	[0,10; 0,33]	[0,07; 0,28]	[0,08; 0,32]	[0,02; 0,21]								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,75	99,43	99,23	99,04	98,87	98,67	98,50	98,30	98,18								
CI			[99,65; 99,85]	[99,27; 99,59]	[99,04; 99,42]	[98,83; 99,25]	[98,64; 99,10]	[98,41; 98,93]	[98,22; 98,78]	[98,00; 98,60]	[97,86; 98,50]									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>10330</i>	<i>9940</i>	<i>8435</i>	<i>7735</i>	<i>7205</i>	<i>6731</i>	<i>6317</i>	<i>5936</i>	<i>5626</i>									
2008-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9044	8707	8099	7402	6845	6403	6040	5695	5380									
	auswertbar	Anzahl		8126	7539	6983	6535	6150	5792	5474	5180									
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		30	6	4	10	12	4	10	8									
		Anteil in %		0,37	0,08	0,06	0,15	0,20	0,07	0,18	0,15									
		CI Anteil in %		[0,24; 0,50]	[0,02; 0,14]	[0,00; 0,11]	[0,06; 0,25]	[0,08; 0,31]	[0,00; 0,14]	[0,07; 0,30]	[0,05; 0,26]									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,64	99,56	99,51	99,36	99,17	99,10	98,92	98,77									
CI			[99,51; 99,77]	[99,42; 99,70]	[99,36; 99,66]	[99,18; 99,54]	[98,96; 99,38]	[98,88; 99,32]	[98,68; 99,16]	[98,50; 99,04]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>9430</i>	<i>9074</i>	<i>8463</i>	<i>7733</i>	<i>7156</i>	<i>6701</i>	<i>6331</i>	<i>5959</i>	<i>5643</i>									
2008-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6380	6154	5690	5254	4858	4533	4253	4011										
	auswertbar	Anzahl		5817	5347	4966	4658	4341	4073	3844										
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		18	10	8	4	7	8	7										
		Anteil in %		0,31	0,19	0,16	0,09	0,16	0,20	0,18										
		CI Anteil in %		[0,17; 0,45]	[0,07; 0,30]	[0,05; 0,27]	[0,00; 0,17]	[0,04; 0,28]	[0,06; 0,33]	[0,05; 0,32]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,70	99,51	99,36	99,27	99,11	98,92	98,74										
CI			[99,56; 99,84]	[99,33; 99,69]	[99,15; 99,57]	[99,04; 99,50]	[98,86; 99,36]	[98,63; 99,21]	[98,42; 99,06]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6552</i>	<i>6320</i>	<i>5851</i>	<i>5399</i>	<i>5008</i>	<i>4674</i>	<i>4394</i>	<i>4147</i>										

EZ	Erstauftreten eines Herzinfarkts im Kollektiv der Patienten ohne Herzinfarkt laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5408	5187	4799	4415	4124	3851	3631													
	auswertbar	Anzahl		4966	4537	4214	3951	3700	3522													
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		8	5	8	2	8	6													
		Anteil in %			0,16	0,11	0,19	0,05	0,22	0,17												
		CI Anteil in %			[0,05; 0,27]	[0,01; 0,21]	[0,06; 0,32]	[0,00; 0,12]	[0,07; 0,37]	[0,03; 0,31]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,84	99,73	99,55	99,50	99,28	99,11													
		CI		[99,73; 99,95]	[99,58; 99,88]	[99,36; 99,74]	[99,29; 99,71]	[99,03; 99,53]	[98,82; 99,40]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5527</i>	<i>5299</i>	<i>4907</i>	<i>4513</i>	<i>4221</i>	<i>3942</i>	<i>3724</i>													
2009-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5864	5593	5094	4695	4377	4104														
	auswertbar	Anzahl		5312	4835	4507	4215	3965														
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		11	4	6	5	7														
		Anteil in %			0,21	0,08	0,13	0,12	0,18													
		CI Anteil in %			[0,08; 0,33]	[0,00; 0,16]	[0,03; 0,24]	[0,01; 0,22]	[0,05; 0,31]													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,80	99,71	99,58	99,47	99,29														
		CI		[99,68; 99,92]	[99,57; 99,85]	[99,40; 99,76]	[99,26; 99,68]	[99,05; 99,53]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5982</i>	<i>5705</i>	<i>5205</i>	<i>4802</i>	<i>4483</i>	<i>4208</i>														
2010-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6502	6248	5735	5291	4939															
	auswertbar	Anzahl		6021	5447	5063	4744															
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		19	8	11	9															
		Anteil in %			0,32	0,15	0,22	0,19														
		CI Anteil in %			[0,17; 0,46]	[0,05; 0,25]	[0,09; 0,35]	[0,07; 0,31]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,69	99,54	99,33	99,14															
		CI		[99,55; 99,83]	[99,37; 99,71]	[99,12; 99,54]	[98,89; 99,39]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6630</i>	<i>6363</i>	<i>5859</i>	<i>5409</i>	<i>5055</i>															
2010-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6562	6288	5802	5342																
	auswertbar	Anzahl		6021	5475	5128																
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		15	5	9																
		Anteil in %			0,25	0,09	0,18															
		CI Anteil in %			[0,12; 0,38]	[0,01; 0,17]	[0,06; 0,29]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,75	99,66	99,49																
		CI		[99,63; 99,87]	[99,51; 99,81]	[99,30; 99,68]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6682</i>	<i>6400</i>	<i>5912</i>	<i>5443</i>																
2011-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6223	5982	5481																	
	auswertbar	Anzahl		5729	5178																	
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		26	12																	
		Anteil in %			0,45	0,23																
		CI Anteil in %			[0,28; 0,63]	[0,10; 0,36]																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,55	99,32																	
		CI		[99,38; 99,72]	[99,10; 99,54]																	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6352</i>	<i>6098</i>	<i>5609</i>																	
2011-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5267	5066																		
	auswertbar	Anzahl		4859																		
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl		18																		
		Anteil in %			0,37																	
		CI Anteil in %			[0,20; 0,54]																	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,63																		
		CI		[99,46; 99,80]																		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5365</i>	<i>5157</i>																		
2012-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5866																			
	auswertbar	Anzahl																				
	erstmalig aufgetretener Herzinfarkt	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																				
CI																						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5991</i>																			

In Tabelle 3.5.6 wird dokumentiert, wie viele Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren von einem **erstmalig auftretendem Schlaganfall** betroffen waren. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keinen Schlaganfall hatten.

Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch kein Schlaganfall dokumentiert war. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die Folgedokumentation vorlag. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem Anteil ein

erstmalig aufgetretener Schlaganfall dokumentiert ist. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier dargestellt.

In der Kohorte 2003-1 waren anfangs 18532 Patienten eingeschrieben. Bei 17439 dieser Personen war laut Erstdokumentation kein Schlaganfall dokumentiert. Dieses Kollektiv umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch 4168 Mitglieder. Bei 4064 Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei 0,22 Prozent dieser auswertbaren Patienten wurde im letzten Berichtshalbjahr ein erstmalig aufgetretener Schlaganfall dokumentiert.

Tabelle 3.5.6 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation

EZ	Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	17439	15945	14343	12980	11713	10796	9926	8437	7794	7138	6804	6341	5869	5553	5222	4908	4645	4398	4168
	auswertbar	Anzahl		12748	13395	12659	11390	10574	9511	8166	7565	6997	6497	6083	5700	5373	5057	4795	4551	4316	4064
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		64	67	81	52	42	27	26	22	24	15	141	37	18	17	12	16	10	9
		Anteil in %		0,50	0,50	0,64	0,46	0,40	0,28	0,32	0,29	0,34	0,23	2,32	0,65	0,34	0,34	0,25	0,35	0,23	0,22
		CI Anteil in %		[0,38; 0,62]	[0,38; 0,62]	[0,50; 0,78]	[0,33; 0,58]	[0,28; 0,52]	[0,18; 0,39]	[0,20; 0,44]	[0,17; 0,41]	[0,21; 0,48]	[0,11; 0,35]	[1,94; 2,70]	[0,44; 0,86]	[0,18; 0,49]	[0,18; 0,50]	[0,11; 0,39]	[0,18; 0,52]	[0,09; 0,38]	[0,08; 0,37]
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,58	99,11	98,49	98,05	97,66	97,38	97,08	96,80	96,46	96,24	94,04	93,43	93,12	92,81	92,58	92,25	92,04	91,83
CI			[99,48; 99,68]	[98,96; 99,26]	[98,29; 98,69]	[97,82; 98,28]	[97,40; 97,92]	[97,10; 97,66]	[96,78; 97,38]	[96,48; 97,12]	[96,11; 96,81]	[95,87; 96,61]	[93,53; 94,55]	[92,89; 93,97]	[92,56; 93,68]	[92,24; 93,38]	[91,99; 93,17]	[91,64; 92,86]	[91,42; 92,66]	[91,20; 92,46]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18532</i>	<i>16919</i>	<i>15229</i>	<i>13819</i>	<i>12524</i>	<i>11575</i>	<i>10657</i>	<i>9051</i>	<i>8357</i>	<i>7654</i>	<i>7302</i>	<i>6797</i>	<i>6413</i>	<i>6084</i>	<i>5724</i>	<i>5377</i>	<i>5082</i>	<i>4817</i>	<i>4564</i>	
2003-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	14463	12530	11297	10049	9105	8294	7466	6809	6156	5873	5529	5126	4829	4571	4336	4106	3865	3666	
	auswertbar	Anzahl		11230	10927	9783	8878	7976	7206	6483	6011	5611	5283	4893	4682	4434	4223	3988	3769	3561	
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		58	79	37	33	35	26	22	27	9	142	28	18	19	14	12	18	11	
		Anteil in %		0,52	0,72	0,38	0,37	0,44	0,36	0,34	0,45	0,16	2,69	0,57	0,38	0,43	0,33	0,30	0,48	0,31	
		CI Anteil in %		[0,38; 0,65]	[0,56; 0,88]	[0,26; 0,50]	[0,25; 0,50]	[0,29; 0,58]	[0,22; 0,50]	[0,20; 0,48]	[0,28; 0,62]	[0,06; 0,27]	[2,25; 3,12]	[0,36; 0,78]	[0,21; 0,56]	[0,24; 0,62]	[0,16; 0,50]	[0,13; 0,47]	[0,26; 0,70]	[0,13; 0,49]	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,53	98,83	98,46	98,10	97,67	97,32	96,99	96,56	96,41	93,86	93,33	92,97	92,58	92,27	92,00	91,56	91,28	
CI			[99,41; 99,65]	[98,63; 99,03]	[98,23; 98,69]	[97,84; 98,36]	[97,38; 97,96]	[97,00; 97,64]	[96,64; 97,34]	[96,18; 96,94]	[96,01; 96,81]	[93,29; 94,43]	[92,74; 93,92]	[92,36; 93,58]	[91,94; 93,22]	[91,61; 92,93]	[91,33; 92,67]	[90,86; 92,26]	[90,56; 92,00]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>15338</i>	<i>13264</i>	<i>11995</i>	<i>10737</i>	<i>9767</i>	<i>8914</i>	<i>8042</i>	<i>7361</i>	<i>6677</i>	<i>6381</i>	<i>5997</i>	<i>5700</i>	<i>5383</i>	<i>5096</i>	<i>4829</i>	<i>4575</i>	<i>4304</i>	<i>4094</i>		
2004-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6366	5659	4979	4492	4023	3610	3339	3040	2876	2673	2452	2311	2188	2066	1959	1852	1774		
	auswertbar	Anzahl		5344	4764	4346	3886	3493	3190	2928	2676	2516	2330	2203	2084	1980	1871	1790	1700		
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		32	23	21	14	7	8	5	12	52	9	10	6	8	8	9	7		
		Anteil in %		0,60	0,48	0,48	0,36	0,20	0,25	0,17	0,45	2,07	0,39	0,45	0,29	0,40	0,43	0,50	0,41		
		CI Anteil in %		[0,39; 0,81]	[0,29; 0,68]	[0,28; 0,69]	[0,17; 0,55]	[0,05; 0,35]	[0,08; 0,42]	[0,02; 0,32]	[0,20; 0,70]	[1,51; 2,62]	[0,13; 0,64]	[0,17; 0,73]	[0,06; 0,52]	[0,12; 0,68]	[0,13; 0,72]	[0,18; 0,83]	[0,11; 0,72]		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,43	98,96	98,49	98,14	97,94	97,70	97,53	97,10	95,13	94,77	94,34	94,07	93,70	93,30	92,84	92,45		
CI			[99,23; 99,63]	[98,69; 99,23]	[98,15; 98,83]	[97,76; 98,35]	[97,53; 98,35]	[97,26; 98,14]	[97,07; 97,99]	[96,58; 97,62]	[94,39; 95,87]	[94,00; 95,54]	[93,53; 95,15]	[93,23; 94,91]	[92,83; 94,57]	[92,39; 94,21]	[91,88; 93,80]	[91,46; 93,44]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6722</i>	<i>5979</i>	<i>5294</i>	<i>4783</i>	<i>4296</i>	<i>3854</i>	<i>3572</i>	<i>3250</i>	<i>3080</i>	<i>2873</i>	<i>2690</i>	<i>2532</i>	<i>2401</i>	<i>2263</i>	<i>2147</i>	<i>2032</i>	<i>1951</i>			
2004-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4935	4470	4049	3672	3295	3066	2856	2733	2538	2386	2258	2139	2034	1936	1853	1763			
	auswertbar	Anzahl		4226	3886	3532	3073	2843	2631	2434	2289	2141	2045	1914	1834	1735	1657	1571			
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		31	13	8	11	8	7	10	35	8	4	7	9	2	3	5			
		Anteil in %		0,73	0,33	0,23	0,36	0,28	0,27	0,41	1,53	0,37	0,20	0,37	0,49	0,12	0,18	0,32			
		CI Anteil in %		[0,48; 0,99]	[0,15; 0,52]	[0,07; 0,38]	[0,15; 0,57]	[0,09; 0,48]	[0,07; 0,46]	[0,16; 0,67]	[1,03; 2,03]	[0,12; 0,63]	[0,00; 0,39]	[0,10; 0,64]	[0,17; 0,81]	[0,00; 0,27]	[0,00; 0,39]	[0,04; 0,60]			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,30	98,97	98,75	98,40	98,12	97,86	97,47	96,00	95,65	95,46	95,12	94,65	94,54	94,37	94,07			
CI			[99,05; 99,55]	[98,67; 99,27]	[98,41; 99,09]	[98,00; 98,80]	[97,68; 98,56]	[97,38; 98,34]	[96,93; 98,01]	[95,29; 96,71]	[94,90; 96,40]	[94,69; 96,23]	[94,31; 95,93]	[93,79; 95,51]	[93,67; 95,41]	[93,48; 95,26]	[93,14; 95,00]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5209</i>	<i>4715</i>	<i>4298</i>	<i>3897</i>	<i>3506</i>	<i>3261</i>	<i>3038</i>	<i>2910</i>	<i>2710</i>	<i>2571</i>	<i>2446</i>	<i>2321</i>	<i>2204</i>	<i>2102</i>	<i>2005</i>	<i>1906</i>				
2005-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6913	6434	5832	5174	4676	4291	4057	3799	3518	3306	3116	2930	2790	2654	2518				
	auswertbar	Anzahl		6125	5511	4960	4466	4130	3827	3619	3358	3204	3011	2851	2695	2562	2449				
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		32	17	12	13	14	10	88	19	12	13	10	11	9	8				
		Anteil in %		0,52	0,31	0,24	0,29	0,34	0,26	2,43	0,57	0,37	0,43	0,35	0,41	0,35					
		CI Anteil in %		[0,34; 0,70]	[0,16; 0,45]	[0,11; 0,38]	[0,13; 0,45]	[0,16; 0,52]	[0,10; 0,42]	[1,93; 2,93]	[0,31; 0,82]	[0,16; 0,59]	[0,20; 0,67]	[0,13; 0,57]	[0,17; 0,65]	[0,12; 0,58]	[0,10; 0,55]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,49	99,19	98,95	98,67	98,34	98,08	95,74	95,21	94,86	94,45	94,12	93,74	93,41					
CI			[99,31; 99,67]	[98,96; 99,42]	[98,69; 99,21]	[98,37; 98,97]	[97,99; 98,69]	[97,70; 98,46]	[95,13; 96,35]	[94,56; 95,86]	[94,18; 95,54]	[93,74; 95,16]	[93,38; 94,86]	[92,97; 94,51]	[92,62; 94,20]	[92,29; 93,93]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7326</i>	<i>6819</i>	<i>6209</i>	<i>5519</i>	<i>4992</i>	<i>4584</i>	<i>4340</i>	<i>4066</i>	<i>3849</i>	<i>3623</i>	<i>3415</i>	<i>3216</i>	<i>3064</i>	<i>2915</i>	<i>2769</i>					

EZ	Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2005-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9201	8465	7676	6974	6367	5984	5544	5107	4773	4477	4165	3928	3731	3530					
	auswertbar	Anzahl		8064	7337	6677	6098	5632	5223	4852	4576	4275	4026	3799	3602	3417					
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		39	28	25	25	15	127	36	24	26	17	13	8	11					
		Anteil in %		0,48	0,38	0,37	0,41	0,27	2,43	0,74	0,52	0,61	0,42	0,34	0,22	0,32					
		CI Anteil in %		[0,33; 0,64]	[0,24; 0,52]	[0,23; 0,52]	[0,25; 0,57]	[0,13; 0,40]	[2,01; 2,85]	[0,50; 0,98]	[0,32; 0,73]	[0,38; 0,84]	[0,22; 0,62]	[0,16; 0,53]	[0,07; 0,38]	[0,13; 0,51]					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,53	99,15	98,79	98,39	98,13	95,80	95,11	94,61	94,05	93,65	93,34	93,13	92,83					
CI			[99,38; 99,68]	[98,95; 99,35]	[98,54; 99,04]	[98,10; 98,68]	[97,81; 98,45]	[95,29; 96,31]	[94,56; 95,66]	[94,03; 95,19]	[93,43; 94,67]	[93,01; 94,29]	[92,68; 94,00]	[92,45; 93,81]	[92,13; 93,53]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9778</i>	<i>8989</i>	<i>8164</i>	<i>7426</i>	<i>6790</i>	<i>6402</i>	<i>5933</i>	<i>5585</i>	<i>5240</i>	<i>4913</i>	<i>4579</i>	<i>4321</i>	<i>4101</i>	<i>3871</i>						
2006-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	10558	9910	8970	8203	7757	7196	6667	6247	5879	5493	5198	4875	4649						
	auswertbar	Anzahl		9567	8598	7963	7305	6832	6398	6032	5640	5345	5033	4738	4537						
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		43	27	21	19	159	36	22	17	17	14	16	9						
		Anteil in %		0,45	0,31	0,26	0,26	2,33	0,56	0,36	0,30	0,32	0,28	0,34	0,20						
		CI Anteil in %		[0,32; 0,58]	[0,20; 0,43]	[0,15; 0,38]	[0,14; 0,38]	[1,97; 2,68]	[0,38; 0,75]	[0,21; 0,52]	[0,16; 0,44]	[0,17; 0,47]	[0,13; 0,42]	[0,17; 0,50]	[0,07; 0,33]						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,56	99,25	98,99	98,73	96,48	95,95	95,60	95,32	95,02	94,75	94,44	94,25						
CI			[99,43; 99,69]	[99,07; 99,43]	[98,78; 99,20]	[98,49; 98,97]	[96,06; 96,90]	[95,50; 96,40]	[95,13; 96,07]	[94,83; 95,81]	[94,51; 95,53]	[94,23; 95,27]	[93,90; 94,98]	[93,69; 94,81]							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11195</i>	<i>10505</i>	<i>9553</i>	<i>8754</i>	<i>8293</i>	<i>7702</i>	<i>7289</i>	<i>6827</i>	<i>6435</i>	<i>6016</i>	<i>5692</i>	<i>5332</i>	<i>5084</i>							
2006-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	13579	12931	11791	10989	10001	9234	8555	8065	7542	7113	6699	6329							
	auswertbar	Anzahl		12200	11163	10193	9322	8685	8201	7664	7235	6805	6475	6093							
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		54	30	37	188	61	41	22	19	29	20	21							
		Anteil in %		0,44	0,27	0,36	2,02	0,70	0,50	0,29	0,26	0,43	0,31	0,34							
		CI Anteil in %		[0,32; 0,56]	[0,17; 0,36]	[0,25; 0,48]	[1,73; 2,30]	[0,53; 0,88]	[0,35; 0,65]	[0,17; 0,41]	[0,14; 0,38]	[0,27; 0,58]	[0,17; 0,44]	[0,20; 0,49]							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,57	99,31	98,95	97,01	96,34	95,87	95,60	95,35	94,95	94,66	94,33							
CI			[99,46; 99,68]	[99,16; 99,46]	[98,76; 99,14]	[96,68; 97,34]	[95,97; 96,71]	[95,48; 96,26]	[95,19; 96,01]	[94,93; 95,77]	[94,50; 95,40]	[94,20; 95,12]	[93,85; 94,81]								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>13791</i>	<i>12613</i>	<i>11771</i>	<i>10718</i>	<i>10080</i>	<i>9390</i>	<i>8865</i>	<i>8292</i>	<i>7821</i>	<i>7374</i>	<i>6965</i>								
2007-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	17023	16183	15142	13709	12659	11800	11077	10341	9733	9171	8718								
	auswertbar	Anzahl		15409	14000	12739	11918	11294	10639	9913	9354	8877	8411								
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		76	54	224	75	57	48	43	30	32	28								
		Anteil in %		0,49	0,39	1,76	0,63	0,50	0,45	0,43	0,32	0,36	0,33								
		CI Anteil in %		[0,38; 0,60]	[0,28; 0,49]	[1,53; 1,99]	[0,49; 0,77]	[0,37; 0,64]	[0,32; 0,58]	[0,30; 0,56]	[0,21; 0,44]	[0,24; 0,49]	[0,21; 0,46]								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,52	99,14	97,45	96,85	96,36	95,93	95,52	95,22	94,88	94,57								
CI			[99,41; 99,63]	[98,99; 99,29]	[97,19; 97,71]	[96,56; 97,14]	[96,04; 96,68]	[95,59; 96,27]	[95,16; 95,88]	[94,85; 95,59]	[94,49; 95,27]	[94,16; 94,98]									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>17190</i>	<i>16142</i>	<i>14666</i>	<i>13722</i>	<i>12823</i>	<i>12070</i>	<i>11283</i>	<i>10635</i>	<i>10034</i>	<i>9520</i>									
2007-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9705	9349	8564	7790	7146	6658	6236	5852	5491	5186									
	auswertbar	Anzahl		8756	7765	7206	6756	6347	5965	5611	5291	4976									
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		28	147	38	26	22	23	24	25	16									
		Anteil in %		0,32	1,89	0,53	0,38	0,35	0,39	0,43	0,47	0,32									
		CI Anteil in %		[0,20; 0,44]	[1,59; 2,20]	[0,36; 0,69]	[0,24; 0,53]	[0,20; 0,49]	[0,23; 0,54]	[0,26; 0,60]	[0,29; 0,66]	[0,16; 0,48]									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,69	97,86	97,36	96,99	96,66	96,29	95,88	95,43	95,13									
CI			[99,57; 99,81]	[97,55; 98,17]	[97,01; 97,71]	[96,61; 97,37]	[96,26; 97,06]	[95,86; 96,72]	[95,43; 96,33]	[94,95; 95,91]	[94,62; 95,64]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>9940</i>	<i>9118</i>	<i>8435</i>	<i>7735</i>	<i>7205</i>	<i>6731</i>	<i>6317</i>	<i>5936</i>	<i>5626</i>										
2008-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	8948	8619	7931	7238	6691	6269	5911	5544	5253										
	auswertbar	Anzahl		8034	7379	6822	6395	6024	5666	5328	5060										
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		123	33	22	15	29	25	10	12										
		Anteil in %		1,53	0,45	0,32	0,23	0,48	0,44	0,19	0,24										
		CI Anteil in %		[1,26; 1,80]	[0,29; 0,60]	[0,19; 0,46]	[0,12; 0,35]	[0,31; 0,66]	[0,27; 0,61]	[0,07; 0,30]	[0,10; 0,37]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,52	98,08	97,77	97,54	97,08	96,66	96,48	96,25										
CI			[98,26; 98,78]	[97,78; 98,38]	[97,45; 98,09]	[97,20; 97,88]	[96,70; 97,46]	[96,25; 97,07]	[96,05; 96,91]	[95,80; 96,70]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>9074</i>	<i>8463</i>	<i>7733</i>	<i>7156</i>	<i>6701</i>	<i>6331</i>	<i>5959</i>	<i>5643</i>											
2008-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6216	5993	5510	5068	4700	4370	4097	3863											
	auswertbar	Anzahl		5660	5169	4788	4505	4181	3922	3702											
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		49	25	10	17	19	13	9											
		Anteil in %		0,87	0,48	0,21	0,38	0,45	0,33	0,24											
		CI Anteil in %		[0,62; 1,11]	[0,29; 0,67]	[0,08; 0,34]	[0,20; 0,56]	[0,25; 0,66]	[0,15; 0,51]	[0,08; 0,40]											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,15	98,68	98,48	98,11	97,67	97,35	97,11											
CI			[98,91; 99,39]	[98,38; 98,98]	[98,16; 98,80]	[97,74; 98,48]	[97,25; 98,09]	[96,90; 97,80]	[96,64; 97,58]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>6320</i>	<i>5851</i>	<i>5399</i>	<i>5008</i>	<i>4674</i>	<i>4394</i>	<i>4147</i>												

EZ	Erstauftreten eines Schlaganfalls im Kollektiv der Patienten ohne Schlaganfall laut Erstdokumentation	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2009-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5285	5069	4668	4269	3993	3727	3509											
	auswertbar	Anzahl		4853	4409	4074	3827	3581	3400											
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		34	23	9	8	13	7											
		Anteil in %			0,70	0,52	0,22	0,21	0,36	0,21										
		CI Anteil in %			[0,47; 0,94]	[0,31; 0,73]	[0,08; 0,37]	[0,06; 0,35]	[0,17; 0,56]	[0,05; 0,36]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,31	98,80	98,58	98,38	98,03	97,82											
		CI		[99,08; 99,54]	[98,49; 99,11]	[98,24; 98,92]	[98,01; 98,75]	[97,62; 98,44]	[97,38; 98,26]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>5299</i>	<i>4907</i>	<i>4513</i>	<i>4221</i>	<i>3942</i>	<i>3724</i>												
2009-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5691	5434	4928	4538	4230	3962												
	auswertbar	Anzahl		5166	4669	4356	4066	3828												
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		42	17	13	16	7												
		Anteil in %			0,81	0,36	0,30	0,39	0,18											
		CI Anteil in %			[0,57; 1,06]	[0,19; 0,54]	[0,14; 0,46]	[0,20; 0,59]	[0,05; 0,32]											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,20	98,84	98,55	98,17	97,99												
		CI		[98,96; 99,44]	[98,55; 99,13]	[98,22; 98,88]	[97,79; 98,55]	[97,59; 98,39]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>5705</i>	<i>5205</i>	<i>4802</i>	<i>4483</i>	<i>4208</i>													
2010-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6322	6068	5566	5117	4781													
	auswertbar	Anzahl		5850	5277	4891	4593													
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		41	25	11	7													
		Anteil in %			0,70	0,47	0,22	0,15												
		CI Anteil in %			[0,49; 0,91]	[0,29; 0,66]	[0,09; 0,36]	[0,04; 0,27]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,31	98,84	98,62	98,47													
		CI		[99,10; 99,52]	[98,56; 99,12]	[98,31; 98,93]	[98,14; 98,80]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>6363</i>	<i>5859</i>	<i>5409</i>	<i>5055</i>														
2010-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6355	6087	5601	5144														
	auswertbar	Anzahl		5827	5282	4933														
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		30	19	18														
		Anteil in %			0,51	0,36	0,36													
		CI Anteil in %			[0,33; 0,70]	[0,20; 0,52]	[0,20; 0,53]													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,49	99,14	98,78														
		CI		[99,31; 99,67]	[98,90; 99,38]	[98,49; 99,07]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>	<i>6400</i>	<i>5912</i>	<i>5443</i>															
2011-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6063	5832	5338															
	auswertbar	Anzahl		5586	5045															
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		36	10															
		Anteil in %			0,64	0,20														
		CI Anteil in %			[0,43; 0,85]	[0,08; 0,32]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,36	99,17															
		CI		[99,15; 99,57]	[98,93; 99,41]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>	<i>6098</i>	<i>5609</i>																
2011-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5073	4874																
	auswertbar	Anzahl		4670																
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl		34																
		Anteil in %			0,73															
		CI Anteil in %			[0,48; 0,97]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,27																
		CI		[99,03; 99,51]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>	<i>5157</i>																	
2012-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5696																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmalig aufgetretener Schlaganfall	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																		
		CI																		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>																		

In der folgenden Tabelle 3.5.7 wird dokumentiert, bei wie vielen Patienten in den jeweiligen Berichtshalbjahren **erstmalig eine Nierenersatztherapie** durchgeführt wurde. Dazu wird das Kollektiv derjenigen Patienten betrachtet, bei denen in der Erstdokumentation noch keine Nierenersatztherapie vermerkt war.

Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine Nierenersatztherapie durchgeführt wurde. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die benötigten Angaben vorlagen. Zudem wird ausgewiesen, bei wie vielen der auswertbaren Kollektivmitglieder unter Risiko bzw. welchem

Anteil im Berichtshalbjahr eine erstmalige Nierenersatztherapie dokumentiert ist. Außerdem wird wie oben beschrieben die kumulierte „Rate der ereignisfreien Zeit“ nach Kaplan-Meier dargestellt.

In der Kohorte 2004-2 waren anfangs 5209 Patienten eingeschrieben. Bei 5189 dieser Personen war laut Erstdokumentation keine Nierenersatztherapie durchgeführt wurden. Dieses Kollektiv umfasste im letzten Berichtshalbjahr noch 1886 Mitglieder. Bei 1681 Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei 0,18 Prozent dieser auswertbaren Patienten wurde im letzten Berichtshalbjahr eine erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie dokumentiert.

Tabelle 3.5.7 Ereigniszeitanalyse: Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut Erstdokumentation

EZ	Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr
2004-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5189	4698	4279	3879	3487	3244	3019	2890	2690	2548	2422	2295	2180	2080	1985	1886		
	auswertbar	Anzahl		4442	4104	3731	3252	3006	2784	2572	2427	2293	2195	2057	1970	1863	1780	1681		
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		5	4	6	0	2	1	1	11	4	3	0	2	1	1	3		
		Anteil in %		0,11	0,10	0,16	0,00	0,07	0,04	0,04	0,45	0,17	0,14	0,00	0,10	0,05	0,06	0,18		
		CI Anteil in %		[0,01; 0,21]	[0,00; 0,19]	[0,03; 0,29]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,12]	[0,19; 0,72]	[0,00; 0,35]	[0,00; 0,29]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,24]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,38]		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,89	99,80	99,64	99,64	99,57	99,54	99,50	99,05	98,88	98,75	98,75	98,65	98,60	98,54	98,37		
CI			[99,80; 99,98]	[99,67; 99,93]	[99,46; 99,82]	[99,46; 99,82]	[99,36; 99,78]	[99,32; 99,76]	[99,27; 99,73]	[98,70; 99,40]	[98,50; 99,26]	[98,34; 99,16]	[98,34; 99,16]	[98,21; 99,09]	[98,15; 99,05]	[98,08; 99,00]	[97,87; 98,87]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5209</i>	<i>4715</i>	<i>4298</i>	<i>3897</i>	<i>3506</i>	<i>3261</i>	<i>3038</i>	<i>2910</i>	<i>2710</i>	<i>2571</i>	<i>2446</i>	<i>2321</i>	<i>2204</i>	<i>2102</i>	<i>2005</i>	<i>1906</i>			
2005-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	7303	6797	6187	5499	4972	4562	4319	4046	3822	3594	3389	3192	3040	2891	2744			
	auswertbar	Anzahl		6473	5844	5274	4750	4392	4076	3855	3641	3479	3274	3104	2934	2793	2668			
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		5	5	4	5	2	1	8	5	3	3	3	3	2	4			
		Anteil in %		0,08	0,09	0,08	0,11	0,05	0,02	0,21	0,14	0,09	0,09	0,10	0,10	0,07	0,15			
		CI Anteil in %		[0,01; 0,14]	[0,01; 0,16]	[0,00; 0,15]	[0,01; 0,20]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,07]	[0,06; 0,35]	[0,02; 0,26]	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,21]	[0,00; 0,22]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,30]			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,92	99,84	99,77	99,66	99,62	99,59	99,39	99,26	99,17	99,08	98,99	98,89	98,82	98,67			
CI			[99,85; 99,99]	[99,74; 99,94]	[99,65; 99,89]	[99,51; 99,81]	[99,46; 99,78]	[99,42; 99,76]	[99,17; 99,61]	[99,01; 99,51]	[98,90; 99,44]	[98,79; 99,37]	[98,68; 99,30]	[98,56; 99,22]	[98,48; 99,16]	[98,30; 99,04]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7326</i>	<i>6819</i>	<i>6209</i>	<i>5519</i>	<i>4992</i>	<i>4584</i>	<i>4340</i>	<i>4066</i>	<i>3849</i>	<i>3623</i>	<i>3415</i>	<i>3216</i>	<i>3064</i>	<i>2915</i>	<i>2769</i>				
2005-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9735	8957	8134	7393	6756	6367	5901	5556	5214	4889	4558	4300	4075	3840				
	auswertbar	Anzahl		8532	7780	7073	6477	5991	5563	5274	4999	4661	4401	4154	3935	3707				
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		5	8	4	4	3	5	6	2	1	1	5	11	2				
		Anteil in %		0,06	0,10	0,06	0,06	0,05	0,09	0,11	0,04	0,02	0,02	0,12	0,28	0,05				
		CI Anteil in %		[0,01; 0,11]	[0,03; 0,17]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,11]	[0,01; 0,17]	[0,02; 0,20]	[0,00; 0,10]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,07]	[0,01; 0,23]	[0,11; 0,44]	[0,00; 0,13]				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,94	99,84	99,79	99,72	99,68	99,59	99,48	99,44	99,42	99,39	99,28	99,00	98,95				
CI			[99,89; 99,99]	[99,75; 99,93]	[99,69; 99,89]	[99,60; 99,84]	[99,55; 99,81]	[99,44; 99,74]	[99,30; 99,66]	[99,26; 99,62]	[99,23; 99,61]	[99,20; 99,58]	[99,06; 99,50]	[98,73; 99,27]	[98,67; 99,23]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9778</i>	<i>8989</i>	<i>8164</i>	<i>7426</i>	<i>6790</i>	<i>6402</i>	<i>5933</i>	<i>5585</i>	<i>5240</i>	<i>4913</i>	<i>4579</i>	<i>4321</i>	<i>4101</i>	<i>3871</i>					
2006-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	11151	10462	9510	8715	8258	7667	7246	6784	6389	5969	5646	5287	5039					
	auswertbar	Anzahl		10097	9106	8457	7773	7280	6931	6549	6129	5803	5460	5133	4918					
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		8	3	3	5	12	8	6	8	3	8	5	4					
		Anteil in %		0,08	0,03	0,04	0,06	0,16	0,12	0,09	0,13	0,05	0,15	0,10	0,08					
		CI Anteil in %		[0,02; 0,13]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,08]	[0,01; 0,12]	[0,07; 0,26]	[0,04; 0,20]	[0,02; 0,16]	[0,04; 0,22]	[0,00; 0,11]	[0,05; 0,25]	[0,01; 0,18]	[0,00; 0,16]					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,92	99,89	99,85	99,79	99,63	99,52	99,43	99,30	99,25	99,10	99,01	98,93					
CI			[99,87; 99,97]	[99,82; 99,96]	[99,77; 99,93]	[99,70; 99,88]	[99,50; 99,76]	[99,37; 99,67]	[99,26; 99,60]	[99,11; 99,49]	[99,05; 99,45]	[98,88; 99,32]	[98,77; 99,25]	[98,68; 99,18]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11195</i>	<i>10505</i>	<i>9553</i>	<i>8754</i>	<i>8293</i>	<i>7702</i>	<i>7289</i>	<i>6827</i>	<i>6435</i>	<i>6016</i>	<i>5692</i>	<i>5332</i>	<i>5084</i>						
2006-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	14414	13719	12542	11698	10654	10006	9317	8790	8219	7747	7303	6901						
	auswertbar	Anzahl		12933	11865	10845	9920	9409	8918	8358	7887	7404	7045	6633						
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		8	8	9	19	14	9	6	11	6	6	6						
		Anteil in %		0,06	0,07	0,08	0,19	0,15	0,10	0,07	0,14	0,08	0,09	0,09						
		CI Anteil in %		[0,02; 0,10]	[0,02; 0,11]	[0,03; 0,14]	[0,11; 0,28]	[0,07; 0,23]	[0,04; 0,17]	[0,01; 0,13]	[0,06; 0,22]	[0,02; 0,15]	[0,02; 0,15]	[0,02; 0,16]						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,94	99,87	99,79	99,61	99,46	99,36	99,29	99,15	99,08	98,99	98,90						
CI			[99,90; 99,98]	[99,81; 99,93]	[99,71; 99,87]	[99,49; 99,73]	[99,32; 99,60]	[99,21; 99,51]	[99,13; 99,45]	[98,97; 99,33]	[98,89; 99,27]	[98,79; 99,19]	[98,68; 99,12]							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>13791</i>	<i>12613</i>	<i>11771</i>	<i>10718</i>	<i>10080</i>	<i>9390</i>	<i>8865</i>	<i>8292</i>	<i>7821</i>	<i>7374</i>	<i>6965</i>							

EZ	Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2007-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	18028	17106	16059	14595	13626	12727	11969	11189	10550	9955	9444							
	auswertbar	Anzahl		16294	14857	13562	12833	12185	11494	10726	10124	9622	9099							
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		13	8	31	16	19	16	11	10	12	6							
		Anteil in %		0,08	0,05	0,23	0,12	0,16	0,14	0,10	0,10	0,12	0,07							
		CI Anteil in %		[0,04; 0,12]	[0,02; 0,09]	[0,15; 0,31]	[0,06; 0,19]	[0,09; 0,23]	[0,07; 0,21]	[0,04; 0,16]	[0,04; 0,16]	[0,05; 0,20]	[0,01; 0,12]							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,92	99,87	99,65	99,53	99,37	99,24	99,14	99,04	98,92	98,85							
CI			[99,88; 99,96]	[99,81; 99,93]	[99,55; 99,75]	[99,42; 99,64]	[99,24; 99,50]	[99,09; 99,39]	[98,98; 99,30]	[98,87; 99,21]	[98,74; 99,10]	[98,66; 99,04]								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>17190</i>	<i>16142</i>	<i>14666</i>	<i>13722</i>	<i>12823</i>	<i>12070</i>	<i>11283</i>	<i>10635</i>	<i>10034</i>	<i>9520</i>								
2007-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	10270	9884	9070	8375	7685	7157	6684	6271	5894	5582								
	auswertbar	Anzahl		9258	8219	7734	7257	6815	6387	6012	5679	5351								
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		7	19	5	4	7	5	4	6	6								
		Anteil in %		0,08	0,23	0,06	0,06	0,10	0,08	0,07	0,11	0,11								
		CI Anteil in %		[0,02; 0,13]	[0,13; 0,34]	[0,01; 0,12]	[0,00; 0,11]	[0,03; 0,18]	[0,01; 0,15]	[0,00; 0,13]	[0,02; 0,19]	[0,02; 0,20]								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,93	99,70	99,64	99,59	99,48	99,41	99,34	99,24	99,13								
CI			[99,87; 99,99]	[99,59; 99,81]	[99,51; 99,77]	[99,45; 99,73]	[99,32; 99,64]	[99,24; 99,58]	[99,16; 99,52]	[99,04; 99,44]	[98,91; 99,35]									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>9940</i>	<i>9118</i>	<i>8435</i>	<i>7735</i>	<i>7205</i>	<i>6731</i>	<i>6317</i>	<i>5936</i>	<i>5626</i>									
2008-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	9387	9033	8417	7680	7106	6652	6279	5906	5594									
	auswertbar	Anzahl		8424	7836	7243	6778	6383	6014	5677	5384									
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		17	15	5	6	6	3	1	2									
		Anteil in %		0,20	0,19	0,07	0,09	0,09	0,05	0,02	0,04									
		CI Anteil in %		[0,11; 0,30]	[0,09; 0,29]	[0,01; 0,13]	[0,02; 0,16]	[0,02; 0,17]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,05]	[0,00; 0,09]									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,80	99,62	99,55	99,46	99,37	99,32	99,30	99,27									
CI			[99,71; 99,89]	[99,49; 99,75]	[99,40; 99,70]	[99,30; 99,62]	[99,19; 99,55]	[99,13; 99,51]	[99,11; 99,49]	[99,07; 99,47]										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>9074</i>	<i>8463</i>	<i>7733</i>	<i>7156</i>	<i>6701</i>	<i>6331</i>	<i>5959</i>	<i>5643</i>										
2008-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6529	6299	5827	5376	4987	4651	4371	4122										
	auswertbar	Anzahl		5945	5472	5082	4779	4455	4184	3947										
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		7	7	2	5	5	5	3										
		Anteil in %		0,12	0,13	0,04	0,10	0,11	0,12	0,08										
		CI Anteil in %		[0,03; 0,20]	[0,03; 0,22]	[0,00; 0,09]	[0,01; 0,20]	[0,01; 0,21]	[0,01; 0,22]	[0,00; 0,16]										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,88	99,76	99,72	99,62	99,51	99,39	99,31										
CI			[99,79; 99,97]	[99,63; 99,89]	[99,58; 99,86]	[99,46; 99,78]	[99,32; 99,70]	[99,17; 99,61]	[99,08; 99,54]											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>6320</i>	<i>5851</i>	<i>5399</i>	<i>5008</i>	<i>4674</i>	<i>4394</i>	<i>4147</i>											
2009-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5498	5270	4880	4485	4196	3916	3702											
	auswertbar	Anzahl		5042	4614	4282	4020	3764	3592											
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		4	7	1	5	2	3											
		Anteil in %		0,08	0,15	0,02	0,12	0,05	0,08											
		CI Anteil in %		[0,00; 0,16]	[0,04; 0,26]	[0,00; 0,07]	[0,02; 0,23]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,18]											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,92	99,77	99,75	99,63	99,57	99,49											
CI			[99,84; 100,00]	[99,64; 99,90]	[99,61; 99,89]	[99,45; 99,81]	[99,38; 99,76]	[99,28; 99,70]												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>5299</i>	<i>4907</i>	<i>4513</i>	<i>4221</i>	<i>3942</i>	<i>3724</i>												
2009-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5954	5681	5181	4780	4462	4184												
	auswertbar	Anzahl		5399	4912	4589	4293	4040												
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		5	3	4	4	3												
		Anteil in %		0,09	0,06	0,09	0,09	0,07												
		CI Anteil in %		[0,01; 0,17]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,16]												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,91	99,85	99,76	99,67	99,60												
CI			[99,83; 99,99]	[99,75; 99,95]	[99,63; 99,89]	[99,51; 99,83]	[99,42; 99,78]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>5705</i>	<i>5205</i>	<i>4802</i>	<i>4483</i>	<i>4208</i>													

EZ	Erstmalige Durchführung einer Nierenersatztherapie im Kollektiv der Patienten ohne Nierenersatztherapie laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6602	6337	5830	5384	5030															
	auswertbar	Anzahl		6108	5534	5145	4832															
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		9	2	2	5															
		Anteil in %			0,15	0,04	0,04	0,10														
		CI Anteil in %			[0,05; 0,24]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,09]	[0,01; 0,19]														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,85	99,82	99,78	99,68															
CI				[99,75; 99,95]	[99,71; 99,93]	[99,66; 99,90]	[99,53; 99,83]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6630</i>	<i>6363</i>	<i>5859</i>	<i>5409</i>	<i>5055</i>															
2010-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6653	6373	5890	5419																
	auswertbar	Anzahl		6106	5555	5198																
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		4	3	2																
		Anteil in %			0,07	0,05	0,04															
		CI Anteil in %			[0,00; 0,13]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,09]															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,94	99,88	99,84																
CI				[99,88; 100,00]	[99,79; 99,97]	[99,74; 99,94]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6682</i>	<i>6400</i>	<i>5912</i>	<i>5443</i>																
2011-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6330	6078	5586																	
	auswertbar	Anzahl		5821	5277																	
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		10	7																	
		Anteil in %			0,17	0,13																
		CI Anteil in %			[0,07; 0,28]	[0,03; 0,23]																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,83	99,70																	
CI				[99,72; 99,94]	[99,56; 99,84]																	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>6352</i>	<i>6098</i>	<i>5609</i>																	
2011-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5344	5138																		
	auswertbar	Anzahl		4926																		
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl		6																		
		Anteil in %			0,12																	
		CI Anteil in %			[0,02; 0,22]																	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,88																		
CI				[99,78; 99,98]																		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5365</i>	<i>5157</i>																		
2012-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5969																			
	auswertbar	Anzahl																				
	erstmalig durchgeführte Nierenersatztherapie	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																				
CI																						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>		<i>5991</i>																			

In der Tabelle 3.5.8 wird die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier bezüglich primärer Endpunkte für das Kollektiv der Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation ausgewiesen. Sie wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Die Analyse erfolgt für die primären Endpunkte: Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit und Nierenersatztherapie sowie für die sekundären Endpunkte: diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, auffälliger Fußstatus laut Wagner- und/oder Armstrong-Stadium, pAVK, proliferative Retinopathie und KHK.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine primären oder sekundären Endpunkte dokumentiert waren. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die medizinischen Angaben vorlagen oder im PM-Datensatz ein Sterbedatum vermerkt war. Anschließend wird dargestellt, bei wie vielen Patienten bis einschließlich des Berichtshalbjahres keine primären oder sekundären Endpunkte dokumentiert waren und bei wie vielen Patienten erstmalig primäre Endpunkte auftraten sowie welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern des Restkollektivs unter Risiko dies jeweils entspricht. Todesfälle werden dabei wie primäre Endpunkte gewertet.

In der Kohorte 2003-1 waren im letzten Berichtshalbjahr noch 3048 Personen dem Kollektiv der Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte zum Zeitpunkt der Erstdokumentation zuzuordnen. Für 2999 dieser Kollektivmitglieder lagen auswertbare Angaben vor. Die kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit lag bezüglich der primären Endpunkte bei 67,62 Prozent.

Tabelle 3.5.8 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	11816	10849	9818	8954	8105	7497	6931	5925	5513	5082	4865	4563	4250	4041	3804	3569	3379	3211	3048
	auswertbar	Anzahl		8683	9140	8718	7908	7380	6716	5776	5398	5021	4705	4424	4172	3949	3703	3515	3350	3172	2999
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		90	81	88	140	126	128	124	117	93	113	173	108	104	94	93	85	83	84
		Anteil in %		1,04	0,89	1,01	1,77	1,71	1,91	2,15	2,17	1,85	2,40	3,91	2,59	2,63	2,54	2,65	2,54	2,62	2,80
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		99,14	98,31	97,34	95,65	94,03	92,25	90,29	88,34	86,71	84,65	81,38	79,29	77,21	75,26	73,29	71,43	69,57	67,62
	CI		[98,96; 99,32]	[98,06; 98,56]	[97,02; 97,66]	[95,23; 96,07]	[93,53; 94,53]	[91,67; 92,83]	[89,63; 90,95]	[87,61; 89,07]	[85,92; 87,50]	[83,79; 85,51]	[80,43; 82,33]	[78,28; 80,30]	[76,15; 78,27]	[74,16; 76,36]	[72,15; 74,43]	[70,25; 72,61]	[68,35; 70,79]	[66,37; 68,87]	
2003-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	10121	8824	7950	7092	6443	5912	5359	4925	4452	4264	4039	3747	3532	3357	3190	3038	2868	2722	
	auswertbar	Anzahl		7848	7696	6942	6333	5727	5214	4713	4372	4099	3877	3621	3433	3284	3135	2974	2824	2671	
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		97	82	107	109	106	107	97	71	78	167	110	65	86	71	76	83	51	
		Anteil in %		1,24	1,07	1,54	1,72	1,85	2,05	2,06	1,62	1,90	4,31	3,04	1,89	2,62	2,26	2,56	2,94	1,91	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,88	97,86	96,37	94,73	92,99	91,10	89,23	87,79	86,16	82,52	80,05	78,55	76,52	74,79	72,89	70,77	69,42	
	CI		[98,66; 99,10]	[97,55; 98,17]	[95,96; 96,78]	[94,22; 95,24]	[92,39; 93,59]	[90,42; 91,78]	[88,47; 89,99]	[86,97; 88,61]	[85,28; 87,04]	[81,52; 83,52]	[78,98; 81,12]	[77,44; 79,66]	[75,35; 77,69]	[73,58; 76,00]	[71,64; 74,14]	[69,48; 72,06]	[68,10; 70,74]		
2004-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4732	4221	3702	3330	3005	2702	2514	2305	2189	2044	1898	1794	1702	1600	1522	1453	1396		
	auswertbar	Anzahl		3985	3554	3246	2932	2641	2410	2240	2066	1946	1820	1723	1635	1554	1468	1418	1356		
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		42	69	68	59	35	38	38	46	71	35	36	41	40	31	30	33		
		Anteil in %		1,05	1,94	2,09	2,01	1,33	1,58	1,70	2,23	3,65	1,92	2,09	2,51	2,57	2,11	2,12	2,43		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,99	97,13	95,12	93,22	91,99	90,56	89,03	87,09	83,97	82,38	80,69	78,69	76,69	75,09	73,51	71,72		
	CI		[98,69; 99,29]	[96,60; 97,66]	[94,42; 95,82]	[92,38; 94,06]	[91,07; 92,91]	[89,55; 91,57]	[87,92; 90,14]	[85,87; 88,31]	[82,60; 85,34]	[80,94; 83,82]	[79,17; 82,21]	[77,09; 80,29]	[75,02; 78,36]	[73,36; 76,82]	[71,73; 75,29]	[69,88; 73,56]			
2004-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	3573	3250	2948	2690	2411	2254	2091	2005	1866	1753	1671	1591	1511	1441	1373	1308			
	auswertbar	Anzahl		3076	2839	2604	2286	2120	1964	1823	1720	1612	1551	1460	1398	1327	1266	1200			
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		51	45	51	37	35	38	36	58	39	31	32	30	35	30	27			
		Anteil in %		1,66	1,59	1,96	1,62	1,65	1,93	1,97	3,37	2,42	2,00	2,19	2,15	2,64	2,37	2,25			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,41	96,88	94,99	93,47	91,95	90,19	88,43	85,50	83,47	81,81	80,04	78,34	76,30	74,51	72,83			
	CI		[97,98; 98,84]	[96,26; 97,50]	[94,20; 95,78]	[92,55; 94,39]	[90,92; 92,98]	[89,03; 91,35]	[87,16; 89,70]	[84,07; 86,93]	[81,94; 85,00]	[80,20; 83,42]	[78,35; 81,73]	[76,58; 80,10]	[74,46; 78,14]	[72,61; 76,41]	[70,87; 74,79]				
2005-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5126	4778	4328	3863	3508	3247	3073	2885	2689	2532	2397	2267	2167	2061	1972				
	auswertbar	Anzahl		4574	4138	3729	3378	3154	2921	2762	2591	2472	2339	2224	2122	2008	1931				
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		85	70	65	66	66	54	101	57	57	62	52	59	38	51				
		Anteil in %		1,86	1,69	1,74	1,95	2,09	1,85	3,66	2,20	2,31	2,65	2,34	2,78	1,89	2,64				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,19	96,56	94,90	93,08	91,15	89,49	86,29	84,41	82,48	80,32	78,45	76,29	74,86	72,88				
	CI		[97,81; 98,57]	[96,03; 97,09]	[94,24; 95,56]	[92,30; 93,86]	[90,26; 92,04]	[88,51; 90,47]	[85,16; 87,42]	[83,21; 85,61]	[81,21; 83,75]	[78,97; 81,67]	[77,04; 79,86]	[74,81; 77,77]	[73,34; 76,38]	[71,31; 74,45]					
2005-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6730	6209	5629	5129	4704	4427	4106	3808	3584	3390	3164	3000	2850	2706					
	auswertbar	Anzahl		5946	5431	4956	4530	4184	3894	3673	3470	3274	3087	2915	2773	2651					
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		137	105	110	96	80	157	105	70	99	78	71	60	65					
		Anteil in %		2,30	1,93	2,22	2,12	1,91	4,03	2,86	2,02	3,02	2,53	2,44	2,16	2,45					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,75	95,89	93,79	91,83	90,11	86,58	84,15	82,47	80,02	78,02	76,15	74,52	72,69					
	CI		[97,38; 98,12]	[95,38; 96,40]	[93,16; 94,42]	[91,10; 92,56]	[89,30; 90,92]	[85,63; 87,53]	[83,12; 85,18]	[81,39; 83,55]	[78,87; 81,17]	[76,82; 79,22]	[74,90; 77,40]	[73,23; 75,81]	[71,36; 74,02]						
2006-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	7701	7230	6577	6044	5748	5344	4983	4700	4435	4174	3957	3736	3580						
	auswertbar	Anzahl		7009	6386	5910	5468	5102	4845	4577	4307	4098	3881	3665	3523						
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		161	148	103	99	187	122	93	99	107	100	89	73						
		Anteil in %		2,30	2,32	1,74	1,81	3,67	2,52	2,03	2,30	2,61	2,58	2,43	2,07						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,74	95,50	93,84	92,17	88,88	86,67	84,92	82,99	80,84	78,78	76,88	75,29						
	CI		[97,39; 98,09]	[95,01; 95,99]	[93,26; 94,42]	[91,52; 92,82]	[88,10; 89,66]	[85,81; 87,53]	[84,01; 85,83]	[82,03; 83,95]	[79,82; 81,86]	[77,71; 79,85]	[75,76; 78,00]	[74,14; 76,44]							

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	10039	9574	8754	8178	7484	6955	6472	6130	5761	5478	5179	4908						
	auswertbar	Anzahl		9117	8379	7686	7062	6650	6265	5897	5599	5309	5063	4774						
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		199	157	191	243	190	139	131	127	141	131	136						
		Anteil in %		2,18	1,87	2,49	3,44	2,86	2,22	2,22	2,27	2,66	2,59	2,85						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,88	96,07	93,74	90,60	88,06	86,13	84,25	82,36	80,21	78,15	75,92						
	CI		[97,59; 98,17]	[95,67; 96,47]	[93,23; 94,25]	[89,97; 91,23]	[87,35; 88,77]	[85,37; 86,89]	[83,44; 85,06]	[81,51; 83,21]	[79,31; 81,11]	[77,20; 79,10]	[74,93; 76,91]							
2007-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	13038	12428	11630	10571	9808	9184	8622	8064	7626	7197	6868							
	auswertbar	Anzahl		11897	10845	9907	9355	8850	8367	7807	7422	7030	6704							
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		272	241	325	261	209	231	201	197	169	170							
		Anteil in %		2,29	2,22	3,28	2,79	2,36	2,76	2,57	2,65	2,40	2,54							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,76	95,63	92,60	90,07	87,97	85,58	83,41	81,22	79,28	77,27							
	CI		[97,50; 98,02]	[95,26; 96,00]	[92,12; 93,08]	[89,51; 90,63]	[87,36; 88,58]	[84,91; 86,25]	[82,69; 84,13]	[80,46; 81,98]	[78,48; 80,08]	[76,44; 78,10]								
2007-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	7565	7309	6720	6169	5682	5316	5010	4708	4429	4203								
	auswertbar	Anzahl		6894	6181	5779	5432	5118	4851	4567	4312	4079								
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		141	204	160	130	98	125	113	102	94								
		Anteil in %		2,05	3,30	2,77	2,39	1,91	2,58	2,47	2,37	2,30								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,99	94,88	92,31	90,15	88,45	86,20	84,10	82,13	80,23								
	CI		[97,66; 98,32]	[94,35; 95,41]	[91,66; 92,96]	[89,42; 90,88]	[87,66; 89,24]	[85,34; 87,06]	[83,18; 85,02]	[81,15; 83,11]	[79,20; 81,26]									
2008-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	7090	6842	6322	5802	5382	5047	4753	4498	4275									
	auswertbar	Anzahl		6427	5941	5506	5184	4883	4595	4350	4170									
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		198	125	105	102	126	102	95	92									
		Anteil in %		3,08	2,10	1,91	1,97	2,58	2,22	2,18	2,21									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,01	95,00	93,23	91,42	89,08	87,13	85,25	83,37									
	CI		[96,60; 97,42]	[94,47; 95,53]	[92,61; 93,85]	[90,72; 92,12]	[88,29; 89,87]	[86,27; 87,99]	[84,33; 86,17]	[82,39; 84,35]										
2008-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5123	4955	4571	4230	3915	3648	3422	3231										
	auswertbar	Anzahl		4712	4333	4034	3789	3531	3308	3136										
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		133	91	97	87	103	78	81										
		Anteil in %		2,82	2,10	2,40	2,30	2,92	2,36	2,58										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,24	95,23	92,98	90,86	88,25	86,19	83,96										
	CI		[96,78; 97,70]	[94,62; 95,84]	[92,24; 93,72]	[90,01; 91,71]	[87,29; 89,21]	[85,15; 87,23]	[82,84; 85,08]											
2009-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4373	4217	3891	3592	3372	3154	2976											
	auswertbar	Anzahl		4065	3715	3460	3260	3050	2908											
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		85	85	60	66	50	68											
		Anteil in %		2,09	2,29	1,73	2,02	1,64	2,34											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,94	95,73	94,09	92,20	90,71	88,58											
	CI		[97,51; 98,37]	[95,10; 96,36]	[93,35; 94,83]	[91,34; 93,06]	[89,77; 91,65]	[87,54; 89,62]												
2009-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4773	4564	4152	3841	3604	3375												
	auswertbar	Anzahl		4356	3989	3719	3493	3288												
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		123	93	66	87	57												
		Anteil in %		2,82	2,33	1,77	2,49	1,73												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,23	94,99	93,32	91,02	89,44												
	CI		[96,75; 97,71]	[94,34; 95,64]	[92,57; 94,07]	[90,14; 91,90]	[88,49; 90,39]													
2010-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5317	5128	4718	4343	4054													
	auswertbar	Anzahl		4964	4508	4189	3926													
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		120	107	98	77													
		Anteil in %		2,42	2,37	2,34	1,96													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,60	95,31	93,10	91,28													
	CI		[97,18; 98,02]	[94,71; 95,91]	[92,37; 93,83]	[90,46; 92,10]														

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten <u>ohne</u> primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2010-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5301	5077	4682	4325																	
	auswertbar	Anzahl		4876	4475	4189																	
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		111	100	111																	
		Anteil in %			2,28	2,23	2,65																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			97,76	95,60	93,06																
CI				[97,35; 98,17]	[95,02; 96,18]	[92,33; 93,79]																	
2011-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4961	4773	4375																		
	auswertbar	Anzahl		4587	4156																		
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		94	57																		
		Anteil in %			2,05	1,37																	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			97,98	96,63																	
CI				[97,57; 98,39]	[96,10; 97,16]																		
2011-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4123	3969																			
	auswertbar	Anzahl		3817																			
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		97																			
		Anteil in %			2,54																		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate			97,46																		
CI				[96,96; 97,96]																			
2012-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4675																				
	auswertbar	Anzahl																					
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl																					
		Anteil in %																					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																					
CI																							

In der Tabelle 3.5.9 wird die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier bezüglich primärer Endpunkte für das Kollektiv der Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten in der Erstdokumentation ausgewiesen. Sie wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Die Analyse erfolgt für die primären Endpunkte: Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit und Nierenersatztherapie sowie für die sekundären Endpunkte: diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, auffälliger Fußstatus laut Wagner- und/oder Armstrong-Stadium, pAVK, proliferative Retinopathie und KHK.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine primären aber ein oder mehrere sekundäre Endpunkte dokumentiert waren. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die medizinischen Angaben vorlagen oder im PM-Datensatz ein Sterbedatum vermerkt war. Anschließend wird dargestellt, bei wie vielen Patienten erstmalig primäre Endpunkte auftraten sowie welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern des Restkollektivs dies jeweils entspricht. Todesfälle werden dabei wie primäre Endpunkte gewertet.

In der Kohorte 2003-1 waren im letzten Berichtshalbjahr noch 741 Personen dem Kollektiv der Patienten ohne primäre aber mit einem oder mehreren sekundären Endpunkten zum Zeitpunkt der Erstdokumentation zuzuordnen. Für 735 dieser Kollektivmitglieder lagen auswertbare Angaben vor. Die kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit lag bezüglich der primären Endpunkte bei 52,80 Prozent.

Die kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit lag bezüglich der primären Endpunkte bei 52,80 Prozent.

Tabelle 3.5.9 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut Erstdokumentation

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4180	3803	3335	2908	2558	2320	2083	1722	1554	1399	1305	1189	1074	997	934	886	843	781	741
	auswertbar	Anzahl		3053	3148	2851	2516	2299	1986	1693	1525	1377	1258	1154	1056	979	921	875	827	770	735
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		50	84	58	84	74	62	55	41	50	59	82	46	39	29	27	31	20	37
		Anteil in %		1,64	2,67	2,03	3,34	3,22	3,12	3,25	2,69	3,63	4,69	7,11	4,36	3,98	3,15	3,09	3,75	2,60	5,03
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,62	96,11	94,18	91,07	88,15	85,42	82,65	80,44	77,54	73,93	68,72	65,74	63,15	61,18	59,30	57,08	55,60	52,80
	CI		[98,24; 99,00]	[95,46; 96,76]	[93,38; 94,98]	[90,06; 92,08]	[86,97; 89,33]	[84,09; 86,75]	[81,18; 84,12]	[78,86; 82,02]	[75,83; 79,25]	[72,06; 75,80]	[66,67; 70,77]	[63,61; 67,87]	[60,95; 65,35]	[58,94; 63,42]	[57,02; 61,58]	[54,75; 59,41]	[53,24; 57,96]	[50,40; 55,20]	
2003-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	3146	2692	2350	2046	1815	1606	1424	1257	1112	1045	963	878	820	764	712	666	621	582	
	auswertbar	Anzahl		2454	2276	1999	1785	1555	1383	1214	1089	1015	934	844	801	754	701	656	614	571	
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		52	36	61	62	61	51	43	35	33	65	36	25	26	25	24	25	23	
		Anteil in %		2,12	1,58	3,05	3,47	3,92	3,69	3,54	3,21	3,25	6,96	4,27	3,12	3,45	3,57	3,66	4,07	4,03	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		98,04	96,53	93,63	90,41	86,89	83,70	80,75	78,18	75,67	70,49	67,54	65,45	63,20	60,95	58,73	56,37	54,07	
	CI		[97,51; 98,57]	[95,82; 97,24]	[92,63; 94,63]	[89,17; 91,65]	[85,41; 88,37]	[82,04; 85,36]	[78,93; 82,57]	[76,23; 80,13]	[73,60; 77,74]	[68,21; 72,77]	[65,16; 69,92]	[63,01; 67,89]	[60,69; 65,71]	[58,38; 63,52]	[56,11; 61,35]	[53,66; 59,02]	[51,34; 56,80]		
2004-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	1120	985	866	774	664	581	529	470	433	396	340	312	289	269	247	223	211		
	auswertbar	Anzahl		937	837	757	650	563	512	449	403	376	321	298	277	256	238	214	200		
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		20	18	37	21	19	20	20	17	32	13	12	9	11	12	7	8		
		Anteil in %		2,13	2,15	4,89	3,23	3,37	3,91	4,45	4,22	8,51	4,05	4,03	3,25	4,30	5,04	3,27	4,00		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,96	95,90	91,26	88,34	85,38	82,06	78,46	75,24	68,91	66,15	63,49	61,43	58,81	55,85	54,02	51,86		
	CI		[97,07; 98,85]	[94,62; 97,18]	[89,36; 93,16]	[86,13; 90,55]	[82,87; 87,89]	[79,26; 84,86]	[75,37; 81,55]	[71,92; 78,56]	[65,21; 72,61]	[62,31; 69,99]	[59,52; 67,46]	[57,37; 65,49]	[54,64; 62,98]	[51,56; 60,14]	[49,67; 58,37]	[47,43; 56,29]			
2004-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	977	875	780	687	612	560	520	487	448	413	381	356	339	324	306	287			
	auswertbar	Anzahl		830	758	674	558	507	468	430	393	357	331	303	291	273	255	237			
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		24	26	23	14	13	16	17	17	11	10	9	13	6	11	5			
		Anteil in %		2,89	3,43	3,41	2,51	2,56	3,42	3,95	4,33	3,08	3,02	2,97	4,47	2,20	4,31	2,11			
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		97,23	93,95	90,75	88,49	86,24	83,31	80,03	76,61	74,26	72,03	69,92	66,82	65,36	62,60	61,27			
	CI		[96,14; 98,32]	[92,32; 95,58]	[88,72; 92,78]	[86,19; 90,79]	[83,69; 88,79]	[80,47; 86,15]	[76,91; 83,15]	[73,22; 80,00]	[70,70; 77,82]	[68,32; 75,74]	[66,07; 73,77]	[62,79; 70,85]	[61,25; 69,47]	[58,35; 66,85]	[56,96; 65,58]				
2005-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	1341	1246	1100	959	851	760	709	658	585	548	506	464	434	407	367				
	auswertbar	Anzahl		1187	1059	935	815	740	685	640	567	538	499	457	423	391	363				
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		42	44	32	26	28	20	48	21	20	28	16	19	21	10				
		Anteil in %		3,54	4,15	3,42	3,19	3,78	2,92	7,50	3,70	3,72	5,61	3,50	4,49	5,37	2,75				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,58	92,64	89,50	86,69	83,43	81,03	75,02	72,28	69,60	65,70	63,41	60,60	57,38	55,80				
	CI		[95,56; 97,60]	[91,14; 94,14]	[87,70; 91,30]	[84,65; 88,73]	[81,14; 85,72]	[78,57; 83,49]	[72,22; 77,82]	[69,34; 75,22]	[66,55; 72,65]	[62,50; 68,90]	[60,13; 66,69]	[57,23; 63,97]	[53,92; 60,84]	[52,30; 59,30]					
2005-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	1866	1706	1532	1368	1230	1138	1045	923	838	767	699	643	605	571					
	auswertbar	Anzahl		1641	1473	1323	1194	1091	1005	879	811	739	687	633	592	556					
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		54	55	46	39	34	74	47	37	35	32	21	17	32					
		Anteil in %		3,29	3,73	3,48	3,27	3,12	7,36	5,35	4,56	4,74	4,66	3,32	2,87	5,76					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,78	93,22	90,02	87,12	84,44	78,33	74,21	70,89	67,59	64,45	62,32	60,54	57,05					
	CI		[95,93; 97,63]	[91,99; 94,45]	[88,52; 91,52]	[85,42; 88,82]	[82,57; 86,31]	[76,13; 80,53]	[71,84; 76,58]	[68,39; 73,39]	[64,98; 70,20]	[61,74; 67,16]	[59,55; 65,09]	[57,73; 63,35]	[54,15; 59,95]						
2006-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	2166	2034	1777	1589	1473	1356	1211	1102	1014	923	857	787	728						
	auswertbar	Anzahl		1975	1702	1551	1393	1311	1171	1070	973	910	836	775	716						
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		78	50	54	54	108	59	50	40	34	36	39	24						
		Anteil in %		3,95	2,94	3,48	3,88	8,24	5,04	4,67	4,11	3,74	4,31	5,03	3,35						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,10	93,32	90,11	86,71	79,67	75,70	72,20	69,28	66,70	63,85	60,66	58,63						
	CI		[95,25; 96,95]	[92,20; 94,44]	[88,74; 91,48]	[85,12; 88,30]	[77,73; 81,61]	[73,61; 77,79]	[69,99; 74,41]	[66,98; 71,58]	[64,33; 69,07]	[61,41; 66,29]	[58,14; 63,18]	[56,07; 61,19]							

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	2651	2513	2245	2054	1818	1621	1461	1364	1254	1141	1050	965						
	auswertbar	Anzahl		2392	2139	1926	1720	1538	1408	1309	1196	1091	1023	942						
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		100	85	89	131	91	44	60	59	46	54	46						
		Anteil in %		4,18	3,97	4,62	7,62	5,92	3,13	4,58	4,93	4,22	5,28	4,88						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,93	92,21	88,04	81,52	76,79	74,43	71,09	67,65	64,86	61,46	58,46						
CI			[95,15; 96,71]	[91,13; 93,29]	[86,71; 89,37]	[79,88; 83,16]	[74,98; 78,60]	[72,55; 76,31]	[69,11; 73,07]	[65,58; 69,72]	[62,73; 66,99]	[59,25; 63,67]	[56,20; 60,72]							
2007-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	3003	2836	2611	2301	2054	1883	1743	1598	1450	1345	1253							
	auswertbar	Anzahl		2708	2441	2182	1964	1825	1697	1551	1421	1320	1224							
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		119	112	156	96	72	74	83	67	56	56							
		Anteil in %		4,39	4,59	7,15	4,89	3,95	4,36	5,35	4,71	4,24	4,58							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,71	91,38	85,01	80,92	77,77	74,41	70,48	67,18	64,35	61,40							
CI			[94,96; 96,46]	[90,32; 92,44]	[83,63; 86,39]	[79,38; 82,46]	[76,13; 79,41]	[72,67; 76,15]	[68,64; 72,32]	[65,26; 69,10]	[62,37; 66,33]	[59,37; 63,43]								
2007-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	1608	1538	1373	1193	1074	964	876	808	742	679								
	auswertbar	Anzahl		1455	1267	1117	1031	929	848	777	720	661								
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		72	105	47	59	37	39	39	34	30								
		Anteil in %		4,95	8,29	4,21	5,72	3,98	4,60	5,02	4,72	4,54								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,14	87,48	83,87	79,13	76,00	72,55	68,96	65,73	62,75								
CI			[94,04; 96,24]	[85,75; 89,21]	[81,93; 85,81]	[76,95; 81,31]	[73,69; 78,31]	[70,10; 75,00]	[66,39; 71,53]	[63,06; 68,40]	[60,00; 65,50]									
2008-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	1413	1356	1198	1050	947	875	816	742	682									
	auswertbar	Anzahl		1257	1125	1004	915	849	797	725	660									
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		72	64	44	28	23	44	33	27									
		Anteil in %		5,73	5,69	4,38	3,06	2,71	5,52	4,55	4,09									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		94,48	89,17	85,33	82,75	80,53	76,12	72,68	69,71									
CI			[93,24; 95,72]	[87,45; 90,89]	[83,34; 87,32]	[80,61; 84,89]	[78,26; 82,80]	[73,63; 78,61]	[70,04; 75,32]	[66,95; 72,47]										
2008-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	879	835	739	660	602	548	504	469										
	auswertbar	Anzahl		804	699	631	577	526	488	449										
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		49	32	24	30	23	22	18										
		Anteil in %		6,09	4,58	3,80	5,20	4,37	4,51	4,01										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		93,97	89,76	86,37	81,92	78,39	74,88	71,88										
CI			[92,33; 95,61]	[87,64; 91,88]	[83,94; 88,80]	[79,14; 84,70]	[75,38; 81,40]	[71,67; 78,09]	[68,51; 75,25]											
2009-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	759	709	630	552	497	459	422											
	auswertbar	Anzahl		679	594	532	479	443	416											
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		43	27	28	17	19	20											
		Anteil in %		6,33	4,55	5,26	3,55	4,29	4,81											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		93,83	89,64	84,99	82,01	78,53	74,76											
CI			[92,04; 95,62]	[87,34; 91,94]	[82,24; 87,74]	[79,01; 85,01]	[75,28; 81,78]	[71,27; 78,25]												
2009-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	765	727	635	565	498	455												
	auswertbar	Anzahl		699	594	536	484	440												
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		39	31	28	19	18												
		Anteil in %		5,58	5,22	5,22	3,93	4,09												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		94,48	89,64	85,01	81,68	78,34												
CI			[92,79; 96,17]	[87,34; 91,94]	[82,26; 87,76]	[78,66; 84,70]	[75,07; 81,61]													
2010-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	844	795	691	628	577													
	auswertbar	Anzahl		770	664	607	546													
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		51	26	22	14													
		Anteil in %		6,62	3,92	3,62	2,56													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		93,44	89,82	86,58	84,36													
CI			[91,70; 95,18]	[87,66; 91,98]	[84,11; 89,05]	[81,69; 87,03]														

EZ	Erstauftreten von primären Endpunkten bei Patienten ohne primäre, aber mit Vorliegen von einem oder mehreren sekundären Endpunkten laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2010-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	914	879	790	704														
	auswertbar	Anzahl		849	745	686														
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		39	32	28														
		Anteil in %		4,59	4,30	4,08														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,43	91,37	87,64														
CI			[94,03; 96,83]	[89,45; 93,29]	[85,35; 89,93]															
2011-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	952	920	813															
	auswertbar	Anzahl		887	781															
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		48	30															
		Anteil in %		5,41	3,84															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		94,64	91,00															
CI			[93,16; 96,12]	[89,09; 92,91]																
2011-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	823	787																
	auswertbar	Anzahl		767																
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl		32																
		Anteil in %		4,17																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,83																
CI			[94,41; 97,25]																	
2012-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	875																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmalige primäre Endpunkte	Anzahl																		
		Anteil in %																		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																		
CI																				

In Tabelle 3.5.10 wird die kumulierte „**Rate der ereignisfreien Zeit**“ nach Kaplan-Meier bezüglich primärer oder sekundärer Endpunkte für das Kollektiv der Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausgewiesen. Sie wird für jede Kohorte in der vorletzten Zeile fett markiert dargestellt.

Die Analyse erfolgt für die primären Endpunkte: Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit und Nierenersatztherapie sowie für die sekundären Endpunkte: diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, auffälliger Fußstatus laut Wagner- und/oder Armstrong-Stadium, pAVK, proliferative Retinopathie und KHK.

Darüber hinaus werden für alle Kohorten und Berichtshalbjahre in den ersten Zeilen ergänzende Angaben in der „üblichen“ Tabellensystematik gemacht. Für jede Kohorte wird dazu unter „Kollektivmitglieder unter Risiko“ zunächst angegeben, wie viele der ursprünglichen Kollektivmitglieder im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren und bei denen noch keine primären oder sekundären Endpunkte dokumentiert waren. Unter „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalbjahr die medizinischen Angaben vorlagen. Anschließend wird dargestellt, bei wie vielen Patienten erstmalig primäre oder sekundäre Endpunkte auftraten sowie welchem Anteil an den auswertbaren Mitgliedern des Restkollektivs unter Risiko dies jeweils entspricht. Todesfälle werden dabei wie primäre Endpunkte gewertet.

In der Kohorte 2003-1 waren im letzten Berichtshalbjahr noch 1762 Personen dem Kollektiv der Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte zum Zeitpunkt der Erstdokumentation zuzuordnen. Für 1731 dieser Kollektivmitglieder lagen auswertbare Angaben vor. Die kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit lag bezüglich der primären und sekundären Endpunkte bei 37,43 Prozent.

Tabelle 3.5.10 Ereigniszeitanalyse: Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut Erstdokumentation

EZ	Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	11816	10849	9596	8512	7472	6733	6067	5098	4675	4266	4028	3738	3101	2795	2572	2331	2150	1938	1762
	auswertbar	Anzahl		8683	8932	8283	7284	6626	5873	4965	4574	4215	3884	3640	3042	2723	2499	2292	2130	1920	1731
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		337	333	339	323	268	193	188	151	137	126	548	232	132	151	122	158	141	100
		Anteil in %		3,88	3,73	4,09	4,43	4,04	3,29	3,79	3,30	3,25	3,24	15,05	7,63	4,85	6,04	5,32	7,42	7,34	5,78
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		96,78	93,39	89,65	85,75	82,31	79,62	76,64	74,13	71,73	69,43	59,07	54,61	51,97	48,85	46,28	42,86	39,72	37,43
	CI		[96,44; 97,12]	[92,91; 93,87]	[89,04; 90,26]	[85,04; 86,46]	[81,51; 83,11]	[78,76; 80,48]	[75,72; 77,56]	[73,15; 75,11]	[70,71; 72,75]	[68,36; 70,50]	[57,86; 60,28]	[53,36; 55,86]	[50,70; 53,24]	[47,57; 50,13]	[44,99; 47,57]	[41,56; 44,16]	[38,41; 41,03]	[36,12; 38,74]	
2003-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	10121	8824	7686	6628	5878	5277	4705	4278	3822	3625	3385	2765	2513	2309	2138	1961	1737	1571	
	auswertbar	Anzahl		7848	7440	6484	5778	5105	4577	4080	3747	3491	3252	2666	2440	2258	2101	1911	1710	1539	
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		392	338	267	214	171	143	128	94	110	530	177	132	115	126	160	137	84	
		Anteil in %		4,99	4,54	4,12	3,70	3,35	3,12	3,14	2,51	3,15	16,30	6,64	5,41	5,09	6,00	8,37	8,01	5,46	
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,49	91,26	87,57	84,35	81,55	79,03	76,56	74,65	72,34	60,79	56,81	53,78	51,07	48,03	44,04	40,53	38,32	
	CI		[95,05; 95,93]	[90,65; 91,87]	[86,84; 88,30]	[83,53; 85,17]	[80,66; 82,44]	[78,07; 79,99]	[75,54; 77,56]	[73,59; 75,11]	[71,23; 73,45]	[59,49; 62,09]	[55,47; 58,15]	[52,42; 55,14]	[49,69; 52,45]	[46,63; 49,43]	[42,63; 45,45]	[39,11; 41,95]	[36,90; 39,74]		
2004-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4732	4221	3564	3129	2785	2473	2269	2046	1919	1759	1472	1341	1223	1130	1049	959	865		
	auswertbar	Anzahl		3985	3421	3050	2717	2416	2173	1986	1808	1672	1402	1285	1177	1096	1010	937	832		
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		204	158	115	100	70	74	55	67	226	76	75	58	55	66	80	48		
		Anteil in %		5,12	4,62	3,77	3,68	2,90	3,41	2,77	3,71	13,52	5,42	5,84	4,93	5,02	6,53	8,54	5,77		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,11	90,85	87,47	84,27	81,84	79,08	76,91	74,12	64,27	60,84	57,35	54,55	51,85	48,51	44,38	41,82		
	CI		[94,45; 95,77]	[89,95; 91,75]	[86,41; 88,53]	[83,08; 85,46]	[80,55; 83,13]	[77,69; 80,47]	[75,45; 78,37]	[72,56; 75,68]	[62,47; 66,07]	[58,98; 62,70]	[55,43; 59,27]	[52,60; 56,50]	[49,87; 53,83]	[46,50; 50,52]	[42,35; 46,41]	[39,78; 43,86]			
2004-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	3573	3250	2852	2542	2240	2070	1898	1799	1646	1371	1259	1161	1061	989	908	833			
	auswertbar	Anzahl		3076	2743	2461	2125	1942	1781	1632	1514	1247	1152	1049	967	894	822	742			
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		156	107	91	63	52	57	57	234	78	60	63	45	62	55	35			
		Anteil in %		5,07	3,90	3,70	2,96	2,68	3,20	3,49	15,46	6,26	5,21	6,01	4,65	6,69	4,72				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,14	91,49	88,13	85,54	83,28	80,64	77,87	66,03	61,98	58,78	55,31	52,75	49,14	45,88	43,71			
	CI		[94,40; 95,88]	[90,50; 92,48]	[86,96; 89,30]	[84,24; 86,84]	[81,88; 84,68]	[79,13; 82,15]	[76,25; 79,49]	[64,07; 67,99]	[59,94; 64,02]	[56,69; 60,87]	[53,18; 57,44]	[50,59; 54,91]	[46,95; 51,33]	[43,67; 48,09]	[41,49; 45,93]				
2005-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5126	4778	4215	3693	3308	3010	2822	2620	2159	1962	1786	1646	1509	1368	1253				
	auswertbar	Anzahl		4574	4029	3564	3185	2923	2683	2500	2076	1910	1743	1616	1475	1333	1225				
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		206	145	116	110	88	79	384	114	114	92	104	113	87	70				
		Anteil in %		4,50	3,60	3,25	3,45	3,01	2,94	15,36	5,49	5,97	5,28	6,44	7,66	6,53	5,71				
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,61	92,25	89,28	86,24	83,67	81,25	69,05	65,32	61,45	58,25	54,51	50,37	47,13	44,44				
	CI		[95,02; 96,20]	[91,47; 93,03]	[88,36; 90,20]	[85,19; 87,29]	[82,52; 84,82]	[80,02; 82,48]	[67,51; 70,59]	[63,72; 66,92]	[59,79; 63,11]	[56,56; 59,94]	[52,78; 56,24]	[48,61; 52,13]	[45,36; 48,90]	[42,66; 46,22]					
2005-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	6730	6209	5459	4883	4410	4107	3772	3116	2801	2572	2328	2145	1932	1741					
	auswertbar	Anzahl		5946	5265	4721	4247	3886	3577	3006	2710	2479	2270	2075	1873	1714					
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		319	202	179	138	114	545	227	133	153	121	156	139	93					
		Anteil in %		5,36	3,84	3,79	3,25	2,93	15,24	7,55	4,91	6,17	5,33	7,52	7,42	5,43					
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		94,77	91,18	87,77	84,96	82,51	70,32	65,10	61,95	58,20	55,13	51,04	47,31	44,74					
	CI		[94,21; 95,33]	[90,46; 91,90]	[86,92; 88,62]	[84,01; 85,91]	[81,49; 83,53]	[69,04; 71,60]	[63,74; 66,46]	[60,56; 63,34]	[56,77; 59,63]	[53,68; 56,58]	[49,56; 52,52]	[45,81; 48,81]	[43,24; 46,24]						
2006-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	7701	7230	6340	5713	5353	4923	4100	3710	3399	3094	2855	2557	2325						
	auswertbar	Anzahl		7009	6153	5585	5097	4701	3983	3614	3298	3047	2799	2512	2290						
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		409	260	181	152	675	262	184	185	160	211	191	128						
		Anteil in %		5,84	4,23	3,24	2,98	14,36	6,58	5,09	5,61	5,25	7,54	7,60	5,59						
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		94,26	90,31	87,41	84,84	72,95	68,22	64,78	61,20	58,00	53,66	49,61	46,84						
	CI		[93,72; 94,80]	[89,61; 91,01]	[86,62; 88,20]	[83,97; 85,71]	[71,83; 74,07]	[67,04; 69,40]	[63,56; 66,00]	[59,94; 62,46]	[56,71; 59,29]	[52,34; 54,98]	[48,27; 50,95]	[45,49; 48,19]							

EZ	Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten ohne primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2006-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	10039	9574	8542	7843	7082	5926	5300	4863	4447	4097	3719	3359							
	auswertbar	Anzahl		9117	8173	7371	6694	5651	5125	4670	4321	3976	3630	3254							
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		425	294	280	902	391	274	236	228	271	268	176							
		Anteil in %		4,66	3,60	3,80	13,47	6,92	5,35	5,05	5,28	6,82	7,38	5,41							
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,46	92,09	88,67	77,04	71,82	68,03	64,66	61,28	57,16	52,97	50,11							
		CI		[95,04; 95,88]	[91,53; 92,65]	[88,01; 89,33]	[76,13; 77,95]	[70,83; 72,81]	[67,00; 69,06]	[63,59; 65,73]	[60,18; 62,38]	[56,03; 58,29]	[51,82; 54,12]	[48,95; 51,27]							
2007-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	13038	12428	11356	10177	8614	7697	7008	6411	5923	5328	4840								
	auswertbar	Anzahl		11897	10591	9549	8198	7405	6803	6213	5751	5199	4719								
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		557	386	1179	608	400	343	321	419	377	275								
		Anteil in %		4,68	3,64	12,35	7,42	5,40	5,04	5,17	7,29	7,25	5,83								
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,41	92,01	81,01	75,13	71,14	67,60	64,16	59,55	55,26	52,04								
		CI		[95,04; 95,78]	[91,52; 92,50]	[80,28; 81,74]	[74,32; 75,94]	[70,28; 72,00]	[66,71; 68,49]	[63,24; 65,08]	[58,59; 60,51]	[54,28; 56,24]	[51,04; 53,04]								
2007-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	7565	7309	6578	5557	4894	4436	4080	3731	3360	3027									
	auswertbar	Anzahl		6894	6049	5188	4669	4270	3952	3614	3262	2937									
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		295	702	365	260	195	212	243	241	134									
		Anteil in %		4,28	11,61	7,04	5,57	4,57	5,36	6,72	7,39	4,56									
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		95,80	85,08	79,25	74,92	71,56	67,77	63,27	58,65	55,97									
		CI		[95,33; 96,27]	[84,22; 85,94]	[78,27; 80,23]	[73,86; 75,98]	[70,45; 72,67]	[66,60; 68,94]	[62,05; 64,49]	[57,39; 59,91]	[54,69; 57,25]									
2008-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	7090	6842	5790	5046	4528	4110	3768	3422	3125										
	auswertbar	Anzahl		6427	5433	4785	4355	3970	3639	3301	3042										
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		753	391	249	224	203	229	203	163										
		Anteil in %		11,72	7,20	5,20	5,14	5,11	6,29	6,15	5,36										
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		88,63	82,37	78,16	74,19	70,44	66,07	62,06	58,74										
		CI		[87,87; 89,39]	[81,44; 83,30]	[77,14; 79,18]	[73,10; 75,28]	[69,29; 71,59]	[64,86; 67,28]	[60,80; 63,32]	[57,45; 60,03]										
2008-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5123	4955	4202	3734	3359	3034	2714	2439											
	auswertbar	Anzahl		4712	3977	3550	3247	2924	2617	2361											
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		511	246	186	178	216	184	144											
		Anteil in %		10,84	6,19	5,24	5,48	7,39	7,03	6,10											
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		89,39	83,96	79,64	75,31	69,82	64,96	61,00											
		CI		[88,52; 90,26]	[82,91; 85,01]	[78,48; 80,80]	[74,05; 76,57]	[68,45; 71,19]	[63,52; 66,40]	[59,51; 62,49]											
2009-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4373	4217	3656	3272	2981	2669	2392												
	auswertbar	Anzahl		4065	3496	3153	2880	2580	2337												
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		337	193	149	175	170	144												
		Anteil in %		8,29	5,52	4,73	6,08	6,59	6,16												
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		91,82	86,82	82,77	77,79	72,72	68,24												
		CI		[90,98; 92,66]	[85,77; 87,87]	[81,59; 83,95]	[76,47; 79,11]	[71,28; 74,16]	[66,71; 69,77]												
2009-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4773	4564	3918	3509	3164	2839													
	auswertbar	Anzahl		4356	3763	3396	3064	2760													
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		369	210	192	206	154													
		Anteil in %		8,47	5,58	5,65	6,72	5,58													
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		91,68	86,63	81,78	76,35	72,09													
		CI		[90,87; 92,49]	[85,61; 87,65]	[80,61; 82,95]	[75,05; 77,65]	[70,70; 73,48]													
2010-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5317	5128	4415	3869	3433														
	auswertbar	Anzahl		4964	4212	3726	3324														
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		433	300	266	181														
		Anteil in %		8,72	7,12	7,14	5,45														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		91,35	84,92	78,92	74,62														
		CI		[90,57; 92,13]	[83,91; 85,93]	[77,75; 80,09]	[73,36; 75,88]														

EZ	Erstauftreten von primären oder sekundären Endpunkten bei Patienten <u>ohne</u> primäre oder sekundäre Endpunkte laut ED	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2010-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	5301	5077	4348	3835														
	auswertbar	Anzahl		4876	4151	3716														
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		455	278	232														
		Anteil in %		9,33	6,70	6,24														
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		90,80	84,79	79,50														
	CI		[89,99; 91,61]	[83,77; 85,81]	[78,34; 80,66]															
2011-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4961	4773	4058															
	auswertbar	Anzahl		4587	3854															
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		423	235															
		Anteil in %		9,22	6,10															
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		90,89	85,35															
	CI		[90,06; 91,72]	[84,31; 86,39]																
2011-2	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4123	3969																
	auswertbar	Anzahl		3817																
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl		370																
		Anteil in %		9,69																
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate		90,31																
	CI		[89,37; 91,25]																	
2012-1	Kollektivmitglieder unter Risiko	Anzahl	4675																	
	auswertbar	Anzahl																		
	erstmalige primäre oder sekundäre Endpunkte	Anzahl																		
		Anteil in %																		
	kumulierte Rate der ereignisfreien Zeit	Rate																		
	CI																			

Berichtsteil II: Evaluation der ökonomischen Inhalte

Ein Grundziel der Evaluation ist laut Kriterien des BVA die Überprüfung der Kosten der Versorgung der DMP-Patienten. Entsprechende Auswertungen werden in diesem zweiten Teil des Evaluationsberichtes vorgenommen. Hierzu werden anhand von Zufallsstichproben die durchschnittlichen Leistungsausgaben pro Patient berechnet. In diese Betrachtung fließen alle Ausgaben für die betrachteten Leistungsbereiche ein, nicht nur die diabetesspezifischen Ausgaben. Differenziert wird nach folgenden Bereichen:

- Ambulante ärztliche Behandlung
- Krankenhausbehandlung
- Arzneimittel
- Heilmittel
- Hilfsmittel
- Dialyse-Sachkosten
- Anschlussrehabilitation
- Häusliche Krankenpflege
- Krankengeld

Für die Zuordnung der Kosten zu einem Halbjahreszeitraum ist in der Regel der Beginn der Maßnahme ausschlaggebend, der die Kosten zuzuordnen sind. So sind die Kosten für einen Krankenhausaufenthalt dem (Halb-)Jahr zuzuordnen, in dem der Krankenhausaufenthalt begann. Allerdings ist für die Zuordnung der Heilmittelkosten relevant, in welchem Monat sie abgerechnet wurden. Bei Neueinschreibungen gilt, dass die Kosten des vollständigen Quartals, in dem die Einschreibung erfolgt, berücksichtigt werden.

In den nachfolgenden standardisierten Tabellen wird die Entwicklung der durchschnittlichen Ausgaben zunächst getrennt nach Leistungsbereichen ausgewiesen, bevor die Gesamtbetrachtung erfolgt. Die Tabellen enthalten für alle Halbjahres-Kohorten die statistischen Kennwerte arithmetisches Mittel, Konfidenzintervall (95%) und Standardabweichung.

Das arithmetische Mittel wird berechnet, indem die gesamten Ausgaben eines Leistungsbereiches, die innerhalb eines Halbjahres für eine Kohorte angefallen sind, durch die Anzahl der teilnehmenden Patienten dieser Kohorte in diesem Halbjahr dividiert werden. Patienten, die im Berichtshalbjahr versterben, sind mit 0,5 zu gewichten. Patienten, die aus anderen Gründen ausscheiden, sind ebenfalls mit 0,5 zu gewichten, sofern ihr Ausscheiden im 1. Quartal des Halbjahres erfolgt.

Würden beispielsweise im Berichtshalbjahr von zehn Patienten zwei im zweiten Quartal versterben und einer aus sonstigen Gründen im zweiten Quartal ausscheiden, wären die beiden verstorbenen Patienten halb, der aus sonstigen Gründen ausgeschiedene Patient sowie die im Programm verbliebenen Patienten voll zu gewichten. Die Bezugsgröße für die Mittelwertbildung beliefe sich rechnerisch auf neun Fälle.

Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden, sofern die Daten vorliegen, die Ausgaben der Patienten einer Kohorte über alle Berichtshalbjahre aufsummiert und durch die Summe der gewichteten Teilnahmejahre dividiert (jeweils ohne Beitrittsjahr).

Bei den Auswertungen zu Krankengeldausgaben entfällt die Gewichtung.

Einschränkend ist anzumerken, dass in allen Leistungsbereichen erstmals die mit Beginn 2004 anfallenden Abrechnungsdaten genutzt werden können, da erst ab diesem Zeitpunkt wesentliche Abrechnungsdaten (ambulante ärztliche Behandlung) verfügbar sind. Folglich sind die Ausgaben insgesamt und nach Leistungsbereichen erst ab dem 1. Halbjahr 2004 darzustellen. Für vorige Halbjahre wird daher in diesem Bericht nur die Anzahl der Patienten in der Stichprobe ausgewiesen. Für Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege sind die Leistungsausgaben sogar erst ab dem 1. Halbjahr 2006 darzustellen, da eine frühere versichertenbezogene Erfassung dieser Daten bei einigen Krankenkassen sehr aufwändig wäre.

Neben den durchschnittlichen Leistungsausgaben pro Patient, deren Berechnung auf Zufallsstichproben basiert, werden weitere Kosten der Versorgung der DMP-Patienten dargestellt. Diese beinhalten die gesonderten Kosten der Krankenkassen für Verwaltung, Qualitätssicherung u.ä. im Rahmen der DMP. Die Verwaltungskosten und die Kosten der Qualitätssicherung werden durch die programmduchführenden Krankenkassen kalkulatorisch ermittelt und basieren nicht auf Stichproben. Eine Differenzierung nach Kohorten erfolgt dabei nicht. Patienten, die nicht während des gesamten Jahres eingeschrieben waren, gehen anteilig in die Berechnung ein. Die Durchschnittskosten ergeben sich folglich als der Quotient aus den Gesamtkosten für Verwaltung und Qualitätssicherung und den Versichertenjahren (= Gesamtzahl der eingeschriebenen Versicherten gewichtet mit dem Anteil ihres Teilnahmezeitraums im betrachteten Jahr).

Als **Verwaltungskosten** der Krankenkassen für die DMPs gelten

- Personal- und Sachkosten inklusive der Raumkosten, die mit der Durchführung der DMPs zusammenhängen und
- Kosten für die Datenverarbeitung und -erfassung sowie für die Evaluation, die in erster Linie an Dritte vergeben wird.

Als **Kosten der Qualitätssicherung** der Krankenkassen gelten

- Kosten der versichertenbezogenen Qualitätssicherung, die intern oder durch die Beauftragung von Dienstleistungsunternehmen anfallen, z.B. durch Beratung der Versicherten, Reminder, Broschüren;
- Kosten der arztbezogenen Qualitätssicherung, die, je nach Datenflussmodell, direkt bei den Kassen anfallen können, bei der gemeinsamen Einrichtung oder bei Dritten (z.B. Erstellung von Feedbackberichten durch Datenstellen).

Die genaue Methode zur Ermittlung der Verwaltungskosten ist in diesem Evaluationsbericht nicht darzustellen; die Kassen haben die jeweils von ihnen verwendete Methodik dem BVA jedoch auf Anfrage mitzuteilen.

Im Gegensatz zu den Auswertungen der Patientenmerkmale und der medizinischen Inhalte im ersten Teil basiert die Evaluation der ökonomischen Inhalte nicht auf den Daten aller Teilnehmer des evaluierten DMP. Vielmehr werden dazu aus allen Halbjahres-Kohorten **Stichproben** gezogen. Der Stichprobenumfang beträgt in der Regel zehn Prozent der Patientenanzahl der jeweiligen Kohorte, höchstens 500 und mindestens 100 Patienten. Bei Kohorten mit weniger als 100 Patienten werden Vollerhebungen durchgeführt. Davon wird jedoch abgesehen, wenn die Kohorte weniger als zehn Patienten umfasst. Um die Anonymität zu wahren, wird in diesen Fällen auf eine Auswertung verzichtet.

Zu beachten ist dabei, dass die Stichprobenziehung gemäß der engen zeitlichen Vorgaben des BVA unmittelbar nach Eingang der PM-Daten beim Evaluator erfolgen muss. Etwaige zeitverzögerte Aktualisierungen der PM-Datenbasis können daher – anders als im Berichtsteil I – in der Stichprobe nicht mehr berücksichtigt werden. Daher kann sich auch bei Vollerhebungen die Anzahl der ausgewiesenen Patienten im Berichtsteil I von derjenigen in den Berichtsteilen II und III unterscheiden.

Zu beachten sind bezüglich der Stichprobengröße auch Sondereffekte, die sich aus der Fusion von Knappschaft und See-Krankenkasse zum 1.1.2008 ergeben. Für alle Kohorten vor der Fusion (bis einschließlich der Kohorte 2007-2) wurden die Stichproben für DMP-Teilnehmer von AOK und See-Krankenkasse gemeinsam gezogen, da auch die Versicherten der See-Krankenkasse an den DMPs der AOK teilnahmen. Nach der Fusion waren die Versicherten der See-Krankenkasse gemäß der Vorgaben des BVA mit ihrer gesamten Historie den Berichten der Knappschaft zuzuordnen. Diese nachträgliche Neuordnung der (ehemaligen) See-Versicherten führt sowohl in den Evaluationsberichten der AOK als auch in den Evaluationsberichten der Knappschaft dazu, dass häufig in den Kohorten bis einschließlich 2007-2 die Stichprobenfallzahlen nicht mehr der oben beschriebenen Stichprobenquote bzw. den oben definierten Ober- und Untergrenzen entsprechen.

Auswertungskapitel 4: Patientenzahlen der Stichprobe für die Leistungsausgaben

Tabelle 4.1 gibt für alle Kohorten Auskunft darüber, wie viele Patienten für die Ausgabenanalysen zur Verfügung standen. Dabei handelt es sich um Stichproben aus der Gesamtzahl der Patienten je Kohorte. Ihre Anzahl wird jeweils in der ersten Zeile ausgewiesen. Im Laufe der weiteren Teilnahmehalbjahre kann sich die Anzahl verringern, weil Patienten wegen Tod, Ausschluss oder eigener Beendigung aus dem Programm ausscheiden. Für die Berechnung der durchschnittlichen Ausgaben nach Leistungsbereichen ist jedoch nicht die Zahl der Patienten zu Beginn des Berichtshalbjahres relevant, sondern die Zahl der gewichteten Patienten (siehe einführende Anmerkungen zum Berichtsteil II), für die im Berichtshalbjahr die erforderlichen Angaben zu den Leistungsausgaben vorliegen. Zur Information wird diese Zahl in der zweiten Zeile ausgewiesen. Da die Daten zu den Leistungsausgaben erst ab dem Halbjahr 2004-1 vorliegen, können für davor liegende Halbjahre keine Auswertungen vorgenommen werden.

In der jeweils dritten Zeile wird ausgewiesen, wie viele Patienten im jeweiligen Berichtshalbjahr aus der Stichprobe ausgeschieden sind. Die vierte Zeile weist den kumulierten Wert aus: Sie gibt an, wie viele Patienten bis zum Ende des Berichtshalbjahres verstorben oder aus anderen Gründen aus der Stichprobe ausgeschieden sind.

Umfasst eine Kohorte in der Stichprobe weniger als 10 Patientinnen, werden keine Auswertungen vorgenommen. Stattdessen sind die Zahlenfelder der Auswertungstabellen in diesem Fall mit „-“ gefüllt.

In der Kohorte 2003-1 umfasst die Stichprobe im Beitrittsjahr 500 Patienten. Als Berechnungsbasis für die durchschnittlichen Leistungsausgaben dieser Kohorte und des jeweils letzten Berichtshalbjahres werden in den folgenden Tabellen diese 119,5 auswertbaren und gewichteten Patienten herangezogen.

Tabelle 4.1 Patienten in der Stichprobe (Anzahl)

EZ	Patienten in der Stichprobe (Anzahl)		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	456	405	371	336	314	292	242	221	206	193	177	166	158	147	139	131	127	121
		auswertbar und gewichtet				395,5	360,0	329,0	308,5	274,0	233,5	215,5	201,5	186,5	174,0	163,0	153,5	143,0	136,5	129,5	125,5
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden			34	35	22	22	50	21	15	13	16	11	8	11	8	8	4	6	5
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden			129	164	186	208	258	279	294	307	323	334	342	353	361	369	373	379	384
2003-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	435	384	344	312	281	254	230	213	206	189	179	171	164	157	149	136	128	
		auswertbar und gewichtet		424,0	374,0	335,0	300,5	273,0	248,5	222,5	210,5	201,5	186,5	175,5	169,0	161,0	154,0	144,5	133,5	127,0	
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden		51	40	32	31	27	24	17	7	17	10	8	7	7	8	13	8	3	
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden		116	156	188	219	246	270	287	294	311	321	329	336	343	351	364	372	375	
2004-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	449	396	356	323	294	269	248	232	221	210	193	185	174	169	159	156		
		auswertbar und gewichtet	487,0	438,0	386,0	345,0	311,0	282,0	257,5	239,0	226,5	214,5	201,5	187,5	178,5	168,5	162,5	155,0	150,0		
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	51	53	40	33	29	25	21	16	11	11	17	8	11	5	10	3	7		
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	51	104	144	177	206	231	252	268	279	290	307	315	326	331	341	344	351		
2004-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	449	407	377	349	323	297	288	272	257	246	233	221	212	201	188			
		auswertbar und gewichtet	488,5	436,5	396,0	353,5	327,0	300,5	280,0	270,0	254,5	238,5	227,0	215,0	203,0	193,5	182,0	171,0			
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	51	42	30	28	26	26	9	16	15	11	13	12	9	11	13	6			
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	51	93	123	151	177	203	212	228	243	254	267	279	288	299	312	318			
2005-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	496	455	414	370	336	303	292	273	262	248	232	218	206	198	192				
		auswertbar und gewichtet	487,5	442,5	400,5	359,0	326,0	298,0	285,0	269,5	257,5	242,5	228,0	214,5	203,0	196,0	188,5				
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	41	41	44	34	33	11	19	11	14	16	14	12	8	6	8				
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	41	82	126	160	193	204	223	234	248	264	278	290	298	304	312				
2005-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	499	444	402	367	332	321	287	269	253	231	218	207	193	184					
		auswertbar und gewichtet	482,5	430,0	387,5	355,0	327,5	309,5	280,5	262,5	245,0	226,5	213,5	203,5	190,0	179,0					
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	55	42	35	35	11	34	18	16	22	13	11	14	9	13					
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	55	97	132	167	178	212	230	246	268	281	292	306	315	328					
2006-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	477	441	396	375	344	327	309	294	280	268	246	233						
		auswertbar und gewichtet	494,0	465,0	425,5	390,0	365,5	337,5	318,5	304,0	288,5	275,5	259,0	240,5	228,5						
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	23	36	45	21	31	17	18	15	14	12	22	13	10						
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	23	59	104	125	156	173	191	206	220	232	254	267	277						
2006-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	473	439	413	371	342	313	292	276	262	249	230							
		auswertbar und gewichtet	492,0	461,0	428,5	398,5	361,5	328,5	305,0	284,5	269,0	257,5	240,5	225,5							
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	27	34	26	42	29	29	21	16	14	13	19	10							
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	27	61	87	129	158	187	208	224	238	251	270	280							
2007-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	469	446	408	375	350	328	297	287	270	260								
		auswertbar und gewichtet	493,5	460,5	434,5	397,5	364,0	343,0	318,0	294,5	281,0	266,0	253,0								
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	31	23	38	33	25	22	31	10	17	10	15								
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	31	54	92	125	150	172	203	213	230	240	255								

EZ	Patienten in der Stichprobe (Anzahl)		Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2007-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	483	442	401	368	343	311	291	280	266											
		auswertbar und gewichtet	494,5	468,0	430,0	387,5	358,0	334,0	301,5	283,5	274,0	260,5											
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	17	41	41	33	25	32	20	11	14	11											
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	17	58	99	132	157	189	209	220	234	245											
2008-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	482	448	407	381	350	333	314	300												
		auswertbar und gewichtet	495,0	470,0	431,0	397,5	368,5	342,5	324,5	306,0	293,5												
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	18	34	41	26	31	17	19	14	13												
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	18	52	93	119	150	167	186	200	213												
2008-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	488	449	421	402	370	351	334													
		auswertbar und gewichtet	490,5	475,5	439,5	412,0	389,0	360,0	343,0	323,0													
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	12	39	28	19	32	19	17	18													
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	12	51	79	98	130	149	166	184													
2009-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	397	385	354	328	314	288	276														
		auswertbar und gewichtet	392,0	374,0	344,5	322,0	302,0	283,0	268,5														
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	12	31	26	14	26	12	15														
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	12	43	69	83	109	121	136														
2009-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	481	448	421	396	378															
		auswertbar und gewichtet	488,0	467,5	434,0	407,5	385,5	366,5															
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	19	33	27	25	18	13															
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	19	52	79	104	122	135															
2010-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	472	433	393	375																
		auswertbar und gewichtet	495,0	458,5	420,0	387,0	366,5																
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	28	39	40	18	21																
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	28	67	107	125	146																
2010-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	482	445	406																	
		auswertbar und gewichtet	495,0	469,0	431,5	397,0																	
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	18	37	39	21																	
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	18	55	94	115																	
2011-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	482	439																		
		auswertbar und gewichtet	494,0	466,0	425,5																		
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	18	43	30																		
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	18	61	91																		
2011-2	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500	478																			
		auswertbar und gewichtet	489,0	465,0																			
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	22	34																			
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	22	56																			
2012-1	Patienten	zu Beginn des Berichtshalbjahres	500																				
		auswertbar und gewichtet	496,5																				
	ausgeschiedene Patienten	im Auswertungshalbjahr ausgeschieden	7																				
		bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden	7																				

Auswertungskapitel 5: Leistungsausgaben

Tabelle 5.1 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patient für die **ambulante ärztliche Behandlung**. Die Leistungsausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung ergeben sich dabei aus dem Produkt aus der Summe der erbrachten Punkte und einem durchschnittlichen Punktwert von 3,5 Eurocent sowie den in Euro abgerechneten Gebührenpositionen. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten

Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patienten dividiert.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 119,5 Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient 824,88 Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich [401,11; 1248,65].

Tabelle 5.1 Patienten und zugehörige Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	456	405	371	336	314	292	242	221	206	193	177	166	158	147	139	131	127	121	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				395,5	360,0	329,0	308,5	274,0	233,5	215,5	201,5	186,5	174,0	163,0	153,5	143,0	136,5	129,5	125,5	119,5
	Leistungsausgaben	Mean	1061,60			392,93	423,91	417,22	404,77	418,23	448,28	538,89	514,07	552,10	651,73	691,97	653,01	658,38	770,15	759,67	811,71	824,88
		CI	[974,13; 1149,08]			[310,67; 475,19]	[326,97; 520,85]	[321,19; 513,26]	[303,36; 506,18]	[380,55; 455,91]	[398,33; 498,22]	[388,45; 689,34]	[363,23; 664,90]	[382,10; 722,09]	[366,16; 937,31]	[402,39; 981,56]	[355,41; 950,62]	[343,76; 972,99]	[399,40; 1140,89]	[442,15; 1077,18]	[435,48; 1187,94]	[401,11; 1248,65]
SD		2695,82			834,67	938,42	888,71	908,73	318,19	389,39	1126,78	1092,40	1184,47	1921,94	1886,30	1881,20	1919,53	2209,95	1843,49	2150,38	2363,52	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	435	384	344	312	281	254	230	213	206	189	179	171	164	157	149	136	128		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				424,0	374,0	335,0	300,5	273,0	248,5	222,5	210,5	201,5	186,5	175,5	169,0	161,0	154,0	144,5	133,5	127,0
	Leistungsausgaben	Mean	958,84			380,50	427,25	462,97	503,08	406,04	456,96	493,65	470,20	490,16	492,52	527,89	614,16	531,57	545,70	572,48	508,69	577,01
		CI	[883,41; 1034,26]			[306,77; 454,23]	[315,65; 538,86]	[322,36; 603,58]	[337,96; 668,21]	[321,03; 491,04]	[306,51; 607,41]	[311,69; 675,61]	[323,38; 617,03]	[337,71; 642,62]	[330,24; 654,79]	[352,31; 703,46]	[361,61; 866,70]	[347,59; 715,55]	[340,75; 750,65]	[356,36; 788,59]	[321,60; 695,78]	[330,67; 823,35]
SD		2384,79			774,61	1101,23	1313,04	1460,43	716,56	1210,02	1384,79	1086,86	1104,14	1130,67	1186,70	1675,06	1191,04	1297,62	1325,46	1102,87	1416,37	
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	449	396	356	323	294	269	248	232	221	210	193	185	174	169	159	156			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				487,0	438,0	386,0	345,0	311,0	282,0	257,5	239,0	226,5	214,5	201,5	187,5	178,5	168,5	162,5	155,0	150,0
	Leistungsausgaben	Mean	900,01	351,04	322,41	391,50	400,31	402,49	431,61	413,49	427,66	450,59	457,14	496,49	466,69	539,80	564,14	565,88	634,88	672,76		
		CI	[827,73; 972,28]	[330,70; 371,39]	[301,05; 343,77]	[305,08; 477,92]	[298,82; 501,80]	[298,34; 506,63]	[317,52; 545,69]	[298,23; 528,75]	[305,42; 549,91]	[315,01; 586,17]	[311,67; 602,61]	[339,81; 653,16]	[299,53; 633,84]	[322,04; 757,57]	[294,48; 833,81]	[299,14; 832,61]	[335,82; 933,93]	[365,16; 980,36]		
SD		2303,74	229,07	228,06	866,24	961,78	937,04	977,46	943,63	964,23	1041,05	1087,00	1134,69	1167,77	1484,40	1785,96	1734,80	1899,60	1922,10			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	449	407	377	349	323	297	288	272	257	246	233	221	212	201	188				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				488,5	436,5	396,0	353,5	327,0	300,5	280,0	270,0	254,5	238,5	227,0	215,0	203,0	193,5	182,0	171,0	
	Leistungsausgaben	Mean	871,34	396,17	383,06	382,07	386,76	394,56	422,90	417,45	446,54	513,16	491,04	476,25	474,15	459,03	448,85	495,75	507,50			
		CI	[812,67; 930,00]	[331,24; 461,11]	[306,09; 460,03]	[301,74; 462,39]	[296,81; 476,71]	[297,13; 491,99]	[314,38; 531,42]	[305,48; 529,42]	[328,34; 564,74]	[380,47; 645,84]	[356,59; 625,49]	[335,88; 616,61]	[332,88; 615,42]	[316,28; 601,78]	[390,79; 506,92]	[328,66; 662,83]	[333,35; 681,65]			
SD		1904,30	732,28	820,46	815,57	862,87	898,90	959,79	955,94	990,93	1079,96	1059,38	1078,98	1056,85	1037,70	412,09	1150,04	1161,90				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	496	455	414	370	336	303	292	273	262	248	232	218	206	198	192					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				487,5	442,5	400,5	359,0	326,0	298,0	285,0	269,5	257,5	242,5	228,0	214,5	203,0	196,0	188,5		
	Leistungsausgaben	Mean	944,44	430,04	371,08	374,34	372,80	408,87	444,61	506,93	541,31	578,83	561,45	622,48	567,33	526,12	492,41	479,44				
		CI	[875,41; 1013,46]	[333,78; 526,30]	[300,64; 441,52]	[331,20; 417,48]	[332,39; 413,21]	[345,83; 471,90]	[339,90; 549,31]	[390,81; 623,06]	[374,87; 707,75]	[372,06; 785,59]	[367,86; 755,04]	[395,91; 849,04]	[363,26; 771,39]	[376,89; 675,34]	[352,87; 631,95]	[320,10; 638,78]				
SD		2202,37	1084,37	756,03	440,48	390,63	580,67	922,19	1000,22	1394,05	1692,83	1538,06	1745,44	1524,83	1084,75	996,72	1116,15					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	499	444	402	367	332	321	287	269	253	231	218	207	193	184						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				482,5	430,0	387,5	355,0	327,5	309,5	280,5	262,5	245,0	226,5	213,5	203,5	190,0	179,0			
	Leistungsausgaben	Mean	1062,08	439,95	417,33	498,55	520,62	532,34	603,04	609,74	555,35	560,70	560,67	567,83	548,61	491,55	509,37					
		CI	[963,91; 1160,26]	[344,23; 535,68]	[317,83; 516,82]	[352,21; 644,89]	[350,64; 690,59]	[344,85; 719,83]	[408,74; 797,33]	[406,54; 812,94]	[380,24; 730,46]	[376,75; 744,66]	[365,29; 756,05]	[357,72; 777,94]	[335,53; 761,69]	[317,95; 665,15]	[327,48; 691,26]					
SD		3009,52	1072,77	1052,65	1469,71	1633,96	1731,15	1743,95	1736,35	1447,48	1469,04	1500,22	1566,35	1550,85	1220,86	1241,59						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	477	441	396	375	344	327	309	294	280	268	246	233							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				494,0	465,0	425,5	390,0	365,5	337,5	318,5	304,0	288,5	275,5	259,0	240,5	228,5				
	Leistungsausgaben	Mean	890,15	450,29	455,82	409,59	389,20	415,98	423,49	432,20	427,94	474,03	521,34	524,60	427,69	503,51						
		CI	[847,26; 933,05]	[367,74; 532,84]	[367,57; 544,07]	[338,56; 480,61]	[313,72; 464,69]	[388,82; 443,13]	[395,30; 451,68]	[398,38; 466,02]	[398,85; 457,04]	[394,12; 553,94]	[399,89; 642,80]	[431,12; 618,07]	[393,21; 462,17]	[377,40; 629,62]						
SD		1366,39	936,10	970,93	747,50	760,56	264,88	264,20	307,96	258,83	692,51	1028,51	767,51	272,79	972,62							

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	473	439	413	371	342	313	292	276	262	249	230						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		492,0	461,0	428,5	398,5	361,5	328,5	305,0	284,5	269,0	257,5	240,5	225,5						
	Leistungsausgaben	Mean	1065,03	485,63	483,76	531,60	551,14	535,53	521,17	505,27	524,49	576,46	564,53	537,45	565,42						
		CI	[972,45; 1157,61]	[363,92; 607,34]	[349,67; 617,84]	[386,25; 676,96]	[400,03; 702,26]	[381,39; 689,66]	[374,90; 667,43]	[365,58; 644,97]	[375,92; 673,06]	[424,98; 727,94]	[388,34; 740,72]	[385,89; 689,02]	[375,61; 755,23]						
SD		2818,31	1377,39	1468,83	1535,16	1539,06	1495,19	1352,54	1244,74	1278,52	1267,57	1442,50	1199,24	1454,25							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	469	446	408	375	350	328	297	287	270	260							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		493,5	460,5	434,5	397,5	364,0	343,0	318,0	294,5	281,0	266,0	253,0							
	Leistungsausgaben	Mean	1075,84	421,98	429,71	479,45	534,12	656,06	560,84	536,95	541,55	600,56	526,05	580,13							
		CI	[967,95; 1183,73]	[314,44; 529,51]	[306,76; 552,66]	[342,20; 616,70]	[372,05; 696,19]	[457,76; 854,36]	[376,19; 745,48]	[370,23; 703,67]	[359,00; 724,11]	[389,38; 811,74]	[359,51; 692,60]	[378,66; 781,61]							
SD		3215,26	1218,86	1346,14	1459,64	1648,58	1930,30	1744,73	1516,85	1598,36	1806,11	1385,84	1635,02								
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	483	442	401	368	343	311	291	280	266								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,5	468,0	430,0	387,5	358,0	334,0	301,5	283,5	274,0	260,5								
	Leistungsausgaben	Mean	840,77	368,15	397,33	412,94	412,91	441,53	439,72	408,35	420,44	416,75	449,07								
		CI	[778,22; 903,33]	[304,93; 431,36]	[323,47; 471,18]	[331,86; 494,02]	[326,98; 498,85]	[349,02; 534,03]	[344,48; 534,97]	[306,81; 509,90]	[311,50; 529,39]	[306,07; 527,43]	[329,80; 568,33]								
SD		1776,11	717,21	815,15	857,81	863,11	893,02	888,11	899,60	935,87	934,73	982,08									
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	448	407	381	350	333	314	300									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	470,0	431,0	397,5	368,5	342,5	324,5	306,0	293,5									
	Leistungsausgaben	Mean	893,80	415,27	402,62	432,57	458,29	443,34	436,77	457,47	473,30	500,48									
		CI	[828,26; 959,33]	[353,91; 476,63]	[333,59; 471,65]	[355,73; 509,41]	[372,25; 544,32]	[353,52; 533,17]	[369,03; 504,52]	[358,34; 556,60]	[352,40; 594,20]	[352,07; 648,89]									
SD		1810,97	696,51	763,58	813,92	875,17	879,76	639,68	911,08	1079,01	1297,24										
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	488	449	421	402	370	351	334										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	475,5	439,5	412,0	389,0	360,0	343,0	323,0										
	Leistungsausgaben	Mean	930,99	439,06	483,44	501,32	445,56	475,81	437,90	424,11	478,05										
		CI	[856,97; 1005,02]	[369,26; 508,85]	[389,97; 576,90]	[382,60; 620,04]	[348,11; 543,01]	[375,19; 576,43]	[354,20; 521,60]	[361,14; 487,08]	[375,42; 580,68]										
SD		1977,67	788,65	1039,85	1269,83	1009,18	1012,50	810,24	595,01	941,08											
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl		397	385	354	328	314	288	276											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		392,0	374,0	344,5	322,0	302,0	283,0	268,5											
	Leistungsausgaben	Mean	1044,86	584,47	604,69	562,62	483,38	547,08	458,12	443,17											
		CI	[924,96; 1164,76]	[433,29; 735,65]	[440,60; 768,78]	[401,91; 723,32]	[345,79; 620,98]	[393,62; 700,53]	[339,73; 576,51]	[335,45; 550,89]											
SD		2662,21	1527,15	1619,07	1521,84	1259,70	1360,60	1016,17	900,58												
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	481	448	421	396	378												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	467,5	434,0	407,5	385,5	366,5												
	Leistungsausgaben	Mean	868,54	417,38	391,69	400,78	440,60	474,21	479,20												
		CI	[796,53; 940,56]	[385,99; 448,76]	[367,88; 415,49]	[347,03; 454,54]	[360,53; 520,67]	[363,14; 585,27]	[358,95; 599,44]												
SD		1668,04	353,72	262,57	571,35	824,64	1112,59	1174,47													
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	472	433	393	375													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	458,5	420,0	387,0	366,5													
	Leistungsausgaben	Mean	966,62	508,68	503,24	494,79	480,35	448,34													
		CI	[852,06; 1081,18]	[401,41; 615,95]	[385,26; 621,23]	[382,42; 607,15]	[359,41; 601,29]	[345,95; 550,74]													
SD		2361,26	1217,63	1288,98	1174,89	1213,86	1000,14														
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	445	406														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	469,0	431,5	397,0														
	Leistungsausgaben	Mean	865,63	406,00	425,83	439,00	434,34														
		CI	[778,67; 952,59]	[341,63; 470,38]	[356,74; 494,92]	[361,17; 516,83]	[354,31; 514,38]														
SD		1598,12	730,74	763,42	824,87	813,57															

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	439																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,0	466,0	425,5																	
	Leistungsausgaben	Mean	913,87	457,18	458,55	455,17																	
		CI	[780,85;	[385,23;	[366,36;	[359,02;																	
		Mean	1046,89]	529,13]	550,74]	551,32]																	
SD	2026,36	815,91	1015,40	1011,94																			
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	478																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,0	465,0																		
	Leistungsausgaben	Mean	771,76	379,38	385,88																		
		CI	[714,20;	[356,43;	[357,10;																		
		Mean	829,31]	402,34]	414,66]																		
SD	633,20	258,98	316,60																				
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500																			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		496,5																			
	Leistungsausgaben	Mean		422,97																			
		CI		[386,96;																			
		Mean		458,98]																			
SD			409,35																				

Tabelle 5.2 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patient für die **Krankenhausbehandlung**. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 119,5 Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient 1535,68 Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich [901,22; 2170,14].

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patienten dividiert.

Tabelle 5.2 Patienten und zugehörige Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)		Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	456	405	371	336	314	292	242	221	206	193	177	166	158	147	139	131	127	121	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl					395,5	360,0	329,0	308,5	274,0	233,5	215,5	201,5	186,5	174,0	163,0	153,5	143,0	136,5	129,5	125,5	119,5
	Leistungsausgaben	Mean	2326,99				854,92	1233,04	778,74	955,98	1044,07	1185,69	1003,52	1333,30	1448,45	1586,19	1274,91	1324,90	1353,51	1405,95	1322,53	1326,42	1535,68
		CI	[2079,02; 2574,97]				[600,80; 1109,03]	[712,38; 1753,70]	[505,29; 1052,19]	[648,04; 1263,91]	[640,47; 1447,68]	[635,56; 1735,82]	[652,91; 1354,12]	[809,50; 1857,10]	[911,36; 1985,55]	[727,00; 2445,38]	[787,97; 1761,86]	[789,29; 1860,51]	[327,00; 2380,01]	[717,62; 2094,29]	[565,43; 2079,64]	[724,61; 1928,23]	[901,22; 2170,14]
SD		7641,97				2578,38	5040,21	2530,58	2759,51	3408,59	4288,99	2625,94	3793,57	3742,24	5782,40	3171,86	3385,67	6262,88	4103,10	4395,77	3439,75	3538,61	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	435	384	344	312	281	254	230	213	206	189	179	171	164	157	149	136	128		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			424,0	374,0	335,0	300,5	273,0	248,5	222,5	210,5	201,5	186,5	175,5	169,0	161,0	154,0	144,5	133,5	127,0		
	Leistungsausgaben	Mean	1868,47		922,75	848,94	978,89	1179,08	1199,85	444,13	664,60	842,69	875,23	1058,21	1004,42	820,23	1077,67	1394,23	1188,60	745,02	674,85		
		CI	[1671,88; 2065,05]		[665,14; 1180,36]	[564,26; 1133,62]	[671,67; 1286,11]	[731,94; 1626,22]	[564,47; 1835,23]	[240,05; 648,21]	[407,19; 922,01]	[557,08; 1128,30]	[440,44; 1310,02]	[555,12; 1561,30]	[555,07; 1453,07]	[446,10; 1194,36]	[630,58; 1524,77]	[720,92; 2067,55]	[712,92; 1664,29]	[439,04; 1051,00]	[329,06; 1020,64]		
SD		6215,71		2706,39	2808,87	2868,89	3954,66	5356,25	1641,38	1959,03	2114,20	3148,89	3505,33	3032,42	2481,49	2894,38	4263,06	2917,39	1803,75	1988,18			
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	449	396	356	323	294	269	248	232	221	210	193	185	174	169	159	156			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		487,0	438,0	386,0	345,0	311,0	282,0	257,5	239,0	226,5	214,5	201,5	187,5	178,5	168,5	162,5	155,0	150,0			
	Leistungsausgaben	Mean	1947,17		690,87	613,44	1385,27	976,99	1196,07	805,53	822,90	1274,97	886,64	818,15	882,59	797,75	1194,46	855,77	998,05	663,76	1449,83		
		CI	[1683,80; 2219,54]		[485,78; 895,98]	[434,42; 792,47]	[524,66; 2245,88]	[606,32; 1347,67]	[827,16; 1564,98]	[515,89; 1095,18]	[350,74; 1295,06]	[547,23; 2002,71]	[552,43; 1220,84]	[524,01; 1112,29]	[452,16; 1313,02]	[352,59; 1242,92]	[682,14; 1706,79]	[281,55; 1429,99]	[497,61; 1498,49]	[337,51; 990,01]	[624,25; 2275,40]		
SD		8394,84		2309,41	1911,56	8626,66	3512,74	3319,28	2481,61	3865,67	5740,07	2566,23	2197,91	3117,36	3110,05	3492,29	3802,97	3254,78	2072,31	5158,79			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	449	407	377	349	323	297	288	272	257	246	233	221	212	201	188				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,5	436,5	396,0	353,5	327,0	300,5	280,0	270,0	254,5	238,5	227,0	215,0	203,0	193,5	182,0	171,0				
	Leistungsausgaben	Mean	1973,78		957,04	795,26	937,83	497,70	997,25	1106,80	1135,75	696,87	625,26	716,11	1178,26	1208,90	1519,96	1431,01	1779,42	988,40			
		CI	[1728,11; 2219,45]		[656,40; 1257,69]	[498,11; 1092,42]	[540,56; 1335,11]	[324,36; 671,05]	[569,35; 1425,15]	[753,15; 1460,46]	[630,11; 1641,39]	[438,23; 955,51]	[410,07; 840,45]	[458,69; 973,54]	[655,06; 1701,47]	[718,54; 1699,26]	[564,91; 2475,00]	[881,81; 1980,22]	[469,65; 3089,19]	[470,14; 1506,66]			
SD		7974,70		3390,25	3167,54	4033,50	1662,84	3947,85	3127,82	4316,83	2168,31	1751,50	2028,35	4021,87	3668,41	6942,51	3897,82	9015,17	3457,69				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl		496	455	414	370	336	303	292	273	262	248	232	218	206	198	192					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		487,5	442,5	400,5	359,0	326,0	298,0	285,0	269,5	257,5	242,5	228,0	214,5	203,0	196,0	188,5					
	Leistungsausgaben	Mean	1993,04		903,56	818,93	1380,31	1042,38	1410,85	836,82	669,39	514,43	806,26	1071,27	840,67	835,48	1199,61	897,42	1650,22				
		CI	[1738,34; 2247,74]		[677,78; 1129,34]	[572,25; 1065,62]	[622,04; 2138,57]	[638,24; 1446,53]	[923,21; 1898,49]	[568,16; 1105,49]	[407,17; 931,61]	[314,80; 714,07]	[522,79; 1089,74]	[516,29; 1626,25]	[497,85; 1183,48]	[437,78; 1233,17]	[749,65; 1649,56]	[484,65; 1310,18]	[724,44; 2576,01]				
SD		8126,22		2543,42	2647,53	7742,25	3906,88	4492,13	2366,27	2258,58	1672,09	2320,86	4409,37	2641,02	2971,73	3270,85	2948,35	6484,99					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl		499	444	402	367	332	321	287	269	253	231	218	207	193	184						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		482,5	430,0	387,5	355,0	327,5	309,5	280,5	262,5	245,0	226,5	213,5	203,5	190,0	179,0						
	Leistungsausgaben	Mean	2336,03		972,02	1099,44	949,53	1032,74	982,70	1512,11	1247,63	1227,67	1662,08	805,58	1020,73	1338,15	1061,75	1483,26					
		CI	[2066,97; 2605,08]		[623,37; 1320,66]	[770,28; 1428,60]	[673,02; 1226,05]	[604,11; 1461,36]	[631,35; 1334,06]	[972,36; 2051,86]	[696,15; 1799,12]	[781,09; 1674,24]	[884,33; 2439,82]	[520,99; 1090,17]	[543,74; 1497,71]	[418,72; 2257,58]	[655,66; 1467,85]	[906,05; 2060,47]					
SD		8247,86		3907,30	3482,44	2777,13	4120,35	3244,08	4844,71	4712,46	3691,50	6211,04	2185,22	3555,86	6691,82	2855,95	3940,09						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	477	441	396	375	344	327	309	294	280	268	246	233							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,0	465,0	425,5	390,0	365,5	337,5	318,5	304,0	288,5	275,5	259,0	240,5	228,5							
	Leistungsausgaben	Mean	2497,04		1220,23	1055,41	832,76	1004,75	1089,22	1191,30	949,51	1176,33	1447,94	1546,59	2186,08	1571,25	1670,36						
		CI	[2230,86; 2763,22]		[600,34; 1840,12]	[772,05; 1338,77]	[541,77; 1123,75]	[575,80; 1433,70]	[787,49; 1390,94]	[808,01; 1574,60]	[597,05; 1301,98]	[806,60; 1546,06]	[980,33; 1915,55]	[987,19; 2105,99]	[1190,26; 3181,90]	[911,11; 2231,39]	[1056,50; 2284,22]						
SD		8478,87		7029,45	3117,56	3062,45	4322,00	2943,06	3592,64	3209,31	3289,02	4052,30	4737,29	8176,67	5223,21	4734,32							

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	473	439	413	371	342	313	292	276	262	249	230						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		492,0	461,0	428,5	398,5	361,5	328,5	305,0	284,5	269,0	257,5	240,5	225,5						
	Leistungsausgaben	Mean	2539,70	761,76	1087,01	1037,95	1583,23	1275,00	1438,42	1128,90	1178,83	1224,46	1911,15	793,27	1412,32						
		CI	[2244,03; 2835,38]	[583,48; 940,04]	[773,09; 1400,92]	[764,91; 1310,99]	[1026,56; 2139,90]	[718,84; 1831,16]	[814,40; 2062,44]	[746,30; 1511,50]	[714,85; 1642,81]	[796,23; 1652,68]	[1127,05; 2695,25]	[515,17; 1071,36]	[770,35; 2054,28]						
SD		9000,75	2017,60	3438,78	2883,69	5669,67	5395,07	5770,48	3409,08	3992,84	3583,37	6419,51	2200,34	4918,47							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	469	446	408	375	350	328	297	287	270	260							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		493,5	460,5	434,5	397,5	364,0	343,0	318,0	294,5	281,0	266,0	253,0							
	Leistungsausgaben	Mean	2111,34	1206,46	858,94	1001,96	1142,51	1306,01	758,61	1045,78	773,08	1337,16	1329,56	1152,87							
		CI	[1861,06; 2361,62]	[707,64; 1705,28]	[615,07; 1102,81]	[730,49; 1273,43]	[776,98; 1508,05]	[811,19; 1800,83]	[296,53; 1220,70]	[684,74; 1406,82]	[447,85; 1098,32]	[818,59; 1855,73]	[799,95; 1859,17]	[691,14; 1614,59]							
SD		7458,84	5653,71	2670,04	2887,08	3718,27	4816,61	4366,31	3284,82	2847,62	4435,13	4406,97	3747,04								
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	483	442	401	368	343	311	291	280	266								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,5	468,0	430,0	387,5	358,0	334,0	301,5	283,5	274,0	260,5								
	Leistungsausgaben	Mean	2245,06	1388,10	1094,63	1665,40	1426,52	1058,08	1024,64	610,49	1065,57	1082,85	734,81								
		CI	[1824,34; 2665,79]	[744,72; 2031,47]	[817,73; 1371,53]	[598,82; 2731,98]	[477,05; 2375,98]	[761,76; 1354,40]	[666,34; 1382,94]	[396,01; 824,97]	[636,40; 1494,73]	[670,63; 1495,06]	[476,99; 992,64]								
SD		11945,77	7299,43	3056,25	11284,22	9535,81	2860,53	3340,90	1900,08	3686,77	3481,34	2123,11									
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	448	407	381	350	333	314	300									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	470,0	431,0	397,5	368,5	342,5	324,5	306,0	293,5									
	Leistungsausgaben	Mean	2148,88	866,89	618,14	967,66	1071,08	1291,43	1027,36	1081,67	1398,75	1402,87									
		CI	[1849,20; 2448,55]	[611,57; 1122,21]	[427,39; 808,88]	[682,36; 1252,95]	[719,77; 1422,39]	[822,88; 1759,97]	[653,94; 1400,78]	[579,88; 1583,46]	[724,97; 2072,53]	[764,08; 2041,66]									
SD		8280,99	2898,20	2109,87	3021,88	3573,56	4588,96	3525,90	4611,84	6013,41	5583,50										
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	488	449	421	402	370	351	334										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	475,5	439,5	412,0	389,0	360,0	343,0	323,0										
	Leistungsausgaben	Mean	2245,84	804,52	1147,82	951,74	1073,98	984,13	1544,80	1237,82	956,52										
		CI	[1908,68; 2583,00]	[560,91; 1048,13]	[828,37; 1467,27]	[715,24; 1188,25]	[791,18; 1356,78]	[693,07; 1275,20]	[574,35; 2515,25]	[783,69; 1691,94]	[693,84; 1219,21]										
SD		9007,76	2752,72	3554,06	2529,68	2928,66	2928,95	9394,42	4291,08	2408,67											
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl		397	385	354	328	314	288	276											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		392,0	374,0	344,5	322,0	302,0	283,0	268,5											
	Leistungsausgaben	Mean	2402,94	1267,60	934,08	1074,14	1352,80	1453,81	1304,87	1163,02											
		CI	[1999,72; 2806,17]	[807,64; 1727,57]	[640,36; 1227,79]	[716,81; 1431,47]	[627,96; 2077,64]	[916,14; 1991,47]	[707,88; 1901,87]	[802,70; 1523,34]											
SD		8953,24	4646,33	2898,08	3383,82	6636,12	4767,15	5123,96	3012,33												
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	481	448	421	396	378												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	467,5	434,0	407,5	385,5	366,5												
	Leistungsausgaben	Mean	1910,38	1316,49	887,56	1109,90	1003,06	702,06	1071,27												
		CI	[1620,70; 2200,05]	[912,85; 1720,13]	[581,96; 1193,16]	[743,89; 1475,91]	[698,60; 1307,51]	[470,71; 933,42]	[684,16; 1458,39]												
SD		6709,59	4549,34	3371,20	3890,30	3135,72	2317,60	3781,12													
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	472	433	393	375													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	458,5	420,0	387,0	366,5													
	Leistungsausgaben	Mean	2558,45	926,10	1226,40	1205,66	1456,08	1242,87													
		CI	[2040,80; 3076,10]	[676,59; 1175,62]	[885,93; 1566,88]	[552,48; 1858,84]	[899,92; 2012,24]	[749,23; 1736,50]													
SD		10669,43	2832,32	3719,66	6829,72	5582,11	4821,53														
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	445	406														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	469,0	431,5	397,0														
	Leistungsausgaben	Mean	2026,87	845,28	951,48	1140,25	948,79														
		CI	[1609,79; 2443,96]	[601,06; 1089,50]	[665,31; 1237,65]	[663,84; 1616,65]	[661,36; 1236,23]														
SD		7665,21	2772,24	3161,92	5049,04	2922,03															

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für die Krankenhausbehandlung in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	439																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,0	466,0	425,5																	
	Leistungsausgaben	Mean	1858,00	896,98	1018,31	831,19																	
		CI	[1336,83;	[678,11;	[619,15;	[503,84;																	
		Mean	2379,18]	1115,84]	1417,47]	1158,54]																	
SD	7939,37	2481,89	4396,30	3445,15																			
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	478																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,0	465,0																		
	Leistungsausgaben	Mean	2413,35	1572,67	1206,67																		
		CI	[1567,08;	[814,32;	[783,54;																		
		Mean	3259,62]	2331,02]	1629,81]																		
SD	9310,62	8555,97	4655,31																				
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500																			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		496,5																			
	Leistungsausgaben	Mean		978,80																			
		CI		[731,49;																			
		Mean		1226,11]																			
SD			2811,52																				

Tabelle 5.3 gibt für alle Kohorten Auskunft über die Anzahl der **Patienten mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt** im betrachteten Halbjahr und ihren Anteil an der Gesamtzahl der Patienten. Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

In der Kohorte 2003-1 umfasst die Stichprobe im letzten Berichtshalbjahr 121 Patienten. Davon hatten 29 auswertbare Patienten bzw. 23,97 Prozent mindestens einen Krankenhausaufenthalt.

Tabelle 5.3 Patienten mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt im Halbjahr

EZ	Patienten mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt im Berichtshalbjahr (Stichprobe)	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	456	405	371	336	314	292	242	221	206	193	177	166	158	147	139	131	127	121
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl			80	83	73	66	52	42	48	57	61	45	41	43	30	33	36	25	29
		Anteil in %			19,75	22,37	21,73	21,02	17,81	17,36	21,72	27,67	31,61	25,42	24,70	27,22	20,41	23,74	27,48	19,69	23,97
		CI Anteil in %			[15,87; 23,63]	[18,12; 26,62]	[17,31; 26,15]	[16,51; 25,53]	[13,41; 22,21]	[12,58; 22,14]	[16,27; 27,17]	[21,55; 33,79]	[25,03; 38,19]	[18,99; 31,85]	[18,12; 31,28]	[20,26; 34,18]	[13,87; 26,95]	[16,64; 30,84]	[19,81; 35,15]	[12,75; 26,63]	[16,33; 31,61]
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	435	384	344	312	281	254	230	213	206	189	179	171	164	157	149	136	128	
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		97	75	79	61	49	35	46	50	36	37	41	35	33	37	39	37	25	
		Anteil in %			22,30	19,53	22,97	19,55	17,44	13,78	20,00	23,47	17,48	19,58	22,91	20,47	20,12	23,57	26,17	27,21	19,53
		CI Anteil in %		[18,38; 26,22]	[15,56; 23,50]	[18,52; 27,42]	[15,14; 23,96]	[13,00; 21,88]	[9,53; 18,03]	[14,82; 25,18]	[17,76; 29,18]	[12,28; 22,68]	[13,91; 25,25]	[16,74; 29,08]	[14,40; 26,54]	[13,97; 26,27]	[16,91; 30,23]	[19,09; 33,25]	[19,70; 34,72]	[12,64; 26,42]	
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	449	396	356	323	294	269	248	232	221	210	193	185	174	169	159	156		
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		96	75	82	59	68	58	44	50	43	49	37	30	35	27	29	28	27	
		Anteil in %			19,20	16,70	20,71	16,57	21,05	19,73	16,36	20,16	18,53	22,17	17,62	15,54	18,92	15,52	17,16	17,61	17,31
		CI Anteil in %		[15,74; 22,66]	[13,25; 20,15]	[16,71; 24,71]	[12,70; 20,44]	[16,60; 25,50]	[15,17; 24,29]	[11,93; 20,79]	[15,16; 25,16]	[13,52; 23,54]	[16,68; 27,66]	[12,45; 22,79]	[10,42; 20,66]	[13,26; 24,58]	[10,12; 20,92]	[11,46; 22,86]	[11,67; 23,55]	[11,35; 23,27]	
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	449	407	377	349	323	297	288	272	257	246	233	221	212	201	188			
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		96	79	72	55	62	72	55	52	46	46	51	48	45	48	45	37		
		Anteil in %			19,20	17,59	17,69	14,59	17,77	22,29	18,52	18,06	16,91	17,90	20,73	20,60	20,36	22,64	22,39	19,68	
		CI Anteil in %		[15,74; 22,66]	[14,06; 21,12]	[13,98; 21,40]	[11,02; 18,16]	[13,75; 21,79]	[17,74; 26,84]	[14,09; 22,95]	[13,61; 22,51]	[12,45; 21,37]	[13,20; 22,60]	[15,65; 25,81]	[15,40; 25,80]	[15,04; 25,68]	[16,99; 28,29]	[16,61; 28,17]	[13,98; 25,38]		
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	496	455	414	370	336	303	292	273	262	248	232	218	206	198	192				
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		116	86	86	78	68	61	52	48	49	46	43	38	50	37	39			
		Anteil in %			23,39	18,90	20,77	21,08	20,24	20,13	17,81	17,58	18,70	18,55	18,53	17,43	24,27	18,69	20,31		
		CI Anteil in %		[19,66; 27,12]	[15,30; 22,50]	[16,86; 24,68]	[16,92; 25,24]	[15,94; 24,54]	[15,61; 24,65]	[13,41; 22,21]	[13,06; 22,10]	[13,97; 23,43]	[13,70; 23,40]	[13,52; 23,54]	[12,38; 22,48]	[18,40; 30,14]	[13,25; 24,13]	[14,60; 26,02]			
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	499	444	402	367	332	321	287	269	253	231	218	207	193	184					
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		89	91	78	89	63	85	67	57	61	55	46	52	43	47				
		Anteil in %			17,84	20,50	19,40	24,25	18,98	26,48	23,34	21,19	24,11	23,81	21,10	25,12	22,28	25,54			
		CI Anteil in %		[14,48; 21,20]	[16,74; 24,26]	[15,53; 23,27]	[19,86; 28,64]	[14,76; 23,20]	[21,65; 31,31]	[18,44; 28,24]	[16,30; 26,08]	[18,83; 29,39]	[18,31; 29,31]	[15,67; 26,53]	[19,20; 31,04]	[16,39; 28,17]	[19,22; 31,86]				
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	477	441	396	375	344	327	309	294	280	268	246	233						
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		116	109	80	84	93	77	63	70	84	68	71	55	65					
		Anteil in %			23,20	22,85	18,14	21,21	24,80	22,38	19,27	22,65	28,57	24,29	26,49	22,36	27,90				
		CI Anteil in %		[19,50; 26,90]	[19,08; 26,62]	[14,54; 21,74]	[17,18; 25,24]	[20,42; 29,18]	[17,97; 26,79]	[14,99; 23,55]	[17,98; 27,32]	[23,40; 33,74]	[19,26; 29,32]	[21,20; 31,78]	[17,14; 27,58]	[22,13; 33,67]					
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	473	439	413	371	342	313	292	276	262	249	230							
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		99	89	99	97	82	84	67	65	68	64	52	55						
		Anteil in %			19,80	18,82	22,55	23,49	22,10	24,56	21,41	22,26	24,64	24,43	20,88	23,91					
		CI Anteil in %		[16,30; 23,30]	[15,29; 22,35]	[18,64; 26,46]	[19,40; 27,58]	[17,87; 26,33]	[19,99; 29,13]	[16,86; 25,96]	[17,48; 27,04]	[19,55; 29,73]	[19,22; 29,64]	[15,82; 25,94]	[18,39; 29,43]						
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	469	446	408	375	350	328	297	287	270	260								
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		121	88	94	86	81	54	63	44	70	59	65							
		Anteil in %			24,20	18,76	21,08	21,08	21,60	15,43	19,21	14,81	24,39	21,85	25,00						
		CI Anteil in %		[20,44; 27,96]	[15,22; 22,30]	[17,29; 24,87]	[17,12; 25,04]	[17,43; 25,77]	[11,64; 19,22]	[14,94; 23,48]	[10,76; 18,86]	[19,41; 29,37]	[16,91; 26,79]	[19,73; 30,27]							
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	483	442	401	368	343	311	291	280	266									
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		111	108	100	98	85	72	50	44	46	53								
		Anteil in %			22,20	22,36	22,62	24,44	23,10	20,99	16,08	15,12	16,43	19,92							
		CI Anteil in %		[18,55; 25,85]	[18,64; 26,08]	[18,72; 26,52]	[20,23; 28,65]	[18,79; 27,41]	[16,67; 25,31]	[11,99; 20,17]	[11,00; 19,24]	[12,08; 20,78]	[15,11; 24,73]								
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	482	448	407	381	350	333	314	300										
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl		108	85	105	78	85	67	74	56	67									
		Anteil in %			21,60	17,63	23,44	19,16	22,31	19,14	22,22	17,83	22,33								
		CI Anteil in %		[17,99; 25,21]	[14,22; 21,04]	[19,51; 27,37]	[15,33; 22,99]	[18,12; 26,50]	[15,01; 23,27]	[17,75; 26,69]	[13,59; 22,07]	[17,61; 27,05]									

EZ	Patienten mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt im Berichtshalbjahr (Stichprobe)	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	488	449	421	402	370	351	334													
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	87	112	96	86	85	76	81	82													
		Anteil in %	17,40	22,95	21,38	20,43	21,14	20,54	23,08	24,55													
		CI Anteil in %	[14,07; 20,73]	[19,22; 26,68]	[17,58; 25,18]	[16,57; 24,29]	[17,14; 25,14]	[16,42; 24,66]	[18,67; 27,49]	[19,93; 29,17]													
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	397	385	354	328	314	288	276														
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	97	83	88	66	68	66	66														
		Anteil in %	24,43	21,56	24,86	20,12	21,66	22,92	23,91														
		CI Anteil in %	[20,20; 28,66]	[17,45; 25,67]	[20,35; 29,37]	[15,77; 24,47]	[17,10; 26,22]	[18,06; 27,78]	[18,87; 28,95]														
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	481	448	421	396	378															
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	110	94	96	91	75	82															
		Anteil in %	22,00	19,54	21,43	21,62	18,94	21,69															
		CI Anteil in %	[18,37; 25,63]	[15,99; 23,09]	[17,63; 25,23]	[17,68; 25,56]	[15,08; 22,80]	[17,53; 25,85]															
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	472	433	393	375																
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	110	115	80	77	73																
		Anteil in %	22,00	24,36	18,48	19,59	19,47																
		CI Anteil in %	[18,37; 25,63]	[20,48; 28,24]	[14,82; 22,14]	[15,66; 23,52]	[15,46; 23,48]																
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	482	445	406																	
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	103	97	79	75																	
		Anteil in %	20,60	20,12	17,75	18,47																	
		CI Anteil in %	[17,05; 24,15]	[16,54; 23,70]	[14,20; 21,30]	[14,69; 22,25]																	
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	482	439																		
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	118	96	79																		
		Anteil in %	23,60	19,92	18,00																		
		CI Anteil in %	[19,87; 27,33]	[16,35; 23,49]	[14,40; 21,60]																		
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	478																			
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	103	85																			
		Anteil in %	20,60	17,78																			
		CI Anteil in %	[17,05; 24,15]	[14,35; 21,21]																			
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500																				
	auswertbar, mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt	Anzahl	111																				
		Anteil in %	22,20																				
		CI Anteil in %	[18,55; 25,85]																				

Tabelle 5.4 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patient für **Arzneimittel**. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 119,5 Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient 1335,16 Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich [900,54; 1769,78].

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patienten dividiert.

Tabelle 5.4 Patienten und zugehörige Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)		Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	456	405	371	336	314	292	242	221	206	193	177	166	158	147	139	131	127	121	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl																					
	Leistungsausgaben	Mean	1781,44				750,45	809,77	797,63	851,37	695,87	838,01	806,24	908,54	873,03	942,00	928,79	953,89	1040,15	1013,46	1135,89	1394,21	1335,16
		CI Mean	[1701,33; 1861,56]				[639,97; 860,94]	[717,83; 901,72]	[701,26; 894,01]	[750,63; 952,11]	[607,12; 784,61]	[735,53; 940,49]	[684,92; 927,55]	[789,68; 1027,40]	[748,82; 997,24]	[806,11; 1077,89]	[798,55; 1059,04]	[818,71; 1089,07]	[804,59; 1275,70]	[788,43; 1238,49]	[751,38; 1520,40]	[861,88; 1926,53]	[900,54; 1769,78]
	SD	2468,97				1121,00	890,05	891,84	902,79	749,50	798,96	908,64	860,83	865,45	914,55	848,39	854,49	1437,15	1341,38	2232,47	3042,58	2424,04	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	435	384	344	312	281	254	230	213	206	189	179	171	164	157	149	136	128		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			424,0	374,0	335,0	300,5	273,0	248,5	222,5	210,5	201,5	186,5	175,5	169,0	161,0	154,0	144,5	133,5	127,0		
	Leistungsausgaben	Mean	1611,85		748,96	891,11	777,88	814,18	663,17	726,55	753,25	808,90	783,38	856,93	863,41	843,32	890,41	923,16	852,01	850,15	832,72		
		CI Mean	[1530,96; 1692,74]		[575,35; 922,57]	[638,83; 1143,39]	[687,73; 868,03]	[723,82; 904,54]	[580,73; 745,61]	[634,80; 818,30]	[646,24; 860,26]	[692,73; 925,06]	[672,84; 893,91]	[684,16; 1029,71]	[659,14; 1067,69]	[717,11; 969,52]	[681,70; 1099,11]	[740,17; 1106,16]	[744,14; 959,87]	[732,92; 967,38]	[698,77; 966,66]		
	SD	2557,48		1823,88	2489,21	841,85	799,16	694,98	737,92	814,37	859,87	800,53	1203,82	1380,70	837,07	1351,10	1158,62	661,55	691,07	770,13			
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	449	396	356	323	294	269	248	232	221	210	193	185	174	169	159	156			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			487,0	438,0	386,0	345,0	311,0	282,0	257,5	239,0	226,5	214,5	201,5	187,5	178,5	168,5	162,5	155,0	150,0		
	Leistungsausgaben	Mean	1750,13		654,75	795,98	765,12	819,45	659,11	829,76	866,59	930,33	847,29	964,23	937,44	959,60	912,49	1165,95	944,54	1026,46	1098,22		
		CI Mean	[1662,46; 1837,79]		[597,43; 712,08]	[717,08; 874,89]	[674,99; 855,25]	[728,20; 910,70]	[545,70; 772,53]	[672,52; 987,00]	[673,14; 1060,04]	[740,43; 1120,22]	[699,18; 995,41]	[769,47; 1158,98]	[699,81; 1175,07]	[754,80; 1164,40]	[719,52; 1105,45]	[742,08; 1134,74]	[754,35; 1238,57]	[814,35; 1467,81]	[728,63; 1467,81]		
	SD	2794,27		645,43	842,51	903,42	864,75	1020,49	1347,21	1583,81	1497,79	1137,28	1455,29	1721,03	1430,77	1315,36	2807,23	1236,99	1347,33	2309,47			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	449	407	377	349	323	297	288	272	257	246	233	221	212	201	188				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			488,5	436,5	396,0	353,5	327,0	300,5	280,0	270,0	254,5	238,5	227,0	215,0	203,0	193,5	182,0	171,0			
	Leistungsausgaben	Mean	1451,03		700,73	693,49	747,05	575,81	679,47	677,97	736,88	707,62	755,75	768,64	769,13	763,02	767,30	850,90	797,51	769,75			
		CI Mean	[1405,36; 1496,69]		[632,42; 769,04]	[615,84; 771,14]	[666,44; 827,66]	[518,20; 633,41]	[615,14; 743,80]	[609,96; 745,98]	[653,93; 819,83]	[624,10; 791,14]	[669,78; 841,72]	[678,00; 859,29]	[678,16; 860,11]	[669,72; 856,32]	[675,44; 859,16]	[660,78; 1041,03]	[702,04; 892,99]	[678,99; 860,50]			
	SD	1482,26		770,27	827,74	818,40	552,61	593,52	601,51	708,17	700,19	699,72	714,21	699,32	697,97	667,76	1349,34	657,16	605,51				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl		496	455	414	370	336	303	292	273	262	248	232	218	206	198	192					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			487,5	442,5	400,5	359,0	326,0	298,0	285,0	269,5	257,5	242,5	228,0	214,5	203,0	196,0	188,5				
	Leistungsausgaben	Mean	1654,04		666,93	736,31	677,01	738,65	838,34	909,14	928,28	879,80	847,92	879,82	893,59	891,81	893,97	880,83	770,30				
		CI Mean	[1556,56; 1751,53]		[609,71; 724,16]	[652,47; 820,14]	[543,64; 810,38]	[604,65; 872,64]	[641,95; 1034,72]	[674,50; 1143,77]	[588,38; 1268,19]	[706,86; 1052,74]	[692,98; 1002,87]	[694,89; 1064,74]	[723,49; 1063,69]	[731,70; 1051,92]	[697,70; 1090,25]	[719,21; 1042,44]	[667,13; 873,48]				
	SD	3110,32		644,64	899,74	1361,80	1295,32	1809,07	2066,53	2927,71	1448,49	1268,58	1469,24	1310,41	1196,40	1426,79	1154,39	722,73					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl		499	444	402	367	332	321	287	269	253	231	218	207	193	184						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			482,5	430,0	387,5	355,0	327,5	309,5	280,5	262,5	245,0	226,5	213,5	203,5	190,0	179,0					
	Leistungsausgaben	Mean	1604,00		747,94	599,37	750,58	821,36	810,83	833,23	983,58	809,03	844,37	810,14	786,72	808,26	849,21	889,42					
		CI Mean	[1511,07; 1696,93]		[666,68; 829,21]	[522,44; 676,30]	[641,55; 859,60]	[574,00; 1068,72]	[669,78; 951,89]	[691,53; 974,92]	[652,09; 1315,07]	[711,69; 906,36]	[706,27; 982,46]	[694,43; 925,85]	[658,24; 915,21]	[698,67; 917,84]	[736,73; 961,69]	[750,36; 1028,47]					
	SD	2848,79		910,76	813,94	1094,99	2377,90	1302,39	1271,86	2832,57	804,58	1102,83	888,46	957,84	797,58	791,04	949,20						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	477	441	396	375	344	327	309	294	280	268	246	233							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			494,0	465,0	425,5	390,0	365,5	337,5	318,5	304,0	288,5	275,5	259,0	240,5	228,5						
	Leistungsausgaben	Mean	1678,38		612,28	787,78	712,44	777,34	737,07	897,55	854,85	954,00	903,88	924,75	907,78	871,28	891,63						
		CI Mean	[1617,76; 1739,00]		[546,44; 678,13]	[707,17; 868,38]	[647,81; 777,06]	[699,48; 855,20]	[672,12; 802,03]	[719,20; 1075,90]	[731,95; 977,76]	[828,89; 1079,11]	[800,54; 1007,22]	[818,05; 1031,45]	[809,82; 1005,73]	[783,86; 958,70]	[766,62; 1016,65]						
	SD	1931,08		746,63	886,81	680,17	784,51	633,59	1671,67	1119,09	1112,92	895,54	903,57	804,31	691,71	964,17							

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	473	439	413	371	342	313	292	276	262	249	230						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		492,0	461,0	428,5	398,5	361,5	328,5	305,0	284,5	269,0	257,5	240,5	225,5						
	Leistungsausgaben	Mean	1765,00	892,11	856,47	819,45	954,38	919,58	891,94	901,07	946,51	893,62	817,56	848,68	846,43						
		CI Mean	[1668,80; 1861,21]	[719,10; 1065,12]	[693,75; 1019,19]	[727,97; 910,93]	[749,25; 1159,50]	[777,70; 1061,46]	[724,43; 1059,46]	[729,32; 1072,82]	[728,60; 1164,42]	[764,21; 1023,03]	[716,62; 918,50]	[743,93; 953,43]	[723,83; 969,03]						
	SD	2928,75	1957,98	1782,57	966,15	2089,20	1376,31	1549,06	1530,35	1875,28	1082,88	826,41	828,83	939,30							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	469	446	408	375	350	328	297	287	270	260							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		493,5	460,5	434,5	397,5	364,0	343,0	318,0	294,5	281,0	266,0	253,0							
	Leistungsausgaben	Mean	1630,19	687,79	878,54	875,73	800,24	782,72	782,09	770,02	772,10	810,12	818,81	818,50							
		CI Mean	[1530,12; 1730,26]	[589,66; 785,91]	[643,28; 1113,79]	[657,77; 1093,69]	[690,53; 909,96]	[673,38; 892,06]	[690,25; 873,92]	[682,06; 857,97]	[675,33; 868,87]	[698,99; 921,26]	[716,24; 921,38]	[714,57; 922,43]							
	SD	2982,37	1112,16	2575,74	2318,01	1116,02	1064,32	867,77	800,27	847,25	950,50	853,52	843,42								
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	483	442	401	368	343	311	291	280	266								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,5	468,0	430,0	387,5	358,0	334,0	301,5	283,5	274,0	260,5								
	Leistungsausgaben	Mean	1787,60	760,84	950,11	902,15	878,32	996,55	970,41	828,83	758,22	778,59	906,36								
		CI Mean	[1638,24; 1936,95]	[585,28; 936,40]	[658,74; 1241,47]	[748,16; 1056,13]	[695,86; 1060,77]	[684,39; 1308,70]	[746,29; 1194,53]	[679,06; 978,60]	[628,17; 888,27]	[640,67; 916,52]	[708,50; 1104,23]								
	SD	4240,71	1991,83	3215,92	1629,14	1832,45	3013,38	2089,77	1326,79	1117,21	1164,84	1629,38									
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	448	407	381	350	333	314	300									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	470,0	431,0	397,5	368,5	342,5	324,5	306,0	293,5									
	Leistungsausgaben	Mean	1500,48	718,99	739,52	724,58	780,46	714,53	727,54	807,22	771,14	750,69									
		CI Mean	[1422,61; 1578,35]	[633,29; 804,70]	[641,14; 837,90]	[646,60; 802,56]	[655,88; 905,04]	[639,02; 790,04]	[643,69; 811,40]	[637,39; 977,05]	[657,93; 884,35]	[618,36; 883,02]									
	SD	2151,70	972,81	1088,16	826,01	1267,20	739,54	791,79	1560,88	1010,37	1156,68										
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	488	449	421	402	370	351	334										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	475,5	439,5	412,0	389,0	360,0	343,0	323,0										
	Leistungsausgaben	Mean	1534,21	742,05	738,99	751,40	746,33	801,33	717,37	807,45	827,74										
		CI Mean	[1428,85; 1639,58]	[628,44; 855,66]	[624,46; 853,52]	[629,40; 873,40]	[648,32; 844,34]	[653,94; 948,73]	[615,23; 819,52]	[628,15; 986,75]	[608,65; 1046,83]										
	SD	2814,90	1283,72	1274,21	1304,95	1015,00	1483,22	988,83	1694,21	2008,93											
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl		397	385	354	328	314	288	276											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		392,0	374,0	344,5	322,0	302,0	283,0	268,5											
	Leistungsausgaben	Mean	1720,53	812,00	852,74	946,43	914,55	829,65	876,06	712,90											
		CI Mean	[1568,48; 1872,58]	[655,98; 968,03]	[684,05; 1021,42]	[748,03; 1144,83]	[717,87; 1111,23]	[646,21; 1013,08]	[655,54; 1096,57]	[588,08; 837,71]											
	SD	3376,13	1576,08	1664,42	1878,82	1800,69	1626,40	1892,68	1043,44												
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	481	448	421	396	378												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	467,5	434,0	407,5	385,5	366,5												
	Leistungsausgaben	Mean	1517,58	672,93	666,94	764,75	777,84	781,86	823,45												
		CI Mean	[1386,20; 1648,96]	[581,02; 764,83]	[574,88; 758,99]	[642,50; 887,00]	[625,40; 930,29]	[625,02; 938,70]	[609,25; 1037,64]												
	SD	3043,15	1035,81	1015,49	1299,36	1570,09	1571,15	2092,14													
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	472	433	393	375													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	458,5	420,0	387,0	366,5													
	Leistungsausgaben	Mean	1410,87	609,30	713,93	712,82	736,26	653,81													
		CI Mean	[1284,58; 1537,17]	[534,86; 683,73]	[623,89; 803,97]	[584,12; 841,51]	[557,52; 914,99]	[558,35; 749,27]													
	SD	2603,07	844,95	983,70	1345,65	1793,97	932,44														
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	445	406														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	469,0	431,5	397,0														
	Leistungsausgaben	Mean	1598,88	704,88	757,60	858,34	784,85														
		CI Mean	[1419,44; 1778,33]	[584,41; 825,36]	[625,75; 889,46]	[689,32; 1027,36]	[617,34; 952,37]														
	SD	3297,88	1367,57	1456,87	1791,33	1702,91															

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Arzneimittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	439																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,0	466,0	425,5																	
	Leistungsausgaben	Mean	1243,74	634,61	645,86	595,59																	
		CI Mean	[1128,90; 1358,58]	[543,99; 725,24]	[561,09; 730,64]	[519,04; 672,15]																	
	SD	1749,44	1027,68	933,65	805,65																		
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	478																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,0	465,0																		
	Leistungsausgaben	Mean	1201,65	674,67	600,82																		
		CI Mean	[1055,22; 1348,07]	[580,14; 769,21]	[527,61; 674,03]																		
	SD	1610,94	1066,57	805,47																			
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500																			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		496,5																			
	Leistungsausgaben	Mean		685,58																			
		CI Mean		[581,09; 790,07]																			
	SD		1187,91																				

Tabelle 5.5 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patient für Heilmittel. Zu den Heilmitteln gehören verschiedene Formen der Therapie wie z.B. physikalische Therapie, Ergotherapie, Logopädie. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patienten dividiert.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 119,5 Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient 61,70 Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich [34,73; 88,67].

Tabelle 5.5 Patienten und zugehörige Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitrittsjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	456	405	371	336	314	292	242	221	206	193	177	166	158	147	139	131	127	121
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			395,5	360,0	329,0	308,5	274,0	233,5	215,5	201,5	186,5	174,0	163,0	153,5	143,0	136,5	129,5	125,5	119,5
	Leistungsausgaben	Mean	74,27		19,40	23,50	24,09	29,31	30,99	39,97	28,67	40,12	53,17	56,09	27,20	49,82	57,71	63,62	50,67	61,02	61,70
		CI Mean	[66,47; 82,06]		[13,14; 25,67]	[16,84; 30,17]	[17,36; 30,83]	[21,06; 37,57]	[21,73; 40,26]	[23,78; 56,16]	[13,69; 43,65]	[26,97; 53,28]	[28,50; 77,83]	[25,66; 86,51]	[10,32; 44,08]	[25,08; 74,57]	[27,99; 87,43]	[34,00; 93,24]	[25,79; 75,55]	[32,75; 89,29]	[34,73; 88,67]
	SD	240,24		63,56	64,52	62,33	73,95	78,25	126,22	112,22	95,26	171,86	204,74	109,96	156,41	181,30	176,56	144,47	161,57	150,42	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	435	384	344	312	281	254	230	213	206	189	179	171	164	157	149	136	128	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		424,0	374,0	335,0	300,5	273,0	248,5	222,5	210,5	201,5	186,5	175,5	169,0	161,0	154,0	144,5	133,5	127,0	
	Leistungsausgaben	Mean	74,07	21,39	26,68	29,78	34,79	29,71	33,61	40,98	51,55	45,52	52,73	16,80	50,54	44,66	48,94	62,73	52,39	39,70	
		CI Mean	[67,57; 80,58]	[14,68; 28,10]	[18,49; 34,86]	[21,36; 38,20]	[24,44; 45,14]	[22,15; 37,27]	[21,06; 46,17]	[26,02; 55,94]	[28,44; 74,67]	[29,34; 61,69]	[34,55; 70,91]	[9,10; 24,51]	[31,70; 69,37]	[27,92; 61,41]	[31,51; 66,37]	[39,38; 86,08]	[32,28; 72,49]	[24,55; 54,86]	
	SD	205,70	70,51	80,75	78,63	91,54	63,74	100,96	113,85	171,10	117,13	126,69	52,08	124,92	108,40	110,36	143,20	118,51	87,14		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	449	396	356	323	294	269	248	232	221	210	193	185	174	169	159	156		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		487,0	438,0	386,0	345,0	311,0	282,0	257,5	239,0	226,5	214,5	201,5	187,5	178,5	168,5	162,5	155,0	150,0	
	Leistungsausgaben	Mean	77,33	19,93	25,29	19,79	36,65	30,20	27,31	33,14	34,19	44,66	40,28	18,42	48,36	58,63	58,00	81,31	78,80	57,01	
		CI Mean	[69,24; 85,43]	[13,21; 26,64]	[16,69; 33,90]	[13,65; 25,94]	[22,31; 50,99]	[17,33; 43,07]	[19,24; 35,38]	[20,80; 45,48]	[22,37; 46,02]	[28,32; 61,00]	[26,19; 54,36]	[9,91; 26,93]	[26,72; 70,01]	[37,64; 79,62]	[29,14; 86,87]	[42,92; 119,70]	[41,43; 116,17]	[35,53; 78,48]	
	SD	258,01	75,60	91,85	61,57	135,89	115,76	69,14	101,01	93,26	125,48	105,27	61,65	151,22	143,05	191,16	249,70	237,38	134,21		
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	449	407	377	349	323	297	288	272	257	246	233	221	212	201	188			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,5	436,5	396,0	353,5	327,0	300,5	280,0	270,0	254,5	238,5	227,0	215,0	203,0	193,5	182,0	171,0		
	Leistungsausgaben	Mean	80,60	30,23	32,30	40,71	36,19	28,56	32,12	30,85	39,77	42,46	19,63	47,98	57,10	71,26	60,34	49,20	46,76		
		CI Mean	[71,60; 89,60]	[19,62; 40,84]	[19,34; 45,25]	[21,84; 59,57]	[19,64; 52,75]	[21,30; 35,83]	[23,42; 40,83]	[22,44; 39,26]	[27,45; 52,10]	[29,56; 55,37]	[12,32; 26,94]	[29,41; 66,55]	[32,85; 81,35]	[33,30; 109,21]	[31,37; 89,31]	[27,76; 70,65]	[24,10; 69,41]		
	SD	292,22	119,66	138,11	191,52	158,80	67,06	77,02	71,79	103,32	105,05	57,57	142,73	181,44	275,88	205,62	147,62	151,15			
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	496	455	414	370	336	303	292	273	262	248	232	218	206	198	192				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		487,5	442,5	400,5	359,0	326,0	298,0	285,0	269,5	257,5	242,5	228,0	214,5	203,0	196,0	188,5			
	Leistungsausgaben	Mean	70,72	35,10	37,88	29,25	30,36	33,23	44,94	47,32	41,79	16,29	48,19	33,00	37,36	36,88	26,53	30,85			
		CI Mean	[62,62; 78,82]	[17,90; 52,31]	[24,74; 51,01]	[18,23; 40,28]	[16,74; 43,98]	[21,49; 44,97]	[24,49; 65,39]	[28,31; 66,33]	[23,30; 60,29]	[6,29; 26,29]	[22,76; 73,63]	[20,96; 45,05]	[25,42; 49,31]	[27,37; 46,39]	[18,84; 34,23]	[22,11; 39,60]			
	SD	258,44	193,82	140,99	112,54	131,68	108,14	180,09	163,71	154,88	81,87	202,06	92,77	89,25	69,15	54,98	61,25				
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	499	444	402	367	332	321	287	269	253	231	218	207	193	184					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		482,5	430,0	387,5	355,0	327,5	309,5	280,5	262,5	245,0	226,5	213,5	203,5	190,0	179,0				
	Leistungsausgaben	Mean	75,39	39,56	31,08	35,52	36,45	32,02	33,51	44,87	19,25	37,60	47,00	50,68	51,21	45,96	42,92				
		CI Mean	[67,28; 83,49]	[26,13; 43,68]	[18,48; 43,68]	[22,39; 48,65]	[19,56; 53,34]	[21,79; 42,24]	[22,32; 44,69]	[30,92; 58,83]	[11,40; 27,10]	[26,27; 48,93]	[30,02; 63,97]	[32,05; 69,30]	[31,92; 70,50]	[25,56; 66,36]	[24,38; 61,45]				
	SD	248,43	150,47	133,32	131,86	162,36	94,41	100,41	119,27	64,90	90,49	130,33	138,84	140,41	143,47	126,54					
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	477	441	396	375	344	327	309	294	280	268	246	233						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,0	465,0	425,5	390,0	365,5	337,5	318,5	304,0	288,5	275,5	259,0	240,5	228,5					
	Leistungsausgaben	Mean	81,95	29,99	32,64	31,85	29,85	37,35	35,20	16,04	51,24	51,37	58,61	55,15	58,96	59,93					
		CI Mean	[73,04; 90,85]	[20,39; 39,59]	[23,67; 41,61]	[21,68; 42,02]	[20,30; 39,39]	[25,38; 49,32]	[23,72; 46,67]	[9,34; 22,74]	[29,68; 72,80]	[35,78; 66,95]	[35,48; 81,75]	[30,35; 79,95]	[35,19; 82,73]	[34,80; 85,06]					
	SD	283,58	108,85	98,69	107,03	96,17	116,74	107,57	61,01	191,80	135,04	195,90	203,65	188,09	193,79						

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	473	439	413	371	342	313	292	276	262	249	230						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		492,0	461,0	428,5	398,5	361,5	328,5	305,0	284,5	269,0	257,5	240,5	225,5						
	Leistungsausgaben	Mean	110,07	39,46	36,33	47,14	44,15	61,75	32,34	56,76	72,49	84,32	80,61	63,23	52,59						
		CI Mean	[99,18; 120,96]	[24,64; 54,29]	[24,37; 48,28]	[33,98; 60,30]	[30,08; 58,23]	[43,70; 79,81]	[20,40; 44,27]	[37,53; 75,98]	[50,44; 94,55]	[57,63; 111,01]	[55,24; 105,97]	[40,30; 86,15]	[31,26; 73,92]						
	SD	331,41	167,78	130,98	138,96	143,39	175,11	110,37	171,29	189,80	223,34	207,66	181,38	163,39							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	469	446	408	375	350	328	297	287	270	260							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		493,5	460,5	434,5	397,5	364,0	343,0	318,0	294,5	281,0	266,0	253,0							
	Leistungsausgaben	Mean	92,01	36,40	45,23	40,40	42,51	20,64	41,84	48,89	49,31	58,17	65,58	63,13							
		CI Mean	[80,42; 103,61]	[24,38; 48,42]	[30,91; 59,56]	[27,81; 52,99]	[29,86; 55,15]	[11,36; 29,92]	[27,30; 56,38]	[31,51; 66,26]	[29,63; 68,99]	[28,35; 87,98]	[37,37; 93,80]	[31,28; 94,99]							
	SD	345,58	136,23	156,85	133,94	128,64	90,32	137,42	158,06	172,32	254,99	234,79	258,54								
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	483	442	401	368	343	311	291	280	266								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,5	468,0	430,0	387,5	358,0	334,0	301,5	283,5	274,0	260,5								
	Leistungsausgaben	Mean	110,10	49,62	50,14	44,88	25,28	61,39	71,52	75,37	58,38	64,97	57,55								
		CI Mean	[95,77; 124,43]	[31,92; 67,31]	[30,13; 70,16]	[29,52; 60,25]	[15,30; 35,26]	[40,78; 81,99]	[45,72; 97,32]	[43,75; 106,99]	[35,14; 81,61]	[39,99; 89,94]	[34,86; 80,25]								
	SD	406,86	200,80	220,96	162,59	100,25	198,95	240,55	280,12	199,63	210,94	186,89									
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	448	407	381	350	333	314	300									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	470,0	431,0	397,5	368,5	342,5	324,5	306,0	293,5									
	Leistungsausgaben	Mean	90,57	39,75	47,23	16,31	37,58	47,62	62,84	56,68	53,83	50,25									
		CI Mean	[80,04; 101,10]	[28,38; 51,13]	[34,09; 60,37]	[11,23; 21,38]	[27,69; 47,47]	[33,54; 61,71]	[41,80; 83,88]	[35,69; 77,67]	[35,94; 71,72]	[33,78; 66,73]									
	SD	291,01	129,12	145,34	53,76	100,62	137,94	198,65	192,93	159,67	144,03										
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	488	449	421	402	370	351	334										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	475,5	439,5	412,0	389,0	360,0	343,0	323,0										
	Leistungsausgaben	Mean	127,93	56,20	26,58	62,79	66,44	78,79	84,14	68,77	71,98										
		CI Mean	[109,60; 146,25]	[38,28; 74,12]	[15,47; 37,68]	[41,18; 84,41]	[42,84; 90,04]	[49,39; 108,18]	[53,72; 114,57]	[42,74; 94,81]	[43,30; 100,66]										
	SD	489,50	202,50	123,54	231,20	244,41	295,78	294,55	245,97	262,99											
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl		397	385	354	328	314	288	276											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		392,0	374,0	344,5	322,0	302,0	283,0	268,5											
	Leistungsausgaben	Mean	90,39	20,51	45,65	50,70	54,16	40,61	41,01	36,33											
		CI Mean	[75,46; 105,33]	[11,52; 29,49]	[25,47; 65,82]	[29,65; 71,75]	[32,73; 75,60]	[26,57; 54,66]	[27,54; 54,49]	[24,15; 48,51]											
	SD	331,71	90,76	199,06	199,34	196,23	124,54	115,66	101,82												
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	481	448	421	396	378												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	467,5	434,0	407,5	385,5	366,5												
	Leistungsausgaben	Mean	92,88	39,20	44,68	51,07	49,91	45,20	40,65												
		CI Mean	[79,02; 106,73]	[29,25; 49,15]	[30,18; 59,17]	[35,48; 66,66]	[31,71; 68,10]	[30,60; 59,79]	[26,78; 54,52]												
	SD	320,96	112,13	159,91	165,71	187,43	146,21	135,45													
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	472	433	393	375													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	458,5	420,0	387,0	366,5													
	Leistungsausgaben	Mean	107,98	49,47	52,05	48,62	63,44	52,60													
		CI Mean	[87,67; 128,29]	[33,81; 65,13]	[34,45; 69,64]	[28,91; 68,33]	[39,91; 86,96]	[31,73; 73,47]													
	SD	418,66	177,74	192,24	206,10	236,14	203,85														
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	445	406														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	469,0	431,5	397,0														
	Leistungsausgaben	Mean	100,64	54,90	63,56	48,97	36,14														
		CI Mean	[79,48; 121,80]	[37,49; 72,32]	[40,41; 86,71]	[32,97; 64,97]	[24,16; 48,12]														
	SD	388,90	197,70	255,78	169,54	121,76															

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Heilmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	439																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,0	466,0	425,5																	
	Leistungsausgaben	Mean	85,84	44,09	45,57	40,02																	
		CI Mean	[68,33; 103,35]	[32,49; 55,69]	[32,36; 58,78]	[28,72; 51,31]																	
		SD	266,78	131,51	145,47	118,87																	
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	478																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,0	465,0																		
	Leistungsausgaben	Mean	74,41	43,27	37,20																		
		CI Mean	[51,19; 97,63]	[27,68; 58,86]	[25,60; 48,81]																		
		SD	255,45	175,87	127,73																		
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500																			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		496,5																			
	Leistungsausgaben	Mean		46,93																			
		CI Mean			[31,45; 62,40]																		
	SD			175,93																			

Tabelle 5.6 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patient für **Hilfsmittel**. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe. Die Daten für die entsprechenden Leistungsausgaben stehen erst ab dem Halbjahr 2006-1 zur Verfügung.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (im Fall der Hilfsmittel erst ab 2006-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patienten dividiert.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 119,5 Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient 114,67 Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich [58,82; 170,53].

Tabelle 5.6 Patienten und zugehörige Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	456	405	371	336	314	292	242	221	206	193	177	166	158	147	139	131	127	121	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl							274,0	233,5	215,5	201,5	186,5	174,0	163,0	153,5	143,0	136,5	129,5	125,5	119,5	
	Leistungsausgaben	Mean	195,34							127,01	68,04	79,41	92,35	110,07	82,78	77,22	96,48	118,08	96,90	126,64	90,43	114,67
		CI Mean	[167,91; 222,78]							[64,64; 189,38]	[43,27; 92,80]	[47,52; 111,30]	[50,13; 134,56]	[47,73; 172,42]	[50,23; 115,33]	[45,98; 108,45]	[40,29; 152,67]	[61,53; 174,62]	[45,79; 148,00]	[65,11; 188,16]	[51,28; 129,57]	[58,82; 170,53]
	SD	664,72							526,75	193,07	238,86	305,74	434,39	219,07	203,47	355,20	345,00	304,64	357,21	223,74	311,52	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	435	384	344	312	281	254	230	213	206	189	179	171	164	157	149	136	128		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl						273,0	248,5	222,5	210,5	201,5	186,5	175,5	169,0	161,0	154,0	144,5	133,5	127,0		
	Leistungsausgaben	Mean	204,09						108,40	142,27	71,99	92,44	151,20	98,38	45,94	99,16	78,80	99,38	149,44	98,20	69,82	
		CI Mean	[174,21; 233,96]						[66,85; 149,95]	[78,39; 206,14]	[41,78; 102,19]	[48,34; 136,53]	[56,58; 245,83]	[55,02; 141,74]	[19,12; 72,76]	[33,82; 164,50]	[40,98; 116,61]	[60,67; 208,47]	[90,41; 208,47]	[49,32; 147,09]	[36,93; 102,71]	
	SD	747,79						350,27	513,75	229,86	326,43	685,32	302,12	181,27	433,37	244,82	245,11	362,02	288,16	189,09		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	449	396	356	323	294	269	248	232	221	210	193	185	174	169	159	156			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl					311,0	282,0	257,5	239,0	226,5	214,5	201,5	187,5	178,5	168,5	162,5	155,0	150,0			
	Leistungsausgaben	Mean	137,04				52,45	55,64	64,59	80,84	76,03	59,99	46,85	77,48	78,57	101,67	71,73	71,29	76,38			
		CI Mean	[118,42; 155,65]				[31,60; 73,30]	[31,13; 80,15]	[37,85; 91,33]	[42,84; 118,84]	[43,74; 108,31]	[34,91; 85,07]	[26,58; 67,12]	[36,96; 117,99]	[38,90; 118,24]	[37,14; 166,21]	[38,98; 104,48]	[35,77; 106,80]	[31,74; 121,02]			
	SD	496,57				187,61	209,99	218,93	299,74	247,93	187,41	146,79	283,06	270,42	427,42	212,98	225,61	278,94				
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	449	407	377	349	323	297	288	272	257	246	233	221	212	201	188				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				353,5	327,0	300,5	280,0	270,0	254,5	238,5	227,0	215,0	203,0	193,5	182,0	171,0				
	Leistungsausgaben	Mean	199,40			76,37	76,42	78,43	67,64	139,68	70,21	100,86	114,72	105,68	129,94	136,96	144,00	108,83				
		CI Mean	[167,86; 230,94]			[48,88; 103,85]	[49,43; 103,40]	[45,16; 111,70]	[41,29; 93,99]	[1,43; 277,93]	[43,01; 97,41]	[53,16; 148,56]	[73,32; 156,12]	[56,81; 154,56]	[73,04; 186,83]	[82,42; 191,50]	[75,46; 212,54]	[57,93; 159,73]				
	SD	912,51			263,63	248,95	294,24	224,96	1159,06	221,39	375,85	318,23	365,62	413,60	387,09	471,76	339,62					
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	496	455	414	370	336	303	292	273	262	248	232	218	206	198	192					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			400,5	359,0	326,0	298,0	285,0	269,5	257,5	242,5	228,0	214,5	203,0	196,0	188,5					
	Leistungsausgaben	Mean	137,75		64,12	73,46	58,46	109,27	73,65	63,12	54,52	61,53	53,99	62,11	68,90	56,91	92,60					
		CI Mean	[121,37; 154,14]		[42,19; 86,05]	[48,49; 98,44]	[30,61; 86,32]	[66,72; 151,82]	[40,23; 107,08]	[37,02; 89,21]	[27,07; 81,97]	[39,92; 83,13]	[37,62; 70,36]	[38,31; 85,91]	[33,91; 103,89]	[30,92; 82,89]	[47,52; 137,68]					
	SD	492,35		223,94	241,43	256,56	374,78	287,87	218,58	224,77	171,65	126,14	177,84	254,38	185,61	315,79						
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	499	444	402	367	332	321	287	269	253	231	218	207	193	184						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		430,0	387,5	355,0	327,5	309,5	280,5	262,5	245,0	226,5	213,5	203,5	190,0	179,0						
	Leistungsausgaben	Mean	153,93	73,57	79,61	51,60	66,68	80,91	80,34	44,11	112,30	80,47	100,05	98,73	80,77	75,50						
		CI Mean	[134,68; 173,19]	[45,17; 101,98]	[51,39; 107,83]	[35,54; 67,65]	[32,90; 100,45]	[33,35; 128,47]	[49,15; 111,52]	[23,27; 64,95]	[70,01; 154,59]	[38,88; 122,05]	[60,89; 139,21]	[52,76; 144,69]	[35,09; 126,44]	[43,79; 107,22]						
	SD	590,22	300,49	283,43	154,33	311,87	426,89	266,49	172,28	337,71	319,34	291,92	334,55	321,23	216,50							
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	477	441	396	375	344	327	309	294	280	268	246	233							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,0	465,0	425,5	390,0	365,5	337,5	318,5	304,0	288,5	275,5	259,0	240,5	228,5						
	Leistungsausgaben	Mean	188,03	95,15	90,38	79,10	90,98	81,97	100,53	49,15	106,18	103,78	105,92	117,89	106,90	123,06						
		CI Mean	[166,83; 209,23]	[49,70; 140,61]	[57,61; 123,16]	[49,94; 108,26]	[52,44; 129,53]	[51,06; 112,89]	[60,51; 140,56]	[25,13; 73,16]	[63,36; 149,01]	[63,60; 143,97]	[71,94; 139,90]	[81,75; 154,02]	[59,95; 153,85]	[75,14; 170,98]						
	SD	675,37	515,46	360,58	306,90	388,38	301,57	375,16	218,66	380,94	348,27	287,73	296,72	371,46	369,60							

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	473	439	413	371	342	313	292	276	262	249	230						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		492,0	461,0	428,5	398,5	361,5	328,5	305,0	284,5	269,0	257,5	240,5	225,5						
	Leistungsausgaben	Mean	194,08	101,22	95,82	94,88	112,74	73,72	64,89	92,57	114,56	105,79	103,12	91,93	132,15						
		CI Mean	[171,38; 216,78]	[59,71; 142,73]	[64,31; 127,32]	[59,02; 130,74]	[70,52; 154,95]	[51,75; 95,69]	[37,20; 92,57]	[64,66; 120,49]	[69,34; 159,78]	[71,38; 140,19]	[55,85; 150,39]	[62,09; 121,78]	[64,37; 199,92]						
	SD	690,91	469,78	345,13	378,71	429,97	213,13	255,99	248,73	389,13	287,91	386,99	236,15	519,25							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	469	446	408	375	350	328	297	287	270	260							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		493,5	460,5	434,5	397,5	364,0	343,0	318,0	294,5	281,0	266,0	253,0							
	Leistungsausgaben	Mean	162,84	74,09	72,61	74,01	77,98	76,34	79,65	65,74	119,91	88,01	87,41	86,59							
		CI Mean	[140,81; 184,88]	[33,17; 115,01]	[47,69; 97,54]	[44,90; 103,12]	[49,75; 106,22]	[34,55; 118,14]	[52,26; 107,03]	[40,88; 90,61]	[60,24; 179,59]	[52,37; 123,66]	[56,32; 118,50]	[40,36; 132,82]							
	SD	656,67	463,83	272,93	309,60	287,21	406,84	258,76	226,25	522,53	304,86	258,71	375,20								
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	483	442	401	368	343	311	291	280	266								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,5	468,0	430,0	387,5	358,0	334,0	301,5	283,5	274,0	260,5								
	Leistungsausgaben	Mean	170,07	79,60	102,29	87,45	57,09	88,20	101,95	94,92	83,67	70,69	70,74								
		CI Mean	[147,28; 192,87]	[50,93; 108,28]	[61,22; 143,36]	[56,31; 118,60]	[30,20; 83,99]	[54,26; 122,14]	[66,56; 137,34]	[58,50; 131,34]	[49,45; 117,89]	[45,42; 95,95]	[46,70; 94,77]								
	SD	647,29	325,31	453,33	329,50	270,15	327,64	330,00	322,64	293,97	213,38	197,92									
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	448	407	381	350	333	314	300									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	470,0	431,0	397,5	368,5	342,5	324,5	306,0	293,5									
	Leistungsausgaben	Mean	170,39	79,53	63,39	42,64	109,61	112,26	96,76	99,79	78,49	92,92									
		CI Mean	[150,14; 190,64]	[48,65; 110,42]	[44,44; 82,35]	[27,71; 57,57]	[71,49; 147,73]	[77,44; 147,07]	[66,22; 127,31]	[69,09; 130,48]	[55,76; 101,22]	[57,82; 128,01]									
	SD	559,61	350,60	209,70	158,13	387,75	340,99	288,41	282,11	202,87	306,73										
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	488	449	421	402	370	351	334										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	475,5	439,5	412,0	389,0	360,0	343,0	323,0										
	Leistungsausgaben	Mean	149,59	81,42	60,84	71,80	62,92	69,85	100,36	81,58	84,85										
		CI Mean	[128,51; 170,68]	[52,52; 110,31]	[38,22; 83,45]	[50,75; 92,85]	[45,56; 80,28]	[51,09; 88,61]	[54,18; 146,53]	[47,57; 115,59]	[51,22; 118,48]										
	SD	563,33	326,49	251,57	225,14	179,79	188,75	446,99	321,33	308,35											
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl		397	385	354	328	314	288	276											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		392,0	374,0	344,5	322,0	302,0	283,0	268,5											
	Leistungsausgaben	Mean	189,39	62,43	109,66	90,64	90,78	103,63	91,63	76,91											
		CI Mean	[159,27; 219,50]	[27,96; 96,90]	[65,14; 154,18]	[57,92; 123,36]	[57,19; 124,36]	[69,68; 137,58]	[53,70; 129,56]	[45,08; 108,75]											
	SD	668,66	348,20	439,27	309,82	307,47	301,03	325,56	266,12												
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	481	448	421	396	378												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	467,5	434,0	407,5	385,5	366,5												
	Leistungsausgaben	Mean	155,86	88,02	77,88	84,71	86,98	57,21	81,69												
		CI Mean	[131,30; 180,42]	[57,08; 118,96]	[53,78; 101,99]	[55,66; 113,76]	[56,12; 117,84]	[35,77; 78,64]	[50,76; 112,62]												
	SD	568,84	348,72	265,91	308,80	317,88	214,69	302,09													
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	472	433	393	375													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	458,5	420,0	387,0	366,5													
	Leistungsausgaben	Mean	168,46	80,85	91,92	74,56	96,76	72,45													
		CI Mean	[138,17; 198,74]	[58,71; 102,99]	[60,09; 123,75]	[53,63; 95,49]	[60,11; 133,41]	[42,62; 102,29]													
	SD	624,18	251,31	347,78	218,84	367,85	291,43														
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	445	406														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	469,0	431,5	397,0														
	Leistungsausgaben	Mean	202,08	88,79	110,60	115,17	74,40														
		CI Mean	[160,03; 244,13]	[65,91; 111,66]	[72,50; 148,70]	[75,04; 155,29]	[46,28; 102,52]														
	SD	772,72	259,69	420,99	425,23	285,85															

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Hilfsmittel in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	439																
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,0	466,0	425,5																
	Leistungsausgaben	Mean	229,91	77,38	114,63	115,31																
		CI Mean	[144,75; 315,07]	[53,75; 101,01]	[57,16; 172,11]	[52,01; 178,60]																
	SD	1297,34	267,95	633,01	666,14																	
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	478																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,0	465,0																	
	Leistungsausgaben	Mean	157,44	77,33	78,72																	
		CI Mean	[106,40; 208,48]	[49,16; 105,50]	[53,20; 104,24]																	
	SD	561,53	317,86	280,77																		
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		496,5																		
	Leistungsausgaben	Mean		86,33																		
		CI Mean		[50,73; 121,94]																		
	SD		404,79																			

Tabelle 5.7 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patient für **Dialyse-Sachkosten**. Die Dialyse-Sachkosten werden für die Evaluation der Behandlungsprogramme bei Diabetes mellitus Typ 2 gesondert ausgewiesen aufgrund der Bedeutung der Nierenersatztherapie als möglicher Folgeerkrankung. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten

Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patienten dividiert.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 119,5 Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient 336,34 Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich [0,00; 714,03].

Tabelle 5.7 Patienten und zugehörige Ausgaben für Dialyse-Sachkosten in Euro (Stichprobe)

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Dialyse-Sachkosten in Euro (Stichprobe)		Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	456	405	371	336	314	292	242	221	206	193	177	166	158	147	139	131	127	121	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl					395,5	360,0	329,0	308,5	274,0	233,5	215,5	201,5	186,5	174,0	163,0	153,5	143,0	136,5	129,5	125,5	119,5
	Leistungsausgaben	Mean	208,61				36,73	58,54	42,52	22,33	0,00	20,34	110,67	68,39	80,82	179,33	187,08	191,93	201,58	288,44	247,35	279,17	336,34
		CI Mean	[132,70; 284,52]				[0,00; 108,72]	[0,00; 143,83]	[0,00; 125,85]	[0,00; 66,11]	[0,00; 0,00]	[0,00; 52,65]	[0,00; 246,29]	[0,00; 202,43]	[0,00; 226,22]	[0,00; 429,22]	[0,00; 447,46]	[0,00; 459,18]	[0,00; 482,40]	[0,00; 620,46]	[0,00; 527,48]	[0,00; 608,40]	[0,00; 714,03]
	SD	2339,40				730,44	825,61	771,21	392,29	0,00	251,90	1015,74	970,81	1013,08	1681,76	1696,03	1689,34	1713,31	1979,09	1626,45	1881,73	2106,53	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	435	384	344	312	281	254	230	213	206	189	179	171	164	157	149	136	128		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			424,0	374,0	335,0	300,5	273,0	248,5	222,5	210,5	201,5	186,5	175,5	169,0	161,0	154,0	144,5	133,5	127,0		
	Leistungsausgaben	Mean	165,80			43,06	86,07	109,21	68,79	36,89	94,80	116,72	70,50	68,39	73,89	78,52	162,64	95,07	90,63	91,70	83,37	108,50	
		CI Mean	[102,65; 228,96]			[0,00; 105,18]	[0,00; 184,29]	[0,00; 235,09]	[0,00; 146,38]	[0,00; 109,19]	[0,00; 226,58]	[0,00; 278,45]	[0,00; 199,14]	[0,00; 202,43]	[0,00; 218,71]	[0,00; 232,42]	[0,00; 387,40]	[0,00; 252,91]	[0,00; 268,27]	[0,00; 271,44]	[0,00; 271,44]	[0,00; 246,79]	[0,00; 321,18]
	SD	1996,79			652,61	969,13	1175,52	686,26	609,50	1059,92	1230,82	952,27	970,81	1009,08	1040,24	1490,72	1021,80	1124,73	1102,37	963,35	1222,82		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	449	396	356	323	294	269	248	232	221	210	193	185	174	169	159	156			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			487,0	438,0	386,0	345,0	311,0	282,0	257,5	239,0	226,5	214,5	201,5	187,5	178,5	168,5	162,5	155,0	150,0		
	Leistungsausgaben	Mean	148,40		0,00	0,00	49,86	44,55	44,92	47,41	51,26	54,26	61,07	65,38	68,10	74,18	135,12	173,10	171,58	223,64	201,00		
		CI Mean	[85,32; 211,47]		[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 122,04]	[0,00; 131,88]	[0,00; 132,96]	[0,00; 140,34]	[0,00; 151,75]	[0,00; 160,62]	[0,00; 180,77]	[0,00; 193,52]	[0,00; 201,58]	[0,00; 219,58]	[0,00; 323,84]	[0,00; 412,69]	[0,00; 409,88]	[0,00; 495,03]	[0,00; 479,70]		
	SD	2010,54		0,00	0,00	723,48	827,57	792,18	796,21	822,69	838,93	919,11	957,53	966,73	1015,79	1286,44	1586,72	1549,85	1723,88	1741,53			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	449	407	377	349	323	297	288	272	257	246	233	221	212	201	188				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			488,5	436,5	396,0	353,5	327,0	300,5	280,0	270,0	254,5	238,5	227,0	215,0	203,0	193,5	182,0	171,0			
	Leistungsausgaben	Mean	93,07		27,80	33,28	17,40	38,98	42,14	45,86	49,21	51,04	62,48	60,00	60,70	59,16	60,05	9,13	75,71	79,55			
		CI Mean	[45,01; 141,12]		[0,00; 82,29]	[0,00; 98,51]	[0,00; 51,50]	[0,00; 115,39]	[0,00; 124,74]	[0,00; 135,74]	[0,00; 145,68]	[0,00; 151,07]	[0,00; 169,79]	[0,00; 173,31]	[0,00; 179,69]	[0,00; 175,13]	[0,00; 177,75]	[0,00; 27,02]	[0,00; 224,12]	[0,00; 235,48]			
	SD	1560,01		614,44	695,29	346,25	732,94	762,06	794,96	823,53	838,65	873,46	892,84	914,66	867,53	855,61	126,99	1021,50	1040,32				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl		496	455	414	370	336	303	292	273	262	248	232	218	206	198	192					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			487,5	442,5	400,5	359,0	326,0	298,0	285,0	269,5	257,5	242,5	228,0	214,5	203,0	196,0	188,5				
	Leistungsausgaben	Mean	150,47		59,23	16,08	18,74	14,90	31,07	46,24	65,71	121,34	159,92	150,79	178,29	171,89	86,15	63,09	73,10				
		CI Mean	[91,77; 209,18]		[0,00; 141,27]	[0,00; 46,61]	[0,00; 50,35]	[0,00; 37,17]	[0,00; 80,60]	[0,00; 136,88]	[0,00; 163,54]	[0,00; 265,44]	[0,00; 340,21]	[0,00; 323,07]	[0,00; 379,21]	[0,00; 353,51]	[0,00; 212,56]	[0,00; 186,76]	[0,00; 216,39]				
	SD	1872,95		924,22	327,70	322,78	215,26	456,24	798,28	842,67	1207,00	1476,04	1368,79	1547,84	1357,15	918,92	883,34	1003,73					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl		499	444	402	367	332	321	287	269	253	231	218	207	193	184						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			482,5	430,0	387,5	355,0	327,5	309,5	280,5	262,5	245,0	226,5	213,5	203,5	190,0	179,0					
	Leistungsausgaben	Mean	263,43		43,67	63,79	131,95	155,05	172,21	177,23	182,57	122,43	118,01	125,92	136,75	138,19	91,50	84,63					
		CI Mean	[175,94; 350,92]		[0,00; 91,79]	[0,00; 152,10]	[2,04; 261,85]	[3,45; 306,65]	[3,78; 340,64]	[4,04; 350,43]	[1,54; 363,61]	[0,00; 277,46]	[0,00; 281,43]	[0,00; 300,15]	[0,00; 325,89]	[0,00; 327,77]	[0,00; 245,81]	[0,00; 246,68]					
	SD	2682,01		539,29	934,35	1304,65	1457,33	1555,10	1554,57	1546,91	1281,50	1305,08	1337,89	1410,01	1379,80	1085,25	1106,15						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	477	441	396	375	344	327	309	294	280	268	246	233							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			494,0	465,0	425,5	390,0	365,5	337,5	318,5	304,0	288,5	275,5	259,0	240,5	228,5						
	Leistungsausgaben	Mean	52,43		51,48	54,82	33,90	33,54	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	61,58	34,79	0,00	49,60					
		CI Mean	[17,99; 86,88]		[0,00; 122,76]	[0,00; 130,79]	[0,00; 94,46]	[0,00; 99,29]	[0,00; 19,02]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 97,88]	[0,00; 162,13]	[0,00; 102,97]	[0,00; 0,00]	[0,00; 146,81]					
	SD	1097,30		808,36	835,74	637,37	662,41	122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	561,68	851,47	559,88	0,00	749,75						

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Dialyse-Sachkosten in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	473	439	413	371	342	313	292	276	262	249	230						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		492,0	461,0	428,5	398,5	361,5	328,5	305,0	284,5	269,0	257,5	240,5	225,5						
	Leistungsausgaben	Mean	247,29	110,72	136,56	141,97	139,00	135,08	121,21	88,62	93,83	125,08	131,97	103,23	116,06						
		CI Mean	[166,50; 328,08]	[4,52; 216,92]	[16,90; 256,22]	[16,09; 267,85]	[7,30; 270,70]	[0,00; 270,17]	[0,00; 251,54]	[0,00; 211,27]	[0,00; 223,71]	[0,00; 255,60]	[0,00; 282,73]	[0,00; 234,30]	[0,00; 276,58]						
	SD	2459,43	1201,85	1310,85	1329,42	1341,35	1310,44	1205,15	1092,87	1117,76	1092,24	1234,28	1037,10	1229,84							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	469	446	408	375	350	328	297	287	270	260							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		493,5	460,5	434,5	397,5	364,0	343,0	318,0	294,5	281,0	266,0	253,0							
	Leistungsausgaben	Mean	298,64	85,49	96,61	106,73	152,02	232,06	167,35	143,19	155,91	185,69	131,44	149,12							
		CI Mean	[203,54; 393,74]	[0,00; 182,13]	[0,00; 206,75]	[0,00; 230,45]	[6,14; 297,90]	[54,69; 409,42]	[2,99; 331,70]	[0,00; 289,10]	[0,00; 312,38]	[4,58; 366,80]	[0,00; 278,24]	[0,00; 317,34]							
	SD	2834,24	1095,33	1205,84	1315,83	1483,92	1726,48	1553,04	1327,53	1370,02	1548,92	1221,56	1365,20								
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	483	442	401	368	343	311	291	280	266								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,5	468,0	430,0	387,5	358,0	334,0	301,5	283,5	274,0	260,5								
	Leistungsausgaben	Mean	88,31	27,87	43,79	32,07	35,56	55,76	41,26	45,70	48,61	49,65	52,90								
		CI Mean	[35,32; 141,30]	[0,00; 82,49]	[0,00; 106,69]	[0,00; 94,92]	[0,00; 105,26]	[0,00; 134,53]	[0,00; 122,13]	[0,00; 135,29]	[0,00; 143,88]	[0,00; 146,96]	[0,00; 156,58]								
	SD	1504,60	619,68	694,25	664,97	700,05	760,42	754,04	793,64	818,44	821,83	853,81									
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	448	407	381	350	333	314	300									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	470,0	431,0	397,5	368,5	342,5	324,5	306,0	293,5									
	Leistungsausgaben	Mean	88,41	26,41	29,32	31,56	34,67	37,39	34,56	40,29	72,75	93,90									
		CI Mean	[34,18; 142,63]	[0,00; 78,17]	[0,00; 86,79]	[0,00; 93,43]	[0,00; 102,62]	[0,00; 110,69]	[0,00; 85,14]	[0,00; 119,25]	[0,00; 177,46]	[0,00; 223,83]									
	SD	1498,43	587,59	635,64	655,27	691,18	717,87	477,63	725,75	934,56	1135,64										
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	488	449	421	402	370	351	334										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	475,5	439,5	412,0	389,0	360,0	343,0	323,0										
	Leistungsausgaben	Mean	117,98	37,82	63,90	103,97	60,03	61,31	39,73	26,27	42,66										
		CI Mean	[54,85; 181,12]	[0,00; 96,05]	[0,00; 141,25]	[0,00; 209,70]	[0,00; 143,68]	[0,00; 147,21]	[0,00; 110,31]	[0,00; 77,76]	[0,00; 126,28]										
	SD	1686,82	658,00	860,48	1130,94	866,23	864,34	683,24	486,51	766,77											
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl		397	385	354	328	314	288	276											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		392,0	374,0	344,5	322,0	302,0	283,0	268,5											
	Leistungsausgaben	Mean	206,03	132,39	145,94	138,96	86,14	115,83	62,33	45,83											
		CI Mean	[102,45; 309,62]	[2,49; 262,29]	[3,47; 288,41]	[0,00; 278,91]	[0,00; 205,34]	[0,00; 248,56]	[0,00; 162,97]	[0,00; 135,67]											
	SD	2300,01	1312,18	1405,74	1325,31	1091,35	1176,90	863,84	751,08												
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	481	448	421	396	378												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	467,5	434,0	407,5	385,5	366,5												
	Leistungsausgaben	Mean	77,18	0,00	0,00	21,98	38,50	68,98	75,62												
		CI Mean	[16,75; 137,61]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 65,07]	[0,00; 103,23]	[0,00; 164,75]	[0,00; 180,28]												
	SD	1399,66	0,00	0,00	457,94	666,64	959,31	1022,26													
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	472	433	393	375													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	458,5	420,0	387,0	366,5													
	Leistungsausgaben	Mean	173,50	81,05	97,97	84,86	88,99	72,51													
		CI Mean	[74,74; 272,26]	[0,00; 172,62]	[0,00; 200,53]	[0,00; 181,05]	[0,00; 192,72]	[0,00; 160,95]													
	SD	2035,55	1039,41	1120,51	1005,70	1041,17	863,84														
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	445	406														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	469,0	431,5	397,0														
	Leistungsausgaben	Mean	65,12	27,84	30,19	33,16	34,71														
		CI Mean	[0,00; 138,12]	[0,00; 82,40]	[0,00; 87,80]	[0,00; 98,17]	[0,00; 102,74]														
	SD	1341,56	619,37	636,52	688,91	691,62															

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Dialyse-Sachkosten in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	439																
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,0	466,0	425,5																
	Leistungsausgaben	Mean	117,32	26,82	56,87	60,62																
		CI Mean	[2,29; 232,34]	[0,00; 79,39]	[0,00; 135,85]	[0,00; 144,61]																
SD		1752,32	596,15	869,94	883,94																	
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	478																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,0	465,0																	
	Leistungsausgaben	Mean	0,00	0,00	0,00																	
		CI Mean	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]																	
SD		0,00	0,00	0,00																		
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		496,5																		
	Leistungsausgaben	Mean		16,01																		
		CI Mean		[0,00; 38,62]																		
SD			257,03																			

Tabelle 5.8 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patient für **Anschlussrehabilitation**. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 119,5 Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient 17,24 Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich [0,00; 51,03].

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patienten dividiert.

Tabelle 5.8 Patienten und zugehörige Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)		Durchschnittskosten/Jahr	Beitrittsjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	456	405	371	336	314	292	242	221	206	193	177	166	158	147	139	131	127	121	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl					395,5	360,0	329,0	308,5	274,0	233,5	215,5	201,5	186,5	174,0	163,0	153,5	143,0	136,5	129,5	125,5	119,5
	Leistungsausgaben	Mean	78,73				56,96	42,15	0,00	61,31	56,66	0,00	29,48	15,00	39,01	31,53	58,22	26,45	92,56	36,24	47,06	75,43	17,24
		CI Mean	[54,21; 103,25]				[12,54; 101,37]	[3,29; 81,02]	[0,00; 0,00]	[3,16; 119,45]	[16,05; 97,26]	[0,00; 0,00]	[0,00; 62,70]	[0,00; 44,39]	[0,00; 82,08]	[0,00; 76,71]	[0,00; 116,88]	[0,00; 62,99]	[0,00; 241,90]	[0,00; 87,03]	[0,00; 112,39]	[0,00; 164,54]	[0,00; 51,03]
	SD	755,69				450,69	376,22	0,00	521,08	342,90	0,00	248,79	212,90	300,13	304,09	382,11	231,00	911,15	302,75	379,32	509,37	188,45	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	435	384	344	312	281	254	230	213	206	189	179	171	164	157	149	136	128		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			424,0	374,0	335,0	300,5	273,0	248,5	222,5	210,5	201,5	186,5	175,5	169,0	161,0	154,0	144,5	133,5	127,0		
	Leistungsausgaben	Mean	61,37			38,29	36,14	24,28	26,91	52,89	8,25	9,21	19,14	46,23	53,04	11,68	88,92	6,64	13,31	42,63	0,00	29,43	
		CI Mean	[41,78; 80,96]			[7,07; 69,52]	[4,18; 68,11]	[0,58; 47,97]	[0,00; 54,12]	[0,00; 113,28]	[0,00; 24,42]	[0,00; 27,27]	[0,00; 45,62]	[0,69; 91,77]	[0,00; 138,88]	[0,00; 34,58]	[15,70; 162,14]	[0,00; 19,67]	[0,00; 39,40]	[0,00; 90,55]	[0,00; 0,00]	[0,00; 87,12]	
	SD	619,39			328,06	315,39	221,27	240,72	509,01	130,05	137,44	195,96	329,81	598,09	154,75	485,66	84,30	165,20	293,89	0,00	331,70		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	449	396	356	323	294	269	248	232	221	210	193	185	174	169	159	156			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			487,0	438,0	386,0	345,0	311,0	282,0	257,5	239,0	226,5	214,5	201,5	187,5	178,5	168,5	162,5	155,0	150,0		
	Leistungsausgaben	Mean	49,26			31,94	25,84	22,80	0,00	27,67	0,00	16,12	51,39	17,86	18,55	20,12	0,00	74,24	45,11	14,33	24,58	79,36	
		CI Mean	[34,78; 63,74]			[5,12; 58,76]	[3,66; 48,03]	[0,00; 49,18]	[0,00; 0,00]	[0,68; 54,66]	[0,00; 0,00]	[0,00; 38,41]	[10,64; 92,13]	[0,00; 42,56]	[0,00; 44,22]	[0,00; 47,95]	[0,00; 0,00]	[19,04; 129,45]	[1,20; 89,03]	[0,00; 39,06]	[0,00; 58,58]	[9,46; 149,25]	
	SD	461,44			301,98	236,87	264,48	0,00	242,87	0,00	182,55	321,35	189,66	191,76	201,54	0,00	376,32	290,84	160,83	215,97	436,77		
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	449	407	377	349	323	297	288	272	257	246	233	221	212	201	188				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			488,5	436,5	396,0	353,5	327,0	300,5	280,0	270,0	254,5	238,5	227,0	215,0	203,0	193,5	182,0	171,0			
	Leistungsausgaben	Mean	76,83			17,30	29,94	20,80	12,43	19,72	47,88	82,07	53,36	24,78	8,60	17,49	137,57	62,23	41,76	30,93	19,47		
		CI Mean	[52,07; 101,58]			[0,00; 37,92]	[6,11; 53,77]	[0,45; 41,14]	[0,00; 28,89]	[0,00; 41,98]	[9,08; 86,67]	[28,17; 135,97]	[0,00; 129,89]	[0,00; 52,74]	[0,00; 25,44]	[0,00; 41,68]	[0,00; 285,12]	[0,00; 126,77]	[1,14; 82,38]	[0,00; 85,17]	[0,00; 46,68]		
	SD	803,67			232,51	254,04	206,57	157,98	205,32	343,12	460,14	641,58	227,61	132,75	185,96	1103,82	469,22	288,29	373,33	181,51			
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl		496	455	414	370	336	303	292	273	262	248	232	218	206	198	192					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			487,5	442,5	400,5	359,0	326,0	298,0	285,0	269,5	257,5	242,5	228,0	214,5	203,0	196,0	188,5				
	Leistungsausgaben	Mean	71,65			43,83	11,14	64,72	23,44	52,56	12,02	0,00	102,52	71,06	7,95	53,86	20,03	19,95	0,00	61,73			
		CI Mean	[43,72; 99,59]			[12,82; 74,85]	[0,00; 26,68]	[22,25; 107,19]	[0,55; 46,33]	[16,26; 88,87]	[0,00; 28,76]	[0,00; 0,00]	[0,00; 247,79]	[0,00; 150,89]	[0,00; 22,43]	[11,23; 96,49]	[0,00; 47,75]	[0,00; 47,55]	[0,00; 0,00]	[0,00; 150,94]			
	SD	891,33			349,38	166,82	433,63	221,28	334,46	147,45	0,00	1216,73	653,61	115,02	328,45	207,17	200,65	0,00	624,87				
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl		499	444	402	367	332	321	287	269	253	231	218	207	193	184						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			482,5	430,0	387,5	355,0	327,5	309,5	280,5	262,5	245,0	226,5	213,5	203,5	190,0	179,0					
	Leistungsausgaben	Mean	76,77			30,65	30,04	49,10	11,89	18,92	93,65	0,00	63,63	54,25	11,93	48,44	0,00	86,41	43,41				
		CI Mean	[50,73; 102,81]			[4,95; 56,36]	[6,13; 53,95]	[17,33; 80,88]	[0,00; 28,35]	[0,00; 40,29]	[12,47; 174,82]	[0,00; 0,00]	[0,00; 135,69]	[1,77; 106,73]	[0,00; 35,31]	[0,00; 100,49]	[0,00; 0,00]	[0,00; 203,38]	[0,00; 88,62]				
	SD	798,14			288,06	252,97	319,14	158,23	197,25	728,61	0,00	595,62	419,08	179,56	388,08	0,00	822,63	308,60					
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	477	441	396	375	344	327	309	294	280	268	246	233							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			494,0	465,0	425,5	390,0	365,5	337,5	318,5	304,0	288,5	275,5	259,0	240,5	228,5						
	Leistungsausgaben	Mean	59,47			72,51	41,41	24,18	14,44	21,57	42,09	12,64	6,58	62,39	55,82	28,00	10,78	41,14					
		CI Mean	[40,64; 78,31]			[0,00; 158,99]	[5,53; 77,28]	[0,00; 48,61]	[0,00; 35,00]	[0,00; 47,00]	[11,15; 73,04]	[0,00; 30,13]	[0,00; 19,47]	[2,19; 122,58]	[8,95; 102,70]	[0,00; 62,54]	[0,00; 27,29]	[0,00; 82,77]					
	SD	599,95			980,62	394,69	257,11	207,12	248,01	290,03	159,24	114,71	521,67	396,93	283,59	130,62	321,12						

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	473	439	413	371	342	313	292	276	262	249	230						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		492,0	461,0	428,5	398,5	361,5	328,5	305,0	284,5	269,0	257,5	240,5	225,5						
	Leistungsausgaben	Mean	69,84	57,55	47,37	14,03	61,47	42,69	56,57	13,02	6,85	15,24	34,97	55,33	24,94						
		CI Mean	[45,18; 94,50]	[0,00; 116,75]	[6,44; 88,29]	[0,00; 29,86]	[9,61; 113,33]	[5,67; 79,72]	[11,94; 101,21]	[0,00; 31,03]	[0,00; 20,29]	[0,00; 36,33]	[0,46; 69,49]	[0,00; 148,95]	[0,00; 53,29]						
	SD	750,63	669,96	448,33	167,24	528,19	359,17	412,78	160,48	115,61	176,45	282,60	740,74	217,18							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	469	446	408	375	350	328	297	287	270	260							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		493,5	460,5	434,5	397,5	364,0	343,0	318,0	294,5	281,0	266,0	253,0							
	Leistungsausgaben	Mean	68,64	23,48	27,47	73,63	25,21	48,08	11,37	24,76	19,41	64,67	13,87	22,08							
		CI Mean	[41,74; 95,54]	[2,72; 44,24]	[5,49; 49,44]	[0,00; 150,99]	[3,21; 47,20]	[12,27; 83,90]	[0,00; 27,11]	[0,00; 53,95]	[0,00; 41,36]	[0,00; 133,98]	[0,00; 33,06]	[0,00; 54,00]							
	SD	801,80	235,31	240,57	822,71	223,71	348,60	148,69	265,57	192,20	592,80	159,69	259,02								
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	483	442	401	368	343	311	291	280	266								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,5	468,0	430,0	387,5	358,0	334,0	301,5	283,5	274,0	260,5								
	Leistungsausgaben	Mean	56,37	15,94	29,44	9,26	31,47	44,20	24,43	33,29	38,48	14,60	32,28								
		CI Mean	[39,12; 73,62]	[0,36; 31,51]	[5,37; 53,52]	[0,00; 22,07]	[6,44; 56,50]	[10,55; 77,85]	[0,59; 48,27]	[4,29; 62,28]	[4,78; 72,19]	[0,00; 34,80]	[3,64; 60,91]								
	SD	489,72	176,68	265,69	135,59	251,41	324,82	222,27	256,87	289,52	170,65	235,77									
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	448	407	381	350	333	314	300									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	470,0	431,0	397,5	368,5	342,5	324,5	306,0	293,5									
	Leistungsausgaben	Mean	62,50	58,32	17,29	10,75	26,03	38,04	29,93	61,89	53,38	26,82									
		CI Mean	[35,81; 89,18]	[0,00; 117,20]	[0,39; 34,18]	[0,00; 25,80]	[3,30; 48,76]	[0,00; 92,74]	[0,08; 59,79]	[0,00; 133,07]	[1,88; 104,89]	[1,87; 51,76]									
	SD	737,39	668,36	186,86	159,32	231,18	535,72	281,92	654,15	459,70	218,03										
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	488	449	421	402	370	351	334										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	475,5	439,5	412,0	389,0	360,0	343,0	323,0										
	Leistungsausgaben	Mean	73,20	18,20	24,62	32,58	22,11	10,49	78,53	29,60	70,31										
		CI Mean	[44,76; 101,63]	[0,34; 36,06]	[2,83; 46,42]	[8,61; 56,56]	[2,08; 42,14]	[0,00; 25,01]	[25,23; 131,83]	[5,43; 53,78]	[0,00; 155,82]										
	SD	759,72	201,84	242,51	256,44	207,41	146,10	515,96	228,43	784,10											
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl		397	385	354	328	314	288	276											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		392,0	374,0	344,5	322,0	302,0	283,0	268,5											
	Leistungsausgaben	Mean	60,60	15,79	22,05	5,95	31,37	31,79	44,80	54,79											
		CI Mean	[33,74; 87,46]	[0,00; 33,61]	[0,00; 47,52]	[0,00; 17,61]	[4,04; 58,70]	[0,00; 63,85]	[0,00; 100,43]	[13,82; 95,76]											
	SD	596,33	180,04	251,33	110,45	250,21	284,30	477,46	342,54												
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	481	448	421	396	378												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	467,5	434,0	407,5	385,5	366,5												
	Leistungsausgaben	Mean	50,76	22,88	13,18	46,96	44,77	11,28	8,66												
		CI Mean	[27,12; 74,40]	[2,92; 42,85]	[0,00; 28,06]	[16,19; 77,73]	[1,18; 88,37]	[0,00; 25,61]	[0,00; 20,65]												
	SD	547,48	225,01	164,14	327,07	449,00	143,56	117,12													
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	472	433	393	375													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	458,5	420,0	387,0	366,5													
	Leistungsausgaben	Mean	76,75	4,14	38,76	35,96	56,88	21,11													
		CI Mean	[26,17; 127,33]	[0,00; 12,26]	[5,16; 72,36]	[0,00; 72,50]	[0,00; 145,65]	[1,26; 40,96]													
	SD	1042,47	92,14	367,03	382,00	890,89	193,89														
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	445	406														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	469,0	431,5	397,0														
	Leistungsausgaben	Mean	66,70	55,45	54,36	22,80	19,99														
		CI Mean	[35,49; 97,91]	[0,00; 113,22]	[18,99; 89,73]	[2,88; 42,73]	[0,45; 39,53]														
	SD	573,61	655,79	390,85	211,21	198,68															

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Anschlussrehabilitation in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	439																
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,0	466,0	425,5																
	Leistungsausgaben	Mean	52,16	52,93	13,15	40,24																
		CI Mean	[11,52; 92,80]	[0,00; 116,53]	[0,00; 27,85]	[0,85; 79,64]																
	SD	619,09	721,21	161,95	414,60																	
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	478																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,0	465,0																	
	Leistungsausgaben	Mean	105,02	0,00	52,51																	
		CI Mean	[0,00; 213,19]	[0,00; 0,00]	[0,00; 106,60]																	
	SD	1190,15	0,00	595,07																		
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		496,5																		
	Leistungsausgaben	Mean		17,84																		
		CI Mean		[1,99; 33,69]																		
	SD		180,16																			

Tabelle 5.9 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben je Patient für **häusliche Krankenpflege**. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe. Die Daten für die entsprechenden Leistungsausgaben stehen erst ab dem Halbjahr 2006-1 zur Verfügung.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (im Fall der häuslichen Krankenpflege ab 2006-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der gewichteten Patienten dividiert.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 119,5 Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient 257,00 Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich [102,62; 411,38].

Tabelle 5.9 Patienten und zugehörige Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	456	405	371	336	314	292	242	221	206	193	177	166	158	147	139	131	127	121	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl							274,0	233,5	215,5	201,5	186,5	174,0	163,0	153,5	143,0	136,5	129,5	125,5	119,5	
	Leistungsausgaben	Mean	435,06							171,84	205,08	182,89	247,34	235,48	221,90	181,16	246,72	210,05	250,90	220,11	262,86	257,00
		CI Mean	[372,13; 498,00]							[96,48; 247,21]	[112,60; 297,57]	[93,66; 272,13]	[128,71; 365,97]	[120,83; 350,12]	[111,55; 332,25]	[95,82; 266,49]	[109,92; 383,52]	[85,28; 334,81]	[108,71; 393,10]	[77,69; 362,54]	[106,10; 419,62]	[102,62; 411,38]
	SD	1524,98							636,50	721,04	668,36	859,16	798,81	742,65	555,87	864,74	761,22	847,63	826,93	895,99	861,03	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	435	384	344	312	281	254	230	213	206	189	179	171	164	157	149	136	128		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl						273,0	248,5	222,5	210,5	201,5	186,5	175,5	169,0	161,0	154,0	144,5	133,5	127,0		
	Leistungsausgaben	Mean	378,14						165,26	189,23	189,32	209,10	220,69	169,91	120,01	184,80	169,95	183,55	215,73	216,47	257,17	
		CI Mean	[321,83; 434,45]						[85,59; 244,93]	[97,16; 281,29]	[92,61; 286,03]	[102,93; 315,28]	[112,45; 328,94]	[79,39; 260,42]	[46,31; 193,72]	[79,10; 290,51]	[73,48; 266,43]	[82,44; 284,66]	[91,49; 339,96]	[91,60; 341,34]	[117,04; 397,30]	
	SD	1409,45						671,59	740,47	736,00	785,94	783,96	630,70	498,17	701,12	624,55	640,19	761,93	736,12	805,70		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	449	396	356	323	294	269	248	232	221	210	193	185	174	169	159	156			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl					311,0	282,0	257,5	239,0	226,5	214,5	201,5	187,5	178,5	168,5	162,5	155,0	150,0			
	Leistungsausgaben	Mean	146,59				44,57	55,97	48,94	66,35	71,36	90,38	51,33	59,13	72,67	88,52	106,47	118,06	145,44			
		CI Mean	[118,40; 174,78]				[14,49; 74,64]	[17,18; 94,76]	[13,27; 84,62]	[18,18; 114,52]	[19,31; 123,40]	[35,05; 145,71]	[15,49; 87,18]	[10,64; 107,62]	[21,87; 123,47]	[22,92; 154,11]	[37,72; 175,22]	[39,97; 196,15]	[58,60; 232,28]			
	SD	751,99				270,58	332,37	292,06	379,93	399,62	413,45	259,60	338,77	346,28	434,43	447,12	496,01	542,65				
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	449	407	377	349	323	297	288	272	257	246	233	221	212	201	188				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				353,5	327,0	300,5	280,0	270,0	254,5	238,5	227,0	215,0	203,0	193,5	182,0	171,0				
	Leistungsausgaben	Mean	194,99			55,90	62,82	69,03	73,07	107,27	149,80	111,17	159,63	123,79	149,35	90,60	73,65	83,56				
		CI Mean	[162,40; 227,58]			[21,43; 90,37]	[24,35; 101,29]	[23,22; 114,84]	[22,66; 123,48]	[44,60; 169,94]	[71,91; 227,69]	[51,54; 170,81]	[80,79; 238,46]	[51,37; 196,20]	[65,09; 233,62]	[35,72; 145,47]	[18,67; 128,63]	[26,28; 140,84]				
	SD	942,88			330,69	354,94	405,14	430,35	525,42	634,00	469,89	606,01	541,77	612,52	389,45	378,43	382,14					
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	496	455	414	370	336	303	292	273	262	248	232	218	206	198	192					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			400,5	359,0	326,0	298,0	285,0	269,5	257,5	242,5	228,0	214,5	203,0	196,0	188,5					
	Leistungsausgaben	Mean	139,52		85,32	78,54	67,39	52,25	69,63	59,69	27,80	74,97	62,49	66,18	64,29	70,51	134,91					
		CI Mean	[113,55; 165,48]		[42,62; 128,02]	[35,14; 121,95]	[28,23; 106,55]	[16,58; 87,93]	[25,02; 114,25]	[16,73; 102,64]	[5,08; 50,53]	[27,38; 122,56]	[16,12; 108,86]	[16,01; 116,34]	[10,11; 118,48]	[11,86; 129,16]	[47,14; 222,69]					
	SD	780,19		436,00	419,63	360,73	314,22	384,28	359,79	186,04	378,09	357,25	374,83	393,89	418,93	614,85						
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	499	444	402	367	332	321	287	269	253	231	218	207	193	184						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		430,0	387,5	355,0	327,5	309,5	280,5	262,5	245,0	226,5	213,5	203,5	190,0	179,0						
	Leistungsausgaben	Mean	251,29	78,03	85,20	88,36	100,28	139,65	167,61	83,69	121,15	152,51	192,38	171,64	178,19	204,01						
		CI Mean	[217,59; 284,99]	[35,55; 120,50]	[36,85; 133,56]	[40,17; 136,56]	[49,21; 151,34]	[80,59; 198,71]	[98,69; 236,54]	[43,06; 124,32]	[61,08; 181,21]	[85,78; 219,24]	[108,26; 276,49]	[92,43; 250,85]	[91,06; 265,31]	[106,02; 302,01]						
	SD	1032,99	449,38	485,66	463,29	471,49	530,08	588,93	335,88	479,68	512,37	627,10	576,50	612,70	668,90							
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	477	441	396	375	344	327	309	294	280	268	246	233							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,0	465,0	425,5	390,0	365,5	337,5	318,5	304,0	288,5	275,5	259,0	240,5	228,5						
	Leistungsausgaben	Mean	284,54	77,61	82,74	98,93	110,52	128,60	150,56	101,53	194,96	228,21	242,52	156,67	136,65	154,82						
		CI Mean	[241,93; 327,14]	[36,87; 118,36]	[37,33; 128,14]	[45,45; 152,41]	[49,38; 171,65]	[57,12; 200,08]	[73,47; 227,65]	[52,52; 150,54]	[104,05; 285,87]	[128,61; 327,81]	[135,94; 349,10]	[72,55; 240,79]	[51,96; 221,35]	[67,02; 242,62]						
	SD	1357,05	462,05	499,54	562,83	615,94	697,20	722,54	446,25	808,71	863,15	902,57	690,73	670,14	677,16							

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	473	439	413	371	342	313	292	276	262	249	230							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		492,0	461,0	428,5	398,5	361,5	328,5	305,0	284,5	269,0	257,5	240,5	225,5							
	Leistungsausgaben	Mean		322,79	124,12	137,75	143,19	145,50	158,82	109,46	198,61	184,89	191,09	178,08	183,63	194,03						
		CI Mean		[282,98; 362,60]	[74,75; 173,50]	[83,91; 191,58]	[90,18; 196,21]	[90,89; 200,10]	[95,28; 222,36]	[62,13; 156,80]	[122,39; 274,84]	[105,88; 263,89]	[109,53; 272,66]	[101,50; 254,67]	[104,75; 262,51]	[108,09; 279,97]						
	SD		1211,98	558,75	589,74	559,92	556,19	616,36	437,70	679,20	679,92	682,54	626,99	624,10	658,43							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	469	446	408	375	350	328	297	287	270	260								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		493,5	460,5	434,5	397,5	364,0	343,0	318,0	294,5	281,0	266,0	253,0								
	Leistungsausgaben	Mean		233,87	103,54	109,97	100,77	93,79	66,29	147,64	126,05	126,93	129,38	128,16	176,30							
		CI Mean		[197,17; 270,58]	[60,18; 146,89]	[62,99; 156,94]	[54,01; 147,54]	[43,84; 143,74]	[33,59; 98,98]	[82,21; 213,06]	[69,85; 182,25]	[58,38; 195,47]	[60,11; 198,65]	[54,50; 201,83]	[86,88; 265,72]							
	SD		1093,85	491,41	514,29	497,32	508,11	318,22	618,19	511,32	600,14	592,43	612,98	725,66								
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	483	442	401	368	343	311	291	280	266									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,5	468,0	430,0	387,5	358,0	334,0	301,5	283,5	274,0	260,5									
	Leistungsausgaben	Mean		406,33	137,48	175,85	172,40	122,71	208,96	202,64	236,03	237,31	263,22	277,03								
		CI Mean		[355,29; 457,37]	[85,31; 189,64]	[113,65; 238,04]	[107,78; 237,03]	[73,17; 172,25]	[131,59; 286,34]	[129,03; 276,25]	[149,69; 322,38]	[147,27; 327,35]	[159,49; 366,94]	[172,41; 381,64]								
	SD		1449,26	591,82	686,49	683,73	497,54	746,91	686,38	764,93	773,48	875,97	861,47									
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	448	407	381	350	333	314	300										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	470,0	431,0	397,5	368,5	342,5	324,5	306,0	293,5										
	Leistungsausgaben	Mean		262,43	159,63	142,55	80,63	148,28	138,41	134,09	150,77	115,20	146,94									
		CI Mean		[222,36; 302,51]	[104,29; 214,98]	[86,47; 198,64]	[45,67; 115,59]	[88,47; 208,09]	[82,61; 194,22]	[73,98; 194,20]	[86,05; 215,50]	[61,45; 168,95]	[77,87; 216,00]									
	SD		1107,29	628,26	620,39	370,30	608,39	546,57	567,54	594,87	479,70	603,68										
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	488	449	421	402	370	351	334											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	475,5	439,5	412,0	389,0	360,0	343,0	323,0											
	Leistungsausgaben	Mean		372,24	178,17	120,87	187,41	198,00	186,38	180,46	212,26	243,49										
		CI Mean		[319,10; 425,37]	[115,77; 240,57]	[78,62; 163,11]	[120,63; 254,19]	[126,99; 269,01]	[113,02; 259,74]	[108,69; 252,23]	[130,56; 293,96]	[149,72; 337,26]										
	SD		1419,52	705,12	470,00	714,32	735,39	738,20	694,80	772,03	859,83											
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl		397	385	354	328	314	288	276												
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		392,0	374,0	344,5	322,0	302,0	283,0	268,5												
	Leistungsausgaben	Mean		297,74	81,99	127,80	138,05	166,67	172,04	142,69	151,20											
		CI Mean		[240,87; 354,61]	[39,78; 124,21]	[69,17; 186,43]	[72,60; 203,51]	[90,08; 243,26]	[95,19; 248,89]	[73,18; 212,19]	[78,27; 224,12]											
	SD		1262,78	426,43	578,50	619,87	701,21	681,39	596,54	609,66												
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	481	448	421	396	378													
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	467,5	434,0	407,5	385,5	366,5													
	Leistungsausgaben	Mean		239,03	132,20	121,88	113,88	111,03	127,61	124,08												
		CI Mean		[187,30; 290,76]	[75,92; 188,49]	[67,27; 176,49]	[57,10; 170,66]	[55,17; 166,88]	[67,07; 188,15]	[61,55; 186,61]												
	SD		1198,19	634,39	602,39	603,51	575,27	606,46	610,77													
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	472	433	393	375														
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	458,5	420,0	387,0	366,5														
	Leistungsausgaben	Mean		356,27	148,29	178,51	174,53	176,29	183,76													
		CI Mean		[289,33; 423,21]	[95,24; 201,33]	[117,18; 239,83]	[108,88; 240,19]	[106,66; 245,91]	[110,94; 256,58]													
	SD		1379,74	602,11	669,97	686,49	698,83	711,24														
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	445	406															
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	469,0	431,5	397,0															
	Leistungsausgaben	Mean		203,11	92,55	99,14	104,05	101,69														
		CI Mean		[152,94; 253,27]	[55,74; 129,37]	[58,63; 139,66]	[60,71; 147,38]	[54,55; 148,83]														
	SD		921,97	417,86	447,61	459,29	479,19															

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für häusliche Krankenpflege in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	439																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,0	466,0	425,5																	
	Leistungsausgaben	Mean	156,73	69,78	72,95	84,29																	
		CI Mean	[102,84; 210,61]	[37,19; 102,37]	[37,79; 108,12]	[42,99; 125,59]																	
	SD	820,84	369,55	387,32	434,68																		
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	478																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,0	465,0																		
	Leistungsausgaben	Mean	117,44	72,75	58,72																		
		CI Mean	[49,45; 185,42]	[39,62; 105,88]	[24,73; 92,71]																		
	SD	747,94	373,79	373,97																			
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500																			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		496,5																			
	Leistungsausgaben	Mean		154,79																			
		CI Mean		[99,74; 209,84]																			
	SD		625,84																				

Tabelle 5.10 gibt Auskunft über die durchschnittlichen Ausgaben für **Krankengeld** (ohne Kinderkrankengeld) bei Patienten mit Krankengeldanspruch. Der Krankengeldanspruch wurde dabei jeweils zum 1.1. eines Kalenderjahres erhoben, erstmalig im Jahr 2008. Fehlten die Angaben über den Krankengeldanspruch zum Jahresersten, wurden die Angaben vom Jahresersten des vorangegangenen Jahres übernommen. Die Auswertungen wurden unter der Annahme vorgenommen, dass ein zum 1.1. ermittelter Krankengeldanspruch im gesamten Vorjahr bestand. Bei Patienten, die zum 1.1. 2009 Anspruch auf Krankengeld hatten, wurde demnach ein Krankengeldanspruch für das Berichtshalbjahr 2008-1 angenommen.⁹

Die Angaben für diese Tabelle basieren daher nur auf einer Teilmenge der Stichprobe. Im Unterschied zu den mittleren Ausgaben in den anderen Leistungsbereichen und bei den Leistungsausgaben insgesamt werden also nicht alle Patienten der Stichprobe berücksichtigt.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren Patienten mit Krankengeldanspruch das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Zusätzlich zum Mittelwert für die einzelnen Halbjahre werden – bezogen auf den gesamten Auswertungszeitraum, für den Leistungsausgaben vorliegen (frühestens ab 2004-1), jedoch ohne Beitrittsjahr – die durchschnittlichen Kosten pro Auswertungsjahr ermittelt. Dazu werden für jede Kohorte die Ausgaben aufsummiert und durch die Summe der Auswertungsjahre der Patienten dividiert.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der 3 auswertbaren Patienten mit Krankengeldanspruch in der Stichprobe die durchschnittlichen Ausgaben für Krankengeld je Anspruchsberechtigtem 0,00 Euro. Das 95%-Konfidenzintervall umfasst dabei den Wertebereich [0,00; 0,00].

Tabelle 5.10 Patienten und zugehörige Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)¹⁰

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)*	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	456	405	371	336	314	292	242	221	206	193	177	166	158	147	139	131	127	121	
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl				16	16	16	16	13	10	8	8	4	4	4	4	4	3	3	3	3	
	Leistungsausgaben	Mean	592,25			0,00	278,64	259,72	199,25	821,08	1074,53	805,20	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CI Mean	[140,13; 1044,38]			[0,00; 0,00]	[0,00; 824,77]	[0,00; 768,77]	[0,00; 466,24]	[0,00; 2430,39]	[0,00; 2484,74]	[0,00; 2383,39]	[0,00; 225,94]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]
	SD	2690,15			0,00	1114,56	1038,88	544,86	2960,43	2275,24	2277,45	215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	435	384	344	312	281	254	230	213	206	189	179	171	164	157	149	136	128		
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl			17	14	13	9	7	7	6	5	2	2	2	2	3	3	2	2	2		
	Leistungsausgaben	Mean	205,92		91,49	0,00	71,99	779,40	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CI Mean	[0,00; 494,11]		[0,00; 270,81]	[0,00; 0,00]	[0,00; 169,05]	[0,00; 2307,02]	[0,00; 247,18]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	
	SD	1455,55		377,22	0,00	178,55	2338,20	220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	449	396	356	323	294	269	248	232	221	210	193	185	174	169	159	156			
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl			47	43	37	32	25	25	21	20	19	19	16	14	11	11	10	9	9		
	Leistungsausgaben	Mean	188,29	290,31	105,05	49,11	20,44	0,00	21,44	24,46	9,06	62,74	6,95	0,00	19,45	0,00	837,51	15,71	136,56	1089,51			
		CI Mean	[20,12; 356,46]	[0,00; 582,67]	[0,00; 241,45]	[0,00; 113,58]	[0,00; 51,70]	[0,00; 0,00]	[0,00; 63,47]	[0,00; 72,39]	[0,00; 26,83]	[0,00; 172,03]	[0,00; 20,58]	[0,00; 0,00]	[0,00; 45,36]	[0,00; 0,00]	[0,00; 2446,03]	[0,00; 46,49]	[0,00; 362,27]	[0,00; 3224,96]			
	SD	1537,23	1022,59	456,34	200,06	90,22	0,00	107,22	112,07	40,53	243,05	30,30	0,00	49,46	0,00	2721,86	49,66	345,47	3268,54				
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	449	407	377	349	323	297	288	272	257	246	233	221	212	201	188				
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl			41	29	24	20	19	12	10	10	9	9	8	8	7	7	8				
	Leistungsausgaben	Mean	271,91	171,15	347,67	4,66	87,96	0,00	0,00	114,53	0,00	299,88	289,60	285,03	0,00	0,00	0,00	199,74	415,98				
		CI Mean	[92,01; 451,81]	[0,00; 375,52]	[0,00; 764,45]	[0,00; 13,78]	[0,00; 260,37]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 339,01]	[0,00; 0,00]	[0,00; 887,65]	[0,00; 857,20]	[0,00; 843,68]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 591,22]	[0,00; 1231,30]				
	SD	1261,84	667,63	1145,12	22,80	393,38	0,00	0,00	362,18	0,00	899,65	868,79	855,08	0,00	0,00	0,00	528,45	1176,57					
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl		496	455	414	370	336	303	292	273	262	248	232	218	206	198	192					
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl			48	38	30	27	20	18	17	17	14	13	12	11	11	9					
	Leistungsausgaben	Mean	555,12	278,10	218,19	0,00	64,72	0,00	0,00	0,00	471,88	600,55	402,22	317,68	526,34	1284,08	1219,22	0,00					
		CI Mean	[216,53; 893,72]	[0,00; 603,96]	[0,00; 516,92]	[0,00; 0,00]	[0,00; 191,56]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1396,76]	[0,00; 1759,47]	[0,00; 937,24]	[0,00; 940,33]	[0,00; 1357,74]	[0,00; 3258,31]	[0,00; 3164,75]	[0,00; 0,00]					
	SD	2720,51	1151,84	939,54	0,00	336,28	0,00	0,00	0,00	1945,61	2212,39	984,22	1100,48	1406,85	3340,69	3292,14	0,00						
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl		499	444	402	367	332	321	287	269	253	231	218	207	193	184						
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl			34	29	27	22	21	20	19	16	15	15	13	13	11						
	Leistungsausgaben	Mean	273,63	216,53	52,89	0,00	2,29	21,30	231,36	0,00	156,19	475,55	450,78	375,02	0,00	199,55	63,88						
		CI Mean	[101,45; 445,81]	[0,00; 474,87]	[0,00; 120,33]	[0,00; 0,00]	[0,00; 6,77]	[0,00; 44,61]	[0,00; 536,04]	[0,00; 0,00]	[0,00; 370,32]	[0,00; 1258,02]	[0,00; 1053,82]	[0,00; 1091,13]	[0,00; 0,00]	[0,00; 502,94]	[0,00; 189,10]						
	SD	1352,39	768,54	185,29	0,00	10,72	54,50	695,17	0,00	436,99	1546,18	1230,69	1415,04	0,00	558,12	211,88							

⁹ Für die vorigen Berichtshalbjahre (bis 2007-2) wurde angenommen, dass - mangels voriger Erhebung des Krankengeldanspruchs - der Krankengeldanspruch vom 1.1. 2008 gilt.

¹⁰ berechnet unter der Annahme eines Krankengeldanspruchs wie im Begleittext zu Tabelle 5.10 beschrieben

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)*	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	477	441	396	375	344	327	309	294	280	268	246	233						
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		34	32	20	19	13	13	13	13	10	10	8	8	6						
	Leistungsausgaben	Mean	678,22	165,71	168,38	259,78	384,33	676,41	285,80	929,18	137,54	9,36	188,77	31,72	253,12	1238,52						
		CI Mean	[343,53; 1012,92]	[0,00; 478,00]	[0,00; 498,41]	[0,00; 768,94]	[0,00; 1019,06]	[0,00; 1625,64]	[0,00; 681,94]	[145,13; 1713,22]	[0,00; 407,13]	[0,00; 27,71]	[0,00; 527,38]	[0,00; 74,11]	[0,00; 749,24]	[0,00; 2660,97]						
	SD	2193,51	929,05	952,52	1161,75	1411,57	1746,16	728,73	1442,31	495,92	29,61	546,32	61,17	715,93	1777,69							
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	473	439	413	371	342	313	292	276	262	249	230							
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		32	23	22	15	14	14	13	11	11	9	9	8							
	Leistungsausgaben	Mean	313,25	34,10	234,14	130,58	337,11	423,76	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,83						
		CI Mean	[74,37; 552,12]	[0,00; 100,95]	[0,00; 588,14]	[0,00; 386,52]	[0,00; 763,05]	[0,00; 1254,32]	[0,00; 0,00]	[0,00; 130,01]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1301,89]						
	SD	1487,69	192,92	866,18	612,48	841,65	1585,55	0,00	158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1244,02							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	469	446	408	375	350	328	297	287	270	260								
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		38	37	37	35	27	27	19	17	17	17	16								
	Leistungsausgaben	Mean	438,26	326,60	229,25	68,84	259,52	498,87	176,96	463,62	434,96	0,00	0,00	0,00								
		CI Mean	[183,17; 693,35]	[0,00; 797,00]	[0,00; 606,71]	[0,00; 173,14]	[0,00; 625,63]	[0,00; 1027,39]	[0,00; 523,81]	[0,00; 1089,91]	[0,00; 1287,50]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]							
	SD	2053,67	1479,45	1171,44	323,68	1105,08	1401,17	919,53	1392,81	1793,41	0,00	0,00	0,00									
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	483	442	401	368	343	311	291	280	266									
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		37	35	35	30	29	26	25	21	21	18									
	Leistungsausgaben	Mean	331,71	412,65	199,80	100,80	107,74	403,81	409,70	7,13	15,20	0,00	177,29									
		CI Mean	[77,90; 585,51]	[0,00; 1167,31]	[0,00; 405,88]	[0,00; 236,66]	[0,00; 260,37]	[0,00; 1074,56]	[0,00; 1212,71]	[0,00; 21,11]	[0,00; 44,99]	[0,00; 0,00]	[0,00; 469,87]									
	SD	2006,09	2342,03	622,03	410,08	426,51	1842,89	2089,06	35,66	69,66	0,00	633,33										
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	448	407	381	350	333	314	300										
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		43	43	42	39	35	35	34	33	30										
	Leistungsausgaben	Mean	617,50	5,48	0,54	0,00	183,48	918,09	417,87	599,75	343,41	139,51										
		CI Mean	[327,56; 907,45]	[0,00; 16,22]	[0,00; 1,60]	[0,00; 0,00]	[0,00; 432,07]	[235,76; 1600,43]	[4,34; 831,39]	[0,00; 1231,98]	[0,00; 915,08]	[0,00; 329,66]										
	SD	2523,53	35,93	3,53	0,00	792,08	2059,57	1248,19	1880,87	1675,53	531,38											
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	488	449	421	402	370	351	334											
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		51	48	45	37	36	27	26	21											
	Leistungsausgaben	Mean	931,20	478,63	961,50	481,04	586,92	459,02	106,36	0,00	134,93											
		CI Mean	[536,08; 1326,33]	[7,65; 949,61]	[265,00; 1657,99]	[44,65; 917,42]	[129,40; 1044,43]	[0,00; 976,44]	[0,00; 314,81]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 399,38]										
	SD	3123,10	1716,06	2461,97	1493,55	1419,86	1583,95	552,64	0,00	618,31												
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl		397	385	354	328	314	288	276												
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		45	45	29	29	32	28	21												
	Leistungsausgaben	Mean	606,60	291,63	474,49	494,73	304,00	352,89	0,00	0,00												
		CI Mean	[206,03; 1007,18]	[44,65; 538,62]	[0,00; 957,18]	[0,00; 1142,90]	[0,00; 897,18]	[0,00; 840,43]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]											
	SD	2772,26	845,32	1652,04	1780,86	1629,77	1407,12	0,00	0,00													
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	481	448	421	396	378													
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		50	41	40	35	33	32													
	Leistungsausgaben	Mean	766,02	410,97	304,62	562,47	359,42	406,83	260,36													
		CI Mean	[352,65; 1179,40]	[114,65; 707,29]	[0,00; 647,53]	[97,84; 1027,09]	[0,00; 920,86]	[0,00; 1001,71]	[0,00; 586,48]													
	SD	2837,46	1069,03	1120,24	1499,26	1694,66	1743,53	941,22														
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	472	433	393	375														
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		49	46	40	37	29														
	Leistungsausgaben	Mean	365,94	178,32	69,80	115,80	467,62	91,96														
		CI Mean	[115,34; 616,54]	[0,00; 380,49]	[0,00; 168,74]	[0,00; 313,84]	[45,68; 889,56]	[0,00; 272,20]														
	SD	1576,34	722,06	342,36	639,02	1309,46	495,22															

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben für Krankengeld – ohne Kinderkrankengeld – bei Anspruchsberechtigten (Stichprobe)*	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	445	406																
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		71	74	69	57																
	Leistungsausgaben	Mean	549,78	357,27	343,93	165,23	318,00																
		CI Mean	[196,64; 902,92]	[0,00; 722,05]	[10,98; 676,88]	[0,00; 424,42]	[0,47; 635,52]																
		SD	2548,04	1568,19	1461,32	1098,46	1223,10																
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	439																	
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		69	64	54																	
	Leistungsausgaben	Mean	398,69	177,24	277,14	107,15																	
		CI Mean	[75,93; 721,45]	[0,00; 384,44]	[1,02; 553,26]	[0,00; 237,84]																	
		SD	1788,79	878,15	1127,02	490,01																	
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	478																		
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		70	57																		
	Leistungsausgaben	Mean	794,87	245,86	397,44																		
		CI Mean	[0,00; 1715,84]	[27,03; 464,68]	[0,00; 857,92]																		
		SD	3547,53	934,09	1773,77																		
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500																			
	auswertbar mit Krankengeldanspruch*	Anzahl		73																			
	Leistungsausgaben	Mean		344,76																			
		CI Mean		[27,86; 661,66]																			
		SD		1381,41																			

Tabelle 5.11 gibt Auskunft über die **durchschnittlichen Gesamtausgaben** je Patient für alle bislang einzeln ausgewiesenen Leistungsbereiche, wobei Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege erst ab 2006 berücksichtigt werden. Patienten, die während des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind, waren dabei entsprechend zu gewichten (siehe einführende Erläuterungen zu Berichtsteil II). Die Angaben in der Tabelle basieren auf einer Stichprobe. Das arithmetische Mittel der Gesamtausgaben in Tabelle 5.11 entspricht nicht der Summe der durchschnittlichen Ausgaben nach Leistungsbereichen, die in den vorangegangenen Tabellen ausgewiesen wurden. Das liegt daran, dass die Durchschnittsausgaben teils für unterschiedliche Personengruppen zu ermitteln waren. In der Regel wurden die Durchschnittsausgaben für alle auswertbaren und gewichteten Patienten der Stichprobe berechnet. Davon abweichend waren in Tabelle 5.10 die durchschnittlichen Krankengeldausgaben nicht für die gesamte Stichprobe zu ermitteln, sondern nur für die Patienten mit Krankengeldanspruch laut Stichtagsregelung wie im Begleittext beschrieben wird.

Ausgewiesen werden für die auswertbaren und gewichteten Patienten das arithmetische Mittel, dessen 95%-Konfidenzintervall und die Standardabweichung. Diese Angaben beziehen sich – wie bei der Darstellung der einzelnen Leistungsbereiche – auf die Ausgaben im jeweiligen Berichtshalbjahr bzw. im Durchschnitt der Patientenjahre. Bei der Interpretation der Gesamtausgaben im jeweiligen Berichtshalbjahr ist zu beachten, dass die Ausgaben für Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege erst ab 2006-1 enthalten sind.

Zusätzlich wird in dieser Tabelle das arithmetische Mittel der kumulierten Leistungsausgaben im Zeitverlauf dargestellt. In diese Durchschnittsbildung wurden alle Patienten einbezogen, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren („Restkohorte“). Da im Berichtshalbjahr – nicht aber in den davor liegenden Halbjahren – die Gewichtungsregeln für verstorbene oder aus anderem Grund ausgeschiedene Kohortenmitglieder zu beachten sind, sind nicht einfach die Leistungsausgaben der Restkohorte bis zum aktuellen Berichtshalbjahr aufzusummieren und durch die Anzahl der Kohortenmitglieder zu teilen. Stattdessen sind Durchschnittswerte für alle betrachteten Halbjahre zu bilden und aufzusummieren. Umfasst beispielsweise eine Kohorte im Berichtshalbjahr 8.000 Patienten ungewichtet und 7.500 Patienten gewichtet und soll das kumulierte arithmetische Mittel für das dritte Halbjahr berechnet werden, ist folgendermaßen vorzugehen: Das arithmetische Mittel des ersten und zweiten Halbjahres wird jeweils gebildet, indem die jeweilige Summe der Leistungsausgaben der 8.000 Kohortenmitglieder durch ihre ungewichtete Anzahl dividiert wird. Das arithmetische Mittel des dritten Halbjahres – des Berichtshalbjahres – wird gebildet, indem die Summe der Leistungsausgaben der Kohortenmitglieder durch ihre gewichtete Anzahl geteilt wird, also durch 7.500. In der Tabelle wird dann als kumulierter Wert die Summe dieser drei Teilwerte ausgewiesen.

In der Kohorte 2003-1 betragen im letzten Berichtshalbjahr auf Basis der Stichprobe von 119,5 Patienten (auswertbar und gewichtet) die durchschnittlichen Ausgaben je Patient 4482,68 Euro. Die bis einschließlich des letzten Berichtshalbjahres kumulierten Ausgaben lagen durchschnittlich bei 48841,83 Euro.

Tabelle 5.11 Patienten und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	456	405	371	336	314	292	242	221	206	193	177	166	158	147	139	131	127	121
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl				395,5	360,0	329,0	308,5	274,0	233,5	215,5	201,5	186,5	174,0	163,0	153,5	143,0	136,5	129,5	125,5	119,5
	Leistungsausgaben	Mean	5951,59			2134,89	2603,31	2072,84	2335,41	2604,02	2851,43	2809,67	3222,14	3392,13	3751,54	3426,56	3543,20	3732,01	3925,67	3909,92	4301,24	4482,68
		CI Mean	[5593,61; 6309,57]			[1773,40; 2496,38]	[1974,31; 3232,30]	[1685,80; 2459,87]	[1917,40; 2753,41]	[2110,13; 3097,90]	[2198,11; 3504,76]	[2244,54; 3374,79]	[2558,43; 3885,85]	[2717,27; 4066,99]	[2633,68; 4869,41]	[2601,55; 4251,57]	[2681,34; 4405,06]	[2461,80; 5002,21]	[2746,03; 5105,31]	[2355,71; 5464,12]	[2983,32; 5619,17]	[3114,59; 5850,76]
		SD	11032,21			3667,87	6088,93	3581,73	3745,88	4171,05	5093,53	4232,67	4806,84	4702,16	7523,29	5373,98	5447,98	7749,70	7031,67	9023,73	7532,79	7630,29
Leistungsausgaben kumuliert	Mean			2134,89	4598,15	6162,28	8207,19	10185,26	12417,66	14105,52	16802,75	19717,10	23055,95	25990,35	29312,36	32793,40	36249,08	39298,94	44439,39	48841,83		
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	435	384	344	312	281	254	230	213	206	189	179	171	164	157	149	136	128	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl			424,0	374,0	335,0	300,5	273,0	248,5	222,5	210,5	201,5	186,5	175,5	169,0	161,0	154,0	144,5	133,5	127,0	
	Leistungsausgaben	Mean	5116,61		2180,45	2322,21	2386,16	2650,17	2664,35	2095,78	2339,71	2564,52	2680,80	2855,60	2668,67	2863,76	2894,78	3298,90	3175,31	2554,29	2589,20	
		CI Mean	[4816,19; 5417,02]		[1763,94; 2596,95]	[1829,08; 2815,34]	[1875,16; 2897,15]	[2023,58; 3276,76]	[1900,11; 3428,59]	[1595,12; 2596,44]	[1784,31; 2895,11]	[2091,70; 3037,34]	[2043,79; 3317,81]	[2162,35; 3548,85]	[2036,98; 3300,36]	[2115,72; 3611,80]	[2172,77; 3616,79]	[2451,83; 4145,97]	[2394,18; 3956,45]	[1984,25; 3124,33]	[1881,35; 3297,06]	
		SD	9498,58		4375,69	4865,68	4771,84	5541,79	6442,50	4026,71	4226,80	3499,97	4613,47	4830,28	4269,59	4961,50	4674,14	5363,19	4790,74	3360,40	4069,97	
Leistungsausgaben kumuliert	Mean		2180,45	4272,41	6466,18	9121,55	10724,13	11800,37	14213,20	17194,80	18215,76	20244,19	22873,50	24409,86	26840,66	29356,16	32262,48	31539,60	33940,42			
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	449	396	356	323	294	269	248	232	221	210	193	185	174	169	159	156		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		487,0	438,0	386,0	345,0	311,0	282,0	257,5	239,0	226,5	214,5	201,5	187,5	178,5	168,5	162,5	155,0	150,0		
	Leistungsausgaben	Mean	5103,38	1785,24	1807,78	2639,05	2289,68	2467,22	2255,12	2336,48	2941,89	2461,07	2514,71	2521,34	2484,64	3082,71	3148,75	2958,62	2849,39	3845,35		
		CI Mean	[4764,14; 5442,61]	[1536,73; 2033,76]	[1578,04; 2037,51]	[1728,46; 3549,63]	[1828,05; 2751,32]	[1986,02; 2948,42]	[1834,01; 2676,24]	[1752,92; 2920,04]	[2091,42; 3792,36]	[1974,07; 2948,06]	[2020,33; 3009,08]	[1871,59; 3171,09]	[1866,46; 3102,82]	[2250,46; 3914,96]	[2017,14; 4280,36]	[2085,48; 3831,76]	[2057,83; 3640,96]	[2689,88; 5000,83]		
		SD	10812,95	2798,06	2453,01	9127,62	4374,75	4329,62	3608,05	4777,68	6708,17	3739,38	3694,17	4705,71	4318,79	5673,06	7494,48	5678,76	5028,04	7220,21		
Leistungsausgaben kumuliert	Mean	1785,24	3499,49	6040,98	7684,22	9570,33	11313,87	13528,98	15733,00	17516,24	19675,42	21210,99	23342,26	25347,77	28277,30	31014,01	33196,75	35695,16				
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	449	407	377	349	323	297	288	272	257	246	233	221	212	201	188			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,5	436,5	396,0	353,5	327,0	300,5	280,0	270,0	254,5	238,5	227,0	215,0	203,0	193,5	182,0	171,0			
	Leistungsausgaben	Mean	4876,74	2180,54	2004,20	2148,87	1685,11	2301,69	2480,98	2597,01	2242,15	2257,72	2287,84	2835,47	2929,37	3219,11	3069,55	3453,86	2623,27			
		CI Mean	[4567,64; 5185,85]	[1811,36; 2549,71]	[1621,91; 2386,48]	[1674,70; 2623,05]	[1401,05; 1969,17]	[1794,78; 2808,59]	[2017,51; 2944,45]	[1986,93; 3207,10]	[1811,77; 2672,53]	[1847,30; 2668,13]	[1863,03; 2712,65]	[2171,91; 3499,03]	[2199,29; 3659,46]	[1966,42; 4471,80]	[2419,19; 3719,91]	[2044,35; 4863,37]	[1976,80; 3269,75]			
		SD	10033,99	4162,98	4074,97	4814,25	2724,90	4676,78	4099,09	5208,53	3608,10	3340,49	3347,21	5100,76	5461,79	9106,15	4615,71	9701,68	4313,13			
Leistungsausgaben kumuliert	Mean	2180,54	4124,82	5884,98	7220,65	9235,15	11226,91	13458,90	15144,01	17196,58	19627,53	21656,65	23483,14	26358,22	28974,13	28054,80	29660,65					
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl		496	455	414	370	336	303	292	273	262	248	232	218	206	198	192				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		487,5	442,5	400,5	359,0	326,0	298,0	285,0	269,5	257,5	242,5	228,0	214,5	203,0	196,0	188,5				
	Leistungsausgaben	Mean	5174,59	2188,98	2014,60	2705,19	2379,62	2915,48	2455,29	2360,92	2353,77	2595,26	2883,09	2762,71	2694,82	2965,46	2556,12	3293,17				
		CI Mean	[4819,83; 5529,35]	[1832,16; 2545,80]	[1703,93; 2325,26]	[1860,85; 3549,53]	[1866,50; 2892,74]	[2272,55; 3558,41]	[1954,99; 2955,59]	[1768,84; 2953,00]	[1802,27; 2905,27]	[1994,32; 3196,19]	[1982,04; 3784,13]	[2066,00; 3459,42]	[1935,52; 3454,13]	[2253,64; 3677,28]	[1920,55; 3191,70]	[2265,82; 4320,53]				
		SD	11318,70	4019,58	3334,22	8621,12	4960,29	5922,63	4406,39	5099,75	4619,21	4919,95	7158,87	5367,42	5673,79	5174,43	4539,81	7196,49				
Leistungsausgaben kumuliert	Mean	2188,98	4133,06	6509,90	8336,31	10430,56	12174,51	13712,02	15370,17	17714,68	20329,20	22831,40	24844,67	25937,09	27609,84	30816,82						
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl		499	444	402	367	332	321	287	269	253	231	218	207	193	184					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		482,5	430,0	387,5	355,0	327,5	309,5	280,5	262,5	245,0	226,5	213,5	203,5	190,0	179,0					
	Leistungsausgaben	Mean	5848,07	2299,62	2408,27	2581,45	2719,31	2717,35	3488,27	3316,36	2934,68	3539,57	2626,05	2929,91	3154,78	2898,99	3374,68					
		CI Mean	[5474,83; 6221,32]	[1883,57; 2715,68]	[1978,82; 2837,72]	[2109,82; 3053,08]	[2089,84; 3348,77]	[2145,34; 3289,36]	[2760,23; 4216,31]	[2497,65; 4135,06]	[2332,98; 3536,38]	[2612,45; 4466,69]	[2073,27; 3178,87]	[2218,48; 3641,34]	[2073,36; 4236,20]	[2239,55; 3558,42]	[2622,02; 4127,35]					
		SD	11441,71	4662,78	4543,47	4736,74	6051,04	5281,43	6534,76	6995,82	4973,82	7403,92	4244,53	5303,65	7870,80	4637,58	5137,76					
Leistungsausgaben kumuliert	Mean	2299,62	4293,38	6698,00	9016,08	11172,89	14681,14	17148,34	18580,04	20884,04	22191,81	24553,23	27366,50	29929,88	31145,92							

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	477	441	396	375	344	327	309	294	280	268	246	233					
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,0	465,0	425,5	390,0	365,5	337,5	318,5	304,0	288,5	275,5	259,0	240,5	228,5					
	Leistungsausgaben	Mean	5772,92	2631,18	2622,26	2249,48	2475,01	2542,25	2851,73	2453,84	2923,11	3304,99	3524,00	4021,12	3209,65	3545,31					
		CI Mean	[5452,17; 6093,67]	[1956,52; 3305,83]	[2219,28; 3025,23]	[1877,45; 2621,51]	[1984,03; 2965,98]	[2181,32; 2903,18]	[2377,08; 3326,38]	[2033,21; 2874,48]	[2462,99; 3383,24]	[2726,12; 3883,86]	[2799,59; 4248,41]	[2936,01; 5106,23]	[2485,64; 3933,67]	[2740,88; 4349,74]					
		SD	10217,21	7650,50	4433,48	3915,32	4946,93	3520,53	4448,94	3830,02	4093,17	5016,44	6134,67	8909,82	5728,60	6204,06					
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2631,18</i>	<i>5114,29</i>	<i>6648,32</i>	<i>8528,06</i>	<i>11002,72</i>	<i>12824,24</i>	<i>14777,96</i>	<i>17332,16</i>	<i>20570,03</i>	<i>23302,21</i>	<i>26264,78</i>	<i>26956,87</i>	<i>29279,91</i>						
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	473	439	413	371	342	313	292	276	262	249	230						
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		492,0	461,0	428,5	398,5	361,5	328,5	305,0	284,5	269,0	257,5	240,5	225,5						
	Leistungsausgaben	Mean	6334,42	2574,79	2900,50	2845,69	3604,29	3230,27	3236,01	2986,69	3128,67	3216,06	3821,99	2676,75	3359,55						
		CI Mean	[5913,66; 6755,17]	[2165,65; 2983,93]	[2371,63; 3429,37]	[2330,09; 3361,29]	[2843,15; 4365,43]	[2464,10; 3996,43]	[2466,94; 4005,07]	[2401,75; 3571,64]	[2483,63; 3773,72]	[2588,11; 3844,01]	[2830,55; 4813,43]	[2153,35; 3200,15]	[2415,50; 4303,60]						
		SD	12808,39	4630,15	5793,53	5445,44	7752,13	7432,25	7111,73	5212,07	5551,05	5254,69	8117,07	4141,31	7232,92						
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2574,79</i>	<i>5417,19</i>	<i>8040,35</i>	<i>11396,41</i>	<i>13810,16</i>	<i>15677,93</i>	<i>16813,22</i>	<i>19366,09</i>	<i>21787,46</i>	<i>23780,47</i>	<i>25193,81</i>	<i>25572,83</i>							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	469	446	408	375	350	328	297	287	270	260							
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		493,5	460,5	434,5	397,5	364,0	343,0	318,0	294,5	281,0	266,0	253,0							
	Leistungsausgaben	Mean	5711,48	2666,36	2537,50	2759,16	2903,16	3239,75	2563,31	2789,08	2583,31	3273,76	3101,32	3048,72							
		CI Mean	[5320,95; 6102,00]	[2089,32; 3243,39]	[2066,19; 3008,81]	[2258,10; 3260,22]	[2360,79; 3445,53]	[2460,47; 4019,02]	[1917,33; 3209,28]	[2212,70; 3365,45]	[2015,17; 3151,45]	[2509,88; 4037,65]	[2411,10; 3791,53]	[2338,16; 3759,28]							
		SD	11638,54	6540,17	5160,17	5328,78	5517,08	7585,52	6103,87	5244,00	4974,40	6533,21	5743,42	5766,40							
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2666,36</i>	<i>4972,48</i>	<i>7394,50</i>	<i>10072,23</i>	<i>12726,29</i>	<i>14244,37</i>	<i>16548,02</i>	<i>17455,66</i>	<i>20888,98</i>	<i>23241,79</i>	<i>23965,39</i>								
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	483	442	401	368	343	311	291	280	266								
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,5	468,0	430,0	387,5	358,0	334,0	301,5	283,5	274,0	260,5								
	Leistungsausgaben	Mean	5733,07	2858,46	2862,46	3334,75	2998,32	2990,06	2908,53	2333,58	2711,80	2741,30	2598,31								
		CI Mean	[5246,80; 6219,35]	[2137,67; 3579,25]	[2369,87; 3355,06]	[2231,22; 4438,28]	[2002,69; 3993,94]	[2456,78; 3523,33]	[2400,75; 3416,31]	[1961,17; 2705,98]	[2165,59; 3258,02]	[2195,51; 3287,10]	[2110,16; 3086,46]								
		SD	13806,90	8177,75	5436,97	11675,15	9999,44	5147,97	4734,70	3299,18	4692,30	4609,45	4019,77								
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2858,46</i>	<i>5697,71</i>	<i>8681,76</i>	<i>10159,48</i>	<i>12104,86</i>	<i>14185,04</i>	<i>14990,22</i>	<i>17107,47</i>	<i>19564,19</i>	<i>22064,99</i>									
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl		500	482	448	407	381	350	333	314	300									
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	470,0	431,0	397,5	368,5	342,5	324,5	306,0	293,5									
	Leistungsausgaben	Mean	5280,72	2365,28	2060,11	2306,69	2684,00	2910,22	2594,11	2818,62	3053,88	3087,35									
		CI Mean	[4911,72; 5649,71]	[2012,88; 2717,68]	[1775,99; 2344,22]	[1927,20; 2686,19]	[2246,54; 3121,46]	[2366,18; 3454,27]	[2087,27; 3100,94]	[2162,17; 3175,07]	[2297,80; 3809,96]	[2339,02; 3835,68]									
		SD	10196,67	4000,18	3142,59	4019,63	4449,93	5328,41	4785,62	6033,25	6747,97	6540,98									
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2365,28</i>	<i>4318,77</i>	<i>6412,95</i>	<i>8757,35</i>	<i>11087,71</i>	<i>12944,72</i>	<i>15309,67</i>	<i>17908,91</i>	<i>20163,87</i>										
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl		500	488	449	421	402	370	351	334										
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		490,5	475,5	439,5	412,0	389,0	360,0	343,0	323,0										
	Leistungsausgaben	Mean	5647,89	2414,45	2777,15	2725,65	2740,24	2710,57	3198,64	2887,86	2784,38										
		CI Mean	[5225,89; 6069,89]	[2069,32; 2759,57]	[2347,22; 3207,09]	[2313,38; 3137,92]	[2288,99; 3191,49]	[2263,17; 3157,98]	[2178,34; 4218,94]	[2315,91; 3459,81]	[2321,45; 3247,31]										
		SD	11274,32	3899,82	4783,24	4409,65	4673,16	4502,13	9876,94	5404,40	4244,85										
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2414,45</i>	<i>5079,57</i>	<i>7516,90</i>	<i>9579,79</i>	<i>12113,75</i>	<i>14809,00</i>	<i>16643,94</i>	<i>18730,95</i>											
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl		397	385	354	328	314	288	276											
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		392,0	374,0	344,5	322,0	302,0	283,0	268,5											
	Leistungsausgaben	Mean	6097,93	3032,37	2917,95	3080,24	3210,28	3331,82	3024,27	2705,76											
		CI Mean	[5526,16; 6669,69]	[2398,99; 3665,75]	[2397,48; 3438,41]	[2454,30; 3706,18]	[2351,37; 4069,19]	[2478,77; 4184,86]	[2241,72; 3806,83]	[2214,50; 3197,01]											
		SD	12695,56	6398,11	5135,36	5927,53	7863,56	7563,45	6716,62	4106,98											
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>3032,37</i>	<i>5696,93</i>	<i>8489,75</i>	<i>10824,59</i>	<i>13644,36</i>	<i>14439,90</i>	<i>15757,81</i>												

EZ	Patienten und zugehörige Ausgaben der vorstehenden Leistungsbereiche - Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege ab 2006 - insgesamt in Euro (Stichprobe)	Durchschnittskosten/Jahr	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	481	448	421	396	378															
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		488,0	467,5	434,0	407,5	385,5	366,5														
	Leistungsausgaben	Mean	4993,58	2731,21	2237,07	2646,14	2594,71	2304,84	2744,26														
		CI Mean	[4586,23; 5400,94]	[2283,02; 3179,40]	[1876,93; 2597,21]	[2180,65; 3111,64]	[2158,40; 3031,02]	[1852,85; 2756,82]	[2164,69; 3323,84]														
		SD	9435,35	5051,48	3972,94	4947,68	4493,69	4527,72	5660,93														
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2731,21</i>	<i>4552,18</i>	<i>6903,69</i>	<i>9272,47</i>	<i>11084,64</i>	<i>13442,16</i>															
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	472	433	393	375																
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	458,5	420,0	387,0	366,5															
	Leistungsausgaben	Mean	5861,62	2430,84	2909,77	2852,20	3199,75	2763,22															
		CI Mean	[5218,57; 6504,66]	[2065,04; 2796,64]	[2417,12; 3402,43]	[2098,16; 3606,24]	[2500,47; 3899,03]	[2146,36; 3380,08]															
		SD	13254,00	4152,29	5382,20	7884,29	7018,60	6025,14															
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2430,84</i>	<i>5232,15</i>	<i>7751,02</i>	<i>10302,10</i>	<i>12735,52</i>																
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	482	445	406																	
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		495,0	469,0	431,5	397,0																
	Leistungsausgaben	Mean	5258,94	2347,56	2584,91	2788,21	2509,59																
		CI Mean	[4724,98; 5792,90]	[1989,73; 2705,40]	[2189,30; 2980,51]	[2228,87; 3347,55]	[2092,25; 2926,93]																
		SD	9813,10	4061,89	4371,09	5928,04	4242,56																
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2347,56</i>	<i>4770,50</i>	<i>7364,33</i>	<i>9249,46</i>																	
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500	482	439																		
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		494,0	466,0	425,5																	
	Leistungsausgaben	Mean	4721,90	2307,49	2475,02	2236,03																	
		CI Mean	[4056,76; 5387,05]	[1973,78; 2641,21]	[1987,70; 2962,34]	[1787,70; 2684,35]																	
		SD	10132,58	3784,30	5367,21	4718,32																	
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2307,49</i>	<i>4754,45</i>	<i>6808,82</i>																		
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	500	478																			
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		489,0	465,0																		
	Leistungsausgaben	Mean	5007,81	2862,90	2503,90																		
		CI Mean	[4054,97; 5960,64]	[2073,26; 3652,54]	[2027,49; 2980,32]																		
		SD	10483,05	8908,97	5241,52																		
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2862,90</i>	<i>5102,67</i>																			
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	500																				
	Patienten auswertbar und gewichtet	Anzahl		496,5																			
	Leistungsausgaben	Mean		2485,73																			
		CI Mean		[2124,84; 2846,63]																			
		SD		4102,84																			
<i>Leistungsausgaben kumuliert</i>	<i>Mean</i>		<i>2485,73</i>																				

Auswertungskapitel 6: Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung

In den folgenden Tabelle 6.1 werden die Kosten für Qualitätssicherung und Verwaltung des DMP-Programms pro eingeschriebenem Patienten und Kalenderjahr ausgewiesen; eine Differenzierung nach Kohorten erfolgt dabei nicht. Zu beachten ist dabei, dass alle eingeschriebenen Patienten in die Berechnung eingehen; im Gegensatz zu den bisherigen Auswertungen im

ökonomischen Berichtsteil wird also nicht auf eine Stichprobe zurückgegriffen. Da die Durchschnittskosten auch von der Anzahl der Programmteilnehmer abhängen, werden zur Information zudem die Versichertenjahre im Programm ausgewiesen. Für das Jahr 2003 lagen keine Angaben vor.

Tabelle 6.1 Durchschnittliche Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung pro DMP-Teilnehmer und Jahr und Versichertenjahre¹¹

EZ	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Verwaltungskosten in Euro	--	52,36	55,59	52,72	45,91	39,55	29,79	26,37	25,45	17,18
Qualitätssicherungskosten in Euro	--	31,61	33,29	31,88	29,87	25,95	26,24	24,58	23,72	16,01
Gesamtkosten in Euro	--	83,97	88,88	84,60	75,78	65,50	56,03	50,95	49,17	33,19
zur Information: Versichertenjahre im Programm	--	31568,5	38210,3	49918,8	69403,4	78674,0	81565,0	83322,0	85520,0	86662,0

¹¹ Die Kosten der Qualitätssicherung und Verwaltung ergeben sich aus den gemäß den Vorgaben des BVA gebuchten Aufwendungen und deren Verhältnis zu Versicherten in Jahren. Sollten in vorangegangenen Berichten Beträge enthalten sein, die vor Abschluss des Haushaltsjahres ermittelt wurden, oder Zahlen zu den Versichertenjahren verwendet worden seien, die vor Erstellung der amtlichen Statistiken ermittelt wurden, so können diese Zahlen u.U. von den Zahlen des aktuellen Berichtes abweichen, da sie im Nachhinein nochmals aktualisiert wurden. Zu beachten ist zudem, dass fusionsbedingt die Angaben von Versicherten der (ehemaligen) See-Krankenkasse ab 2008 nicht mehr in den AOK-, sondern in den Knappschaftsberichten berücksichtigt werden.

Berichtsteil III: Auswertungen zur Lebensqualität

Ein Bestandteil der Evaluation ist die Analyse, wie sich die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Patienten im Laufe der Teilnahme an Disease-Management-Programmen verändert. Die Lebensqualität wird mittels des SF-36-Fragebogens erhoben. Der SF-36 zählt zu den bekanntesten und international am häufigsten eingesetzten generischen Instrumenten, um den Gesundheitszustand zu messen. Es handelt sich um ein standardisiertes Instrument, das von Patienten selbst ausgefüllt werden kann und auf seine metrischen Eigenschaften hin mit guten Ergebnissen geprüft wurde. Der SF-36 entstand im Rahmen der Medical Outcome Study (MOS) und ist die Kurzform einer 149 Items umfassenden Fragebatterie zur Funktionsfähigkeit und Lebensqualität. Der Fragebogen umfasst insgesamt 36 Items. Erfasst werden damit 8 Dimensionen der Gesundheit mit jeweils 2-10 Items sowie die Gesundheitsveränderungen in den vergangenen 12 Monaten mittels einer Frage. Die Skalen beinhalten folgende Dimensionen des Gesundheitszustandes:

- Körperliche Funktionsfähigkeit
- Körperliche Rollenfunktion
- Körperliche Schmerzen
- Allgemeine Gesundheitswahrnehmung
- Vitalität
- Soziale Funktionsfähigkeit
- Emotionale Rollenfunktion
- Psychisches Wohlbefinden

Die Bearbeitungszeit des SF-36 wird von den Entwicklern auf 8-15 Minuten geschätzt. Der Fragebogen kann in zwei verschiedenen Versionen eingesetzt werden. Eine davon bezieht die Fragen rückblickend auf eine Woche, die andere im Rahmen der Evaluation der strukturierten Behandlungsprogramme eingesetzte Version hat ein Zeitfenster von 4 zurückliegenden Wochen (vgl. Bullinger/ Kirchberger 1998)¹².

Die Veränderungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität werden mittels des SF 36 schriftlich erhoben. Der Versand der Fragebögen erfolgt durch die jeweils zuständige Krankenkasse. Dem Fragebogen ist ein standardisiertes Anschreiben, das zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und dem BVA abgestimmt wurde, beigelegt.

Analog zu den ökonomischen Auswertungen basieren auch die Auswertungen zum SF-36 nicht auf den Daten aller Patienten, sondern auf einer Stichprobe. Für den SF-36 werden genau dieselben Patienten befragt, für welche auch die ökonomischen Auswertungen vorgenommen wurden. Entsprechend beträgt der Stichprobenumfang in der Regel zehn Prozent der Patientenzahl der jeweiligen Kohorte, höchstens 500 und mindestens 100 Patienten. Bei Kohorten mit weniger als 100 Patienten werden Vollerhebungen durchgeführt. Davon wird jedoch abgesehen, wenn die Kohorte weniger als zehn Patienten umfasst. Um die Anonymität zu wahren, wird in diesen Fällen auf eine Auswertung verzichtet.¹³

Zu beachten ist weiterhin, dass die Stichprobenziehung gemäß der engen zeitlichen Vorgaben des BVA unmittelbar nach Eingang der PM-Daten beim Evaluator erfolgen muss. Etwaige zeitverzögerte Aktualisierungen der PM-Datenbasis können daher – anders als im Berichtsteil I – in der Stichprobe nicht mehr berücksichtigt werden. Daher kann sich auch bei Vollerhebungen die Anzahl der ausgewiesenen Patienten im Berichtsteil I von derjenigen in den Berichtsteilen II und III unterscheiden.

Die gesundheitsbezogene Lebensqualität wird ab der Eintrittskohorte 2006-2 erhoben. Für frühere Kohorten entfällt die Befragung zur Lebensqualität. Die Erstbefragung findet nach dem Beitrittsjahr statt; Wiederholungsbefragungen erfolgen in zweijährigen Abständen. Der vorliegende Bericht enthält somit Auswertungen zum SF-36 für die Erst-, Zweitbefragungen sowie Drittbefragungen der Kohorten 2006-2 bis 2008-1, für die Erst- und Zweitbefragungen der Kohorten 2008-2 bis 2010-1 und für die Erstbefragungen der Kohorten 2010-2 bis 2012-1.

Um die gesundheitsbezogene Lebensqualität auszuwerten und darzustellen, werden die Items des Fragebogens nach einem standardisierten Algorithmus zu Skalenwerten verdichtet, die verschiedene Dimensionen des allgemeinen Gesundheitszustandes abbilden. Durch eine Transformation der Skalenrohre Werte können alle Skalen Werte zwischen „0“ und „100“ annehmen. Der Wert „100“ stellt dabei den Bestwert dar, d.h. je höher der Wert auf einer Skala für einen Patienten ausfällt, desto besser ist sein Gesundheitszustand in dieser Dimension. Neben den acht Subskalen des SF-36 können durch die Gewichtung

von Items zwei übergeordnete Dimensionen, d.h. eine körperliche Summenskala und eine psychische Summenskala berechnet werden, in die jeweils mehrere Skalenwerte eingehen. Diese können ebenfalls Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) annehmen.

Die Ergebnisse zur Lebensqualität beinhalten eine differenzierte Darstellung der Zahl der versendeten Fragebögen und des Rücklaufes je Kohorte und Erhebungszeitpunkt. Darüber hinaus werden die Ergebnisse in den durch den SF-36 erfassten Dimensionen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität sowie des Items „Veränderung der Gesundheit“ je Kohorte im Zeitverlauf aufgezeigt.


Die Lebensqualität und ihre Veränderung im Zeitverlauf werden zudem anhand eines Indexwertes, dem SF-6D (Short Form – 6 Dimensions) evaluiert. Der SF-6D ist ein krankheitsübergreifendes, standardisiertes Verfahren um die Lebensqualität in Form eines eindimensionalen Index- bzw. Nutzwertes subjektiv zu messen. Der Wertebereich reicht dabei von „0“ (schlechtester Gesundheitszustand) bis 1 (bestmöglicher Gesundheitszustand). Der SF-6D kann aus Erhebungsdaten des SF-36 anhand von 11 dazu benötigten Items mit jeweils zwei bis sechs Antwortabstufungen extrahiert werden. Der SF-6D umfasst insgesamt sechs Dimensionen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität: Körperliche Funktionsfähigkeit, Rollenfunktion, Soziale Funktionsfähigkeit, Schmerz, Psychisches Wohlbefinden, Vitalität.

Der SF-6D wurde mit der Zielsetzung entwickelt, einen patientennahen Ergebnisindikator wie die gesundheitsbezogene Lebensqualität in gesundheitsökonomischen Studien zur Effizienz- und Effektivitätsbeurteilung z.B. den Kosten einer Behandlungsmaßnahme entgegen zu setzen. Dazu ist es notwendig, die Lebensqualität, die physische, psychische und soziale Aspekte von Gesundheit umfasst, zu einem einzigen Indexwert zu aggregieren.

¹² Bullinger M., Kirchberger I: SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand, Handanweisung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, Verlag für Psychologie 1998.

¹³ Fusionsbedingt können die Stichproben in den AOK-Berichten kleiner und in den Knappschafts-Berichten größer ausfallen als gemäß obiger Beschreibung zu erwarten wäre. Sofern die Stichprobe Versicherte der ehemaligen See-Krankenkasse enthielt, mussten diese mit der evaluationsseitigen Umsetzung der Fusion von Knappschaft und ehemaliger See-Krankenkasse aus den Auswertungen der AOK-Berichte ausgeschlossen und in die Auswertungen der Knappschaftsberichte aufgenommen werden.

Abb. III.1 Übersicht über die Bildung der Sub- bzw. Summenskalen und des SF-6D-Gesamtindex



Auswertungskapitel 7: Rücklaufstatistik

Tabelle 7.1 gibt für alle Kohorten Auskunft darüber, wie viele Patienten für die Auswertungen zur Lebensqualität zur Verfügung standen. Grundlage ist dieselbe Stichprobe aus der Gesamtzahl der Patienten wie für die Ausgabenanalysen in dem Auswertungskapitel 5. Die Anzahl der Stichprobenmitglieder kann sich im Laufe der weiteren Teilnahmehalbjahre verringern, weil Patienten wegen Tod, Ausschluss oder eigener Beendigung aus dem Programm ausscheiden.

Anschließend wird dargestellt, wie viele Patienten den Fragebogen insgesamt zurückgesendet haben¹⁴, wie viele Patienten den Fragebogen *vollständig* ausgefüllt haben und welchem Anteil an der Brutto-Stichprobe dies jeweils entspricht.

In der Kohorte 2006-2 umfasst die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 500 Patienten. 244 von ihnen schickten den Fragebogen zurück. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 48,80 Prozent der Brutto-Stichprobe. Bei der wiederholten Befragung der Patienten dieser Kohorte 2006-2 lag die Rücklaufquote bei 49,59 Prozent.

¹⁴ Die an dieser Stelle ausgewiesene Anzahl der zurückgesendeten Fragebögen kann – insbesondere in den von der Fusion zwischen Knappschaft und der See-Krankenkasse betroffenen Halbjahren bis 2008-1 – von der entsprechenden Anzahl in den spezifischen Tabellen 8.1 bis 8.12 leicht abweichen. Auf die Anzahl der auswertbaren Fragebögen und damit auf die Auswertungsergebnisse zur Lebensqualität hat dies keinen Einfluss.

Tabelle 7.1 Patienten in der Stichprobe (Anzahl)

EZ	Patienten in der Stichprobe (Anzahl)		Befragung nach Beitritts-	Befragung nach	Befragung nach
			halbjahr	5. Halbjahr	9. Halbjahr
2006-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	369	275
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	244	183	163
		Anteil an Brutto-SP in %	48,80	49,59	59,27
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	222	160	143
		Anteil an Brutto-SP in %	44,40	43,36	52,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>10718</i>	<i>8292</i>	
2007-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	371	281
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	201	195	157
		Anteil an Brutto-SP in %	40,20	52,56	55,87
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	180	178	144
		Anteil an Brutto-SP in %	36,00	47,98	51,25
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>13722</i>	<i>10635</i>	
2007-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	364	277
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	234	174	136
		Anteil an Brutto-SP in %	46,80	47,80	49,10
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	199	158	120
		Anteil an Brutto-SP in %	39,80	43,41	43,32
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>7735</i>	<i>5936</i>	
2008-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	376	299
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	246	212	173
		Anteil an Brutto-SP in %	49,20	56,38	57,86
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	222	190	159
		Anteil an Brutto-SP in %	44,40	50,53	53,18
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>7156</i>	<i>5643</i>	
2008-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	397	
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	248	193	
		Anteil an Brutto-SP in %	49,60	48,61	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	217	165	
		Anteil an Brutto-SP in %	43,40	41,56	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>5008</i>		
2009-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	396	310	
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	179	171	
		Anteil an Brutto-SP in %	45,20	55,16	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	162	155	
		Anteil an Brutto-SP in %	40,91	50,00	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>4221</i>		
2009-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	392	
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	240	203	
		Anteil an Brutto-SP in %	48,00	51,79	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	207	179	
		Anteil an Brutto-SP in %	41,40	45,66	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>4483</i>		

EZ	Patienten in der Stichprobe (Anzahl)		Befragung nach Beitritts-halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	372	
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	258	196	
		Anteil an Brutto-SP in %	51,60	52,69	
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	228	182	
		Anteil an Brutto-SP in %	45,60	48,92	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>5055</i>		
2010-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	285		
		Anteil an Brutto-SP in %	57,00		
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	254		
		Anteil an Brutto-SP in %	50,80		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>			
2011-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	239		
		Anteil an Brutto-SP in %	47,80		
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	212		
		Anteil an Brutto-SP in %	42,40		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>			
2011-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	222		
		Anteil an Brutto-SP in %	44,40		
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	198		
		Anteil an Brutto-SP in %	39,60		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>			
2012-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	zurückgesendete Fragebögen	Anzahl	241		
		Anteil an Brutto-SP in %	48,20		
	vollständig ausgefüllte Fragebögen	Anzahl	222		
		Anteil an Brutto-SP in %	44,40		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>			

Auswertungskapitel 8: Auswertungen zur Lebensqualität

Tabelle 8.1 gibt Auskunft über den **Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Jahr**. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten die vergleichende Frage zum Gesundheitszustand im vergangenen Jahr beantwortet haben. Anschließend wird für diese Personengruppe ausgewiesen, wie sich die Antworten auf einer Skala von 1 „viel besser“ bis 5 „viel schlechter“ verteilen und auf welchen Wert die Antwort im Durchschnitt fiel.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 500 Patienten. 244 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 240 Patienten hatten die Frage zum Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Jahr beantwortet. 0,42 Prozent von ihnen ging es zum Zeitpunkt der Befragung im Vergleich zum vergangenen Jahr viel besser, 8,75 Prozent etwas besser.

Bei der ersten Wiederholungsbefragung der Kohorte 2006-2 sendeten 190 Patienten den Fragebogen zurück. Die Fragen zum Gesundheitszustand im Vergleich zum Vorjahr hatten 178 von ihnen beantwortet. Viel besser als im Vergleich zum Vorjahr ging es 1,12 Prozent, etwas besser 10,67 Prozent der Patienten.

Tabelle 8.1 Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Jahr: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	Gesundheitszustand im Vergleich zu vergangenem Jahr: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts-halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	369	275
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	190	167
		Anteil in %	48,80	51,49	60,73
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	240	178	161
		Anteil in %	98,36	93,68	96,41
		Anteil 2 in %	48,00	48,24	58,55
	(1) viel besser	Anzahl	0,42	1,12	0,00
	(2) etwas besser	Anzahl	8,75	10,67	6,83
	(3) etwa gleich	Anzahl	50,00	45,51	44,72
	(4) etwas schlechter	Anzahl	32,50	30,34	38,51
	(5) viel schlechter	Anzahl	8,33	12,36	9,94
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>10718</i>	<i>8292</i>	
2007-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	371	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	201	197	159
		Anteil in %	40,20	53,10	56,58
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	198	193	155
		Anteil in %	98,51	97,97	97,48
		Anteil 2 in %	39,60	52,02	55,16
	(1) viel besser	Anzahl	1,01	2,07	0,00
	(2) etwas besser	Anzahl	10,10	7,25	3,87
	(3) etwa gleich	Anzahl	57,07	52,85	48,39
	(4) etwas schlechter	Anzahl	24,75	30,05	32,90
	(5) viel schlechter	Anzahl	7,07	7,77	14,84
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>13722</i>	<i>10635</i>	
2007-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	364	277
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	234	175	138
		Anteil in %	46,80	48,08	49,82
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	224	171	133
		Anteil in %	95,73	97,71	96,38
		Anteil 2 in %	44,80	46,98	48,01
	(1) viel besser	Anzahl	1,34	1,75	1,50
	(2) etwas besser	Anzahl	8,93	6,43	6,02
	(3) etwa gleich	Anzahl	51,34	47,95	47,37
	(4) etwas schlechter	Anzahl	26,79	36,26	36,09
	(5) viel schlechter	Anzahl	11,61	7,60	9,02
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>7735</i>	<i>5936</i>	

EZ	Gesundheitszustand im Vergleich zu vergangenem Jahr: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2008-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	376	299
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	246	217	174
		Anteil in %	49,20	57,71	58,19
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	245	211	173
		Anteil in %	99,59	97,24	99,43
		Anteil 2 in %*	49,00	56,12	57,86
	(1) viel besser	Anzahl	1,63	0,00	0,00
	(2) etwas besser	Anzahl	6,53	4,74	5,20
	(3) etwa gleich	Anzahl	51,02	54,50	53,76
	(4) etwas schlechter	Anzahl	29,39	33,18	30,64
	(5) viel schlechter	Anzahl	11,43	7,58	10,40
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>7156</i>	<i>5643</i>
2008-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	397	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	248	194	
		Anteil in %	49,60	48,87	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	247	189	
		Anteil in %	99,60	97,42	
		Anteil 2 in %*	49,40	47,61	
	(1) viel besser	Anzahl	2,43	1,59	
	(2) etwas besser	Anzahl	9,72	6,35	
	(3) etwa gleich	Anzahl	51,42	48,68	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	28,34	31,75	
	(5) viel schlechter	Anzahl	8,10	11,64	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>5008</i>	
2009-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	396	310	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	179	172	
		Anteil in %	45,20	55,48	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	175	169	
		Anteil in %	97,77	98,26	
		Anteil 2 in %*	44,19	54,52	
	(1) viel besser	Anzahl	2,29	0,59	
	(2) etwas besser	Anzahl	8,00	9,47	
	(3) etwa gleich	Anzahl	52,57	50,30	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	28,57	28,99	
	(5) viel schlechter	Anzahl	8,57	10,65	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>4221</i>	
2009-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	392	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	240	207	
		Anteil in %	48,00	52,81	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	236	196	
		Anteil in %	98,33	94,69	
		Anteil 2 in %*	47,20	50,00	
	(1) viel besser	Anzahl	0,00	2,04	
	(2) etwas besser	Anzahl	9,75	3,57	
	(3) etwa gleich	Anzahl	53,39	53,57	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	28,81	30,61	
	(5) viel schlechter	Anzahl	8,05	10,20	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>4483</i>	
2010-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	372	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	258	196	
		Anteil in %	51,60	52,69	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	253	196	
		Anteil in %	98,06	100,00	
		Anteil 2 in %*	50,60	52,69	
	(1) viel besser	Anzahl	1,58	1,53	
	(2) etwas besser	Anzahl	12,65	6,12	
	(3) etwa gleich	Anzahl	51,78	59,18	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	24,90	23,98	
	(5) viel schlechter	Anzahl	9,09	9,18	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>5055</i>	

EZ	Gesundheitszustand im Vergleich zu vergangenem Jahr: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts-halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	285	
		Anteil in %	57,00	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	282	
		Anteil in %	98,95	
		Anteil 2 in %*	56,40	
	(1) viel besser	Anzahl	2,48	
	(2) etwas besser	Anzahl	10,28	
	(3) etwa gleich	Anzahl	53,90	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	25,53	
(5) viel schlechter	Anzahl	7,80		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>		
2011-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	239	
		Anteil in %	47,80	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	230	
		Anteil in %	96,23	
		Anteil 2 in %*	46,00	
	(1) viel besser	Anzahl	3,04	
	(2) etwas besser	Anzahl	12,61	
	(3) etwa gleich	Anzahl	49,57	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	26,52	
(5) viel schlechter	Anzahl	8,26		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>		
2011-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	
		Anteil in %	44,40	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	217	
		Anteil in %	97,75	
		Anteil 2 in %*	43,40	
	(1) viel besser	Anzahl	0,46	
	(2) etwas besser	Anzahl	7,83	
	(3) etwa gleich	Anzahl	58,99	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	23,96	
(5) viel schlechter	Anzahl	8,76		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>		
2012-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	241	
		Anteil in %	48,20	
	mit Angaben zum Gesundheitszustand im Vergleich zu Vorjahr:	Anzahl	240	
		Anteil in %	99,59	
		Anteil 2 in %*	48,00	
	(1) viel besser	Anzahl	2,50	
	(2) etwas besser	Anzahl	7,92	
	(3) etwa gleich	Anzahl	55,00	
	(4) etwas schlechter	Anzahl	27,92	
(5) viel schlechter	Anzahl	6,67		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>		

Tabelle 8.2 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Körperlichen Funktionsfähigkeit**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 500 Patienten. 244 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 242 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala „Körperliche Funktionsfähigkeit“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 46,76.

190 Patienten sendeten nach der ersten Wiederholungsbefragung ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 95,79 Prozent die Fragen zur körperlichen Funktionsfähigkeit beantwortet, so dass sie für die Skala auswertbar waren. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 44,25.

Tabelle 8.2 SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts-halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	369	275
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	190	167
		Anteil in %	48,80	51,49	60,73
	für Skala auswertbar	Anzahl	242	182	162
		Anteil in %	99,18	95,79	97,01
		Anteil 2 in %*	48,40	49,32	58,91
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,76	44,25	41,47
		SD	28,01	29,45	29,27
		CI	[43,23; 50,29]	[39,97; 48,53]	[36,96; 45,97]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,65	-1,76	-1,88
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>10718</i>	<i>8292</i>
2007-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	371	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	201	197	159
		Anteil in %	40,20	53,10	56,58
	für Skala auswertbar	Anzahl	200	194	157
		Anteil in %	99,50	98,48	98,74
		Anteil 2 in %*	40,00	52,29	55,87
	transformierte Skalenwerte	Mean	52,08	52,40	46,25
		SD	30,29	30,64	29,84
		CI	[47,88; 56,27]	[48,09; 56,71]	[41,58; 50,92]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,42	-1,40	-1,67
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>13722</i>	<i>10635</i>
2007-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	364	277
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	234	175	138
		Anteil in %	46,80	48,08	49,82
	für Skala auswertbar	Anzahl	229	171	135
		Anteil in %	97,86	97,71	97,83
		Anteil 2 in %*	45,80	46,98	48,74
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,02	48,62	48,20
		SD	32,47	31,00	30,85
		CI	[43,82; 52,23]	[43,98; 53,27]	[43,00; 53,40]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,59	-1,57	-1,59
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>7735</i>	<i>5936</i>

EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2008-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	376	299
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	246	217	174
		Anteil in %	49,20	57,71	58,19
	für Skala auswertbar	Anzahl	245	209	173
		Anteil in %	99,59	96,31	99,43
		Anteil 2 in %	49,00	55,59	57,86
	transformierte Skalenwerte	Mean	49,24	51,18	43,61
		SD	30,56	29,76	29,19
		CI	[45,41; 53,07]	[47,15; 55,21]	[39,26; 47,96]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,54	-1,46	-1,79
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>7156</i>	<i>5643</i>
2008-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	397	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	248	194	
		Anteil in %	49,60	48,87	
	für Skala auswertbar	Anzahl	246	186	
		Anteil in %	99,19	95,88	
		Anteil 2 in %	49,20	46,85	
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,06	43,60	
		SD	31,53	31,42	
		CI	[43,12; 51,00]	[39,08; 48,11]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,64	-1,79	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>5008</i>	
2009-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	396	310	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	179	172	
		Anteil in %	45,20	55,48	
	für Skala auswertbar	Anzahl	176	169	
		Anteil in %	98,32	98,26	
		Anteil 2 in %	44,44	54,52	
	transformierte Skalenwerte	Mean	52,33	50,89	
		SD	31,83	32,56	
		CI	[47,62; 57,03]	[45,98; 55,79]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,41	-1,47	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>4221</i>	
2009-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	392	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	240	207	
		Anteil in %	48,00	52,81	
	für Skala auswertbar	Anzahl	239	198	
		Anteil in %	99,58	95,65	
		Anteil 2 in %	47,80	50,51	
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,01	49,24	
		SD	30,48	30,70	
		CI	[44,14; 51,87]	[44,96; 53,51]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,59	-1,54	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>4483</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	372
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	258	196
		Anteil in %	51,60	52,69
	für Skala auswertbar	Anzahl	253	194
		Anteil in %	98,06	98,98
		Anteil 2 in %	50,60	52,15
	transformierte Skalenwerte	Mean	54,28	49,69
		SD	31,60	30,57
		CI	[50,38; 58,17]	[45,39; 53,99]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,32	-1,52
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>5055</i>
2010-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	285	
		Anteil in %	57,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	278	
		Anteil in %	97,54	
		Anteil 2 in %	55,60	
	transformierte Skalenwerte	Mean	51,70	
		SD	29,52	
		CI	[48,23; 55,17]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,43	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>	
2011-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	239	
		Anteil in %	47,80	
	für Skala auswertbar	Anzahl	232	
		Anteil in %	97,07	
		Anteil 2 in %	46,40	
	transformierte Skalenwerte	Mean	56,36	
		SD	31,46	
		CI	[52,31; 60,41]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,23	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>	
2011-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	
		Anteil in %	44,40	
	für Skala auswertbar	Anzahl	220	
		Anteil in %	99,10	
		Anteil 2 in %	44,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	52,57	
		SD	32,16	
		CI	[48,32; 56,82]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,40	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	241		
		Anteil in %	48,20		
	für Skala auswertbar	Anzahl	237		
		Anteil in %	98,34		
		Anteil 2 in %	47,40		
	transformierte Skalenwerte	Mean	52,24		
		SD	31,16		
		CI	[48,27; 56,21]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-1,41		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>			

Tabelle 8.3 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Körperlichen Rollenfunktion**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 500 Patienten. 244 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 237 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala „Körperliche Rollenfunktion“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 41,70.

190 Patienten sendeten nach der ersten Wiederholungsbefragung ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 91,58 Prozent alle Fragen zur körperlichen Rollenfunktion beantwortet und konnten daher für die Skala ausgewertet werden. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 33,62.

Tabelle 8.3 SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts-halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	369	275
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	190	167
		Anteil in %	48,80	51,49	60,73
	für Skala auswertbar	Anzahl	237	174	156
		Anteil in %	97,13	91,58	93,41
		Anteil 2 in %*	47,40	47,15	56,73
	transformierte Skalenwerte	Mean	41,70	33,62	33,17
		SD	42,96	41,26	41,17
		CI	[36,23; 47,17]	[27,49; 39,75]	[26,71; 39,63]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,17	-1,41	-1,42
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>10718</i>	<i>8292</i>
2007-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	371	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	201	197	159
		Anteil in %	40,20	53,10	56,58
	für Skala auswertbar	Anzahl	195	188	154
		Anteil in %	97,01	95,43	96,86
		Anteil 2 in %*	39,00	50,67	54,80
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,77	42,42	40,37
		SD	43,58	43,44	43,42
		CI	[39,65; 51,89]	[36,21; 48,63]	[33,51; 47,23]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,05	-1,15	-1,21
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>13722</i>	<i>10635</i>
2007-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	364	277
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	234	175	138
		Anteil in %	46,80	48,08	49,82
	für Skala auswertbar	Anzahl	218	168	131
		Anteil in %	93,16	96,00	94,93
		Anteil 2 in %*	43,60	46,15	47,29
	transformierte Skalenwerte	Mean	41,97	43,06	37,02
		SD	44,43	44,18	41,30
		CI	[36,07; 47,87]	[36,38; 49,74]	[29,95; 44,09]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,16	-1,13	-1,31
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>7735</i>	<i>5936</i>

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	376	299
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	246	217	174
		Anteil in %	49,20	57,71	58,19
	für Skala auswertbar	Anzahl	230	201	166
		Anteil in %	93,50	92,63	95,40
		Anteil 2 in %	46,00	53,46	55,52
	transformierte Skalenwerte	Mean	44,24	38,52	34,49
		SD	44,99	42,48	41,97
		CI	[38,42; 50,05]	[32,64; 44,39]	[28,10; 40,87]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,09	-1,26	-1,38
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>7156</i>	<i>5643</i>
2008-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	397	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	248	194	
		Anteil in %	49,60	48,87	
	für Skala auswertbar	Anzahl	231	178	
		Anteil in %	93,15	91,75	
		Anteil 2 in %	46,20	44,84	
	transformierte Skalenwerte	Mean	39,32	34,55	
		SD	43,62	41,00	
		CI	[33,70; 44,95]	[28,53; 40,57]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,24	-1,38	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>5008</i>	
2009-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	396	310	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	179	172	
		Anteil in %	45,20	55,48	
	für Skala auswertbar	Anzahl	168	164	
		Anteil in %	93,85	95,35	
		Anteil 2 in %	42,42	52,90	
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,63	43,24	
		SD	43,68	43,54	
		CI	[39,03; 52,24]	[36,58; 49,91]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,05	-1,12	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>4221</i>	
2009-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	392	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	240	207	
		Anteil in %	48,00	52,81	
	für Skala auswertbar	Anzahl	228	195	
		Anteil in %	95,00	94,20	
		Anteil 2 in %	45,60	49,74	
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,54	39,40	
		SD	43,05	42,75	
		CI	[39,95; 51,13]	[33,40; 45,40]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,06	-1,24	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>4483</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	372	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	258	196	
		Anteil in %	51,60	52,69	
	für Skala auswertbar	Anzahl	246	190	
		Anteil in %	95,35	96,94	
		Anteil 2 in %	49,20	51,08	
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,49	48,42	
		SD	44,59	44,33	
		CI	[39,92; 51,07]	[42,12; 54,72]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,06	-0,97	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>5055</i>	
2010-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	285		
		Anteil in %	57,00		
	für Skala auswertbar	Anzahl	269		
		Anteil in %	94,39		
		Anteil 2 in %	53,80		
	transformierte Skalenwerte	Mean	42,91		
		SD	44,52		
		CI	[37,59; 48,23]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-1,13		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>		
2011-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	239		
		Anteil in %	47,80		
	für Skala auswertbar	Anzahl	226		
		Anteil in %	94,56		
		Anteil 2 in %	45,20		
	transformierte Skalenwerte	Mean	53,06		
		SD	44,79		
		CI	[47,22; 58,90]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,83		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>		
2011-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222		
		Anteil in %	44,40		
	für Skala auswertbar	Anzahl	213		
		Anteil in %	95,95		
		Anteil 2 in %	42,60		
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,10		
		SD	45,22		
		CI	[41,03; 53,18]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-1,01		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>		

EZ	SF-36-Skala Körperliche Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	241	
		Anteil in %	48,20	
	für Skala auswertbar	Anzahl	230	
		Anteil in %	95,44	
		Anteil 2 in %	46,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,22	
		SD	43,16	
		CI	[39,64; 50,80]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,06	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>		

Tabelle 8.4 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zu **Körperlichen Schmerzen**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (besten Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 500 Patienten. 244 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 240 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala „Körperliche Schmerzen“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 47,81.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 190 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 95,79 Prozent alle Fragen zum Thema „Körperliche Schmerzen“ beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 42,73.

Tabelle 8.4 SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	369	275
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	190	167
		Anteil in %	48,80	51,49	60,73
	für Skala auswertbar	Anzahl	240	182	162
		Anteil in %	98,36	95,79	97,01
		Anteil 2 in %*	48,00	49,32	58,91
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,81	42,73	42,61
		SD	28,46	25,67	26,69
		CI	[44,21; 51,41]	[39,00; 46,45]	[38,50; 46,72]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,18	-1,39	-1,40
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>10718</i>	<i>8292</i>
2007-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	371	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	201	197	159
		Anteil in %	40,20	53,10	56,58
	für Skala auswertbar	Anzahl	197	195	154
		Anteil in %	98,01	98,98	96,86
		Anteil 2 in %*	39,40	52,56	54,80
	transformierte Skalenwerte	Mean	51,54	51,73	47,21
		SD	29,85	29,42	26,53
		CI	[47,38; 55,71]	[47,60; 55,86]	[43,02; 51,40]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,02	-1,01	-1,20
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>13722</i>	<i>10635</i>
2007-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	364	277
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	234	175	138
		Anteil in %	46,80	48,08	49,82
	für Skala auswertbar	Anzahl	228	172	136
		Anteil in %	97,44	98,29	98,55
		Anteil 2 in %*	45,60	47,25	49,10
	transformierte Skalenwerte	Mean	49,95	49,08	47,54
		SD	31,58	30,77	28,07
		CI	[45,85; 54,05]	[44,48; 53,68]	[42,82; 52,25]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,08	-1,12	-1,19
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>7735</i>	<i>5936</i>

EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2008-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	376	299
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	246	217	174
		Anteil in %	49,20	57,71	58,19
	für Skala auswertbar	Anzahl	246	210	173
		Anteil in %	100,00	96,77	99,43
		Anteil 2 in %	49,20	55,85	57,86
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,76	48,52	46,89
		SD	28,78	28,46	28,11
		CI	[45,16; 52,35]	[44,67; 52,37]	[42,70; 51,08]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-1,13	-1,14	-1,21
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>7156</i>	<i>5643</i>
2008-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	397	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	248	194	
		Anteil in %	49,60	48,87	
	für Skala auswertbar	Anzahl	243	189	
		Anteil in %	97,98	97,42	
		Anteil 2 in %	48,60	47,61	
	transformierte Skalenwerte	Mean	50,31	43,07	
		SD	27,69	25,81	
		CI	[46,83; 53,79]	[39,39; 46,75]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,07	-1,38	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>5008</i>	
2009-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	396	310	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	179	172	
		Anteil in %	45,20	55,48	
	für Skala auswertbar	Anzahl	178	170	
		Anteil in %	99,44	98,84	
		Anteil 2 in %	44,95	54,84	
	transformierte Skalenwerte	Mean	52,70	51,52	
		SD	29,05	30,17	
		CI	[48,43; 56,96]	[46,99; 56,06]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,97	-1,02	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>4221</i>	
2009-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	392	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	240	207	
		Anteil in %	48,00	52,81	
	für Skala auswertbar	Anzahl	238	199	
		Anteil in %	99,17	96,14	
		Anteil 2 in %	47,60	50,77	
	transformierte Skalenwerte	Mean	50,58	48,79	
		SD	28,16	28,01	
		CI	[47,00; 54,16]	[44,90; 52,69]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,06	-1,13	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>4483</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	372
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	258	196
		Anteil in %	51,60	52,69
	für Skala auswertbar	Anzahl	255	195
		Anteil in %	98,84	99,49
		Anteil 2 in %	51,00	52,42
	transformierte Skalenwerte	Mean	53,89	50,68
		SD	30,07	29,15
		CI	[50,20; 57,58]	[46,59; 54,77]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-0,92	-1,05
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>5055</i>
2010-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	285	
		Anteil in %	57,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	280	
		Anteil in %	98,25	
		Anteil 2 in %	56,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	50,31	
		SD	29,06	
		CI	[46,90; 53,71]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,07	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>	
2011-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	239	
		Anteil in %	47,80	
	für Skala auswertbar	Anzahl	236	
		Anteil in %	98,74	
		Anteil 2 in %	47,20	
	transformierte Skalenwerte	Mean	55,25	
		SD	31,71	
		CI	[51,20; 59,29]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,86	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>	
2011-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	
		Anteil in %	44,40	
	für Skala auswertbar	Anzahl	218	
		Anteil in %	98,20	
		Anteil 2 in %	43,60	
	transformierte Skalenwerte	Mean	51,54	
		SD	29,98	
		CI	[47,56; 55,52]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,02	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>	

EZ	SF-36-Skala Körperliche Schmerzen: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	241	
		Anteil in %	48,20	
	für Skala auswertbar	Anzahl	240	
		Anteil in %	99,59	
		Anteil 2 in %	48,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	54,07	
		SD	30,48	
		CI	[50,21; 57,92]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,91	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>		

Tabelle 8.5 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Allgemeinen Gesundheitswahrnehmung**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 500 Patienten. 244 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 240 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala „Allgemeine Gesundheitswahrnehmung“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 45,26.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 190 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 92,63 Prozent alle Fragen zur allgemeinen Gesundheitswahrnehmung beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 42,93.

Tabelle 8.5 SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts-	Befragung nach	Befragung nach	
			halbjahr	5. Halbjahr	9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder (brutto)		Anzahl	500	369	275
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	190	167	
		Anteil in %	48,80	51,49	60,73	
	für Skala auswertbar	Anzahl	240	176	156	
		Anteil in %	98,36	92,63	93,41	
		Anteil 2 in %*	48,00	47,70	56,73	
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,26	42,93	45,13	
		SD	19,78	20,83	19,64	
		CI	[42,76; 47,76]	[39,85; 46,01]	[42,05; 48,21]	
		Range: Min.	0,00	0,00	5,00	
		Range: Max.	97,00	95,00	92,00	
		z-Wert	-1,34	-1,45	-1,34	
	<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>10718</i>	<i>8292</i>
2007-1	Stichprobenmitglieder (brutto)		Anzahl	500	371	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	201	197	159	
		Anteil in %	40,20	53,10	56,58	
	für Skala auswertbar	Anzahl	196	188	154	
		Anteil in %	97,51	95,43	96,86	
		Anteil 2 in %*	39,20	50,67	54,80	
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,26	47,46	46,78	
		SD	21,47	20,08	18,46	
		CI	[45,25; 51,26]	[44,59; 50,33]	[43,86; 49,69]	
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00	
		Range: Max.	92,00	97,00	87,00	
		z-Wert	-1,19	-1,23	-1,26	
	<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>13722</i>	<i>10635</i>
2007-2	Stichprobenmitglieder (brutto)		Anzahl	500	364	277
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	234	175	138	
		Anteil in %	46,80	48,08	49,82	
	für Skala auswertbar	Anzahl	222	169	133	
		Anteil in %	94,87	96,57	96,38	
		Anteil 2 in %*	44,40	46,43	48,01	
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,18	46,83	46,38	
		SD	20,97	21,06	20,86	
		CI	[43,42; 48,93]	[43,65; 50,00]	[42,83; 49,92]	
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	97,00	100,00	
		z-Wert	-1,29	-1,26	-1,28	
	<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>7735</i>	<i>5936</i>

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	376	299
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	246	217	174
		Anteil in %	49,20	57,71	58,19
	für Skala auswertbar	Anzahl	242	207	172
		Anteil in %	98,37	95,39	98,85
		Anteil 2 in %	48,40	55,05	57,53
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,14	47,61	44,55
		SD	20,01	18,97	18,41
		CI	[43,62; 48,66]	[45,03; 50,20]	[41,80; 47,30]
		Range: Min.	0,00	0,00	5,00
		Range: Max.	97,00	92,00	92,00
		z-Wert	-1,29	-1,22	-1,37
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>7156</i>	<i>5643</i>
2008-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	397	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	248	194	
		Anteil in %	49,60	48,87	
	für Skala auswertbar	Anzahl	240	187	
		Anteil in %	96,77	96,39	
		Anteil 2 in %	48,00	47,10	
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,99	45,01	
		SD	18,81	18,84	
		CI	[44,61; 49,37]	[42,31; 47,71]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	92,00	92,00	
		z-Wert	-1,25	-1,35	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>5008</i>	
2009-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	396	310	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	179	172	
		Anteil in %	45,20	55,48	
	für Skala auswertbar	Anzahl	174	165	
		Anteil in %	97,21	95,93	
		Anteil 2 in %	43,94	53,23	
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,44	49,33	
		SD	20,61	20,50	
		CI	[44,38; 50,50]	[46,20; 52,46]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	97,00	
		z-Wert	-1,23	-1,13	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>4221</i>	
2009-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	392	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	240	207	
		Anteil in %	48,00	52,81	
	für Skala auswertbar	Anzahl	230	196	
		Anteil in %	95,83	94,69	
		Anteil 2 in %	46,00	50,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,63	45,22	
		SD	20,70	19,81	
		CI	[43,96; 49,31]	[42,45; 48,00]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-1,27	-1,34	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>4483</i>	

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	372
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	258	196
		Anteil in %	51,60	52,69
	für Skala auswertbar	Anzahl	251	192
		Anteil in %	97,29	97,96
		Anteil 2 in %	50,20	51,61
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,87	48,35
		SD	20,44	19,34
		CI	[45,35; 50,40]	[45,61; 51,09]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-1,21	-1,18
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>5055</i>
2010-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	285	
		Anteil in %	57,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	280	
		Anteil in %	98,25	
		Anteil 2 in %	56,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,16	
		SD	20,20	
		CI	[45,79; 50,53]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	97,00	
		z-Wert	-1,19	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>	
2011-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	239	
		Anteil in %	47,80	
	für Skala auswertbar	Anzahl	231	
		Anteil in %	96,65	
		Anteil 2 in %	46,20	
	transformierte Skalenwerte	Mean	49,02	
		SD	20,72	
		CI	[46,35; 51,70]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	97,00	
		z-Wert	-1,15	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>	
2011-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	
		Anteil in %	44,40	
	für Skala auswertbar	Anzahl	215	
		Anteil in %	96,85	
		Anteil 2 in %	43,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,41	
		SD	22,44	
		CI	[45,41; 51,40]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-1,18	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>	

EZ	SF-36-Skala Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	241	
		Anteil in %	48,20	
	für Skala auswertbar	Anzahl	239	
		Anteil in %	99,17	
		Anteil 2 in %	47,80	
	transformierte Skalenwerte	Mean	48,68	
		SD	19,00	
		CI	[46,27; 51,09]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	92,00	
		z-Wert	-1,17	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>		

Tabelle 8.6 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Vitalität**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 500 Patienten. 244 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 243 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala „Vitalität“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 44,40.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 190 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 94,74 Prozent alle Fragen zum Thema „Vitalität“ beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 42,50.

Tabelle 8.6 SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts-	Befragung nach	Befragung nach
			halbjahr	5. Halbjahr	9. Halbjahr
2006-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	369	275
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	190	167
		Anteil in %	48,80	51,49	60,73
	für Skala auswertbar	Anzahl	243	180	160
		Anteil in %	99,59	94,74	95,81
		Anteil 2 in %*	48,60	48,78	58,18
	transformierte Skalenwerte	Mean	44,40	42,50	42,08
		SD	20,97	21,55	20,47
		CI	[41,76; 47,03]	[39,35; 45,65]	[38,91; 45,25]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,80	-0,89	-0,91
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>10718</i>	<i>8292</i>
2007-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	371	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	201	197	159
		Anteil in %	40,20	53,10	56,58
	für Skala auswertbar	Anzahl	199	193	156
		Anteil in %	99,00	97,97	98,11
		Anteil 2 in %*	39,80	52,02	55,52
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,35	49,33	45,47
		SD	23,34	22,06	21,21
		CI	[44,10; 50,59]	[46,21; 52,44]	[42,14; 48,80]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,66	-0,56	-0,75
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>13722</i>	<i>10635</i>
2007-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	364	277
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	234	175	138
		Anteil in %	46,80	48,08	49,82
	für Skala auswertbar	Anzahl	228	170	136
		Anteil in %	97,44	97,14	98,55
		Anteil 2 in %*	45,60	46,70	49,10
	transformierte Skalenwerte	Mean	44,47	46,31	43,76
		SD	23,47	22,85	22,11
		CI	[41,42; 47,51]	[42,88; 49,75]	[40,05; 47,48]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,79	-0,71	-0,83
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>7735</i>	<i>5936</i>

EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	376	299
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	246	217	174
		Anteil in %	49,20	57,71	58,19
	für Skala auswertbar	Anzahl	244	210	172
		Anteil in %	99,19	96,77	98,85
		Anteil 2 in %	48,80	55,85	57,53
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,57	45,85	42,97
		SD	23,99	19,71	20,80
		CI	[42,56; 48,58]	[43,18; 48,52]	[39,87; 46,08]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	86,67
		z-Wert	-0,74	-0,73	-0,87
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>7156</i>	<i>5643</i>
2008-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	397	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	248	194	
		Anteil in %	49,60	48,87	
	für Skala auswertbar	Anzahl	245	187	
		Anteil in %	98,79	96,39	
		Anteil 2 in %	49,00	47,10	
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,68	41,41	
		SD	22,63	22,92	
		CI	[42,85; 48,51]	[38,12; 44,69]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	95,00	
		z-Wert	-0,74	-0,94	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>5008</i>	
2009-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	396	310	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	179	172	
		Anteil in %	45,20	55,48	
	für Skala auswertbar	Anzahl	177	169	
		Anteil in %	98,88	98,26	
		Anteil 2 in %	44,70	54,52	
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,57	46,75	
		SD	21,11	23,03	
		CI	[44,46; 50,68]	[43,27; 50,22]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,65	-0,69	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>4221</i>	
2009-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	392	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	240	207	
		Anteil in %	48,00	52,81	
	für Skala auswertbar	Anzahl	238	197	
		Anteil in %	99,17	95,17	
		Anteil 2 in %	47,60	50,26	
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,81	44,88	
		SD	21,39	20,83	
		CI	[44,09; 49,52]	[41,97; 47,79]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	95,00	100,00	
		z-Wert	-0,68	-0,77	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>4483</i>	

EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	372	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	258	196	
		Anteil in %	51,60	52,69	
	für Skala auswertbar	Anzahl	255	195	
		Anteil in %	98,84	99,49	
		Anteil 2 in %	51,00	52,42	
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,83	47,85	
		SD	22,95	21,70	
		CI	[43,01; 48,65]	[44,80; 50,89]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,73	-0,63	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>5055</i>	
2010-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	285		
		Anteil in %	57,00		
	für Skala auswertbar	Anzahl	277		
		Anteil in %	97,19		
		Anteil 2 in %	55,40		
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,70		
		SD	21,15		
		CI	[43,21; 48,19]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,74		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>		
2011-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	239		
		Anteil in %	47,80		
	für Skala auswertbar	Anzahl	235		
		Anteil in %	98,33		
		Anteil 2 in %	47,00		
	transformierte Skalenwerte	Mean	49,36		
		SD	21,92		
		CI	[46,56; 52,16]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	95,00		
		z-Wert	-0,56		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>		
2011-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222		
		Anteil in %	44,40		
	für Skala auswertbar	Anzahl	218		
		Anteil in %	98,20		
		Anteil 2 in %	43,60		
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,42		
		SD	22,98		
		CI	[44,36; 50,47]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,65		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>		

EZ	SF-36-Skala Vitalität: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	Stichprobenmitglieder (brutto)		Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	241	
			Anteil in %	48,20	
	für Skala auswertbar		Anzahl	238	
			Anteil in %	98,76	
			Anteil 2 in %	47,60	
	transformierte Skalenwerte		Mean	47,54	
			SD	23,13	
			CI	[44,60; 50,48]	
			Range: Min.	0,00	
			Range: Max.	95,00	
			z-Wert	-0,65	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>		

Tabelle 8.7 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Sozialen Funktionsfähigkeit**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts halbjahr 500 Patienten. 244 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 243 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala „Soziale Funktionsfähigkeit“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 70,32.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 190 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 95,79 Prozent alle Fragen zur sozialen Funktionsfähigkeit beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 64,90.

Tabelle 8.7 SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	369	275
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	190	167
		Anteil in %	48,80	51,49	60,73
	für Skala auswertbar	Anzahl	243	182	163
		Anteil in %	99,59	95,79	97,60
		Anteil 2 in %*	48,60	49,32	59,27
	transformierte Skalenwerte	Mean	70,32	64,90	64,88
		SD	27,09	29,33	29,48
		CI	[66,91; 73,73]	[60,64; 69,16]	[60,35; 69,40]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,59	-0,84	-0,84
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>10718</i>	<i>8292</i>
2007-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	371	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	201	197	159
		Anteil in %	40,20	53,10	56,58
	für Skala auswertbar	Anzahl	200	194	156
		Anteil in %	99,50	98,48	98,11
		Anteil 2 in %*	40,00	52,29	55,52
	transformierte Skalenwerte	Mean	72,31	71,33	70,83
		SD	26,90	26,85	26,61
		CI	[68,58; 76,04]	[67,55; 75,11]	[66,66; 75,01]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,50	-0,55	-0,57
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>13722</i>	<i>10635</i>
2007-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	364	277
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	234	175	138
		Anteil in %	46,80	48,08	49,82
	für Skala auswertbar	Anzahl	227	172	136
		Anteil in %	97,01	98,29	98,55
		Anteil 2 in %*	45,40	47,25	49,10
	transformierte Skalenwerte	Mean	67,90	67,44	65,63
		SD	28,02	27,46	28,45
		CI	[64,25; 71,54]	[63,34; 71,55]	[60,84; 70,41]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,70	-0,72	-0,80
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>7735</i>	<i>5936</i>

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	376	299
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	246	217	174
		Anteil in %	49,20	57,71	58,19
	für Skala auswertbar	Anzahl	244	210	173
		Anteil in %	99,19	96,77	99,43
		Anteil 2 in %	48,80	55,85	57,86
	transformierte Skalenwerte	Mean	67,37	71,37	63,15
		SD	29,79	25,90	28,38
		CI	[63,63; 71,10]	[67,87; 74,87]	[58,92; 67,38]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,73	-0,55	-0,91
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>7156</i>	<i>5643</i>
2008-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	397	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	248	194	
		Anteil in %	49,60	48,87	
	für Skala auswertbar	Anzahl	246	190	
		Anteil in %	99,19	97,94	
		Anteil 2 in %	49,20	47,86	
	transformierte Skalenwerte	Mean	66,51	62,89	
		SD	29,36	29,60	
		CI	[62,85; 70,18]	[58,69; 67,10]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,76	-0,93	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>5008</i>	
2009-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	396	310	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	179	172	
		Anteil in %	45,20	55,48	
	für Skala auswertbar	Anzahl	177	170	
		Anteil in %	98,88	98,84	
		Anteil 2 in %	44,70	54,84	
	transformierte Skalenwerte	Mean	69,99	68,60	
		SD	28,52	31,43	
		CI	[65,78; 74,19]	[63,88; 73,33]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,61	-0,67	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>4221</i>	
2009-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	392	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	240	207	
		Anteil in %	48,00	52,81	
	für Skala auswertbar	Anzahl	240	199	
		Anteil in %	100,00	96,14	
		Anteil 2 in %	48,00	50,77	
	transformierte Skalenwerte	Mean	69,74	70,04	
		SD	29,00	28,06	
		CI	[66,07; 73,41]	[66,14; 73,94]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,62	-0,61	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>4483</i>	

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	372
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	258	196
		Anteil in %	51,60	52,69
	für Skala auswertbar	Anzahl	257	195
		Anteil in %	99,61	99,49
		Anteil 2 in %	51,40	52,42
	transformierte Skalenwerte	Mean	71,16	69,62
		SD	27,41	28,60
		CI	[67,81; 74,51]	[65,60; 73,63]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-0,56	-0,62
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>5055</i>
2010-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	285	
		Anteil in %	57,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	281	
		Anteil in %	98,60	
		Anteil 2 in %	56,20	
	transformierte Skalenwerte	Mean	71,04	
		SD	27,84	
		CI	[67,79; 74,30]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,56	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>	
2011-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	239	
		Anteil in %	47,80	
	für Skala auswertbar	Anzahl	235	
		Anteil in %	98,33	
		Anteil 2 in %	47,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	71,06	
		SD	29,72	
		CI	[67,26; 74,86]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,56	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>	
2011-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	
		Anteil in %	44,40	
	für Skala auswertbar	Anzahl	219	
		Anteil in %	98,65	
		Anteil 2 in %	43,80	
	transformierte Skalenwerte	Mean	67,12	
		SD	30,47	
		CI	[63,09; 71,16]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,74	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>	

EZ	SF-36-Skala Soziale Funktionsfähigkeit: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	241		
		Anteil in %	48,20		
	für Skala auswertbar	Anzahl	241		
		Anteil in %	100,00		
		Anteil 2 in %	48,20		
	transformierte Skalenwerte	Mean	69,29		
		SD	28,93		
		CI	[65,64; 72,95]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,64		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>			

Tabelle 8.8 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zur **Emotionalen Rollenfunktion**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts halbjahr 500 Patienten. 244 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 235 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala „Emotionale Rollenfunktion“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 52,98.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 190 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 91,58 Prozent alle Fragen zum Thema „Emotionale Rollenfunktion“ beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 49,81.

Tabelle 8.8 SF-36-Skala Emotionale Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollenfunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	369	275
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	190	167
		Anteil in %	48,80	51,49	60,73
	für Skala auswertbar	Anzahl	235	174	150
		Anteil in %	96,31	91,58	89,82
		Anteil 2 in %*	47,00	47,15	54,55
	transformierte Skalenwerte	Mean	52,98	49,81	50,44
		SD	46,54	47,11	47,26
		CI	[47,03; 58,93]	[42,81; 56,81]	[42,88; 58,01]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,86	-0,95	-0,93
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>10718</i>	<i>8292</i>
2007-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	371	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	201	197	159
		Anteil in %	40,20	53,10	56,58
	für Skala auswertbar	Anzahl	191	184	153
		Anteil in %	95,02	93,40	96,23
		Anteil 2 in %*	38,20	49,60	54,45
	transformierte Skalenwerte	Mean	58,03	58,42	57,52
		SD	46,29	45,97	45,92
		CI	[51,46; 64,59]	[51,78; 65,07]	[50,24; 64,79]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,70	-0,69	-0,72
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>13722</i>	<i>10635</i>
2007-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	364	277
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	234	175	138
		Anteil in %	46,80	48,08	49,82
	für Skala auswertbar	Anzahl	218	164	127
		Anteil in %	93,16	93,71	92,03
		Anteil 2 in %*	43,60	45,05	45,85
	transformierte Skalenwerte	Mean	55,81	56,91	47,77
		SD	46,59	46,26	45,35
		CI	[49,63; 61,99]	[49,83; 63,99]	[39,88; 55,66]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,77	-0,74	-1,02
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>7735</i>	<i>5936</i>

EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollendunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	376	299
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	246	217	174
		Anteil in %	49,20	57,71	58,19
	für Skala auswertbar	Anzahl	228	195	163
		Anteil in %	92,68	89,86	93,68
		Anteil 2 in %	45,60	51,86	54,52
	transformierte Skalenwerte	Mean	60,82	58,80	51,33
		SD	45,18	45,86	47,32
		CI	[54,95; 66,68]	[52,37; 65,24]	[44,06; 58,59]
		Range: Min.	0,00	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,62	-0,68	-0,91
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>7156</i>	<i>5643</i>
2008-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	397	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	248	194	
		Anteil in %	49,60	48,87	
	für Skala auswertbar	Anzahl	230	176	
		Anteil in %	92,74	90,72	
		Anteil 2 in %	46,00	44,33	
	transformierte Skalenwerte	Mean	50,51	47,73	
		SD	46,37	45,16	
		CI	[44,51; 56,50]	[41,06; 54,40]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,93	-1,02	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>5008</i>	
2009-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	396	310	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	179	172	
		Anteil in %	45,20	55,48	
	für Skala auswertbar	Anzahl	168	161	
		Anteil in %	93,85	93,60	
		Anteil 2 in %	42,42	51,94	
	transformierte Skalenwerte	Mean	62,10	56,94	
		SD	45,11	46,49	
		CI	[55,28; 68,92]	[49,75; 64,12]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,58	-0,74	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>4221</i>	
2009-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	392	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	240	207	
		Anteil in %	48,00	52,81	
	für Skala auswertbar	Anzahl	220	189	
		Anteil in %	91,67	91,30	
		Anteil 2 in %	44,00	48,21	
	transformierte Skalenwerte	Mean	62,95	57,05	
		SD	44,91	46,29	
		CI	[57,02; 68,89]	[50,46; 63,65]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,56	-0,73	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>4483</i>	

EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollendunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse	Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	372
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	258	196
		Anteil in %	51,60	52,69
	für Skala auswertbar	Anzahl	240	189
		Anteil in %	93,02	96,43
		Anteil 2 in %	48,00	50,81
	transformierte Skalenwerte	Mean	61,39	58,02
		SD	44,61	46,15
		CI	[55,75; 67,03]	[51,45; 64,60]
		Range: Min.	0,00	0,00
		Range: Max.	100,00	100,00
		z-Wert	-0,60	-0,70
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>5055</i>
2010-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	285	
		Anteil in %	57,00	
	für Skala auswertbar	Anzahl	266	
		Anteil in %	93,33	
		Anteil 2 in %	53,20	
	transformierte Skalenwerte	Mean	57,39	
		SD	45,39	
		CI	[51,94; 62,85]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,72	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>	
2011-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	239	
		Anteil in %	47,80	
	für Skala auswertbar	Anzahl	223	
		Anteil in %	93,31	
		Anteil 2 in %	44,60	
	transformierte Skalenwerte	Mean	61,29	
		SD	45,53	
		CI	[55,31; 67,26]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,61	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>	
2011-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222	
		Anteil in %	44,40	
	für Skala auswertbar	Anzahl	210	
		Anteil in %	94,59	
		Anteil 2 in %	42,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	61,59	
		SD	45,37	
		CI	[55,45; 67,72]	
		Range: Min.	0,00	
		Range: Max.	100,00	
		z-Wert	-0,60	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>	

EZ	SF-36-Skala Emotionale Rollendunktion: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	241		
		Anteil in %	48,20		
	für Skala auswertbar	Anzahl	229		
		Anteil in %	95,02		
		Anteil 2 in %	45,80		
	transformierte Skalenwerte	Mean	60,12		
		SD	45,36		
		CI	[54,24; 65,99]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,64		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>			

Tabelle 8.9 gibt Auskunft über die SF-36-Skala zum **psychischen Wohlbefinden**. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Skala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert und der z-Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 500 Patienten. 244 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 242 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der Skala „Psychisches Wohlbefinden“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 62,40.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 190 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 93,68 Prozent alle Fragen zum psychischen Wohlbefinden beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 60,00.

Tabelle 8.9 SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	369	275
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	190	167
		Anteil in %	48,80	51,49	60,73
	für Skala auswertbar	Anzahl	242	178	159
		Anteil in %	99,18	93,68	95,21
		Anteil 2 in %*	48,40	48,24	57,82
	transformierte Skalenwerte	Mean	62,40	60,00	59,01
		SD	21,31	23,11	21,66
		CI	[59,71; 65,08]	[56,60; 63,40]	[55,65; 62,38]
		Range: Min.	12,00	4,00	8,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,69	-0,82	-0,88
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>10718</i>	<i>8292</i>
2007-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	371	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	201	197	159
		Anteil in %	40,20	53,10	56,58
	für Skala auswertbar	Anzahl	199	193	156
		Anteil in %	99,00	97,97	98,11
		Anteil 2 in %*	39,80	52,02	55,52
	transformierte Skalenwerte	Mean	63,22	64,20	63,79
		SD	21,91	21,09	20,10
		CI	[60,18; 66,26]	[61,22; 67,18]	[60,64; 66,95]
		Range: Min.	0,00	8,00	8,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,65	-0,59	-0,61
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>13722</i>	<i>10635</i>
2007-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	364	277
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	234	175	138
		Anteil in %	46,80	48,08	49,82
	für Skala auswertbar	Anzahl	227	170	133
		Anteil in %	97,01	97,14	96,38
		Anteil 2 in %*	45,40	46,70	48,01
	transformierte Skalenwerte	Mean	60,70	64,49	61,30
		SD	23,39	21,83	20,89
		CI	[57,66; 63,74]	[61,21; 67,77]	[57,75; 64,85]
		Range: Min.	0,00	0,00	12,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,79	-0,57	-0,75
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>7735</i>	<i>5936</i>

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	376	299
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	246	217	174
		Anteil in %	49,20	57,71	58,19
	für Skala auswertbar	Anzahl	242	208	171
		Anteil in %	98,37	95,85	98,28
		Anteil 2 in %	48,40	55,32	57,19
	transformierte Skalenwerte	Mean	63,65	64,43	59,63
		SD	21,08	20,65	20,91
		CI	[61,00; 66,31]	[61,62; 67,23]	[56,50; 62,77]
		Range: Min.	12,00	0,00	8,00
		Range: Max.	100,00	100,00	100,00
		z-Wert	-0,62	-0,58	-0,84
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>7156</i>	<i>5643</i>
2008-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	397	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	248	194	
		Anteil in %	49,60	48,87	
	für Skala auswertbar	Anzahl	242	187	
		Anteil in %	97,58	96,39	
		Anteil 2 in %	48,40	47,10	
	transformierte Skalenwerte	Mean	62,19	57,72	
		SD	20,90	22,04	
		CI	[59,56; 64,83]	[54,56; 60,88]	
		Range: Min.	10,00	8,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,70	-0,95	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>5008</i>	
2009-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	396	310	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	179	172	
		Anteil in %	45,20	55,48	
	für Skala auswertbar	Anzahl	176	167	
		Anteil in %	98,32	97,09	
		Anteil 2 in %	44,44	53,87	
	transformierte Skalenwerte	Mean	63,88	62,45	
		SD	21,52	21,90	
		CI	[60,70; 67,05]	[59,12; 65,77]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,61	-0,69	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>4221</i>	
2009-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	392	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	240	207	
		Anteil in %	48,00	52,81	
	für Skala auswertbar	Anzahl	235	196	
		Anteil in %	97,92	94,69	
		Anteil 2 in %	47,00	50,00	
	transformierte Skalenwerte	Mean	62,80	61,74	
		SD	22,36	21,50	
		CI	[59,95; 65,66]	[58,73; 64,75]	
		Range: Min.	0,00	0,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,67	-0,73	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>4483</i>	

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	372	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	258	196	
		Anteil in %	51,60	52,69	
	für Skala auswertbar	Anzahl	249	195	
		Anteil in %	96,51	99,49	
		Anteil 2 in %	49,80	52,42	
	transformierte Skalenwerte	Mean	63,85	63,66	
		SD	21,23	20,59	
		CI	[61,21; 66,49]	[60,77; 66,55]	
		Range: Min.	0,00	8,00	
		Range: Max.	100,00	100,00	
		z-Wert	-0,61	-0,62	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>5055</i>	
2010-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	285		
		Anteil in %	57,00		
	für Skala auswertbar	Anzahl	275		
		Anteil in %	96,49		
		Anteil 2 in %	55,00		
	transformierte Skalenwerte	Mean	63,17		
		SD	22,44		
		CI	[60,51; 65,82]		
		Range: Min.	8,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,65		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>		
2011-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	239		
		Anteil in %	47,80		
	für Skala auswertbar	Anzahl	231		
		Anteil in %	96,65		
		Anteil 2 in %	46,20		
	transformierte Skalenwerte	Mean	64,81		
		SD	21,62		
		CI	[62,02; 67,60]		
		Range: Min.	8,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,56		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>		
2011-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222		
		Anteil in %	44,40		
	für Skala auswertbar	Anzahl	217		
		Anteil in %	97,75		
		Anteil 2 in %	43,40		
	transformierte Skalenwerte	Mean	62,51		
		SD	23,76		
		CI	[59,34; 65,67]		
		Range: Min.	4,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,68		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>		

EZ	SF-36-Skala Psychisches Wohlbefinden: Stichprobenmitglieder ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	241		
		Anteil in %	48,20		
	für Skala auswertbar	Anzahl	236		
		Anteil in %	97,93		
		Anteil 2 in %	47,20		
	transformierte Skalenwerte	Mean	63,16		
		SD	23,39		
		CI	[60,18; 66,15]		
		Range: Min.	0,00		
		Range: Max.	100,00		
		z-Wert	-0,65		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>		

Tabelle 8.10 gibt Auskunft über die **körperliche Summenskala** des SF-36. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Summenskala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert Wert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts halbjahr 500 Patienten. 244 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 226 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der „Körperlichen Summenskala“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 35,08.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 190 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 87,37 Prozent alle nötigen Fragen, die „Körperliche Summenskala“ betreffend beantwortet und wurden so für die Auswertung der Skala berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 33,14.

Tabelle 8.10 Körperliche Summenskala

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	Körperliche Summenskala: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2006-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	369	275
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	190	167
		Anteil in %	48,80	51,49	60,73
	für Skala auswertbar	Anzahl	226	166	146
		Anteil in %	92,62	87,37	87,43
		Anteil 2 in %*	45,20	44,99	53,09
	transformierte Skalenwerte	Mean	35,08	33,14	32,64
		SD	11,68	10,97	11,13
		CI	[33,56; 36,60]	[31,47; 34,81]	[30,84; 34,45]
		Range: Min.	8,69	10,39	11,38
		Range: Max.	65,91	57,61	58,57
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>10718</i>	<i>8292</i>	
2007-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	371	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	201	197	159
		Anteil in %	40,20	53,10	56,58
	für Skala auswertbar	Anzahl	184	178	147
		Anteil in %	91,54	90,36	92,45
		Anteil 2 in %*	36,80	47,98	52,31
	transformierte Skalenwerte	Mean	36,85	36,49	34,26
		SD	11,80	11,46	10,94
		CI	[35,14; 38,55]	[34,80; 38,17]	[32,49; 36,03]
		Range: Min.	11,06	14,01	14,10
		Range: Max.	58,57	59,46	58,36
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>13722</i>	<i>10635</i>	
2007-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	364	277
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	234	175	138
		Anteil in %	46,80	48,08	49,82
	für Skala auswertbar	Anzahl	206	160	124
		Anteil in %	88,03	91,43	89,86
		Anteil 2 in %*	41,20	43,96	44,77
	transformierte Skalenwerte	Mean	35,92	35,71	35,23
		SD	12,57	12,03	11,96
		CI	[34,21; 37,64]	[33,85; 37,57]	[33,12; 37,33]
		Range: Min.	7,78	9,61	15,16
		Range: Max.	61,77	61,03	59,27
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>7735</i>	<i>5936</i>	

EZ	Körperliche Summenskala: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	376	299
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	246	217	174
		Anteil in %	49,20	57,71	58,19
	für Skala auswertbar	Anzahl	223	190	160
		Anteil in %	90,65	87,56	91,95
		Anteil 2 in %*	44,60	50,53	53,51
	transformierte Skalenwerte	Mean	35,74	35,45	34,16
		SD	11,88	10,98	10,93
		CI	[34,18; 37,30]	[33,89; 37,01]	[32,46; 35,85]
		Range: Min.	11,78	11,66	14,94
		Range: Max.	58,91	56,88	66,89
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>7156</i>	<i>5643</i>
	2008-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	397
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	248	194	
		Anteil in %	49,60	48,87	
für Skala auswertbar		Anzahl	219	169	
		Anteil in %	88,31	87,11	
		Anteil 2 in %*	43,80	42,57	
transformierte Skalenwerte		Mean	35,87	34,08	
		SD	11,47	10,97	
		CI	[34,35; 37,39]	[32,43; 35,73]	
		Range: Min.	14,79	12,83	
		Range: Max.	64,78	62,18	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>5008</i>	
2009-1		Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	396	310
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	179	172	
		Anteil in %	45,20	55,48	
	für Skala auswertbar	Anzahl	164	159	
		Anteil in %	91,62	92,44	
		Anteil 2 in %*	41,41	51,29	
	transformierte Skalenwerte	Mean	37,04	36,67	
		SD	12,43	12,19	
		CI	[35,13; 38,94]	[34,77; 38,56]	
		Range: Min.	10,69	12,93	
		Range: Max.	57,91	58,75	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>4221</i>	
	2009-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	392
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	240	207	
		Anteil in %	48,00	52,81	
für Skala auswertbar		Anzahl	210	185	
		Anteil in %	87,50	89,37	
		Anteil 2 in %*	42,00	47,19	
transformierte Skalenwerte		Mean	36,21	35,24	
		SD	11,22	11,24	
		CI	[34,69; 37,72]	[33,62; 36,86]	
		Range: Min.	12,16	10,91	
		Range: Max.	62,71	59,62	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>4483</i>	

EZ	Körperliche Summenskala: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	372	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	258	196	
		Anteil in %	51,60	52,69	
	für Skala auswertbar	Anzahl	233	184	
		Anteil in %	90,31	93,88	
		Anteil 2 in %*	46,60	49,46	
	transformierte Skalenwerte	Mean	37,91	36,70	
		SD	12,20	11,52	
		CI	[36,34; 39,47]	[35,03; 38,36]	
		Range: Min.	10,89	10,60	
		Range: Max.	59,16	60,80	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>5055</i>		
2010-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	285		
		Anteil in %	57,00		
	für Skala auswertbar	Anzahl	258		
		Anteil in %	90,53		
		Anteil 2 in %*	51,60		
	transformierte Skalenwerte	Mean	36,67		
		SD	11,36		
		CI	[35,28; 38,06]		
		Range: Min.	14,02		
		Range: Max.	61,11		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>			
2011-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	239		
		Anteil in %	47,80		
	für Skala auswertbar	Anzahl	218		
		Anteil in %	91,21		
		Anteil 2 in %*	43,60		
	transformierte Skalenwerte	Mean	38,77		
		SD	12,06		
		CI	[37,17; 40,37]		
		Range: Min.	8,47		
		Range: Max.	63,19		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>			
2011-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222		
		Anteil in %	44,40		
	für Skala auswertbar	Anzahl	202		
		Anteil in %	90,99		
		Anteil 2 in %*	40,40		
	transformierte Skalenwerte	Mean	37,51		
		SD	12,60		
		CI	[35,77; 39,25]		
		Range: Min.	13,71		
		Range: Max.	66,79		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>			

EZ	Körperliche Summenskala: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	241		
		Anteil in %	48,20		
	für Skala auswertbar	Anzahl	222		
		Anteil in %	92,12		
		Anteil 2 in %	44,40		
	transformierte Skalenwerte	Mean	37,48		
		SD	11,46		
		CI	[35,97; 38,98]		
		Range: Min.	13,60		
		Range: Max.	57,77		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>			

Tabelle 8.11 gibt Auskunft über die **psychische Summenskala** des SF-36. Die transformierten Skalenwerte können Werte zwischen „0“ (schlechtester Wert) und „100“ (bester Wert) in dieser Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität annehmen. Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung der Summenskala herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Skalenwert.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitritts halbjahr 500 Patienten. 244 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 226 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung der „Psychischen Summenskala“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Skalenwert bei 46,24.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 190 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 87,37 Prozent alle notwendigen Fragen für die Auswertung der „Psychische Summenskala“ beantwortet. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 44,88.

Tabelle 8.11 Psychische Summenskala

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
			Anzahl	Anzahl	Anzahl	
2006-2	Stichprobenmitglieder (brutto)		Anzahl	500	369	275
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	190	167	
		Anteil in %	48,80	51,49	60,73	
	für Skala auswertbar	Anzahl	226	166	146	
		Anteil in %	92,62	87,37	87,43	
		Anteil 2 in %*	45,20	44,99	53,09	
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,24	44,88	45,13	
		SD	11,61	12,32	12,26	
		CI	[44,73; 47,76]	[43,01; 46,76]	[43,15; 47,12]	
		Range: Min.	17,98	17,15	16,86	
		Range: Max.	67,92	66,69	69,57	
	<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>14493</i>	<i>10718</i>	<i>8292</i>
	2007-1	Stichprobenmitglieder (brutto)		Anzahl	500	371
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	201	197	159	
		Anteil in %	40,20	53,10	56,58	
für Skala auswertbar		Anzahl	184	178	147	
		Anteil in %	91,54	90,36	92,45	
		Anteil 2 in %*	36,80	47,98	52,31	
transformierte Skalenwerte		Mean	47,06	47,49	47,56	
		SD	11,47	11,33	10,96	
		CI	[45,41; 48,72]	[45,82; 49,15]	[45,79; 49,33]	
		Range: Min.	17,34	21,06	20,12	
		Range: Max.	64,91	66,16	64,69	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>18117</i>	<i>13722</i>	<i>10635</i>	
2007-2		Stichprobenmitglieder (brutto)		Anzahl	500	364
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	234	175	138	
		Anteil in %	46,80	48,08	49,82	
	für Skala auswertbar	Anzahl	206	160	124	
		Anteil in %	88,03	91,43	89,86	
		Anteil 2 in %*	41,20	43,96	44,77	
	transformierte Skalenwerte	Mean	45,72	46,46	44,47	
		SD	12,21	11,76	11,51	
		CI	[44,06; 47,39]	[44,64; 48,29]	[42,45; 46,50]	
		Range: Min.	17,18	18,43	21,50	
		Range: Max.	68,65	73,04	67,43	
	<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>7735</i>	<i>5936</i>

EZ	Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2008-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	376	299
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	246	217	174
		Anteil in %	49,20	57,71	58,19
	für Skala auswertbar	Anzahl	223	190	160
		Anteil in %	90,65	87,56	91,95
		Anteil 2 in %	44,60	50,53	53,51
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,32	47,73	45,02
		SD	11,66	10,51	11,70
		CI	[45,79; 48,86]	[46,24; 49,23]	[43,20; 46,83]
		Range: Min.	16,14	8,96	15,96
		Range: Max.	71,12	72,44	65,11
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>7156</i>	<i>5643</i>
	2008-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	397
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	248	194	
		Anteil in %	49,60	48,87	
für Skala auswertbar		Anzahl	219	169	
		Anteil in %	88,31	87,11	
		Anteil 2 in %	43,80	42,57	
transformierte Skalenwerte		Mean	45,51	43,82	
		SD	11,91	11,68	
		CI	[43,94; 47,09]	[42,06; 45,58]	
		Range: Min.	10,44	12,73	
		Range: Max.	69,71	70,13	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>5008</i>	
2009-1		Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	396	310
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	179	172	
		Anteil in %	45,20	55,48	
	für Skala auswertbar	Anzahl	164	159	
		Anteil in %	91,62	92,44	
		Anteil 2 in %	41,41	51,29	
	transformierte Skalenwerte	Mean	47,34	45,93	
		SD	11,84	12,24	
		CI	[45,52; 49,15]	[44,03; 47,84]	
		Range: Min.	13,14	7,14	
		Range: Max.	68,55	69,55	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>4221</i>	
	2009-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	392
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	240	207	
		Anteil in %	48,00	52,81	
für Skala auswertbar		Anzahl	210	185	
		Anteil in %	87,50	89,37	
		Anteil 2 in %	42,00	47,19	
transformierte Skalenwerte		Mean	47,48	46,17	
		SD	12,12	11,79	
		CI	[45,84; 49,12]	[44,47; 47,87]	
		Range: Min.	17,66	11,35	
		Range: Max.	66,27	68,43	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>4483</i>	

EZ	Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	372	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	258	196	
		Anteil in %	51,60	52,69	
	für Skala auswertbar	Anzahl	233	184	
		Anteil in %	90,31	93,88	
		Anteil 2 in %*	46,60	49,46	
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,95	47,15	
		SD	11,75	10,97	
		CI	[45,44; 48,46]	[45,57; 48,74]	
		Range: Min.	14,98	13,43	
		Range: Max.	69,75	66,65	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>5055</i>		
2010-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	285		
		Anteil in %	57,00		
	für Skala auswertbar	Anzahl	258		
		Anteil in %	90,53		
		Anteil 2 in %*	51,60		
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,29		
		SD	11,89		
		CI	[44,84; 47,75]		
		Range: Min.	15,54		
		Range: Max.	67,99		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>			
2011-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	239		
		Anteil in %	47,80		
	für Skala auswertbar	Anzahl	218		
		Anteil in %	91,21		
		Anteil 2 in %*	43,60		
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,91		
		SD	11,36		
		CI	[45,40; 48,42]		
		Range: Min.	18,01		
		Range: Max.	68,20		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>			
2011-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222		
		Anteil in %	44,40		
	für Skala auswertbar	Anzahl	202		
		Anteil in %	90,99		
		Anteil 2 in %*	40,40		
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,40		
		SD	12,72		
		CI	[44,65; 48,16]		
		Range: Min.	17,83		
		Range: Max.	69,72		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>			

EZ	Psychische Summenskala: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2012-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	241		
		Anteil in %	48,20		
	für Skala auswertbar	Anzahl	222		
		Anteil in %	92,12		
		Anteil 2 in %	44,40		
	transformierte Skalenwerte	Mean	46,61		
		SD	12,59		
		CI	[44,96; 48,27]		
		Range: Min.	12,46		
		Range: Max.	68,00		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>			

Tabelle 8.12 gibt Auskunft über den **SF-6D-Gesamtindex**. Der SF-6D (Short Form – 6 Dimensions) ist ein krankheitsübergreifendes, standardisiertes Verfahren um die Lebensqualität in Form eines eindimensionalen Index- bzw. Nutzwertes subjektiv zu messen. Der Wertebereich reicht dabei von „0“ (schlechtester Gesundheitszustand) bis „1“ (bestmöglicher Gesundheitszustand). Zunächst werden Angaben darüber gemacht, wie viele Patienten Stichprobenmitglieder waren, wie viele von Ihnen den Fragebogen zurückgesendet haben und wie viele Patienten alle Fragen beantwortet haben, die zur Auswertung des SF-6D-Gesamtindex herangezogen werden. Anschließend werden für diese Personengruppe die transformierten Skalenwerte ausgewiesen – neben dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Konfidenzintervall auch die Range, d.h. das Intervall zwischen kleinstem und größtem berechneten Indexwert. Darüber hinaus wird ausgewiesen, wie groß die Differenz zwischen der aktuellen Befragung und der ersten Befragung nach dem Beitrittsjahr auf patientenindividueller Ebene im Durchschnitt ist.

In der Kohorte 2006-2 umfasste die Stichprobe für die Befragung nach dem Beitrittsjahr 500 Patienten. 244 von ihnen sendeten den Fragebogen zurück. 228 Patienten hatten alle Fragen beantwortet, die zur Berechnung des „SF-6D-Gesamtindex“ notwendig waren. Im Durchschnitt dieser Patienten lag der Indexwert bei 0,63.

Im Rahmen der ersten Wiederholungsbefragung sendeten 190 Patienten ihren Fragebogen zurück. Von ihnen hatten 90,53 Prozent alle nötigen Fragen zur Ermittlung des „SF-6D-Gesamtindex“ beantwortet und wurden so für die Auswertung des Index berücksichtigt. Der durchschnittliche Skalenwert dieser Patienten lag bei 0,60.

Tabelle 8.12 SF-6D-Gesamtindex: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse

* Dieser Anteilswert bezieht sich auf die Zahl der Stichprobenmitglieder insgesamt, d.h. derjenigen Patienten, an die ein Fragebogen verschickt wurde.

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr	
2006-2	Stichprobenmitglieder (brutto)		Anzahl	500	369	275
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	244	190	167	
		Anteil in %	48,80	51,49	60,73	
	für Skala auswertbar	Anzahl	228	172	148	
		Anteil in %	93,44	90,53	88,62	
		Anteil 2 in %	45,60	46,61	53,82	
	Indexwert	Mean	0,63	0,60	0,60	
		SD	0,14	0,15	0,14	
		CI	[0,61; 0,65]	[0,58; 0,62]	[0,58; 0,62]	
		Range: Min.	0,32	0,30	0,30	
		Range: Max.	1,00	1,00	0,96	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,04	-0,05	
		CI		[-0,06; -0,02]	[-0,08; -0,03]	
		Fallbasis		128	98	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	14493	10718	8292	
2007-1	Stichprobenmitglieder (brutto)		Anzahl	500	371	281
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	201	197	159	
		Anteil in %	40,20	53,10	56,58	
	für Skala auswertbar	Anzahl	188	179	146	
		Anteil in %	93,53	90,86	91,82	
		Anteil 2 in %	37,60	48,25	51,96	
	Indexwert	Mean	0,64	0,65	0,63	
		SD	0,16	0,15	0,15	
		CI	[0,62; 0,67]	[0,63; 0,67]	[0,61; 0,65]	
		Range: Min.	0,30	0,30	0,32	
		Range: Max.	1,00	1,00	1,00	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,01	-0,03	
		CI		[-0,03; 0,01]	[-0,05; -0,01]	
		Fallbasis		111	93	
<i>Patienten insgesamt</i>		<i>Anzahl</i>	18117	13722	10635	

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2007-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	364	277
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	234	175	138
		Anteil in %	46,80	48,08	49,82
	für Skala auswertbar	Anzahl	209	157	119
		Anteil in %	89,32	89,71	86,23
		Anteil 2 in %	41,80	43,13	42,96
	Indexwert	Mean	0,63	0,64	0,61
		SD	0,16	0,16	0,14
		CI	[0,61; 0,65]	[0,61; 0,66]	[0,59; 0,64]
		Range: Min.	0,30	0,30	0,32
		Range: Max.	1,00	1,00	1,00
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		0,00	-0,04
		CI		[-0,02; 0,02]	[-0,06; -0,01]
		Fallbasis		112	77
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10330</i>	<i>7735</i>	<i>5936</i>	
2008-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	376	299
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	246	217	174
		Anteil in %	49,20	57,71	58,19
	für Skala auswertbar	Anzahl	222	193	164
		Anteil in %	90,24	88,94	94,25
		Anteil 2 in %	44,40	51,33	54,85
	Indexwert	Mean	0,64	0,64	0,61
		SD	0,16	0,13	0,14
		CI	[0,62; 0,66]	[0,62; 0,66]	[0,59; 0,63]
		Range: Min.	0,32	0,30	0,32
		Range: Max.	1,00	0,97	0,97
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,01	-0,03
		CI		[-0,03; 0,01]	[-0,05; -0,01]
		Fallbasis		130	109
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>9430</i>	<i>7156</i>	<i>5643</i>	
2008-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	397	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	248	194	
		Anteil in %	49,60	48,87	
	für Skala auswertbar	Anzahl	220	173	
		Anteil in %	88,71	89,18	
		Anteil 2 in %	44,00	43,58	
	Indexwert	Mean	0,64	0,60	
		SD	0,15	0,14	
		CI	[0,62; 0,66]	[0,58; 0,62]	
		Range: Min.	0,30	0,30	
		Range: Max.	1,00	0,97	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,04	
		CI		[-0,06; -0,01]	
		Fallbasis		119	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6552</i>	<i>5008</i>		

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2009-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	396	310	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	179	172	
		Anteil in %	45,20	55,48	
	für Skala auswertbar	Anzahl	164	158	
		Anteil in %	91,62	91,86	
		Anteil 2 in %	41,41	50,97	
	Indexwert	Mean	0,66	0,64	
		SD	0,15	0,16	
		CI	[0,64; 0,68]	[0,62; 0,67]	
		Range: Min.	0,32	0,30	
		Range: Max.	1,00	1,00	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,03	
		CI		[-0,05; -0,01]	
		Fallbasis		107	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5527</i>	<i>4221</i>		
2009-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	392	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	240	207	
		Anteil in %	48,00	52,81	
	für Skala auswertbar	Anzahl	214	184	
		Anteil in %	89,17	88,89	
		Anteil 2 in %	42,80	46,94	
	Indexwert	Mean	0,64	0,64	
		SD	0,15	0,14	
		CI	[0,62; 0,66]	[0,61; 0,66]	
		Range: Min.	0,30	0,30	
		Range: Max.	0,97	1,00	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,03	
		CI		[-0,05; -0,01]	
		Fallbasis		128	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5982</i>	<i>4483</i>		
2010-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	372	
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	258	196	
		Anteil in %	51,60	52,69	
	für Skala auswertbar	Anzahl	238	183	
		Anteil in %	92,25	93,37	
		Anteil 2 in %	47,60	49,19	
	Indexwert	Mean	0,65	0,64	
		SD	0,15	0,15	
		CI	[0,63; 0,67]	[0,62; 0,67]	
		Range: Min.	0,30	0,32	
		Range: Max.	1,00	0,93	
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung		-0,03	
		CI		[-0,05; -0,01]	
		Fallbasis		133	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6630</i>	<i>5055</i>		

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts-halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
2010-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	285		
		Anteil in %	57,00		
	für Skala auswertbar	Anzahl	261		
		Anteil in %	91,58		
		Anteil 2 in %	52,20		
	Indexwert	Mean	0,64		
		SD	0,15		
		CI	[0,63; 0,66]		
		Range: Min.	0,30		
		Range: Max.	1,00		
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung			
		CI			
		Fallbasis			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6682</i>			
2011-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	239		
		Anteil in %	47,80		
	für Skala auswertbar	Anzahl	213		
		Anteil in %	89,12		
		Anteil 2 in %	42,60		
	Indexwert	Mean	0,66		
		SD	0,15		
		CI	[0,64; 0,68]		
		Range: Min.	0,30		
		Range: Max.	1,00		
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung			
		CI			
		Fallbasis			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6352</i>			
2011-2	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500		
	mit zurückgesendetem Fragebogen	Anzahl	222		
		Anteil in %	44,40		
	für Skala auswertbar	Anzahl	203		
		Anteil in %	91,44		
		Anteil 2 in %	40,60		
	Indexwert	Mean	0,65		
		SD	0,16		
		CI	[0,63; 0,68]		
		Range: Min.	0,30		
		Range: Max.	1,00		
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung			
		CI			
		Fallbasis			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5365</i>			

EZ	SF-6D Gesamtindex: Stichprobenmitglieder und ihre Ergebnisse		Befragung nach Beitritts- halbjahr	Befragung nach 5. Halbjahr	Befragung nach 9. Halbjahr
	2012-1	Stichprobenmitglieder (brutto)	Anzahl	500	
mit zurückgesendetem Fragebogen		Anzahl	241		
		Anteil in %	48,20		
für Skala auswertbar		Anzahl	220		
		Anteil in %	91,29		
		Anteil 2 in %	44,00		
Indexwert		Mean	0,65		
		SD	0,16		
		CI	[0,63; 0,67]		
		Range: Min.	0,30		
		Range: Max.	1,00		
		Mittlere Differenz zur Erstbefragung			
		CI			
		Fallbasis			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5991</i>			

Anhang A: Auswertung für Patienten ohne Endpunkte

Im Hauptteil des vorliegenden Evaluationsberichtes wurden in den Auswertungskapiteln 1 und 2 unter anderem tabellarische Auswertungen zu den Patientenzahlen und -merkmalen sowie zu Raucherstatus, Hypertonus und HbA1c-Werten vorgenommen. Diese Auswertungen bezogen sich auf die Gesamtheit der Patienten. Im folgenden Anhang A werden diese Auswertungen nochmals für die Subkohorte der **Patienten ohne Endpunkte** in der Erstdokumentation vorgenommen. Um den Vergleich zwischen den Auswertungen im Hauptteil und im Anhang zu erleichtern, wurden die Auswertungskapitel und Tabellen im Anhang analog zu zum Hauptteil nummeriert. Da das Auswertungskapitel 2 im Anhang entfällt, folgt auf das Auswertungskapitel A.1 direkt das Auswertungskapitel A.3. Vergleichbares gilt für die Tabellen; deren Nummerierung ist im Anhang daher nicht fortlaufend.

Die Subkohorten werden gebildet, indem die Patienten jeder Kohorte nach dem Schweregrad ihrer Begleit- oder Folgeerkrankungen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation in drei Gruppen unterteilt werden. Bei diesen Begleit- oder Folgeerkrankungen handelt es sich zumeist um schwerste Organschädigungen bzw. Organversagen, verursacht durch eine langjährige diabetische Stoffwechsellage, letztlich bedingt durch Mikro-Gefäßerkrankungen. Die Begleit- oder Folgeerkrankungen werden als „Endpunkte“ bezeichnet. Dieser Begriff ist zentral für die Definition der drei Subkohorten gemäß der BVA-Kriterien:

- Patienten **ohne Endpunkte** in der Erstdokumentation
- Patienten **mit primären, d.h. gravierenden Endpunkten** in der Erstdokumentation (*Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit*)
- Patienten nur mit **sekundären, d.h. weniger gravierenden Endpunkten** (*diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, erheblich auffälliger Fußstatus (Stadium 2 bis Stadium 5 nach Wagner ODER Stadium C bis D nach Armstrong), periphere arterielle Verschlusskrankheit, diabetische Retinopathie*)

Für die Zuordnung der Patienten zu den Subkohorten ist die jeweils gravierendste (Begleit- oder Folge-) Erkrankung entscheidend. Patienten ohne Endpunkte sind Patienten, die nicht den Subkohorten 2 oder 3 zuzuordnen sind. Patienten mit sowohl primären als auch sekundären Endpunkten werden daher der Subkohorte der Patienten mit primären Endpunkten zugeordnet. Die anhand der Erstdokumentation vorgenommene Einteilung in Subkohorten bleibt über den ganzen Berichtszeitraum bestehen, unabhängig davon, ob im weiteren Zeitverlauf Begleit- oder Folgeerkrankungen eines höheren Schweregrads auftreten oder nicht.

Zu beachten ist dabei, dass aufgrund der Änderungen im Dokumentationsbogen durch die 9. RSA-ÄndV nicht alle medizinisch relevanten Kriterien in vergleichbarer Weise für die Halbjahre bis 2004-1 einerseits bzw. ab 2004-2 andererseits vorliegen. Daher kann z.B. das Vorliegen einer Nierenersatztherapie nicht als Kriterium für die Abgrenzung der Subkohorten verwendet werden. Auch werden zwar periphere arterielle Verschlusskrankheiten (pAVK) bei der Bildung der Subkohorten berücksichtigt, nicht aber koronare Herzkrankheiten (KHK). Andere Begleit- oder Folgeerkrankungen wie z.B. Hypertonus werden bei der Abgrenzung der primären und sekundären Endpunkte ebenfalls nicht berücksichtigt.

Auswertungskapitel A.1: Patientenzahlen und -merkmale

In den folgenden vier Tabellen ist die Entwicklung der **Patientenzahlen** ab dem Programmeintritt und in den darauffolgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Alle Patienten eines Beitrittsjahres bilden dabei eine Kohorte. Differenziert wird in den Tabellen nach den folgenden Kriterien:

- Geschlechtsverteilung
- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Alter und Altersverteilung
- mittlere und mediane Beobachtungszeit
- Vorliegen einer medizinischen Dokumentation

In Tabelle A.1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerzahlen im Programm differenziert nach Kohorten und Geschlecht ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patienten jeweils im Beitrittsjahr und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmer waren.

Beispielsweise sind in der Kohorte 2003-1 insgesamt 11816 Teilnehmer in das Programm gestartet. Darunter waren 4463 Männer und 7353 Frauen. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres waren in dieser Kohorte noch 3312 Teilnehmer im Programm, 1235 Männer und 2077 Frauen. Diese Teilnehmer bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle A.1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte ohne Endpunkte

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	11816	10849	9883	9067	8272	7705	7151	6132	5721	5287	5081	4776	4533	4332	4084	3845	3644	3478	3312
	männlich	Anzahl	4463	4061	3677	3354	3049	2827	2607	2219	2078	1922	1850	1755	1670	1611	1523	1430	1357	1294	1235
		Anteil in %	37,77	37,43	37,21	36,99	36,86	36,69	36,46	36,19	36,32	36,35	36,41	36,75	36,84	37,19	37,29	37,19	37,24	37,21	37,29
	weiblich	Anzahl	7353	6788	6206	5713	5223	4878	4544	3913	3643	3365	3231	3021	2863	2721	2561	2415	2287	2184	2077
Anteil in %		62,23	62,57	62,79	63,01	63,14	63,31	63,54	63,81	63,68	63,65	63,59	63,25	63,16	62,81	62,71	62,81	62,76	62,79	62,71	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10121	8824	8032	7226	6602	6085	5543	5120	4661	4482	4247	4041	3826	3647	3474	3313	3131	2988	
	männlich	Anzahl	3995	3455	3118	2785	2532	2322	2118	1964	1798	1728	1645	1560	1473	1400	1333	1268	1198	1141	
		Anteil in %	39,47	39,15	38,82	38,54	38,35	38,16	38,21	38,36	38,58	38,55	38,73	38,60	38,50	38,39	38,37	38,27	38,26	38,19	
	weiblich	Anzahl	6126	5369	4914	4441	4070	3763	3425	3156	2863	2754	2602	2481	2353	2247	2141	2045	1933	1847	
Anteil in %		60,53	60,85	61,18	61,46	61,65	61,84	61,79	61,64	61,42	61,45	61,27	61,40	61,50	61,61	61,63	61,73	61,74	61,81		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4732	4221	3732	3386	3072	2768	2575	2363	2254	2108	1990	1890	1704	1627	1554	1498			
	männlich	Anzahl	1952	1740	1532	1375	1249	1107	1034	939	896	837	787	747	722	686	655	627	606		
		Anteil in %	41,25	41,22	41,05	40,61	40,66	39,99	40,16	39,74	39,75	39,71	39,55	39,52	39,98	40,26	40,26	40,35	40,45		
	weiblich	Anzahl	2780	2481	2200	2011	1823	1661	1541	1424	1358	1271	1203	1143	1084	1018	972	927	892		
Anteil in %		58,75	58,78	58,95	59,39	59,34	60,01	59,84	60,26	60,25	60,29	60,45	60,48	60,02	59,74	59,74	59,65	59,55			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	3573	3250	2972	2723	2456	2307	2154	2074	1938	1853	1772	1689	1609	1536	1462	1398			
	männlich	Anzahl	1467	1321	1202	1102	997	944	868	829	769	731	698	661	639	611	585	558			
		Anteil in %	41,06	40,65	40,44	40,47	40,59	40,92	40,30	39,97	39,68	39,45	39,39	39,14	39,71	39,78	40,01	39,91			
	weiblich	Anzahl	2106	1929	1770	1621	1459	1363	1286	1245	1169	1122	1074	1028	970	925	877	840			
Anteil in %		58,94	59,35	59,56	59,53	59,41	59,08	59,70	60,03	60,32	60,55	60,61	60,86	60,29	60,22	59,99	60,09				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5126	4778	4364	3907	3558	3309	3148	2963	2824	2661	2526	2397	2303	2205	2120				
	männlich	Anzahl	2120	1971	1793	1584	1432	1332	1255	1181	1140	1063	1008	959	926	885	852				
		Anteil in %	41,36	41,25	41,09	40,54	40,25	40,25	39,87	39,86	40,37	39,95	39,90	40,01	40,21	40,14	40,19				
	weiblich	Anzahl	3006	2807	2571	2323	2126	1977	1893	1782	1684	1598	1518	1438	1377	1320	1268				
Anteil in %		58,64	58,75	58,91	59,46	59,75	59,75	60,13	60,14	59,63	60,05	60,10	59,99	59,79	59,86	59,81					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6730	6209	5669	5188	4785	4530	4217	3994	3779	3583	3359	3189	3038	2890					
	männlich	Anzahl	2703	2470	2263	2063	1905	1802	1669	1587	1504	1426	1333	1271	1210	1141					
		Anteil in %	40,16	39,78	39,92	39,76	39,81	39,78	39,58	39,73	39,80	39,80	39,68	39,86	39,83	39,48					
	weiblich	Anzahl	4027	3739	3406	3125	2880	2728	2548	2407	2275	2157	2026	1918	1828	1749					
Anteil in %		59,84	60,22	60,08	60,24	60,19	60,22	60,42	60,27	60,20	60,20	60,32	60,14	60,17	60,52						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7701	7230	6624	6126	5851	5453	5178	4900	4649	4384	4171	3943	3796						
	männlich	Anzahl	3148	2945	2670	2440	2320	2150	2048	1915	1790	1680	1599	1519	1463						
		Anteil in %	40,88	40,73	40,31	39,83	39,65	39,43	39,55	39,08	38,50	38,32	38,34	38,52	38,54						
	weiblich	Anzahl	4553	4285	3954	3686	3531	3303	3130	2985	2859	2704	2572	2424	2333						
Anteil in %		59,12	59,27	59,69	60,17	60,35	60,57	60,45	60,92	61,50	61,68	61,66	61,48	61,46							
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10039	9574	8808	8261	7597	7190	6749	6421	6044	5752	5457	5188							
	männlich	Anzahl	4114	3913	3580	3345	3063	2883	2713	2578	2418	2293	2178	2075							
		Anteil in %	40,98	40,87	40,64	40,49	40,32	40,10	40,20	40,15	40,01	39,86	39,91	40,00							
	weiblich	Anzahl	5925	5661	5228	4916	4534	4307	4036	3843	3626	3459	3279	3113							
Anteil in %		59,02	59,13	59,36	59,51	59,68	59,90	59,80	59,85	59,99	60,14	60,09	60,00								
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	13038	12428	11713	10706	10073	9485	8960	8421	7998	7586	7253								
	männlich	Anzahl	5255	4979	4667	4259	4010	3763	3542	3329	3158	2986	2842								
		Anteil in %	40,31	40,06	39,84	39,78	39,81	39,67	39,53	39,53	39,48	39,36	39,18								
	weiblich	Anzahl	7783	7449	7046	6447	6063	5722	5418	5092	4840	4600	4411								
Anteil in %		59,69	59,94	60,16	60,22	60,19	60,33	60,47	60,47	60,52	60,64	60,82									

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte ohne Endpunkte		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	7565	7309	6753	6290	5830	5472	5173	4889	4618	4406										
	männlich	Anzahl	3140	3029	2773	2569	2382	2234	2110	1998	1890	1806										
		Anteil in %	41,51	41,44	41,06	40,84	40,86	40,83	40,79	40,87	40,93	40,99										
	weiblich	Anzahl	4425	4280	3980	3721	3448	3238	3063	2891	2728	2600										
		Anteil in %	58,49	58,56	58,94	59,16	59,14	59,17	59,21	59,13	59,07	59,01										
	2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7090	6842	6424	5924	5514	5191	4923	4677	4452										
männlich		Anzahl	2971	2865	2690	2473	2287	2140	2038	1938	1836											
		Anteil in %	41,90	41,87	41,87	41,75	41,48	41,23	41,40	41,44	41,24											
weiblich		Anzahl	4119	3977	3734	3451	3227	3051	2885	2739	2616											
		Anteil in %	58,10	58,13	58,13	58,25	58,52	58,77	58,60	58,56	58,76											
2008-2		Patienten insgesamt	Anzahl	5123	4955	4617	4293	3992	3733	3522	3336											
	männlich	Anzahl	2141	2064	1923	1784	1652	1537	1457	1383												
		Anteil in %	41,79	41,65	41,65	41,56	41,38	41,17	41,37	41,46												
	weiblich	Anzahl	2982	2891	2694	2509	2340	2196	2065	1953												
		Anteil in %	58,21	58,35	58,35	58,44	58,62	58,83	58,63	58,54												
	2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4373	4217	3920	3632	3418	3201	3030												
männlich		Anzahl	1879	1810	1667	1533	1435	1340	1273													
		Anteil in %	42,97	42,92	42,53	42,21	41,98	41,86	42,01													
weiblich		Anzahl	2494	2407	2253	2099	1983	1861	1757													
		Anteil in %	57,03	57,08	57,47	57,79	58,02	58,14	57,99													
2009-2		Patienten insgesamt	Anzahl	4773	4564	4188	3889	3662	3449													
	männlich	Anzahl	2018	1918	1746	1622	1534	1428														
		Anteil in %	42,28	42,02	41,69	41,71	41,89	41,40														
	weiblich	Anzahl	2755	2646	2442	2267	2128	2021														
		Anteil in %	57,72	57,98	58,31	58,29	58,11	58,60														
	2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5317	5128	4757	4411	4135														
männlich		Anzahl	2323	2233	2057	1905	1775															
		Anteil in %	43,69	43,55	43,24	43,19	42,93															
weiblich		Anzahl	2994	2895	2700	2506	2360															
		Anteil in %	56,31	56,45	56,76	56,81	57,07															
2010-2		Patienten insgesamt	Anzahl	5301	5077	4716	4374															
	männlich	Anzahl	2250	2148	1989	1848																
		Anteil in %	42,44	42,31	42,18	42,25																
	weiblich	Anzahl	3051	2929	2727	2526																
		Anteil in %	57,56	57,69	57,82	57,75																
	2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4961	4773	4409																
männlich		Anzahl	2125	2032	1860																	
		Anteil in %	42,83	42,57	42,19																	
weiblich		Anzahl	2836	2741	2549																	
		Anteil in %	57,17	57,43	57,81																	
2011-2		Patienten insgesamt	Anzahl	4123	3969																	
	männlich	Anzahl	1799	1726																		
		Anteil in %	43,63	43,49																		
	weiblich	Anzahl	2324	2243																		
		Anteil in %	56,37	56,51																		
	2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4675																		
männlich		Anzahl	2081																			
		Anteil in %	44,51																			
weiblich		Anzahl	2594																			
		Anteil in %	55,49																			

Tabelle A.1.3 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patienten bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patienten aus dem Programm**. Dafür kommen beispielsweise Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse oder Beendigung durch den Patienten in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patienten werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2003-1 mit 11816 Teilnehmern. 8657 von ihnen bzw. 73,27 Prozent waren bis zum Ende des letzten Berichtshalbjahres ausgeschieden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle A.1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte ohne Endpunkte

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	967	1933	2749	3544	4111	4665	5684	6095	6529	6735	7040	7283	7484	7732	7971	8172	8338	8504	8657
		Anteil in %	8,18	16,36	23,27	29,99	34,79	39,48	48,10	51,58	55,26	57,00	59,58	61,64	63,34	65,44	67,46	69,16	70,57	71,97	73,27
		CI Anteil in %	[7,69; 8,68]	[15,69; 17,03]	[22,50; 24,03]	[29,17; 30,82]	[33,93; 35,65]	[38,60; 40,36]	[47,20; 49,01]	[50,68; 52,48]	[54,36; 56,15]	[56,11; 57,89]	[58,70; 60,47]	[60,76; 62,51]	[62,47; 64,21]	[64,58; 66,29]	[66,61; 68,30]	[68,33; 69,99]	[69,74; 71,39]	[71,16; 72,78]	[72,47; 74,06]
	davon wegen Tod	Anzahl	7	23	41	56	142	241	343	453	558	635	740	832	922	1023	1108	1199	1278	1359	1441
		Anteil in %	0,06	0,19	0,35	0,47	1,20	2,04	2,90	3,83	4,72	5,37	6,26	7,04	7,80	8,66	9,38	10,15	10,82	11,50	12,20
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	193	650	1127	1672	2039	2380	2582	2711	2750	2777	2815	2838	2886	2933	2976	3020	3059	3089	3108
		Anteil in %	1,63	5,50	9,54	14,15	17,26	20,14	21,85	22,94	23,27	23,50	23,82	24,02	24,42	24,82	25,19	25,56	25,89	26,14	26,30
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	6	19	81	103	127	152	172	212	239	295	309	335	368	429	456	467	490	510
		Anteil in %	0,00	0,05	0,16	0,69	0,87	1,07	1,29	1,46	1,79	2,02	2,50	2,62	2,84	3,11	3,63	3,86	3,95	4,15	4,32
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	767	1254	1562	1735	1827	1917	2607	2759	3009	3084	3190	3304	3341	3408	3458	3497	3534	3566	3598
Anteil %		6,49	10,61	13,22	14,68	15,46	16,22	22,06	23,35	25,47	26,10	27,00	27,96	28,28	28,84	29,27	29,60	29,91	30,18	30,45	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	11816	10849	9883	9067	8272	7705	7151	6132	5721	5287	5081	4776	4533	4332	4084	3845	3644	3478	3312
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	10849	9883	9067	8272	7705	7151	6132	5721	5287	5081	4776	4533	4332	4084	3845	3644	3478	3312	3159
2003-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	1297	2089	2895	3519	4036	4578	5001	5460	5639	5874	6080	6295	6474	6647	6808	6990	7133	7238	
		Anteil in %	12,81	20,64	28,60	34,77	39,88	45,23	49,41	53,95	55,72	58,04	60,07	62,20	63,97	65,68	67,27	69,06	70,48	71,51	
		CI Anteil in %	[12,16; 13,47]	[19,85; 21,43]	[27,72; 29,48]	[33,84; 35,70]	[38,92; 40,83]	[44,26; 46,20]	[48,44; 50,39]	[52,98; 54,92]	[54,75; 56,68]	[57,08; 59,00]	[59,12; 61,03]	[61,25; 63,14]	[63,03; 64,90]	[64,75; 66,60]	[66,35; 68,18]	[68,16; 69,96]	[69,59; 71,37]	[70,64; 72,39]	
	davon wegen Tod	Anzahl	8	18	30	100	184	263	349	423	482	560	629	726	782	861	930	1005	1077	1129	
		Anteil in %	0,08	0,18	0,30	0,99	1,82	2,60	3,45	4,18	4,76	5,53	6,21	7,17	7,73	8,51	9,19	9,93	10,64	11,16	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	269	619	1186	1651	1988	2198	2369	2404	2432	2451	2488	2523	2566	2598	2629	2661	2687	2702	
		Anteil in %	2,66	6,12	11,72	16,31	19,64	21,72	23,41	23,75	24,03	24,22	24,58	24,93	25,35	25,67	25,98	26,29	26,55	26,70	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	6	19	85	106	125	143	155	200	220	261	291	332	367	400	425	446	463	485	
		Anteil in %	0,06	0,19	0,84	1,05	1,24	1,41	1,53	1,98	2,17	2,58	2,88	3,28	3,63	3,95	4,20	4,41	4,57	4,79	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1014	1433	1594	1662	1739	1974	2128	2433	2505	2602	2672	2714	2759	2788	2824	2878	2906	2922	
Anteil %		10,02	14,16	15,75	16,42	17,18	19,50	21,03	24,04	24,75	25,71	26,40	26,82	27,26	27,55	27,90	28,44	28,71	28,87		
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	10121	8824	8032	7226	6602	6085	5543	5120	4661	4482	4247	4041	3826	3647	3474	3313	3131	2988	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	8824	8032	7226	6602	6085	5543	5120	4661	4482	4247	4041	3826	3647	3474	3313	3131	2988	2883	
2004-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	511	1000	1346	1660	1964	2157	2369	2478	2624	2742	2842	2926	3028	3105	3178	3234	3286		
		Anteil in %	10,80	21,13	28,44	35,08	41,50	45,58	50,06	52,37	55,45	57,95	60,06	61,83	63,99	65,62	67,16	68,34	69,44		
		CI Anteil in %	[9,91; 11,68]	[19,97; 22,30]	[27,16; 29,73]	[33,72; 36,44]	[40,10; 42,91]	[44,16; 47,00]	[48,64; 51,49]	[50,94; 53,79]	[54,04; 56,87]	[56,54; 59,35]	[58,66; 61,45]	[60,45; 63,22]	[62,62; 65,36]	[64,26; 66,97]	[65,82; 68,50]	[67,02; 69,67]	[68,13; 70,75]		
	davon wegen Tod	Anzahl	9	19	54	98	147	180	214	244	285	322	351	377	417	451	484	510	539		
		Anteil in %	0,19	0,40	1,14	2,07	3,11	3,80	4,52	5,16	6,02	6,80	7,42	7,97	8,81	9,53	10,23	10,78	11,39		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	269	575	824	1034	1174	1254	1292	1309	1321	1345	1375	1392	1410	1428	1435	1446	1451		
		Anteil in %	5,68	12,15	17,41	21,85	24,81	26,50	27,30	27,66	27,92	28,42	29,06	29,42	29,80	30,18	30,33	30,56	30,66		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	10	58	87	103	119	133	155	168	213	228	252	271	296	308	319	329	336		
		Anteil in %	0,21	1,23	1,84	2,18	2,51	2,81	3,28	3,55	4,50	4,82	5,33	5,73	6,26	6,51	6,74	6,95	7,10		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	223	348	381	425	524	590	708	757	805	847	864	886	905	918	940	949	960		
Anteil %		4,71	7,35	8,05	8,98	11,07	12,47	14,96	16,00	17,01	17,90	18,26	18,72	19,13	19,40	19,86	20,05	20,29			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	4732	4221	3732	3386	3072	2768	2575	2363	2254	2108	1990	1890	1806	1704	1627	1554	1498		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	4221	3732	3386	3072	2768	2575	2363	2254	2108	1990	1890	1806	1704	1627	1554	1498	1446		

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	323	601	850	1117	1266	1419	1499	1635	1720	1801	1884	1964	2037	2111	2175	2228		
		Anteil in %	9,04	16,82	23,79	31,26	35,43	39,71	41,95	45,76	48,14	50,41	52,73	54,97	57,01	59,08	60,87	62,36		
		CI Anteil in %	[8,10; 9,98]	[15,59; 18,05]	[22,39; 25,19]	[29,74; 32,78]	[33,86; 37,00]	[38,11; 41,32]	[40,34; 43,57]	[44,13; 47,39]	[46,50; 49,78]	[48,77; 52,05]	[51,09; 54,37]	[53,34; 56,60]	[55,39; 58,63]	[57,47; 60,69]	[59,27; 62,47]	[60,77; 63,95]		
	davon wegen Tod	Anzahl	4	25	59	94	120	143	174	203	231	267	296	324	355	392	420	441		
		Anteil in %	0,11	0,70	1,65	2,63	3,36	4,00	4,87	5,68	6,47	7,47	8,28	9,07	9,94	10,97	11,75	12,34		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	257	462	605	715	785	825	836	847	859	871	884	892	905	920	935	941		
		Anteil in %	7,19	12,93	16,93	20,01	21,97	23,09	23,40	23,71	24,04	24,38	24,74	24,97	25,33	25,75	26,17	26,34		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	27	41	51	62	69	91	105	142	154	176	192	213	227	237	247	261		
		Anteil in %	0,76	1,15	1,43	1,74	1,93	2,55	2,94	3,97	4,31	4,93	5,37	5,96	6,35	6,63	6,91	7,30		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	35	73	135	246	292	360	384	443	476	487	512	535	550	562	573	585		
Anteil in %		0,98	2,04	3,78	6,88	8,17	10,08	10,75	12,40	13,32	13,63	14,33	14,97	15,39	15,73	16,04	16,37			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	3573	3250	2972	2723	2456	2307	2154	2074	1938	1853	1772	1689	1609	1536	1462	1398		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	3250	2972	2723	2456	2307	2154	2074	1938	1853	1772	1689	1609	1536	1462	1398	1345		
2005-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	348	762	1219	1568	1817	1978	2163	2302	2465	2600	2729	2823	2921	3006	3088			
		Anteil in %	6,79	14,87	23,78	30,59	35,45	38,59	42,20	44,91	48,09	50,72	53,24	55,07	56,98	58,64	60,24			
		CI Anteil in %	[6,10; 7,48]	[13,89; 15,84]	[22,62; 24,95]	[29,33; 31,85]	[34,14; 36,76]	[37,25; 39,92]	[40,84; 43,55]	[43,55; 46,27]	[46,72; 49,46]	[49,35; 52,09]	[51,87; 54,60]	[53,71; 56,43]	[55,63; 58,34]	[57,29; 59,99]	[58,90; 61,58]			
	davon wegen Tod	Anzahl	13	60	119	169	218	269	316	355	407	458	513	556	603	635	681			
		Anteil in %	0,25	1,17	2,32	3,30	4,25	5,25	6,16	6,93	7,94	8,93	10,01	10,85	11,76	12,39	13,29			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	301	566	763	905	946	969	982	1010	1043	1073	1102	1115	1132	1148	1152			
		Anteil in %	5,87	11,04	14,88	17,66	18,45	18,90	19,16	19,70	20,35	20,93	21,50	21,75	22,08	22,40	22,47			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	16	44	74	91	120	141	200	214	268	305	326	350	364	381	395			
		Anteil in %	0,31	0,86	1,44	1,78	2,34	2,75	3,90	4,17	5,23	5,95	6,36	6,83	7,10	7,43	7,71			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	18	92	263	403	533	599	665	723	747	764	788	802	822	842	860			
Anteil in %		0,35	1,79	5,13	7,86	10,40	11,69	12,97	14,10	14,57	14,90	15,37	15,65	16,04	16,43	16,78				
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	5126	4778	4364	3907	3558	3309	3148	2963	2824	2661	2526	2397	2303	2205	2120			
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	4778	4364	3907	3558	3309	3148	2963	2824	2661	2526	2397	2303	2205	2120	2038			
2005-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	521	1061	1542	1945	2200	2513	2736	2951	3147	3371	3541	3692	3840	3958				
		Anteil in %	7,74	15,77	22,91	28,90	32,69	37,34	40,65	43,85	46,76	50,09	52,62	54,86	57,06	58,81				
		CI Anteil in %	[7,10; 8,38]	[14,89; 16,64]	[21,91; 23,92]	[27,82; 29,98]	[31,57; 33,81]	[36,18; 38,50]	[39,48; 41,83]	[42,66; 45,03]	[45,57; 47,95]	[48,89; 51,28]	[51,42; 53,81]	[53,67; 56,05]	[55,88; 58,24]	[57,64; 59,99]				
	davon wegen Tod	Anzahl	36	132	215	297	366	433	510	594	658	742	810	876	935	993				
		Anteil in %	0,53	1,96	3,19	4,41	5,44	6,43	7,58	8,83	9,78	11,03	12,04	13,02	13,89	14,75				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	427	638	840	923	969	1008	1049	1088	1140	1179	1222	1251	1274	1288				
		Anteil in %	6,34	9,48	12,48	13,71	14,40	14,98	15,59	16,17	16,94	17,52	18,16	18,59	18,93	19,14				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	30	73	89	133	167	264	301	348	391	434	460	483	516	535				
		Anteil in %	0,45	1,08	1,32	1,98	2,48	3,92	4,47	5,17	5,81	6,45	6,84	7,18	7,67	7,95				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	28	218	398	592	698	808	876	921	958	1016	1049	1082	1115	1142				
Anteil in %		0,42	3,24	5,91	8,80	10,37	12,01	13,02	13,68	14,23	15,10	15,59	16,08	16,57	16,97					
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	6730	6209	5669	5188	4785	4530	4217	3994	3779	3583	3359	3189	3038	2890				
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	6209	5669	5188	4785	4530	4217	3994	3779	3583	3359	3189	3038	2890	2772				
2006-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	471	1077	1575	1850	2248	2523	2801	3052	3317	3530	3758	3905	4047					
		Anteil in %	6,12	13,99	20,45	24,02	29,19	32,76	36,37	39,63	43,07	45,84	48,80	50,71	52,55					
		CI Anteil in %	[5,58; 6,65]	[13,21; 14,76]	[19,55; 21,35]	[23,07; 24,98]	[28,18; 30,21]	[31,71; 33,81]	[35,30; 37,45]	[38,54; 40,72]	[41,97; 44,18]	[44,73; 46,95]	[47,68; 49,92]	[49,59; 51,82]	[51,44; 53,67]					
	davon wegen Tod	Anzahl	48	159	264	344	428	519	621	694	787	885	980	1053	1119					
		Anteil in %	0,62	2,06	3,43	4,47	5,56	6,74	8,06	9,01	10,22	11,49	12,73	13,67	14,53					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	335	585	696	747	794	844	904	971	1008	1056	1107	1127	1146					
		Anteil in %	4,35	7,60	9,04	9,70	10,31	10,96	11,74	12,61	13,09	13,71	14,37	14,63	14,88					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	33	76	145	184	301	339	405	472	537	570	595	619	639					
		Anteil in %	0,43	0,99	1,88	2,39	3,91	4,40	5,26	6,13	6,97	7,40	7,73	8,04	8,30					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	55	257	470	575	725	821	871	915	985	1019	1076	1106	1143					
Anteil in %		0,71	3,34	6,10	7,47	9,41	10,66	11,31	11,88	12,79	13,23	13,97	14,36	14,84						
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	7701	7230	6624	6126	5851	5453	5178	4900	4649	4384	4171	3943	3796					
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	7230	6624	6126	5851	5453	5178	4900	4649	4384	4171	3943	3796	3654					

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2006-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	465	1231	1778	2442	2849	3290	3618	3995	4287	4582	4851	5063							
		Anteil in %	4,63	12,26	17,71	24,33	28,38	32,77	36,04	39,79	42,70	45,64	48,32	50,43							
		CI Anteil in %	[4,22; 5,04]	[11,62; 12,90]	[16,96; 18,46]	[23,49; 25,16]	[27,50; 29,26]	[31,85; 33,69]	[35,10; 36,98]	[38,84; 40,75]	[41,74; 43,67]	[44,67; 46,62]	[47,34; 49,30]	[49,46; 51,41]							
	davon wegen Tod	Anzahl	35	176	300	455	569	709	818	942	1064	1185	1306	1430							
		Anteil in %	0,35	1,75	2,99	4,53	5,67	7,06	8,15	9,38	10,60	11,80	13,01	14,24							
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	367	585	675	763	842	952	1032	1099	1162	1221	1271	1290							
		Anteil in %	3,66	5,83	6,72	7,60	8,39	9,48	10,28	10,95	11,57	12,16	12,66	12,85							
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	22	124	185	358	444	556	628	707	770	827	884	913							
		Anteil in %	0,22	1,24	1,84	3,57	4,42	5,54	6,26	7,04	7,67	8,24	8,81	9,09							
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	41	346	618	866	994	1073	1140	1247	1291	1349	1390	1430							
Anteil in %		0,41	3,45	6,16	8,63	9,90	10,69	11,36	12,42	12,86	13,44	13,85	14,24								
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	10039	9574	8808	8261	7597	7190	6749	6421	6044	5752	5457	5188							
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	9574	8808	8261	7597	7190	6749	6421	6044	5752	5457	5188	4976							
2007-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	610	1325	2332	2965	3553	4078	4617	5040	5452	5785	6115								
		Anteil in %	4,68	10,16	17,89	22,74	27,25	31,28	35,41	38,66	41,82	44,37	46,90								
		CI Anteil in %	[4,32; 5,04]	[9,64; 10,68]	[17,23; 18,54]	[22,02; 23,46]	[26,49; 28,02]	[30,48; 32,07]	[34,59; 36,23]	[37,82; 39,49]	[40,97; 42,66]	[43,52; 45,22]	[46,04; 47,76]								
	davon wegen Tod	Anzahl	68	256	431	607	813	969	1164	1338	1509	1660	1816								
		Anteil in %	0,52	1,96	3,31	4,66	6,24	7,43	8,93	10,26	11,57	12,73	13,93								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	404	569	687	807	924	1056	1184	1267	1361	1409	1437								
		Anteil in %	3,10	4,36	5,27	6,19	7,09	8,10	9,08	9,72	10,44	10,81	11,02								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	69	147	532	680	844	1010	1107	1189	1248	1305	1381								
		Anteil in %	0,53	1,13	4,08	5,22	6,47	7,75	8,49	9,12	9,57	10,01	10,59								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	69	353	682	871	972	1043	1162	1246	1334	1411	1481								
Anteil in %		0,53	2,71	5,23	6,68	7,46	8,00	8,91	9,56	10,23	10,82	11,36									
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	13038	12428	11713	10706	10073	9485	8960	8421	7998	7586	7253								
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	12428	11713	10706	10073	9485	8960	8421	7998	7586	7253	6923								
2007-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	256	812	1275	1735	2093	2392	2676	2947	3159	3344									
		Anteil in %	3,38	10,73	16,85	22,93	27,67	31,62	35,37	38,96	41,76	44,20									
		CI Anteil in %	[2,98; 3,79]	[10,04; 11,43]	[16,01; 17,70]	[21,99; 23,88]	[26,66; 28,68]	[30,57; 32,67]	[34,30; 36,45]	[37,86; 40,05]	[40,65; 42,87]	[43,08; 45,32]									
	davon wegen Tod	Anzahl	46	151	260	387	499	579	679	776	860	952									
		Anteil in %	0,61	2,00	3,44	5,12	6,60	7,65	8,98	10,26	11,37	12,58									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	142	236	312	402	487	552	614	685	723	738									
		Anteil in %	1,88	3,12	4,12	5,31	6,44	7,30	8,12	9,05	9,56	9,76									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	31	207	337	511	619	700	760	801	850	898									
		Anteil in %	0,41	2,74	4,45	6,75	8,18	9,25	10,05	10,59	11,24	11,87									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	37	218	366	435	488	561	623	685	726	756									
Anteil in %		0,49	2,88	4,84	5,75	6,45	7,42	8,24	9,05	9,60	9,99										
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	7565	7309	6753	6290	5830	5472	5173	4889	4618	4406									
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	7309	6753	6290	5830	5472	5173	4889	4618	4406	4221									
2008-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	248	666	1166	1576	1899	2167	2413	2638	2814										
		Anteil in %	3,50	9,39	16,45	22,23	26,78	30,56	34,03	37,21	39,69										
		CI Anteil in %	[3,07; 3,93]	[8,71; 10,07]	[15,58; 17,31]	[21,26; 23,20]	[25,75; 27,82]	[29,49; 31,64]	[32,93; 35,14]	[36,08; 38,33]	[38,55; 40,83]										
	davon wegen Tod	Anzahl	35	129	223	310	394	489	576	662	750										
		Anteil in %	0,49	1,82	3,15	4,37	5,56	6,90	8,12	9,34	10,58										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	138	253	346	446	515	572	621	657	673										
		Anteil in %	1,95	3,57	4,88	6,29	7,26	8,07	8,76	9,27	9,49										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	30	112	307	467	556	622	686	740	775										
		Anteil in %	0,42	1,58	4,33	6,59	7,84	8,77	9,68	10,44	10,93										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	45	172	290	353	434	484	530	579	616										
Anteil in %		0,63	2,43	4,09	4,98	6,12	6,83	7,48	8,17	8,69											
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	7090	6842	6424	5924	5514	5191	4923	4677	4452										
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	6842	6424	5924	5514	5191	4923	4677	4452	4276										

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2008-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	168	506	830	1131	1390	1601	1787	1922												
		Anteil in %	3,28	9,88	16,20	22,08	27,13	31,25	34,88	37,52												
		CI Anteil in %	[2,79; 3,77]	[9,06; 10,69]	[15,19; 17,21]	[20,94; 23,21]	[25,91; 28,35]	[29,98; 32,52]	[33,58; 36,19]	[36,19; 38,84]												
	davon wegen Tod	Anzahl	28	115	185	263	335	419	487	564												
		Anteil in %	0,55	2,24	3,61	5,13	6,54	8,18	9,51	11,01												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	98	185	270	334	388	435	465	470												
		Anteil in %	1,91	3,61	5,27	6,52	7,57	8,49	9,08	9,17												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	27	135	255	356	427	466	528	555												
		Anteil in %	0,53	2,64	4,98	6,95	8,33	9,10	10,31	10,83												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	15	71	120	178	240	281	307	333												
Anteil in %		0,29	1,39	2,34	3,47	4,68	5,49	5,99	6,50													
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	5123	4955	4617	4293	3992	3733	3522	3336												
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	4955	4617	4293	3992	3733	3522	3336	3201												
2009-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	156	453	741	955	1172	1343	1471													
		Anteil in %	3,57	10,36	16,94	21,84	26,80	30,71	33,64													
		CI Anteil in %	[3,02; 4,12]	[9,46; 11,26]	[15,83; 18,06]	[20,61; 23,06]	[25,49; 28,11]	[29,34; 32,08]	[32,24; 35,04]													
	davon wegen Tod	Anzahl	28	82	154	204	266	305	359													
		Anteil in %	0,64	1,88	3,52	4,66	6,08	6,97	8,21													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	98	183	235	279	328	364	379													
		Anteil in %	2,24	4,18	5,37	6,38	7,50	8,32	8,67													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	17	110	215	266	330	391	422													
		Anteil in %	0,39	2,52	4,92	6,08	7,55	8,94	9,65													
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	13	78	137	206	248	283	311													
Anteil in %		0,30	1,78	3,13	4,71	5,67	6,47	7,11														
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	4373	4217	3920	3632	3418	3201	3030	2902												
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	4217	3920	3632	3418	3201	3030	2902													
2009-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	209	585	884	1111	1324	1462														
		Anteil in %	4,38	12,26	18,52	23,28	27,74	30,63														
		CI Anteil in %	[3,80; 4,96]	[11,33; 13,19]	[17,42; 19,62]	[22,08; 24,48]	[26,47; 29,01]	[29,32; 31,94]														
	davon wegen Tod	Anzahl	46	129	209	264	329	378														
		Anteil in %	0,96	2,70	4,38	5,53	6,89	7,92														
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	117	199	272	329	369	383														
		Anteil in %	2,45	4,17	5,70	6,89	7,73	8,02														
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	21	136	235	302	358	401														
		Anteil in %	0,44	2,85	4,92	6,33	7,50	8,40														
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	25	121	168	216	268	300														
Anteil in %		0,52	2,54	3,52	4,53	5,61	6,29															
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	4773	4564	4188	3889	3662	3449														
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	4564	4188	3889	3662	3449	3311														
2010-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	189	560	906	1182	1387															
		Anteil in %	3,55	10,53	17,04	22,23	26,09															
		CI Anteil in %	[3,06; 4,05]	[9,71; 11,36]	[16,03; 18,05]	[21,11; 23,35]	[24,91; 27,27]															
	davon wegen Tod	Anzahl	27	105	181	261	325															
		Anteil in %	0,51	1,97	3,40	4,91	6,11															
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	123	221	287	343	364															
		Anteil in %	2,31	4,16	5,40	6,45	6,85															
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	8	134	264	361	425															
		Anteil in %	0,15	2,52	4,97	6,79	7,99															
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	31	100	174	217	273															
Anteil in %		0,58	1,88	3,27	4,08	5,13																
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	5317	5128	4757	4411	4135															
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	5128	4757	4411	4135	3930															

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	224	585	927	1145															
		Anteil in %	4,23	11,04	17,49	21,60															
		CI Anteil in %	[3,68; 4,77]	[10,19; 11,88]	[16,46; 18,51]	[20,49; 22,71]															
	davon wegen Tod	Anzahl	37	114	195	291															
		Anteil in %	0,70	2,15	3,68	5,49															
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	133	228	300	313															
		Anteil in %	2,51	4,30	5,66	5,90															
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	20	147	267	328															
		Anteil in %	0,38	2,77	5,04	6,19															
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	34	96	165	213															
Anteil %		0,64	1,81	3,11	4,02																
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	5301	5077	4716	4374															
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	5077	4716	4374	4156															
2011-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	188	552	806																
		Anteil in %	3,79	11,13	16,25																
		CI Anteil in %	[3,26; 4,32]	[10,25; 12,00]	[15,22; 17,27]																
	davon wegen Tod	Anzahl	28	86	134																
		Anteil in %	0,56	1,73	2,70																
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	126	222	251																
		Anteil in %	2,54	4,47	5,06																
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	17	146	265																
		Anteil in %	0,34	2,94	5,34																
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	17	98	156																
Anteil %		0,34	1,98	3,14																	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	4961	4773	4409																
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	4773	4409	4155																
2011-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	154	412																	
		Anteil in %	3,74	9,99																	
		CI Anteil in %	[3,16; 4,31]	[9,08; 10,91]																	
	davon wegen Tod	Anzahl	37	94																	
		Anteil in %	0,90	2,28																	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	84	127																	
		Anteil in %	2,04	3,08																	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	16	112																	
		Anteil in %	0,39	2,72																	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	17	79																	
Anteil %		0,41	1,92																		
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	4123	3969																	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	3969	3711																	
2012-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	97																		
		Anteil in %	2,07																		
		CI Anteil in %	[1,67; 2,48]																		
	davon wegen Tod	Anzahl	29																		
		Anteil in %	0,62																		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	44																		
		Anteil in %	0,94																		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	16																		
		Anteil in %	0,34																		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	8																		
Anteil %		0,17																			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	4675																		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	4578																		

In Tabelle A.1.4 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmer** zur Erstdokumentation ausgewiesen. Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem steht für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

In der Kohorte 2003-1 starteten 11816 Teilnehmer in das Programm. Ihr durchschnittliches Alter betrug im Beitrittsjahr 67,19 Jahre, der Median lag bei 68,00 Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle A.1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitrittsjahr
2003-1	Mean	67,19
	CI Mean	[67,00; 67,38]
	Median	68,00
	Fallbasis	11816
2003-2	Mean	65,82
	CI Mean	[65,61; 66,04]
	Median	67,00
	Fallbasis	10121
2004-1	Mean	65,02
	CI Mean	[64,70; 65,35]
	Median	67,00
	Fallbasis	4732
2004-2	Mean	64,43
	CI Mean	[64,06; 64,80]
	Median	66,00
	Fallbasis	3573
2005-1	Mean	65,37
	CI Mean	[65,06; 65,69]
	Median	67,00
	Fallbasis	5126
2005-2	Mean	66,08
	CI Mean	[65,80; 66,35]
	Median	68,00
	Fallbasis	6730
2006-1	Mean	66,55
	CI Mean	[66,30; 66,81]
	Median	68,00
	Fallbasis	7701
2006-2	Mean	66,67
	CI Mean	[66,45; 66,89]
	Median	68,00
	Fallbasis	10039
2007-1	Mean	67,61
	CI Mean	[67,42; 67,80]
	Median	69,00
	Fallbasis	13038
2007-2	Mean	66,44
	CI Mean	[66,17; 66,71]
	Median	68,00
	Fallbasis	7565

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitrittsjahr
2008-1	Mean	66,49
	CI Mean	[66,20; 66,77]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	7090
2008-2	Mean	65,60
	CI Mean	[65,25; 65,94]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	5123
2009-1	Mean	65,68
	CI Mean	[65,30; 66,05]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	4373
2009-2	Mean	65,30
	CI Mean	[64,94; 65,66]
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	4773
2010-1	Mean	65,53
	CI Mean	[65,19; 65,87]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	5317
2010-2	Mean	65,39
	CI Mean	[65,05; 65,73]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	5301
2011-1	Mean	65,26
	CI Mean	[64,90; 65,61]
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	4961
2011-2	Mean	65,17
	CI Mean	[64,78; 65,57]
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	4123
2012-1	Mean	65,47
	CI Mean	[65,10; 65,84]
	Median	67,00
	<i>Fallbasis</i>	4675

In Tabelle A.1.5 ist die **Altersverteilung nach Alterskategorien** für alle Patienten im Beitrittsjahr ausgewiesen. Dargestellt sind die absoluten Anzahlen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem ist zu beachten, dass für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung steht. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird

Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

In der Kohorte 2003-1 entfielen im Beitrittsjahr 4530 Patienten auf die Altersklasse "61 bis 70" Jahre.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle A.1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitrittsjahr
2003-1	bis 50	953
	51 bis 60	1620
	61 bis 70	4530
	71 bis 80	3648
	81 und älter	1065
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>11816</i>
2003-2	bis 50	1026
	51 bis 60	1559
	61 bis 70	3910
	71 bis 80	2915
	81 und älter	710
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>10120</i>
2004-1	bis 50	577
	51 bis 60	780
	61 bis 70	1815
	71 bis 80	1236
	81 und älter	324
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>4732</i>
2004-2	bis 50	451
	51 bis 60	646
	61 bis 70	1326
	71 bis 80	947
	81 und älter	202
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>3572</i>
2005-1	bis 50	607
	51 bis 60	898
	61 bis 70	1838
	71 bis 80	1400
	81 und älter	382
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>5125</i>
2005-2	bis 50	722
	51 bis 60	1070
	61 bis 70	2390
	71 bis 80	1974
	81 und älter	574
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>6730</i>
2006-1	bis 50	773
	51 bis 60	1268
	61 bis 70	2598
	71 bis 80	2384
	81 und älter	677
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>7700</i>
2006-2	bis 50	928
	51 bis 60	1625
	61 bis 70	3476
	71 bis 80	3176
	81 und älter	833
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>10038</i>

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitrittsjahr
2007-1	bis 50	1130
	51 bis 60	2081
	61 bis 70	4018
	71 bis 80	4378
	81 und älter	1431
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>13038</i>
2007-2	bis 50	876
	51 bis 60	1285
	61 bis 70	2256
	71 bis 80	2380
	81 und älter	767
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>7564</i>
2008-1	bis 50	840
	51 bis 60	1267
	61 bis 70	1921
	71 bis 80	2306
	81 und älter	755
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>7089</i>
2008-2	bis 50	691
	51 bis 60	980
	61 bis 70	1421
	71 bis 80	1514
	81 und älter	516
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>5122</i>
2009-1	bis 50	593
	51 bis 60	880
	61 bis 70	1157
	71 bis 80	1263
	81 und älter	480
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>4373</i>
2009-2	bis 50	663
	51 bis 60	970
	61 bis 70	1314
	71 bis 80	1344
	81 und älter	481
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>4772</i>
2010-1	bis 50	738
	51 bis 60	1104
	61 bis 70	1357
	71 bis 80	1531
	81 und älter	587
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>5317</i>
2010-2	bis 50	728
	51 bis 60	1099
	61 bis 70	1371
	71 bis 80	1561
	81 und älter	541
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>5300</i>
2011-1	bis 50	691
	51 bis 60	1090
	61 bis 70	1217
	71 bis 80	1456
	81 und älter	507
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>4961</i>
2011-2	bis 50	598
	51 bis 60	867
	61 bis 70	1036
	71 bis 80	1175
	81 und älter	445
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>4121</i>

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitrittsjahr
2012-1	bis 50	638
	51 bis 60	986
	61 bis 70	1114
	71 bis 80	1428
	81 und älter	508
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>4674</i>

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle A.1.8 noch diejenigen Patienten aufgeführt, für die im jeweils betrachteten Berichtshalbjahr **kein medizinischer Dokumentationsbogen** vorlag. Diese Patienten wurden bei den medizinischen Auswertungen nicht berücksichtigt. Für das Beitrittsjahr sind keine Patienten mit fehlender medizinischer Dokumentation ausgewiesen, da definitionsgemäß nur Patienten mit Erstdokumentation in die Evaluation einfließen können.

In der Kohorte 2003-1 waren im letzten Berichtshalbjahr 3312 Patienten in das Programm eingeschrieben. Bei 83 von Ihnen bzw. 2,51 Prozent lagen im letzten Berichtshalbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle A.1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	11816	10849	9883	9067	8272	7705	7151	6132	5721	5287	5081	4776	4533	4332	4084	3845	3644	3478	3312
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		2175	690	243	231	169	267	213	161	89	215	191	127	141	143	93	63	65	83
		Anteil in %		20,05	6,98	2,68	2,79	2,19	3,73	3,47	2,81	1,68	4,23	4,00	2,80	3,25	3,50	2,42	1,73	1,87	2,51
	CI Anteil in %		[19,29; 20,80]	[6,48; 7,48]	[2,35; 3,01]	[2,44; 3,15]	[1,87; 2,52]	[3,29; 4,17]	[3,02; 3,93]	[2,39; 3,24]	[1,34; 2,03]	[3,68; 4,79]	[3,44; 4,55]	[2,32; 3,28]	[2,73; 3,78]	[2,94; 4,07]	[1,93; 2,90]	[1,31; 2,15]	[1,42; 2,32]	[1,97; 3,04]	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10121	8824	8032	7226	6602	6085	5543	5120	4661	4482	4247	4041	3826	3647	3474	3313	3131	2988	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		979	266	183	151	221	180	256	109	210	198	185	121	114	89	102	79	81	
		Anteil in %		11,09	3,31	2,53	2,29	3,63	3,25	5,00	2,34	4,69	4,66	4,58	3,16	3,13	2,56	3,08	2,52	2,71	
	CI Anteil in %		[10,44; 11,75]	[2,92; 3,70]	[2,17; 2,89]	[1,93; 2,65]	[3,16; 4,10]	[2,78; 3,71]	[4,40; 5,60]	[1,90; 2,77]	[4,07; 5,30]	[4,03; 5,30]	[3,93; 5,22]	[2,61; 3,72]	[2,56; 3,69]	[2,04; 3,09]	[2,49; 3,67]	[1,97; 3,07]	[2,13; 3,29]		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4732	4221	3732	3386	3072	2768	2575	2363	2254	2108	1990	1890	1806	1704	1627	1554	1498		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		241	161	105	104	80	119	77	147	118	92	84	89	62	69	44	53		
		Anteil in %		5,71	4,31	3,10	3,39	2,89	4,62	3,26	6,52	5,60	4,62	4,44	4,93	3,64	4,24	2,83	3,54		
	CI Anteil in %		[5,01; 6,41]	[3,66; 4,97]	[2,52; 3,68]	[2,75; 4,03]	[2,27; 3,51]	[3,81; 5,43]	[2,54; 3,97]	[5,50; 7,54]	[4,62; 6,58]	[3,70; 5,55]	[3,52; 5,37]	[3,93; 5,93]	[2,75; 4,53]	[3,26; 5,22]	[2,01; 3,66]	[2,60; 4,47]			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	3573	3250	2972	2723	2456	2307	2154	2074	1938	1853	1772	1689	1609	1536	1462	1398			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		179	125	106	139	148	147	205	165	168	136	147	135	135	126	123			
		Anteil in %		5,51	4,21	3,89	5,66	6,42	6,82	9,88	8,51	9,07	7,67	8,70	8,39	8,79	8,62	8,80			
	CI Anteil in %		[4,72; 6,29]	[3,48; 4,93]	[3,17; 4,62]	[4,75; 6,57]	[5,42; 7,42]	[5,76; 7,89]	[8,60; 11,17]	[7,27; 9,76]	[7,76; 10,37]	[6,44; 8,91]	[7,36; 10,05]	[7,04; 9,75]	[7,37; 10,21]	[7,18; 10,06]	[7,31; 10,28]				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5126	4778	4364	3907	3558	3309	3148	2963	2824	2661	2526	2397	2303	2205	2120				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		222	228	163	154	118	185	146	130	83	87	60	72	63	60				
		Anteil in %		4,65	5,22	4,17	4,33	3,57	5,88	4,93	4,60	3,12	3,44	2,50	3,13	2,86	2,83				
	CI Anteil in %		[4,05; 5,24]	[4,56; 5,88]	[3,54; 4,80]	[3,66; 5,00]	[2,93; 4,20]	[5,05; 6,70]	[4,15; 5,71]	[3,83; 5,38]	[2,46; 3,78]	[2,73; 4,16]	[1,88; 3,13]	[2,42; 3,84]	[2,16; 3,55]	[2,12; 3,54]					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6730	6209	5669	5188	4785	4530	4217	3994	3779	3583	3359	3189	3038	2890					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		290	241	214	208	281	259	193	148	165	114	115	100	88					
		Anteil in %		4,67	4,25	4,12	4,35	6,20	6,14	4,83	3,92	4,61	3,39	3,61	3,29	3,05					
	CI Anteil in %		[4,15; 5,20]	[3,73; 4,78]	[3,58; 4,67]	[3,77; 4,92]	[5,50; 6,91]	[5,42; 6,87]	[4,17; 5,50]	[3,30; 4,53]	[3,92; 5,29]	[2,78; 4,01]	[2,96; 4,25]	[2,66; 3,93]	[2,42; 3,67]						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7701	7230	6624	6126	5851	5453	5178	4900	4649	4384	4171	3943	3796						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		250	245	162	328	288	193	151	174	116	116	99	86						
		Anteil in %		3,46	3,70	2,64	5,61	5,28	3,73	3,08	3,74	2,65	2,78	2,51	2,27						
	CI Anteil in %		[3,04; 3,88]	[3,24; 4,15]	[2,24; 3,05]	[5,02; 6,20]	[4,69; 5,88]	[3,21; 4,24]	[2,60; 3,57]	[3,20; 4,29]	[2,17; 3,12]	[2,28; 3,28]	[2,02; 3,00]	[1,79; 2,74]							
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10039	9574	8808	8261	7597	7190	6749	6421	6044	5752	5457	5188							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		514	441	575	488	388	268	300	216	234	175	191							
		Anteil in %		5,37	5,01	6,96	6,42	5,40	3,97	4,67	3,57	4,07	3,21	3,68							
	CI Anteil in %		[4,92; 5,82]	[4,55; 5,46]	[6,41; 7,51]	[5,87; 6,97]	[4,87; 5,92]	[3,51; 4,44]	[4,16; 5,19]	[3,11; 4,04]	[3,56; 4,58]	[2,74; 3,67]	[3,17; 4,19]								
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	13038	12428	11713	10706	10073	9485	8960	8421	7998	7586	7253								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		586	869	760	564	392	349	331	298	242	240								
		Anteil in %		4,72	7,42	7,10	5,60	4,13	3,90	3,93	3,73	3,19	3,31								
	CI Anteil in %		[4,34; 5,09]	[6,94; 7,89]	[6,61; 7,59]	[5,15; 6,05]	[3,73; 4,53]	[3,49; 4,30]	[3,52; 4,35]	[3,31; 4,14]	[2,79; 3,59]	[2,90; 3,72]									
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	7565	7309	6753	6290	5830	5472	5173	4889	4618	4406									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		454	605	460	305	242	209	190	153	171									
		Anteil in %		6,21	8,96	7,31	5,23	4,42	4,04	3,89	3,31	3,88									
	CI Anteil in %		[5,66; 6,76]	[8,28; 9,64]	[6,67; 7,96]	[4,66; 5,80]	[3,88; 4,97]	[3,50; 4,58]	[3,34; 4,43]	[2,80; 3,83]	[3,31; 4,45]										
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7090	6842	6424	5924	5514	5191	4923	4677	4452										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		449	432	333	244	200	197	182	155										
		Anteil in %		6,56	6,72	5,62	4,43	3,85	4,00	3,89	3,48										
	CI Anteil in %		[5,98; 7,15]	[6,11; 7,34]	[5,03; 6,21]	[3,88; 4,97]	[3,33; 4,38]	[3,45; 4,55]	[3,34; 4,45]	[2,94; 4,02]											
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5123	4955	4617	4293	3992	3733	3522	3336											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		275	270	235	156	154	142	126											
		Anteil in %		5,55	5,85	5,47	3,91	4,13	4,03	3,78											
	CI Anteil in %		[4,91; 6,19]	[5,17; 6,52]	[4,79; 6,15]	[3,31; 4,51]	[3,49; 4,76]	[3,38; 4,68]	[3,13; 4,42]												

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4373	4217	3920	3632	3418	3201	3030											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		171	208	162	141	125	87											
		Anteil in %		4,06	5,31	4,46	4,13	3,91	2,87											
		CI Anteil in %		[3,46; 4,65]	[4,60; 6,01]	[3,79; 5,13]	[3,46; 4,79]	[3,23; 4,58]	[2,28; 3,47]											
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	4773	4564	4188	3889	3662	3449												
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		230	194	142	138	110												
		Anteil in %		5,04	4,63	3,65	3,77	3,19												
		CI Anteil in %		[4,40; 5,67]	[4,00; 5,27]	[3,06; 4,24]	[3,15; 4,39]	[2,60; 3,78]												
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5317	5128	4757	4411	4135													
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		183	242	192	152													
		Anteil in %		3,57	5,09	4,35	3,68													
		CI Anteil in %		[3,06; 4,08]	[4,46; 5,71]	[3,75; 4,96]	[3,10; 4,25]													
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5301	5077	4716	4374														
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		221	250	179														
		Anteil in %		4,35	5,30	4,09														
		CI Anteil in %		[3,79; 4,91]	[4,66; 5,94]	[3,51; 4,68]														
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4961	4773	4409															
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		202	244															
		Anteil in %		4,23	5,53															
		CI Anteil in %		[3,66; 4,80]	[4,86; 6,21]															
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	4123	3969																
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		172																
		Anteil in %		4,33																
		CI Anteil in %		[3,70; 4,97]																
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4675																	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		

Auswertungskapitel A.3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung

Ein wesentliches Ziel der Evaluation besteht in der Überprüfung der medizinischen Versorgungsqualität der DMP-Patienten. Hierzu werden die patientenbezogenen Angaben zum Krankheitsverlauf nach der Einschreibung in das DMP aus den Dokumentationen der Leistungserbringer ausgewertet.

Die standardisierten Tabellen für den Evaluationsbericht weisen die patientenbezogenen Ergebnisse nach Kohorten getrennt für die folgenden Bereiche und Variablen aus:

Risikofaktoren

- Raucherstatus
- Hypertonus

Laborwerte

- HbA1c-Werte

A.3.1 Risikofaktoren

In diesem Kapitel werden Auswertungen zu zwei Variablen dargestellt. Die Tabelle „Patienten und ihr Body-Mass-Index“ entfällt für die Auswertung nach Subkohorten. Das Kapitel A.3.1 beginnt daher mit der Tabelle A.3.1.2. Zunächst werden Auswertungen zum Raucherstatus vorgenommen. Rauchen stellt einen der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen dar. Eine Reduktion des Raucheranteils der DMP-Patienten ist demnach eine wichtige Zielsetzung der Behandlung.

Schließlich werden Angaben zum Bluthochdruck bzw. Hypertonus gemacht, da dieser eine bedeutende Begleiterkrankung des Diabetes mit potenzierenden negativen Effekten auf die Herz-Kreislaufmorbidity und -mortalität ist. Eine Senkung des Blutdrucks in den Normbereich bei den DMP-Patienten mit erhöhten Blutdruckwerten ist demnach eine weitere wichtige Zielsetzung der Behandlung.

In Tabelle A.3.1.2 wird die Entwicklung des Raucherstatus für die Gruppe der **Raucher (Kollektivmitglieder insgesamt) laut Erstdokumentation** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Raucher waren.

Zunächst wird für jede Kohorte unter „Kollektivmitglieder insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten aus der Gruppe der Raucher im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an dieser Gruppe ist. Da der Anteil der Raucher im Beitrittsjahr definitionsgemäß bei 100 Prozent liegt, wird auf eine Darstellung dieser Information verzichtet.

In der Kohorte 2003-1 waren laut Erstdokumentation 1358 Personen Raucher. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für 315 Patienten aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation Angaben vor. Davon waren im letzten Berichtshalbjahr noch 47,94 Prozent Raucher.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle A.3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1358	1240	1111	1001	881	810	739	621	569	525	502	472	443	430	407	382	358	337	322
	auswertbar	Anzahl		995	1037	956	859	791	717	597	550	515	479	449	437	410	388	368	349	327	315
	Raucher	Anzahl		826	810	669	547	478	417	319	280	248	232	212	202	193	182	172	166	153	151
		Anteil in %		83,02	78,11	69,98	63,68	60,43	58,16	53,43	50,91	48,16	48,43	47,22	46,22	47,07	46,91	46,74	47,56	46,79	47,94
		CI Anteil in %		[80,68; 85,35]	[75,59; 80,63]	[67,07; 72,89]	[60,46; 66,90]	[57,02; 63,84]	[54,55; 61,77]	[49,43; 57,44]	[46,73; 55,09]	[43,84; 52,47]	[43,95; 52,91]	[42,59; 51,84]	[41,54; 50,90]	[42,24; 51,91]	[41,94; 51,88]	[41,63; 51,84]	[42,32; 52,81]	[41,37; 52,21]	[42,41; 53,46]
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11816</i>	<i>10849</i>	<i>9883</i>	<i>9067</i>	<i>8272</i>	<i>7705</i>	<i>7151</i>	<i>6132</i>	<i>5721</i>	<i>5287</i>	<i>5081</i>	<i>4776</i>	<i>4533</i>	<i>4332</i>	<i>4084</i>	<i>3845</i>	<i>3644</i>	<i>3478</i>	<i>3312</i>	
2003-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1200	1022	918	788	702	635	519	466	446	421	405	382	356	338	313	293	270		
	auswertbar	Anzahl		897	877	757	684	607	547	490	452	427	406	388	366	342	326	305	285	260	
	Raucher	Anzahl		751	644	507	434	379	322	279	246	225	210	201	189	176	167	158	143	129	
		Anteil in %		83,72	73,43	66,97	63,45	62,44	58,87	56,94	54,42	52,69	51,72	51,80	51,64	51,46	51,23	51,80	50,18	49,62	
		CI Anteil in %		[81,31; 86,14]	[70,51; 76,36]	[63,62; 70,33]	[59,84; 67,06]	[58,58; 66,29]	[54,74; 62,99]	[52,55; 61,33]	[49,83; 59,02]	[47,95; 57,43]	[46,86; 56,59]	[46,83; 56,78]	[46,51; 56,77]	[46,16; 56,77]	[45,79; 56,66]	[46,19; 57,42]	[44,36; 55,99]	[43,53; 55,70]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10121</i>	<i>8824</i>	<i>8032</i>	<i>7226</i>	<i>6602</i>	<i>6085</i>	<i>5543</i>	<i>5120</i>	<i>4661</i>	<i>4482</i>	<i>4247</i>	<i>4041</i>	<i>3826</i>	<i>3647</i>	<i>3474</i>	<i>3313</i>	<i>3131</i>	<i>2988</i>		
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	583	509	437	380	338	299	276	254	242	222	207	197	189	176	168	161	156		
	auswertbar	Anzahl		478	410	359	323	293	266	250	229	207	198	187	181	170	160	156	152		
	Raucher	Anzahl		394	294	235	210	183	157	144	132	113	105	97	93	86	84	79	79		
		Anteil in %		82,43	71,71	65,46	65,02	62,46	59,02	57,60	57,64	54,59	53,03	51,87	51,38	50,59	52,50	50,64	51,97		
		CI Anteil in %		[79,01; 85,84]	[67,34; 76,07]	[60,53; 70,39]	[59,81; 70,22]	[56,90; 68,01]	[53,10; 64,94]	[51,46; 63,74]	[51,23; 64,06]	[47,79; 61,39]	[46,06; 60,00]	[44,69; 59,05]	[44,08; 58,68]	[43,05; 58,13]	[44,74; 60,26]	[42,77; 58,51]	[44,00; 59,94]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4732</i>	<i>4221</i>	<i>3732</i>	<i>3386</i>	<i>3072</i>	<i>2768</i>	<i>2575</i>	<i>2363</i>	<i>2254</i>	<i>2108</i>	<i>1990</i>	<i>1890</i>	<i>1806</i>	<i>1704</i>	<i>1627</i>	<i>1554</i>	<i>1498</i>			
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	443	389	351	324	286	269	241	228	215	205	196	186	177	174	167	159			
	auswertbar	Anzahl		362	331	311	270	246	221	205	195	186	180	167	163	158	153	143			
	Raucher	Anzahl		301	235	210	171	148	129	117	108	100	95	92	87	88	85	81			
		Anteil in %		83,15	71,00	67,52	63,33	60,16	58,37	57,07	55,38	53,76	52,78	55,09	53,37	55,70	55,56	56,64			
		CI Anteil in %		[79,29; 87,01]	[66,10; 75,89]	[62,31; 72,74]	[57,57; 69,09]	[54,03; 66,29]	[51,86; 64,88]	[50,28; 63,87]	[48,39; 62,38]	[46,58; 60,95]	[45,46; 60,09]	[47,52; 62,66]	[45,69; 61,06]	[47,93; 63,47]	[47,66; 63,46]	[48,49; 64,79]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3573</i>	<i>3250</i>	<i>2972</i>	<i>2723</i>	<i>2456</i>	<i>2307</i>	<i>2154</i>	<i>2074</i>	<i>1938</i>	<i>1853</i>	<i>1772</i>	<i>1689</i>	<i>1609</i>	<i>1536</i>	<i>1462</i>	<i>1398</i>				
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	617	559	489	416	369	341	329	307	292	274	256	245	240	226	219				
	auswertbar	Anzahl		526	464	396	346	329	303	294	278	263	247	243	232	219	210				
	Raucher	Anzahl		439	338	277	222	196	174	167	153	149	129	129	119	114	110				
		Anteil in %		83,46	72,84	69,95	64,16	59,57	57,43	56,80	55,04	56,65	52,23	53,09	51,29	52,05	52,38				
		CI Anteil in %		[80,28; 86,64]	[68,79; 76,90]	[65,43; 74,47]	[59,10; 69,22]	[54,26; 64,89]	[51,85; 63,00]	[51,13; 62,47]	[49,18; 60,89]	[50,65; 62,65]	[45,98; 58,47]	[46,80; 59,37]	[44,85; 57,74]	[45,42; 58,69]	[45,61; 59,15]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5126</i>	<i>4778</i>	<i>4364</i>	<i>3907</i>	<i>3558</i>	<i>3309</i>	<i>3148</i>	<i>2963</i>	<i>2824</i>	<i>2661</i>	<i>2526</i>	<i>2397</i>	<i>2303</i>	<i>2205</i>	<i>2120</i>					
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	695	624	549	478	443	416	390	374	358	334	313	302	284	270					
	auswertbar	Anzahl		588	520	460	430	391	375	356	344	318	300	283	276	259					
	Raucher	Anzahl		480	387	315	287	246	229	216	199	187	176	161	157	151					
		Anteil in %		81,63	74,42	68,48	66,74	62,92	61,07	60,67	57,85	58,81	58,67	56,89	56,88	58,30					
		CI Anteil in %		[78,50; 84,77]	[70,67; 78,18]	[64,23; 72,73]	[62,29; 71,20]	[58,12; 67,71]	[56,12; 66,01]	[55,59; 65,76]	[52,62; 63,07]	[53,39; 64,22]	[53,08; 64,25]	[51,11; 62,67]	[51,03; 62,74]	[52,28; 64,32]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6730</i>	<i>6209</i>	<i>5669</i>	<i>5188</i>	<i>4785</i>	<i>4530</i>	<i>4217</i>	<i>3994</i>	<i>3779</i>	<i>3583</i>	<i>3359</i>	<i>3189</i>	<i>3038</i>	<i>2890</i>						
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	800	743	661	596	568	520	496	470	451	424	405	385	365						
	auswertbar	Anzahl		720	629	572	528	497	474	457	436	407	392	370	358						
	Raucher	Anzahl		627	502	433	391	318	301	287	279	258	249	234	225						
		Anteil in %		87,08	79,81	75,70	74,05	63,98	63,50	62,80	63,99	63,39	63,52	63,24	62,85						
		CI Anteil in %		[84,63; 89,53]	[76,67; 82,95]	[72,18; 79,22]	[70,31; 77,80]	[59,76; 68,21]	[59,16; 67,84]	[58,36; 67,24]	[59,48; 68,50]	[58,70; 68,08]	[58,75; 68,29]	[58,32; 68,16]	[57,84; 67,86]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7701</i>	<i>7230</i>	<i>6624</i>	<i>6126</i>	<i>5851</i>	<i>5453</i>	<i>5178</i>	<i>4900</i>	<i>4649</i>	<i>4384</i>	<i>4171</i>	<i>3943</i>	<i>3796</i>							

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1055	970	871	814	737	690	645	603	549	519	493	465						
	auswertbar	Anzahl		919	831	744	688	651	619	563	532	490	471	447						
	Raucher	Anzahl		776	651	556	472	436	409	365	345	314	302	287						
		Anteil in %		84,44	78,34	74,73	68,60	66,97	66,07	64,83	64,85	64,08	64,12	64,21						
		CI Anteil in %		[82,09; 86,78]	[75,54; 81,14]	[71,61; 77,86]	[65,13; 72,08]	[63,36; 70,59]	[62,34; 69,81]	[60,88; 68,78]	[60,79; 68,91]	[59,83; 68,33]	[59,78; 68,46]	[59,76; 68,66]						
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10039</i>	<i>9574</i>	<i>8808</i>	<i>8261</i>	<i>7597</i>	<i>7190</i>	<i>6749</i>	<i>6421</i>	<i>6044</i>	<i>5752</i>	<i>5457</i>	<i>5188</i>						
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1395	1303	1213	1084	1005	943	878	823	785	745	711							
	auswertbar	Anzahl		1239	1097	985	942	895	843	797	748	710	685							
	Raucher	Anzahl		1055	861	706	660	629	577	547	505	464	445							
		Anteil in %		85,15	78,49	71,68	70,06	70,28	68,45	68,63	67,51	65,35	64,96							
		CI Anteil in %		[83,17; 87,13]	[76,05; 80,92]	[68,86; 74,49]	[67,14; 72,99]	[67,28; 73,28]	[65,31; 71,59]	[65,41; 71,86]	[64,15; 70,87]	[61,85; 68,85]	[61,39; 68,54]							
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13038</i>	<i>12428</i>	<i>11713</i>	<i>10706</i>	<i>10073</i>	<i>9485</i>	<i>8960</i>	<i>8421</i>	<i>7998</i>	<i>7586</i>	<i>7253</i>							
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	878	836	751	683	622	584	549	517	488	461								
	auswertbar	Anzahl		766	668	624	587	547	527	492	461	445								
	Raucher	Anzahl		669	515	470	427	401	381	338	318	300								
		Anteil in %		87,34	77,10	75,32	72,74	73,31	72,30	68,70	68,98	67,42								
		CI Anteil in %		[84,98; 89,69]	[73,91; 80,28]	[71,93; 78,71]	[69,14; 76,35]	[69,60; 77,02]	[68,47; 76,12]	[64,60; 72,80]	[64,75; 73,21]	[63,06; 71,78]								
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7565</i>	<i>7309</i>	<i>6753</i>	<i>6290</i>	<i>5830</i>	<i>5472</i>	<i>5173</i>	<i>4889</i>	<i>4618</i>	<i>4406</i>								
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	841	805	738	652	598	562	527	506	480									
	auswertbar	Anzahl		730	676	616	559	535	504	480	463									
	Raucher	Anzahl		635	526	476	424	399	378	357	341									
		Anteil in %		86,99	77,81	77,27	75,85	74,58	75,00	74,38	73,65									
		CI Anteil in %		[84,54; 89,43]	[74,68; 80,95]	[73,96; 80,58]	[72,30; 79,40]	[70,89; 78,27]	[71,22; 78,78]	[70,47; 78,28]	[69,63; 77,67]									
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7090</i>	<i>6842</i>	<i>6424</i>	<i>5924</i>	<i>5514</i>	<i>5191</i>	<i>4923</i>	<i>4677</i>	<i>4452</i>									
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	662	631	571	521	473	447	428	397										
	auswertbar	Anzahl		579	529	489	457	424	399	383										
	Raucher	Anzahl		545	477	435	406	374	342	329										
		Anteil in %		94,13	90,17	88,96	88,84	88,21	85,71	85,90										
		CI Anteil in %		[92,21; 96,04]	[87,63; 92,71]	[86,18; 91,74]	[85,95; 91,73]	[85,13; 91,28]	[82,28; 89,15]	[82,41; 89,39]										
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5123</i>	<i>4955</i>	<i>4617</i>	<i>4293</i>	<i>3992</i>	<i>3733</i>	<i>3522</i>	<i>3336</i>										
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	547	514	468	423	396	366	344											
	auswertbar	Anzahl		481	432	400	373	348	334											
	Raucher	Anzahl		450	392	362	337	306	293											
		Anteil in %		93,56	90,74	90,50	90,35	87,93	87,72											
		CI Anteil in %		[91,36; 95,75]	[88,00; 93,48]	[87,62; 93,38]	[87,35; 93,35]	[84,50; 91,36]	[84,20; 91,25]											
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4373</i>	<i>4217</i>	<i>3920</i>	<i>3632</i>	<i>3418</i>	<i>3201</i>	<i>3030</i>											
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	654	612	538	490	457	422												
	auswertbar	Anzahl		565	507	475	430	396												
	Raucher	Anzahl		537	474	431	383	354												
		Anteil in %		95,04	93,49	90,74	89,07	89,39												
		CI Anteil in %		[93,25; 96,84]	[91,34; 95,64]	[88,13; 93,35]	[86,12; 92,02]	[86,36; 92,43]												
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4773</i>	<i>4564</i>	<i>4188</i>	<i>3889</i>	<i>3662</i>	<i>3449</i>												
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	720	696	631	571	529													
	auswertbar	Anzahl		663	582	536	503													
	Raucher	Anzahl		636	532	485	451													
		Anteil in %		95,93	91,41	90,49	89,66													
		CI Anteil in %		[94,42; 97,43]	[89,13; 93,69]	[88,00; 92,97]	[87,00; 92,33]													
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5317</i>	<i>5128</i>	<i>4757</i>	<i>4411</i>	<i>4135</i>													

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	688	655	604	550														
	auswertbar	Anzahl		620	567	525														
	Raucher	Anzahl		600	533	493														
		Anteil in %			96,77	94,00	93,90													
		CI Anteil in %			[95,38; 98,17]	[92,05; 95,96]	[91,86; 95,95]													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5301</i>	<i>5077</i>	<i>4716</i>	<i>4374</i>															
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	654	622	563															
	auswertbar	Anzahl		590	523															
	Raucher	Anzahl		571	494															
		Anteil in %			96,78	94,46														
		CI Anteil in %			[95,35; 98,21]	[92,49; 96,42]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4961</i>	<i>4773</i>	<i>4409</i>																
2011-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	559	536																
	auswertbar	Anzahl		508																
	Raucher	Anzahl		486																
		Anteil in %			95,67															
		CI Anteil in %			[93,90; 97,44]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4123</i>	<i>3969</i>																	
2012-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	662																	
	auswertbar	Anzahl																		
	Raucher	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4675</i>																		

In Tabelle A.3.1.3 werden Anzahl und Anteile der aktuellen **Raucher (Patienten insgesamt)** dokumentiert. Betrachtet werden dabei alle Patienten, also auch diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Nichtraucher waren. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher im jeweiligen Halbjahr dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ist.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitrittsjahr 11816 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 11816 der Patienten lagen auswertbare Daten vor. Davon waren 6,47 Prozent Raucher. Im letzten Berichtshalbjahr waren noch 3312 Patienten eingeschrieben. Für 3229 dieser Patienten lagen auswertbare Daten vor. Davon waren 6,47 Prozent Raucher.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle A.3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte ohne Endpunkte

EZ	Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	11816	10849	9883	9067	8272	7705	7151	6132	5721	5287	5081	4776	4533	4332	4084	3845	3644	3478	3312
	auswertbar	Anzahl	11816	8674	9193	8824	8041	7536	6884	5919	5560	5198	4866	4585	4406	4191	3941	3752	3581	3413	3229
	Raucher	Anzahl	1358	936	955	899	685	584	507	387	350	304	279	280	266	261	254	241	226	213	209
		Anteil in %	11,49	10,79	10,39	10,19	8,52	7,75	7,36	6,54	6,29	5,85	5,73	6,11	6,04	6,23	6,45	6,42	6,31	6,24	6,47
	CI Anteil in %	[10,92; 12,07]	[10,14; 11,44]	[9,76; 11,01]	[9,56; 10,82]	[7,91; 9,13]	[7,15; 8,35]	[6,75; 7,98]	[5,91; 7,17]	[5,66; 6,93]	[5,21; 6,49]	[5,08; 6,39]	[5,41; 6,80]	[5,33; 6,74]	[5,50; 6,96]	[5,68; 7,21]	[5,64; 7,21]	[5,51; 7,11]	[5,43; 7,05]	[5,62; 7,32]	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10121	8824	8032	7226	6602	6085	5543	5120	4661	4482	4247	4041	3826	3647	3474	3313	3131	2988	
	auswertbar	Anzahl	10121	7845	7766	7043	6451	5864	5363	4864	4552	4272	4049	3856	3705	3533	3385	3211	3052	2907	
	Raucher	Anzahl	1200	827	814	587	501	449	386	341	296	271	269	257	243	222	209	195	177	162	
		Anteil in %	11,86	10,54	10,48	8,33	7,77	7,66	7,20	7,01	6,50	6,34	6,64	6,66	6,56	6,28	6,17	6,07	5,80	5,80	5,57
	CI Anteil in %	[11,23; 12,49]	[9,86; 11,22]	[9,80; 11,16]	[7,69; 8,98]	[7,11; 8,42]	[6,98; 8,34]	[6,51; 7,89]	[6,29; 7,73]	[5,79; 7,22]	[5,61; 7,07]	[5,88; 7,41]	[5,88; 7,45]	[5,76; 7,36]	[5,48; 7,08]	[5,36; 6,99]	[5,25; 6,90]	[4,97; 6,63]	[4,74; 6,41]		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4732	4221	3732	3386	3072	2768	2575	2363	2254	2108	1990	1890	1806	1704	1627	1554	1498		
	auswertbar	Anzahl	4732	3980	3571	3281	2968	2688	2456	2286	2107	1990	1898	1806	1717	1642	1558	1510	1445		
	Raucher	Anzahl	583	493	339	283	250	226	185	171	155	154	145	140	131	119	117	107	111		
		Anteil in %	12,32	12,39	9,49	8,63	8,42	8,41	7,53	7,48	7,36	7,74	7,64	7,75	7,63	7,25	7,51	7,09	7,68		
	CI Anteil in %	[11,38; 13,26]	[11,36; 13,41]	[8,53; 10,45]	[7,66; 9,59]	[7,42; 9,42]	[7,36; 9,46]	[6,49; 8,58]	[6,40; 8,56]	[6,24; 8,47]	[6,56; 8,91]	[6,44; 8,83]	[6,52; 8,99]	[6,37; 8,89]	[5,99; 8,50]	[6,20; 8,82]	[5,79; 8,38]	[6,31; 9,06]			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	3573	3250	2972	2723	2456	2307	2154	2074	1938	1853	1772	1689	1609	1536	1462	1398			
	auswertbar	Anzahl	3573	3071	2847	2617	2317	2159	2006	1869	1773	1685	1636	1542	1474	1401	1336	1275			
	Raucher	Anzahl	443	351	280	251	201	180	159	138	133	127	123	116	110	113	107	103			
		Anteil in %	12,40	11,43	9,83	9,59	8,68	8,34	7,93	7,38	7,50	7,54	7,52	7,52	7,46	8,07	8,01	8,08			
	CI Anteil in %	[11,32; 13,48]	[10,30; 12,56]	[8,74; 10,93]	[8,46; 10,72]	[7,53; 9,82]	[7,17; 9,50]	[6,74; 9,11]	[6,20; 8,57]	[6,27; 8,73]	[6,28; 8,80]	[6,24; 8,80]	[6,21; 8,84]	[6,12; 8,80]	[6,64; 9,49]	[6,55; 9,47]	[6,58; 9,57]				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5126	4778	4364	3907	3558	3309	3148	2963	2824	2661	2526	2397	2303	2205	2120				
	auswertbar	Anzahl	5126	4556	4136	3744	3404	3191	2963	2817	2694	2578	2439	2337	2231	2142	2060				
	Raucher	Anzahl	617	506	394	330	277	246	223	221	206	200	181	176	167	164	164				
		Anteil in %	12,04	11,11	9,53	8,81	8,14	7,71	7,53	7,85	7,65	7,76	7,42	7,53	7,49	7,66	7,96				
	CI Anteil in %	[11,15; 12,93]	[10,19; 12,02]	[8,63; 10,42]	[7,91; 9,72]	[7,22; 9,06]	[6,78; 8,63]	[6,58; 8,48]	[6,85; 8,84]	[6,64; 8,65]	[6,73; 8,79]	[6,38; 8,46]	[6,46; 8,60]	[6,39; 8,58]	[6,53; 8,78]	[6,79; 9,13]					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6730	6209	5669	5188	4785	4530	4217	3994	3779	3583	3359	3189	3038	2890					
	auswertbar	Anzahl	6730	5919	5428	4974	4577	4249	3958	3801	3631	3418	3245	3074	2938	2802					
	Raucher	Anzahl	695	552	450	373	338	301	318	310	289	275	265	246	238	225					
		Anteil in %	10,33	9,33	8,29	7,50	7,38	7,08	8,03	8,16	7,96	8,05	8,17	8,00	8,10	8,03					
	CI Anteil in %	[9,60; 11,05]	[8,59; 10,07]	[7,56; 9,02]	[6,77; 8,23]	[6,63; 8,14]	[6,31; 7,86]	[7,19; 8,88]	[7,29; 9,03]	[7,08; 8,84]	[7,13; 8,96]	[7,22; 9,11]	[7,04; 8,96]	[7,11; 9,09]	[7,02; 9,04]						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7701	7230	6624	6126	5851	5453	5178	4900	4649	4384	4171	3943	3796						
	auswertbar	Anzahl	7701	6980	6379	5964	5523	5165	4985	4749	4475	4268	4055	3844	3710						
	Raucher	Anzahl	800	726	577	506	460	418	395	376	366	341	335	312	299						
		Anteil in %	10,39	10,40	9,05	8,48	8,33	8,09	7,92	7,92	8,18	7,99	8,26	8,12	8,06						
	CI Anteil in %	[9,71; 11,07]	[9,68; 11,12]	[8,34; 9,75]	[7,78; 9,19]	[7,60; 9,06]	[7,35; 8,84]	[7,17; 8,67]	[7,15; 8,69]	[7,38; 8,98]	[7,18; 8,80]	[7,41; 9,11]	[7,25; 8,98]	[7,18; 8,94]							
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10039	9574	8808	8261	7597	7190	6749	6421	6044	5752	5457	5188							
	auswertbar	Anzahl	10039	9060	8367	7684	7109	6802	6481	6121	5828	5518	5282	4997							
	Raucher	Anzahl	1055	888	747	638	608	565	530	480	460	422	407	389							
		Anteil in %	10,51	9,80	8,93	8,30	8,55	8,31	8,18	7,84	7,89	7,65	7,71	7,78							
	CI Anteil in %	[9,91; 11,11]	[9,19; 10,41]	[8,32; 9,54]	[7,69; 8,92]	[7,90; 9,20]	[7,65; 8,96]	[7,51; 8,84]	[7,17; 8,52]	[7,20; 8,59]	[6,95; 8,35]	[6,99; 8,42]	[7,04; 8,53]								
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	13038	12428	11713	10706	10073	9485	8960	8421	7998	7586	7253								
	auswertbar	Anzahl	13038	11842	10844	9946	9509	9093	8611	8090	7700	7344	7013								
	Raucher	Anzahl	1395	1168	964	902	855	804	745	716	664	618	590								
		Anteil in %	10,70	9,86	8,89	9,07	8,99	8,84	8,65	8,85	8,62	8,42	8,41								
	CI Anteil in %	[10,17; 11,23]	[9,33; 10,40]	[8,35; 9,43]	[8,50; 9,63]	[8,42; 9,57]	[8,26; 9,43]	[8,06; 9,25]	[8,23; 9,47]	[8,00; 9,25]	[7,78; 9,05]	[7,76; 9,06]									

EZ	Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	7565	7309	6753	6290	5830	5472	5173	4889	4618	4406									
	auswertbar	Anzahl	7565	6855	6148	5830	5525	5230	4964	4699	4465	4235									
	Raucher	Anzahl	878	751	614	559	523	479	472	411	393	373									
		Anteil in %	11,61	10,96	9,99	9,59	9,47	9,16	9,51	8,75	8,80	8,81									
	CI Anteil in %	[10,88; 12,33]	[10,22; 11,69]	[9,24; 10,74]	[8,83; 10,34]	[8,69; 10,24]	[8,38; 9,94]	[8,69; 10,32]	[7,94; 9,55]	[7,97; 9,63]	[7,95; 9,66]										
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7090	6842	6424	5924	5514	5191	4923	4677	4452										
	auswertbar	Anzahl	7090	6393	5992	5591	5270	4991	4726	4495	4297										
	Raucher	Anzahl	841	761	650	594	524	501	477	457	448										
		Anteil in %	11,86	11,90	10,85	10,62	9,94	10,04	10,09	10,17	10,43										
	CI Anteil in %	[11,11; 12,61]	[11,11; 12,70]	[10,06; 11,64]	[9,82; 11,43]	[9,14; 10,75]	[9,20; 10,87]	[9,23; 10,95]	[9,28; 11,05]	[9,51; 11,34]											
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5123	4955	4617	4293	3992	3733	3522	3336											
	auswertbar	Anzahl	5123	4680	4347	4058	3836	3579	3380	3210											
	Raucher	Anzahl	662	597	523	477	447	416	388	374											
		Anteil in %	12,92	12,76	12,03	11,75	11,65	11,62	11,48	11,65											
	CI Anteil in %	[12,00; 13,84]	[11,80; 13,71]	[11,06; 13,00]	[10,76; 12,75]	[10,64; 12,67]	[10,57; 12,67]	[10,40; 12,55]	[10,54; 12,76]												
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4373	4217	3920	3632	3418	3201	3030												
	auswertbar	Anzahl	4373	4046	3712	3470	3277	3076	2943												
	Raucher	Anzahl	547	492	432	402	382	345	337												
		Anteil in %	12,51	12,16	11,64	11,59	11,66	11,22	11,45												
	CI Anteil in %	[11,53; 13,49]	[11,15; 13,17]	[10,61; 12,67]	[10,52; 12,65]	[10,56; 12,76]	[10,10; 12,33]	[10,30; 12,60]													
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	4773	4564	4188	3889	3662	3449													
	auswertbar	Anzahl	4773	4334	3994	3747	3524	3339													
	Raucher	Anzahl	654	575	506	473	430	403													
		Anteil in %	13,70	13,27	12,67	12,62	12,20	12,07													
	CI Anteil in %	[12,73; 14,68]	[12,26; 14,28]	[11,64; 13,70]	[11,56; 13,69]	[11,12; 13,28]	[10,96; 13,17]														
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5317	5128	4757	4411	4135														
	auswertbar	Anzahl	5317	4945	4515	4219	3983														
	Raucher	Anzahl	720	671	572	526	496														
		Anteil in %	13,54	13,57	12,67	12,47	12,45														
	CI Anteil in %	[12,62; 14,46]	[12,61; 14,52]	[11,70; 13,64]	[11,47; 13,46]	[11,43; 13,48]															
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5301	5077	4716	4374															
	auswertbar	Anzahl	5301	4856	4466	4195															
	Raucher	Anzahl	688	666	580	542															
		Anteil in %	12,98	13,71	12,99	12,92															
	CI Anteil in %	[12,07; 13,88]	[12,75; 14,68]	[12,00; 13,97]	[11,90; 13,94]																
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4961	4773	4409																
	auswertbar	Anzahl	4961	4571	4165																
	Raucher	Anzahl	654	602	526																
		Anteil in %	13,18	13,17	12,63																
	CI Anteil in %	[12,24; 14,12]	[12,19; 14,15]	[11,62; 13,64]																	
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	4123	3969																	
	auswertbar	Anzahl	4123	3797																	
	Raucher	Anzahl	559	518																	
		Anteil in %	13,56	13,64																	
	CI Anteil in %	[12,51; 14,60]	[12,55; 14,73]																		
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4675																		
	auswertbar	Anzahl	4675																		
	Raucher	Anzahl	662																		
		Anteil in %	14,16																		
	CI Anteil in %	[13,16; 15,16]																			

In Tabelle A.3.1.4 wird die Entwicklung des Blutdrucks für das Kollektiv der Patienten mit **Hypertonus** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation als Hypertoniker eingestuft wurden.

Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Für jede Kohorte wird unter „Kollektivmitglieder insgesamt“ zunächst die Anzahl derjenigen Hypertoniker laut Anamnesebefund zur ED angegeben, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Alle Kollektivmitglieder, die im jeweiligen Berichtshalbjahr sowohl eine Angabe zum diastolischen als auch zum systolischen Blutdruck und gleichzeitig Angaben zur antihypertensiven Medikation dokumentiert haben, werden in der Zeile ‚auswertbar‘ abgebildet. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der gut eingestellten Kollektivmitglieder (Normotoniker) dokumentiert, bei denen der systolische und der diastolische Blutdruckwert im Normalbereich liegt und es wird gezeigt, wie hoch ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern ist. Außerdem wird ausgewiesen, welcher Anteil dieser gut eingestellten Kollektivmitglieder eine antihypertensive Therapie erhält bzw. nicht erhält.

Anschließend wird die Anzahl der nicht gut eingestellten Kollektivmitglieder (Hypertoniker) ausgewiesen und ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern dargestellt. Die Hypertoniker werden anhand ihrer Blutdruckwerte und in Abhängigkeit davon, ob eine antihypertensive Therapie (AHT) dokumentiert ist in vier Kategorien einsortiert. Den **Kategorien 3 und 4** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und der diastolische Blutdruckwert mindestens die festgelegten Schwellenwerte von 140mmHg (systolisch) bzw. 90 mmHg (diastolisch) erreicht, jedoch um maximal 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet. Den **Kategorien 5 und 6** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und/oder diastolische Blutdruckwert diese Schwellenwerte um mehr als 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet.

Im Beitrittsjahr können die Kategorien 1 und 2 – definitionsgemäß keine Hypertoniker – nicht besetzt sein, da das Kollektiv der Hypertoniker ohne die Patienten gebildet wird, die laut Erstdokumentation in diese Kategorien fallen würden.

Ferner ist zu beachten, dass durch die 9. Risikostrukturausgleichs-Änderungsverordnung eine Änderung in den Dokumentationsmöglichkeiten erfolgte. Bis einschließlich 2004-1 war bei der AHT ein „ja“ oder „nein“ zu dokumentieren. Ab 2004-2 war nur noch das Ankreuzen eines „ja“-Feldes möglich. Dadurch lässt sich in den Daten nicht mehr zwischen „nein“ und „fehlende Angabe“ unterscheiden. Um durchgehend eine einheitliche Rechenregel zu verwenden, sind daher in der Auswertung - unabhängig von den Dokumentationsmöglichkeiten - alle Fälle, in denen bei der AHT kein „ja“ dokumentiert ist, als „nein“ zu werten. In der Tabelle wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den sechs Kategorien über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern angegeben.

In der Tabelle wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den sechs Kategorien über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern angegeben.

In der Kohorte 2003-1 waren von den 11816 anfangs eingeschriebenen Teilnehmern laut Erstdokumentation 9602 Personen Hypertoniker. Im letzten Berichtshalbjahr umfasst dieses Kollektiv noch 2704 Personen. Eine im Zeitverlauf abnehmende Anzahl an Hypertonikern kann zwei Ursachen haben: Zum einen kann es sein, dass Patienten aus dem Programm ausscheiden und damit auch keine Kollektivmitglieder mehr sind. Zum anderen kann es sein, dass sich die Blutdruckwerte der Patienten verbessern und sie daher in späteren Berichtshalbjahren den Kategorien 1 oder 2 zuzuordnen sind, also als Kollektivmitglieder ohne Hypertonus gelten. Daher ist neben der absoluten Anzahl der Hypertoniker auch der entsprechende

Anteilswert zu beachten. So lag im letzten Berichtshalbjahr der Hypertonikeranteil bei 45,25 Prozent der dann auswertbaren Kollektivmitglieder.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle A.3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte

* Die Patienten sind in die für sie jeweils höchste, für sie zutreffende Kategorie einzustufen. Die Kategorisierung hat somit mit der höchsten Kategorie zu beginnen, also Kategorie 5 oder 6 (deutlich erhöhter Blutdruck). Die dort eingestuft Patienten können nicht mehr in eine andere Kategorie eingestuft werden etc.

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9602	8835	8069	7404	6780	6342	5917	5092	4754	4383	4206	3953	3752	3580	3370	3162	2993	2848	2704
	auswertbar	Anzahl	9602	7119	7536	6195	5692	5465	5035	4332	4105	3831	3621	3795	3645	3466	3252	3083	2940	2791	2634
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	3466	3001	3312	2646	2458	2556	2354	2094	2063	1995	1856	1987	1854	1805	1654	1643	1561	1553	1442
		Anteil in %	36,10	42,15	43,95	42,71	43,18	46,77	46,75	48,34	50,26	52,08	51,26	52,36	50,86	52,08	50,86	53,29	53,10	55,64	54,75
		CI Anteil in %	[35,14; 37,06]	[41,01; 43,30]	[42,83; 45,07]	[41,48; 43,94]	[41,90; 44,47]	[45,45; 48,09]	[45,37; 48,13]	[46,85; 49,83]	[48,73; 51,79]	[50,49; 53,66]	[49,63; 52,88]	[50,77; 53,95]	[49,24; 52,49]	[50,41; 53,74]	[49,14; 52,58]	[51,53; 55,05]	[51,29; 54,90]	[53,80; 57,49]	[52,84; 56,65]
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	183	321	332	42	34	25	26	20	23	20	15	92	80	78	65	61	48	50	43
		Anteil in %	1,91	4,51	4,41	0,68	0,60	0,46	0,52	0,46	0,56	0,52	0,41	2,42	2,19	2,25	2,00	1,98	1,63	1,79	1,63
		CI Anteil in %	[1,63; 2,18]	[4,03; 4,99]	[3,94; 4,87]	[0,47; 0,88]	[0,40; 0,80]	[0,28; 0,64]	[0,32; 0,71]	[0,26; 0,66]	[0,33; 0,79]	[0,29; 0,75]	[0,21; 0,62]	[1,93; 2,91]	[1,72; 2,67]	[1,76; 2,74]	[1,52; 2,48]	[1,49; 2,47]	[1,17; 2,09]	[1,30; 2,28]	[1,15; 2,12]
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	3283	2680	2980	2604	2424	2531	2328	2074	2040	1975	1841	1895	1774	1727	1589	1582	1513	1503	1399
		Anteil in %	34,19	37,65	39,54	42,03	42,59	46,31	46,24	47,88	49,70	51,55	50,84	49,93	48,67	49,83	48,86	51,31	51,46	53,85	53,11
		CI Anteil in %	[33,24; 35,14]	[36,52; 38,77]	[38,44; 40,65]	[40,80; 43,26]	[41,30; 43,87]	[44,99; 47,64]	[44,86; 47,61]	[46,39; 49,36]	[48,17; 51,23]	[49,97; 53,14]	[49,21; 52,47]	[48,34; 51,53]	[47,05; 50,29]	[48,16; 51,49]	[47,14; 50,58]	[49,55; 53,08]	[49,66; 53,27]	[52,00; 55,70]	[51,21; 55,02]
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	6136	4118	4224	3549	3234	2909	2681	2238	2042	1836	1765	1808	1791	1661	1598	1440	1379	1238	1192
		Anteil in %	63,90	57,85	56,05	57,29	56,82	53,23	53,25	51,66	49,74	47,92	48,74	47,64	49,14	47,92	49,14	46,71	46,90	44,36	45,25
		CI Anteil in %	[62,94; 64,86]	[56,70; 58,99]	[54,93; 57,17]	[56,06; 58,52]	[55,53; 58,10]	[51,91; 54,55]	[51,87; 54,63]	[50,17; 53,15]	[48,21; 51,27]	[46,34; 49,51]	[47,12; 50,37]	[46,05; 49,23]	[47,51; 50,76]	[46,26; 49,59]	[47,42; 50,86]	[44,95; 48,47]	[45,10; 48,71]	[42,51; 46,20]	[43,35; 47,16]
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	312	330	309	37	26	20	24	17	12	7	12	58	61	56	58	50	46	30	33
		Anteil in %	3,25	4,64	4,10	0,60	0,46	0,37	0,48	0,39	0,29	0,18	0,33	1,53	1,67	1,62	1,78	1,62	1,56	1,07	1,25
		CI Anteil in %	[2,89; 3,60]	[4,15; 5,12]	[3,65; 4,55]	[0,41; 0,79]	[0,28; 0,63]	[0,21; 0,53]	[0,29; 0,67]	[0,21; 0,58]	[0,13; 0,46]	[0,05; 0,32]	[0,14; 0,52]	[1,14; 1,92]	[1,26; 2,09]	[1,20; 2,04]	[1,33; 2,24]	[1,18; 2,07]	[1,12; 2,01]	[0,69; 1,46]	[0,83; 1,68]
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	5046	3337	3493	3171	2893	2649	2433	2054	1870	1651	1597	1587	1566	1448	1368	1234	1205	1096	1037
		Anteil in %	52,55	46,87	46,35	51,19	50,83	48,47	48,32	47,41	45,55	43,10	44,10	41,82	42,96	41,78	42,07	40,03	40,99	39,27	39,37
		CI Anteil in %	[51,55; 53,55]	[45,72; 48,03]	[45,22; 47,48]	[49,94; 52,43]	[49,53; 52,12]	[47,15; 49,80]	[46,94; 49,70]	[45,93; 48,90]	[44,03; 47,08]	[41,53; 44,66]	[42,49; 45,72]	[40,25; 43,39]	[41,36; 44,57]	[40,14; 43,42]	[40,37; 43,76]	[38,30; 41,76]	[39,21; 42,76]	[37,46; 41,08]	[37,50; 41,24]
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	28	26	23	5	5	2	1	1	1	2	0	3	3	4	3	2	4	2	2
		Anteil in %	0,29	0,37	0,31	0,08	0,09	0,04	0,02	0,02	0,02	0,05	0,00	0,08	0,08	0,12	0,09	0,06	0,14	0,07	0,08
		CI Anteil in %	[0,18; 0,40]	[0,23; 0,51]	[0,18; 0,43]	[0,01; 0,15]	[0,01; 0,16]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,07]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,23]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,27]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,18]
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	750	425	399	336	310	238	223	166	159	176	156	160	161	153	169	154	124	110	120	
	Anteil in %	7,81	5,97	5,29	5,42	5,45	4,35	4,43	3,83	3,87	4,59	4,31	4,22	4,42	4,41	5,20	5,00	4,22	3,94	4,56	
	CI Anteil in %	[7,27; 8,35]	[5,42; 6,52]	[4,79; 5,80]	[4,86; 5,99]	[4,86; 6,04]	[3,81; 4,90]	[3,86; 5,00]	[3,26; 4,40]	[3,28; 4,46]	[3,93; 5,26]	[3,65; 4,97]	[3,58; 4,86]	[3,75; 5,08]	[3,73; 5,10]	[4,43; 5,96]	[4,23; 5,76]	[3,49; 4,94]	[3,22; 4,66]	[3,76; 5,35]	
Patienten insgesamt	Anzahl	11816	10849	9883	9067	8272	7705	7151	6132	5721	5287	5081	4776	4533	4332	4084	3845	3644	3478	3312	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2003-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8127	7090	6490	5868	5381	4964	4528	4175	3793	3650	3457	3282	3101	2952	2812	2684	2525	2403
	auswertbar	Anzahl	8126	6346	5138	4765	4388	4037	3726	3430	3209	3053	3294	3130	3005	2862	2737	2592	2456	2341
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2891	2451	2032	1935	1929	1784	1680	1611	1544	1499	1669	1517	1490	1405	1404	1369	1312	1263
		Anteil in %	35,58	38,62	39,55	40,61	43,96	44,19	45,09	46,97	48,11	49,10	50,67	48,47	49,58	49,09	51,30	52,82	53,42	53,95
		CI Anteil in %	[34,54; 36,62]	[37,42; 39,82]	[38,21; 40,89]	[39,21; 42,00]	[42,49; 45,43]	[42,66; 45,72]	[43,49; 46,69]	[45,30; 48,64]	[46,39; 49,84]	[47,33; 50,87]	[48,96; 52,38]	[46,72; 50,22]	[47,80; 51,37]	[47,26; 50,92]	[49,42; 53,17]	[50,89; 54,74]	[51,45; 55,39]	[51,93; 55,97]
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	186	290	46	38	42	30	35	28	25	21	83	69	71	66	68	63	64	56
		Anteil in %	2,29	4,57	0,90	0,80	0,96	0,74	0,94	0,82	0,78	0,69	2,52	2,20	2,36	2,31	2,48	2,43	2,61	2,39
		CI Anteil in %	[1,96; 2,61]	[4,06; 5,08]	[0,64; 1,15]	[0,54; 1,05]	[0,67; 1,25]	[0,48; 1,01]	[0,63; 1,25]	[0,52; 1,12]	[0,47; 1,08]	[0,39; 0,98]	[1,98; 3,06]	[1,69; 2,72]	[1,82; 2,91]	[1,76; 2,86]	[1,90; 3,07]	[1,84; 3,02]	[1,98; 3,24]	[1,77; 3,01]
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2705	2161	1986	1897	1887	1754	1645	1583	1519	1478	1586	1448	1419	1339	1336	1306	1248	1207
		Anteil in %	33,29	34,05	38,65	39,81	43,00	43,45	44,15	46,15	47,34	48,41	48,15	46,26	47,22	46,79	48,81	50,39	50,81	51,56
		CI Anteil in %	[32,26; 34,31]	[32,89; 35,22]	[37,32; 39,98]	[38,42; 41,20]	[41,54; 44,47]	[41,92; 44,98]	[42,55; 45,74]	[44,48; 47,82]	[45,61; 49,06]	[46,64; 50,18]	[46,44; 49,85]	[44,51; 48,01]	[45,44; 49,01]	[44,96; 48,61]	[46,94; 50,69]	[48,46; 52,31]	[48,84; 52,79]	[49,53; 53,58]
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	5235	3895	3106	2830	2459	2253	2046	1819	1665	1554	1625	1613	1515	1457	1333	1223	1144	1078
		Anteil in %	64,42	61,38	60,45	59,39	56,04	55,81	54,91	53,03	51,89	50,90	49,33	51,53	50,42	50,91	48,70	47,18	46,58	46,05
		CI Anteil in %	[63,38; 65,46]	[60,18; 62,58]	[59,11; 61,79]	[58,00; 60,79]	[54,57; 57,51]	[54,28; 57,34]	[53,31; 56,51]	[51,36; 54,70]	[50,16; 53,61]	[49,13; 52,67]	[47,62; 51,04]	[49,78; 53,28]	[48,63; 52,20]	[49,08; 52,74]	[46,83; 50,58]	[45,26; 49,11]	[44,61; 48,55]	[44,03; 48,07]
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	257	348	44	28	22	22	23	13	16	11	59	58	45	41	40	37	33	34
		Anteil in %	3,16	5,48	0,86	0,59	0,50	0,54	0,62	0,38	0,50	0,36	1,79	1,85	1,50	1,43	1,46	1,43	1,34	1,45
		CI Anteil in %	[2,78; 3,54]	[4,92; 6,04]	[0,60; 1,11]	[0,37; 0,80]	[0,29; 0,71]	[0,32; 0,77]	[0,37; 0,87]	[0,17; 0,58]	[0,25; 0,74]	[0,15; 0,57]	[1,34; 2,24]	[1,38; 2,33]	[1,06; 1,93]	[1,00; 1,87]	[1,01; 1,91]	[0,97; 1,88]	[0,89; 1,80]	[0,97; 1,94]
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	4236	3079	2722	2470	2160	1994	1822	1638	1486	1399	1395	1390	1302	1271	1159	1053	990	922
		Anteil in %	52,13	48,52	52,98	51,84	49,23	49,39	48,90	47,76	46,31	45,82	42,35	44,41	43,33	44,41	42,35	40,63	40,31	39,38
		CI Anteil in %	[51,04; 53,22]	[47,29; 49,75]	[51,61; 54,34]	[50,42; 53,26]	[47,75; 50,70]	[47,85; 50,94]	[47,29; 50,50]	[46,08; 49,43]	[44,58; 48,03]	[44,06; 47,59]	[40,66; 44,04]	[42,67; 46,15]	[41,56; 45,10]	[42,59; 46,23]	[40,49; 44,20]	[38,73; 42,52]	[38,37; 42,25]	[37,41; 41,36]
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	40	40	4	4	2	0	0	0	1	1	10	4	4	0	1	4	1	2	
	Anteil in %	0,49	0,63	0,08	0,08	0,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,30	0,13	0,13	0,00	0,04	0,15	0,04	0,09	
	CI Anteil in %	[0,34; 0,64]	[0,44; 0,83]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,09]	[0,00; 0,10]	[0,12; 0,49]	[0,00; 0,25]	[0,00; 0,26]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,11]	[0,00; 0,31]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,20]	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	702	428	336	328	275	237	201	168	162	143	161	161	164	145	133	129	120	120	
	Anteil in %	8,64	6,74	6,54	6,88	6,27	5,87	5,39	4,90	5,05	4,68	4,89	5,14	5,46	5,07	4,86	4,98	4,89	5,13	
	CI Anteil in %	[8,03; 9,25]	[6,13; 7,36]	[5,86; 7,22]	[6,16; 7,60]	[5,55; 6,98]	[5,15; 6,60]	[4,67; 6,12]	[4,18; 5,62]	[4,29; 5,81]	[3,93; 5,43]	[4,15; 5,62]	[4,37; 5,92]	[4,65; 6,27]	[4,26; 5,87]	[4,05; 5,67]	[4,14; 5,81]	[4,03; 5,74]	[4,23; 6,02]	
Patienten insgesamt	Anzahl	10121	8824	8032	7226	6602	6085	5543	5120	4661	4482	4247	4041	3826	3647	3474	3313	3131	2988	
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3639	3265	2896	2641	2399	2154	1998	1824	1734	1630	1535	1452	1390	1309	1251	1194	1151	
	auswertbar	Anzahl	3634	2565	2340	2208	2000	1813	1688	1567	1450	1543	1467	1386	1318	1262	1195	1162	1109	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1150	983	927	911	824	813	765	780	687	735	676	664	627	633	628	616	598	
		Anteil in %	31,65	38,32	39,62	41,26	41,20	44,84	45,32	49,78	47,38	47,63	46,08	47,91	47,57	50,16	52,55	53,01	53,92	
		CI Anteil in %	[30,13; 33,16]	[36,44; 40,21]	[37,63; 41,60]	[39,21; 43,31]	[39,04; 43,36]	[42,55; 47,13]	[42,94; 47,70]	[47,30; 52,25]	[44,81; 49,95]	[45,14; 50,13]	[43,53; 48,63]	[45,28; 50,54]	[44,87; 50,27]	[47,40; 52,92]	[49,72; 55,38]	[50,14; 55,88]	[50,99; 56,86]	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	63	39	20	13	14	8	21	13	9	41	30	30	23	28	29	23	20	
		Anteil in %	1,73	1,52	0,85	0,59	0,70	0,44	1,24	0,83	0,62	2,66	2,04	2,16	1,75	2,22	2,43	1,98	1,80	
		CI Anteil in %	[1,31; 2,16]	[1,05; 1,99]	[0,48; 1,23]	[0,27; 0,91]	[0,33; 1,07]	[0,14; 0,75]	[0,72; 1,77]	[0,38; 1,28]	[0,22; 1,03]	[1,85; 3,46]	[1,32; 2,77]	[1,40; 2,93]	[1,04; 2,45]	[1,41; 3,03]	[1,55; 3,30]	[1,18; 2,78]	[1,02; 2,59]	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1087	944	907	898	810	805	744	767	678	694	646	634	604	605	599	593	578	
		Anteil in %	29,91	36,80	38,76	40,67	40,50	44,40	44,08	48,95	46,76	44,98	44,04	45,74	45,83	47,94	50,13	51,03	52,12	
		CI Anteil in %	[28,42; 31,40]	[34,94; 38,67]	[36,79; 40,74]	[38,62; 42,72]	[38,35; 42,65]	[42,11; 46,69]	[41,71; 46,45]	[46,47; 51,42]	[44,19; 49,33]	[42,49; 47,46]	[41,49; 46,58]	[43,12; 48,37]	[43,14; 48,52]	[45,18; 50,70]	[47,29; 52,96]	[48,16; 53,91]	[49,18; 55,06]	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2484	1582	1413	1297	1176	1000	923	787	763	808	791	722	691	629	567	546	511	
		Anteil in %	68,35	61,68	60,38	58,74	58,80	55,16	54,68	50,22	52,62	52,37	53,92	52,09	52,43	49,84	47,45	46,99	46,08	
		CI Anteil in %	[66,84; 69,87]	[59,79; 63,56]	[58,40; 62,37]	[56,69; 60,79]	[56,64; 60,96]	[52,87; 57,45]	[52,30; 57,06]	[47,75; 52,70]	[50,05; 55,19]	[49,87; 54,86]	[51,37; 56,47]	[49,46; 54,72]	[49,73; 55,13]	[47,08; 52,60]	[44,62; 50,28]	[44,12; 49,86]	[43,14; 49,01]	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	122	34	17	22	22	23	18	13	13	34	37	20	27	23	14	14	15	
		Anteil in %	3,36	1,33	0,73	1,00	1,10	1,27	1,07	0,83	0,90	2,20	2,52	1,44	2,05	1,82	1,17	1,20	1,35	
		CI Anteil in %	[2,77; 3,94]	[0,88; 1,77]	[0,38; 1,07]	[0,58; 1,41]	[0,64; 1,56]	[0,75; 1,78]	[0,58; 1,56]	[0,38; 1,28]	[0,41; 1,38]	[1,47; 2,94]	[1,72; 3,32]	[0,81; 2,07]	[1,28; 2,81]	[1,08; 2,56]	[0,56; 1,78]	[0,58; 1,83]	[0,67; 2,03]	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1951	1352	1230	1121	1025	868	817	689	687	687	670	630	585	532	485	476	431	
		Anteil in %	53,69	52,71	52,56	50,77	51,25	47,88	48,40	43,97	47,38	44,52	45,67	45,45	44,39	42,16	40,59	40,96	38,86	
		CI Anteil in %	[52,07; 55,31]	[50,78; 54,64]	[50,54; 54,59]	[48,68; 52,86]	[49,06; 53,44]	[45,58; 50,18]	[46,02; 50,79]	[41,51; 46,43]	[44,81; 49,95]	[42,04; 47,00]	[43,12; 48,22]	[42,83; 48,08]	[41,70; 47,07]	[39,43; 44,88]	[37,80; 43,37]	[38,14; 43,79]	[35,99; 41,73]	
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	22	1	1	0	1	0	0	1	0	2	1	2	2	1	2	2	2		
	Anteil in %	0,61	0,04	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,06	0,00	0,13	0,07	0,14	0,15	0,08	0,17	0,17	0,18		
	CI Anteil in %	[0,35; 0,86]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,19]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,31]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,34]	[0,00; 0,36]	[0,00; 0,23]	[0,00; 0,40]	[0,00; 0,41]	[0,00; 0,43]		
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	389	195	165	154	128														

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2768	2540	2334	2140	1927	1811	1693	1631	1524	1459	1398	1331	1271	1210	1152	1104			
	auswertbar	Anzahl	2052	1874	1772	1653	1484	1409	1318	1228	1398	1331	1296	1222	1167	1110	1061	1010			
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	757	756	721	749	701	710	647	641	667	665	662	623	622	596	576	552			
		Anteil in %	36,89	40,34	40,69	45,31	47,24	50,39	49,09	52,20	47,71	49,96	51,08	50,98	53,30	53,69	54,29	54,65			
		CI Anteil in %	[34,80; 38,98]	[38,12; 42,56]	[38,40; 42,98]	[42,91; 47,71]	[44,70; 49,78]	[47,78; 53,00]	[46,39; 51,79]	[49,40; 54,99]	[45,09; 50,33]	[47,28; 52,65]	[48,36; 53,80]	[48,18; 53,79]	[50,44; 56,16]	[50,76; 56,63]	[51,29; 57,29]	[51,58; 57,73]			
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	17	18	14	12	10	15	11	4	35	39	38	28	33	27	32	27			
		Anteil in %	0,83	0,96	0,79	0,73	0,67	1,06	0,83	0,33	2,50	2,93	2,93	2,29	2,83	2,43	3,02	2,67			
		CI Anteil in %	[0,44; 1,22]	[0,52; 1,40]	[0,38; 1,20]	[0,32; 1,14]	[0,26; 1,09]	[0,53; 1,60]	[0,34; 1,33]	[0,01; 0,64]	[1,68; 3,32]	[2,02; 3,84]	[2,01; 3,85]	[1,45; 3,13]	[1,88; 3,78]	[1,53; 3,34]	[1,99; 4,05]	[1,68; 3,67]			
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	740	738	707	737	691	695	636	637	632	626	624	595	589	569	544	525			
		Anteil in %	36,06	39,38	39,90	44,59	46,56	49,33	48,25	51,87	45,21	47,03	48,15	48,69	50,47	51,26	51,27	51,98			
		CI Anteil in %	[33,98; 38,14]	[37,17; 41,59]	[37,62; 42,18]	[42,19; 46,98]	[44,02; 49,10]	[46,71; 51,94]	[45,56; 50,95]	[49,08; 54,67]	[42,60; 47,82]	[44,35; 49,71]	[45,43; 50,87]	[45,89; 51,49]	[47,60; 53,34]	[48,32; 54,20]	[48,26; 54,28]	[48,90; 55,06]			
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1295	1118	1051	904	783	699	671	587	731	666	634	599	545	514	485	458			
		Anteil in %	63,11	59,66	59,31	54,69	52,76	49,61	50,91	47,80	52,29	50,04	48,92	49,02	46,70	46,31	45,71	45,35			
		CI Anteil in %	[61,02; 65,20]	[57,44; 61,88]	[57,02; 61,60]	[52,29; 57,09]	[50,22; 55,30]	[47,00; 52,22]	[48,21; 53,61]	[45,01; 50,60]	[49,67; 54,91]	[47,35; 52,72]	[46,20; 51,64]	[46,21; 51,82]	[43,84; 49,56]	[43,37; 49,24]	[42,71; 48,71]	[42,27; 48,42]			
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	14	20	12	11	8	4	5	6	36	25	29	30	25	22	18	17			
		Anteil in %	0,68	1,07	0,68	0,67	0,54	0,28	0,38	0,49	2,58	1,88	2,24	2,45	2,14	1,98	1,70	1,68			
		CI Anteil in %	[0,33; 1,04]	[0,60; 1,53]	[0,30; 1,06]	[0,27; 1,06]	[0,17; 0,91]	[0,01; 0,56]	[0,05; 0,71]	[0,10; 0,88]	[1,74; 3,41]	[1,15; 2,61]	[1,43; 3,04]	[1,59; 3,32]	[1,31; 2,97]	[1,16; 2,80]	[0,92; 2,47]	[0,89; 2,48]			
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1100	967	925	792	690	618	587	511	605	572	540	508	451	439	414	390			
		Anteil in %	53,61	51,60	52,20	47,91	46,50	43,86	44,54	41,61	43,28	42,98	41,67	41,57	38,65	39,55	39,02	38,61			
		CI Anteil in %	[51,45; 55,76]	[49,34; 53,86]	[49,87; 54,53]	[45,50; 50,32]	[43,96; 49,03]	[41,27; 46,45]	[41,85; 47,22]	[38,85; 44,37]	[40,68; 45,87]	[40,31; 45,64]	[38,98; 44,35]	[38,81; 44,34]	[35,85; 41,44]	[36,67; 42,43]	[36,08; 41,96]	[35,61; 41,62]			
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	4	1	3	2	1	0	1	3	2	1	4	1	1	0	1			
		Anteil in %	0,05	0,21	0,06	0,18	0,13	0,07	0,00	0,08	0,21	0,15	0,08	0,33	0,09	0,09	0,00	0,10			
		CI Anteil in %	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,42]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,39]	[0,00; 0,32]	[0,00; 0,21]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,24]	[0,00; 0,46]	[0,00; 0,36]	[0,00; 0,23]	[0,01; 0,65]	[0,00; 0,25]	[0,00; 0,27]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,29]			
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	180	127	113	98	83	76	79	69	87	67	64	57	68	52	53	50				
	Anteil in %	8,77	6,78	6,38	5,93	5,59	5,39	5,99	5,62	6,22	5,03	4,94	4,66	5,83	4,68	5,00	4,95				
	CI Anteil in %	[7,55; 10,00]	[5,64; 7,92]	[5,24; 7,51]	[4,79; 7,07]	[4,42; 6,76]	[4,21; 6,57]	[4,71; 7,28]	[4,33; 6,91]	[4,96; 7,49]	[3,86; 6,21]	[3,76; 6,12]	[3,48; 5,85]	[4,48; 7,17]	[3,44; 5,93]	[3,68; 6,31]	[3,61; 6,29]				
Patienten insgesamt	Anzahl	3573	3250	2972	2723	2456	2307	2154	2074	1938	1853	1772	1689	1609	1536	1462	1398				

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4099	3845	3520	3151	2872	2683	2562	2412	2299	2173	2066	1962	1884	1802	1730			
	auswertbar	Anzahl	3176	2999	2783	2557	2393	2252	2122	2297	2205	2110	1996	1913	1823	1749	1680			
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1152	1216	1202	1224	1140	1101	1080	1173	1173	1103	1002	983	982	955	908			
		Anteil in %	36,27	40,55	43,19	47,87	47,64	48,89	50,90	51,07	53,20	52,27	50,20	51,39	53,87	54,60	54,05			
		CI Anteil in %	[34,60; 37,94]	[38,79; 42,30]	[41,35; 45,03]	[45,93; 49,81]	[45,64; 49,64]	[46,82; 50,95]	[48,77; 53,02]	[49,02; 53,11]	[51,11; 55,28]	[50,14; 54,41]	[48,01; 52,39]	[49,14; 53,63]	[51,58; 56,16]	[52,27; 56,94]	[51,66; 56,43]			
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	10	15	18	13	13	16	12	83	81	69	59	58	55	54	45			
		Anteil in %	0,31	0,50	0,65	0,51	0,54	0,71	0,57	3,61	3,67	3,27	2,96	3,03	3,02	3,09	2,68			
		CI Anteil in %	[0,12; 0,51]	[0,25; 0,75]	[0,35; 0,94]	[0,23; 0,78]	[0,25; 0,84]	[0,36; 1,06]	[0,25; 0,88]	[2,85; 4,38]	[2,89; 4,46]	[2,51; 4,03]	[2,21; 3,70]	[2,26; 3,80]	[2,23; 3,80]	[2,28; 3,90]	[1,91; 3,45]			
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1142	1201	1184	1211	1127	1085	1068	1090	1092	1034	943	925	927	901	863			
		Anteil in %	35,96	40,05	42,54	47,36	47,10	48,18	50,33	47,45	49,52	49,00	47,24	48,35	50,85	51,52	51,37			
		CI Anteil in %	[34,29; 37,63]	[38,29; 41,80]	[40,71; 44,38]	[45,42; 49,30]	[45,10; 49,10]	[46,12; 50,24]	[48,20; 52,46]	[45,41; 49,50]	[47,44; 51,61]	[46,87; 51,14]	[45,05; 49,44]	[46,11; 50,59]	[48,55; 53,15]	[49,17; 53,86]	[48,98; 53,76]			
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2024	1783	1581	1333	1253	1151	1042	1124	1032	1007	994	930	841	794	772			
		Anteil in %	63,73	59,45	56,81	52,13	52,36	51,11	49,10	48,93	46,80	47,73	49,80	48,61	46,13	45,40	45,95			
		CI Anteil in %	[62,06; 65,40]	[57,70; 61,21]	[54,97; 58,65]	[50,19; 54,07]	[50,36; 54,36]	[49,05; 53,18]	[46,98; 51,23]	[46,89; 50,98]	[44,72; 48,89]	[45,59; 49,86]	[47,61; 51,99]	[46,37; 50,86]	[43,84; 48,42]	[43,06; 47,73]	[43,57; 48,34]			
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	26	23	20	14	15	11	14	48	49	49	47	41	33	24	29			
		Anteil in %	0,82	0,77	0,72	0,55	0,63	0,49	0,66	2,09	2,22	2,32	2,35	2,14	1,81	1,37	1,73			
		CI Anteil in %	[0,51; 1,13]	[0,45; 1,08]	[0,40; 1,03]	[0,26; 0,83]	[0,31; 0,94]	[0,20; 0,78]	[0,32; 1,00]	[1,50; 2,67]	[1,61; 2,84]	[1,68; 2,97]	[1,69; 3,02]	[1,49; 2,79]	[1,20; 2,42]	[0,83; 1,92]	[1,10; 2,35]			
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1687	1542	1354	1163	1105	1025	917	942	870	841	822	778	720	684	653			
		Anteil in %	53,12	51,42	48,65	45,48	46,18	45,52	43,21	41,01	39,46	39,86	41,18	40,67	39,50	39,11	38,87			
		CI Anteil in %	[51,38; 54,85]	[49,63; 53,21]	[46,80; 50,51]	[43,55; 47,41]	[44,18; 48,17]	[43,46; 47,57]	[41,11; 45,32]	[39,00; 43,02]	[37,42; 41,50]	[37,77; 41,95]	[39,02; 43,34]	[38,47; 42,87]	[37,25; 41,74]	[36,82; 41,40]	[36,54; 41,20]			
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	5	4	2	2	3	3	1	3	3	2	6	3	5	1	0				
	Anteil in %	0,16	0,13	0,07	0,08	0,13	0,13	0,05	0,13	0,14	0,09	0,30	0,16	0,27	0,06	0,00				
	CI Anteil in %	[0,02; 0,30]	[0,00; 0,26]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,19]	[0,00; 0,27]	[0,00; 0,28]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,28]	[0,00; 0,29]	[0,00; 0,23]	[0,06; 0,54]	[0,00; 0,33]	[0,03; 0,51]	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,00]				
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	306	214	205	154	130	112	110	131	110	115	119	108	83	85	90				
	Anteil in %	9,63	7,14	7,37	6,02	5,43	4,97	5,18	5,70	4,99	5,45	5,96	5,65	4,55	4,86	5,36				
	CI Anteil in %	[8,61; 10,66]	[6,21; 8,06]	[6,40; 8,34]	[5,10; 6,95]	[4,52; 6,34]	[4,08; 5,87]	[4,24; 6,13]	[4,75; 6,65]	[4,08; 5,90]	[4,48; 6,42]	[4,92; 7,00]	[4,61; 6,68]	[3,60; 5,51]	[3,85; 5,87]	[4,28; 6,43]				
Patienten insgesamt	Anzahl	5126	4778	4364	3907	3558	3309	3148	2963	2824	2661	2526	2397	2303	2205	2120				
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5331	4939	4543	4177	3868	3674	3427	3260	3085	2924	2741	2596	2474	2358				
	auswertbar	Anzahl	4317	3956	3683	3455	3213	3024	3223	3098	2965	2798	2650	2507	2389	2285				
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1703	1652	1615	1549	1544	1488	1534	1500	1431	1357	1312	1265	1273	1251				
		Anteil in %	39,45	41,76	43,85	44,83	48,05	49,21	47,60	48,42	48,26	48,50	49,51	50,46	53,29	54,75				
		CI Anteil in %	[37,99; 40,91]	[40,22; 43,30]	[42,25; 45,45]	[43,18; 46,49]	[46,33; 49,78]	[47,42; 50,99]	[45,87; 49,32]	[46,66; 50,18]	[46,46; 50,06]	[46,65; 50,35]	[47,61; 51,41]	[48,50; 52,42]	[51,28; 55,29]	[52,71; 56,79]				
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	32	34	30	33	29	31	114	105	88	76	75	67	60	67				
		Anteil in %	0,74	0,86	0,81	0,96	0,90	1,03	3,54	3,39	2,97	2,72	2,83	2,67	2,51	2,93				
		CI Anteil in %	[0,49; 1,00]	[0,57; 1,15]	[0,52; 1,10]	[0,63; 1,28]	[0,58; 1,23]	[0,67; 1,38]	[2,90; 4,17]	[2,75; 4,03]	[2,36; 3,58]	[2,11; 3,32]	[2,20; 3,46]	[2,04; 3,30]	[1,88; 3,14]	[2,24; 3,62]				
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1671	1618	1585	1516	1515	1457	1420	1395	1343	1281	1237	1198	1213	1184				
		Anteil in %	38,71	40,90	43,04	43,88	47,15	48,18	44,06	45,03	45,30	45,78	46,68	47,79	50,77	51,82				
		CI Anteil in %	[37,25; 40,16]	[39,37; 42,43]	[41,44; 44,63]	[42,22; 45,53]	[45,43; 48,88]	[46,40; 49,96]	[42,34; 45,77]	[43,28; 46,78]	[43,50; 47,09]	[43,94; 47,63]	[44,78; 48,58]	[45,83; 49,74]	[48,77; 52,78]	[49,77; 53,87]				
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2614	2304	2068	1906	1669	1536	1689	1598	1534	1441	1338	1242	1116	1034				
		Anteil in %	60,55	58,24	56,15	55,17	51,95	50,79	52,40	51,58	51,74	51,50	50,49	49,54	46,71	45,25				
		CI Anteil in %	[59,09; 62,01]	[56,70; 59,78]	[54,55; 57,75]	[53,51; 56,82]	[50,22; 53,67]	[49,01; 52,58]	[50,68; 54,13]	[49,82; 53,34]	[49,94; 53,54]	[49,65; 53,35]	[48,59; 52,39]	[47,58; 51,50]	[44,71; 48,72]	[43,21; 47,29]				
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	42	39	41	37	25	22	75	68	61	64	56	49	47	35				
		Anteil in %	0,97	0,99	1,11	1,07	0,78	0,73	2,33	2,19	2,06	2,29	2,11	1,95	1,97	1,53				
		CI Anteil in %	[0,68; 1,27]	[0,68; 1,29]	[0,77; 1,45]	[0,73; 1,41]	[0,47; 1,08]	[0,42; 1,03]	[1,81; 2,85]	[1,68; 2,71]	[1,55; 2,57]	[1,73; 2,84]	[1,57; 2,66]	[1,41; 2,50]	[1,41; 2,52]	[1,03; 2,04]				
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2172	1990	1767	1660	1451	1316	1407	1336	1305	1203	1102	1071	951	881				
		Anteil in %	50,31	50,30	47,98	48,05	45,16	43,52	43,65	43,12	44,01	42,99	41,58	42,72	39,81	38,56				
		CI Anteil in %	[48,82; 51,80]	[48,75; 51,86]	[46,36; 49,59]	[46,38; 49,71]	[43,44; 46,88]	[41,75; 45,29]	[41,94; 45,37]	[41,38; 44,87]	[42,23; 45,80]	[41,16; 44,83]	[39,71; 43,46]	[40,78; 44,66]	[37,84; 41,77]	[36,56; 40,55]				
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	6	2	2	3	5	4	6	5	9	10	6	4	6	1					
	Anteil in %	0,14	0,05	0,05	0,09	0,16	0,13	0,19	0,16	0,30	0,36	0,23	0,16	0,25	0,04					
	CI Anteil in %	[0,03; 0,25]	[0,00; 0,12]	[0,00; 0,13]	[0,00; 0,19]	[0,02; 0,29]	[0,00; 0,26]	[0,04; 0,34]	[0,02; 0,30]	[0,11; 0,50]	[0,14; 0,58]	[0,05; 0,41]	[0,00; 0,32]	[0,05; 0,45]	[0,00; 0,13]					
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	394	273	258	206	188	194	201	189	159	164	174	118	112	117					
	Anteil in %	9,13	6,90	7,01	5,96	5,85	6,42	6,24	6,10	5,36	5,86	6,57	4,71	4,69	5,12					
	CI Anteil in %	[8,27; 9,99]	[6,11; 7,69]	[6,18; 7,83]	[5,17; 6,75]	[5,04; 6,66]	[5,54; 7,29]	[5,40; 7,07]	[5,26; 6,94]	[4,55; 6,17]	[4,99; 6,73]	[5,62; 7,51]	[3,88; 5,54]	[3,84; 5,54]	[4,22; 6,02]					
Patienten insgesamt	Anzahl	6730	6209	5669	5188	4785	4530	4217	3994	3779	3583	3359	3189	3038	2890					

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6057	5703	5247	4886	4680	4364	4151	3929	3735	3524	3352	3172	3061					
	auswertbar	Anzahl	4985	4739	4378	4147	3911	4152	4005	3819	3599	3432	3264	3093	2990					
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1901	2082	1966	1944	1857	1966	1891	1821	1742	1676	1636	1585	1578					
		Anteil in %	38,13	43,93	44,91	46,88	47,48	47,35	47,22	47,68	48,40	48,83	50,12	51,24	52,78					
		CI Anteil in %	[36,79; 39,48]	[42,52; 45,35]	[43,43; 46,38]	[45,36; 48,40]	[45,92; 49,05]	[45,83; 48,87]	[45,67; 48,76]	[46,10; 49,27]	[46,77; 50,04]	[47,16; 50,51]	[48,41; 51,84]	[49,48; 53,01]	[50,99; 54,57]					
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	36	37	38	39	33	138	122	127	121	102	95	91	76					
		Anteil in %	0,72	0,78	0,87	0,94	0,84	3,32	3,05	3,33	3,36	2,97	2,91	2,94	2,54					
		CI Anteil in %	[0,49; 0,96]	[0,53; 1,03]	[0,59; 1,14]	[0,65; 1,23]	[0,56; 1,13]	[2,78; 3,87]	[2,51; 3,58]	[2,76; 3,89]	[2,77; 3,95]	[2,40; 3,54]	[2,33; 3,49]	[2,35; 3,54]	[1,98; 3,11]					
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1865	2045	1928	1905	1824	1828	1769	1694	1621	1574	1541	1494	1502					
		Anteil in %	37,41	43,15	44,04	45,94	46,64	44,03	44,17	44,36	45,04	45,86	47,21	48,30	50,23					
		CI Anteil in %	[36,07; 38,76]	[41,74; 44,56]	[42,57; 45,51]	[44,42; 47,45]	[45,07; 48,20]	[42,52; 45,54]	[42,63; 45,71]	[42,78; 45,93]	[43,41; 46,67]	[44,20; 47,53]	[45,50; 48,92]	[46,54; 50,06]	[48,44; 52,03]					
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	3084	2657	2412	2203	2054	2186	2114	1998	1857	1756	1628	1508	1412					
		Anteil in %	61,87	56,07	55,09	53,12	52,52	52,65	52,78	52,32	51,60	51,17	49,88	48,76	47,22					
		CI Anteil in %	[60,52; 63,21]	[54,65; 57,48]	[53,62; 56,57]	[51,60; 54,64]	[50,95; 54,08]	[51,13; 54,17]	[51,24; 54,33]	[50,73; 53,90]	[49,96; 53,23]	[49,49; 52,84]	[48,16; 51,59]	[46,99; 50,52]	[45,43; 49,01]					
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	43	39	37	28	28	116	117	85	65	78	72	61	66					
		Anteil in %	0,86	0,82	0,85	0,68	0,72	2,79	2,92	2,23	1,81	2,27	2,21	1,97	2,21					
		CI Anteil in %	[0,61; 1,12]	[0,57; 1,08]	[0,57; 1,12]	[0,43; 0,92]	[0,45; 0,98]	[2,29; 3,30]	[2,40; 3,44]	[1,76; 2,69]	[1,37; 2,24]	[1,77; 2,77]	[1,70; 2,71]	[1,48; 2,46]	[1,68; 2,73]					
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2571	2286	2061	1898	1795	1844	1746	1666	1536	1453	1373	1256	1191					
		Anteil in %	51,57	48,24	47,08	45,77	45,90	44,41	43,60	43,62	42,68	42,34	42,06	40,61	39,83					
		CI Anteil in %	[50,19; 52,96]	[46,82; 49,66]	[45,60; 48,56]	[44,25; 47,28]	[44,33; 47,46]	[42,90; 45,92]	[42,06; 45,13]	[42,05; 45,20]	[41,06; 44,29]	[40,68; 43,99]	[40,37; 43,76]	[38,88; 42,34]	[38,08; 41,59]					
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	8	2	8	3	4	12	8	8	9	7	3	8	5						
	Anteil in %	0,16	0,04	0,18	0,07	0,10	0,29	0,20	0,21	0,25	0,20	0,09	0,26	0,17						
	CI Anteil in %	[0,05; 0,27]	[0,00; 0,10]	[0,06; 0,31]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,20]	[0,13; 0,45]	[0,06; 0,34]	[0,06; 0,35]	[0,09; 0,41]	[0,05; 0,35]	[0,00; 0,20]	[0,08; 0,44]	[0,02; 0,31]						
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	462	330	306	274	227	214	243	239	247	218	180	183	150						
	Anteil in %	9,27	6,96	6,99	6,61	5,80	5,15	6,07	6,26	6,86	6,35	5,51	5,92	5,02						
	CI Anteil in %	[8,46; 10,07]	[6,24; 7,69]	[6,23; 7,74]	[5,85; 7,36]	[5,07; 6,54]	[4,48; 5,83]	[5,33; 6,81]	[5,49; 7,03]	[6,04; 7,69]	[5,54; 7,17]	[4,73; 6,30]	[5,08; 6,75]	[4,23; 5,80]						
Patienten insgesamt	Anzahl	7701	7230	6624	6126	5851	5453	5178	4900	4649	4384	4171	3943	3796						
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8107	7764	7184	6738	6193	5876	5529	5258	4953	4706	4459	4232						
	auswertbar	Anzahl	6561	6230	5831	5424	5809	5563	5300	5012	4775	4515	4315	4073						
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2778	2752	2605	2554	2749	2554	2490	2363	2372	2292	2190	2190						
		Anteil in %	42,34	44,17	44,68	47,09	47,32	45,91	46,98	47,15	49,68	50,76	50,75	53,77						
		CI Anteil in %	[41,15; 43,54]	[42,94; 45,41]	[43,40; 45,95]	[45,76; 48,42]	[46,04; 48,61]	[44,60; 47,22]	[45,64; 48,32]	[45,76; 48,53]	[48,26; 51,09]	[49,31; 52,22]	[49,26; 52,25]	[52,24; 55,30]						
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	57	52	45	52	195	180	164	119	138	113	108	107						
		Anteil in %	0,87	0,83	0,77	0,96	3,36	3,24	3,09	2,37	2,89	2,50	2,50	2,63						
		CI Anteil in %	[0,64; 1,09]	[0,61; 1,06]	[0,55; 1,00]	[0,70; 1,22]	[2,89; 3,82]	[2,77; 3,70]	[2,63; 3,56]	[1,95; 2,80]	[2,41; 3,37]	[2,05; 2,96]	[2,04; 2,97]	[2,14; 3,12]						
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2721	2700	2560	2502	2554	2374	2326	2244	2234	2179	2082	2083						
		Anteil in %	41,47	43,34	43,90	46,13	43,97	42,67	43,89	44,77	46,79	48,26	48,25	51,14						
		CI Anteil in %	[40,28; 42,66]	[42,11; 44,57]	[42,63; 45,18]	[44,80; 47,46]	[42,69; 45,24]	[41,37; 43,97]	[42,55; 45,22]	[43,40; 46,15]	[45,37; 48,20]	[46,80; 49,72]	[46,76; 49,74]	[49,61; 52,68]						
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	3783	3478	3226	2870	3060	3009	2810	2649	2403	2223	2125	1883						
		Anteil in %	57,66	55,83	55,32	52,91	52,68	54,09	53,02	52,85	50,32	49,24	49,25	46,23						
		CI Anteil in %	[56,46; 58,85]	[54,59; 57,06]	[54,05; 56,60]	[51,58; 54,24]	[51,39; 53,96]	[52,78; 55,40]	[51,68; 54,36]	[51,47; 54,24]	[48,91; 51,74]	[47,78; 50,69]	[47,75; 50,74]	[44,70; 47,76]						
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	33	55	42	40	197	157	137	136	110	102	91	70						
		Anteil in %	0,50	0,88	0,72	0,74	3,39	2,82	2,58	2,71	2,30	2,26	2,11	1,72						
		CI Anteil in %	[0,33; 0,67]	[0,65; 1,12]	[0,50; 0,94]	[0,51; 0,97]	[2,93; 3,86]	[2,39; 3,26]	[2,16; 3,01]	[2,26; 3,16]	[1,88; 2,73]	[1,83; 2,69]	[1,68; 2,54]	[1,32; 2,12]						
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	3279	3036	2820	2528	2533	2495	2354	2217	2063	1905	1833	1629						
		Anteil in %	49,98	48,73	48,36	46,61	43,60	44,85	44,42	44,23	43,20	42,19	42,48	40,00						
		CI Anteil in %	[48,77; 51,19]	[47,49; 49,97]	[47,08; 49,65]	[45,28; 47,94]	[42,33; 44,88]	[43,54; 46,16]	[43,08; 45,75]	[42,86; 45,61]	[41,80; 44,61]	[40,75; 43,63]	[41,00; 43,95]	[38,49; 41,50]						
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	5	7	5	7	16	11	17	15	13	14	6	9							
	Anteil in %	0,08	0,11	0,09	0,13	0,28	0,20	0,32	0,30	0,27	0,31	0,14	0,22							
	CI Anteil in %	[0,01; 0,14]	[0,03; 0,20]	[0,01; 0,16]	[0,03; 0,22]	[0,14; 0,41]	[0,08; 0,31]	[0,17; 0,47]	[0,15; 0,45]	[0,12; 0,42]	[0,15; 0,47]	[0,03; 0,25]	[0,08; 0,37]							
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	466	380	359	295	314	346	302	281	217	202	195	175							
	Anteil in %	7,10	6,10	6,16	5,44	5,41	6,22	5,70	5,61	4,54	4,47	4,52	4,30							
	CI Anteil in %	[6,48; 7,72]	[5,51; 6,69]	[5,54; 6,77]	[4,84; 6,04]	[4,82; 5,99]	[5,58; 6,85]	[5,07; 6,32]	[4,97; 6,24]	[3,95; 5,14]	[3,87; 5,08]	[3,90; 5,14]	[3,67; 4,92]							
Patienten insgesamt	Anzahl	10039	9574	8808	8261	7597	7190	6749	6421	6044	5752	5457	5188							

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	10644	10204	9639	8828	8336	7853	7425	6967	6616	6278	6010							
	auswertbar	Anzahl	8708	8236	7625	8251	7889	7534	7129	6689	6364	6089	5807							
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	3433	3701	3571	3878	3708	3558	3349	3267	3227	3179	3017							
		Anteil in %	39,42	44,94	46,83	47,00	47,00	47,23	46,98	48,84	50,71	52,21	51,95							
		CI Anteil in %	[38,40; 40,45]	[43,86; 46,01]	[45,71; 47,95]	[45,92; 48,08]	[45,90; 48,10]	[46,10; 48,35]	[45,82; 48,14]	[47,64; 50,04]	[49,48; 51,94]	[50,95; 53,46]	[50,67; 53,24]							
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	57	71	67	292	247	217	168	172	154	154	148							
		Anteil in %	0,65	0,86	0,88	3,54	3,13	2,88	2,36	2,57	2,42	2,53	2,55							
		CI Anteil in %	[0,49; 0,82]	[0,66; 1,06]	[0,67; 1,09]	[3,14; 3,94]	[2,75; 3,52]	[2,50; 3,26]	[2,00; 2,71]	[2,19; 2,95]	[2,04; 2,80]	[2,13; 2,92]	[2,14; 2,95]							
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	3376	3630	3504	3586	3461	3341	3181	3095	3073	3025	2869							
		Anteil in %	38,77	44,07	45,95	43,46	43,87	44,35	44,62	46,27	48,29	49,68	49,41							
		CI Anteil in %	[37,75; 39,79]	[43,00; 45,15]	[44,84; 47,07]	[42,39; 44,53]	[42,78; 44,97]	[43,22; 45,47]	[43,47; 45,77]	[45,08; 47,46]	[47,06; 49,52]	[48,42; 50,94]	[48,12; 50,69]							
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	5275	4535	4054	4373	4181	3976	3780	3422	3137	2910	2790							
		Anteil in %	60,58	55,06	53,17	53,00	53,00	52,77	53,02	51,16	49,29	47,79	48,05							
		CI Anteil in %	[59,55; 61,60]	[53,99; 56,14]	[52,05; 54,29]	[51,92; 54,08]	[51,90; 54,10]	[51,65; 53,90]	[51,86; 54,18]	[49,96; 52,36]	[48,06; 50,52]	[46,54; 49,05]	[46,76; 49,33]							
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	61	56	52	224	204	178	174	146	128	108	96							
		Anteil in %	0,70	0,68	0,68	2,71	2,59	2,36	2,44	2,18	2,01	1,77	1,65							
		CI Anteil in %	[0,53; 0,88]	[0,50; 0,86]	[0,50; 0,87]	[2,36; 3,07]	[2,24; 2,94]	[2,02; 2,71]	[2,08; 2,80]	[1,83; 2,53]	[1,67; 2,36]	[1,44; 2,11]	[1,33; 1,98]							
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	4431	3941	3570	3684	3508	3379	3198	2930	2717	2504	2397							
		Anteil in %	50,88	47,85	46,82	44,65	44,47	44,85	44,86	43,80	42,69	41,12	41,28							
		CI Anteil in %	[49,83; 51,93]	[46,77; 48,93]	[45,70; 47,94]	[43,58; 45,72]	[43,37; 45,56]	[43,73; 45,97]	[43,70; 46,01]	[42,61; 44,99]	[41,48; 43,91]	[39,89; 42,36]	[40,01; 42,54]							
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	8	5	6	26	27	20	12	8	7	7	9								
	Anteil in %	0,09	0,06	0,08	0,32	0,34	0,27	0,17	0,12	0,11	0,11	0,15								
	CI Anteil in %	[0,03; 0,16]	[0,01; 0,11]	[0,02; 0,14]	[0,19; 0,44]	[0,21; 0,47]	[0,15; 0,38]	[0,07; 0,26]	[0,04; 0,20]	[0,03; 0,19]	[0,03; 0,20]	[0,05; 0,26]								
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	775	533	426	439	442	399	396	338	285	291	288								
	Anteil in %	8,90	6,47	5,59	5,32	5,60	5,30	5,55	5,05	4,48	4,78	4,96								
	CI Anteil in %	[8,30; 9,50]	[5,94; 7,00]	[5,07; 6,10]	[4,84; 5,80]	[5,10; 6,11]	[4,79; 5,80]	[5,02; 6,09]	[4,53; 5,58]	[3,97; 4,99]	[4,24; 5,31]	[4,40; 5,52]								
Patienten insgesamt	Anzahl	13038	12428	11713	10706	10073	9485	8960	8421	7998	7586	7253								
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6186	6003	5580	5206	4841	4555	4311	4077	3859	3685								
	auswertbar	Anzahl	5115	4748	5115	4841	4593	4361	4138	3918	3731	3546								
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	2126	2210	2521	2298	2226	2088	2056	2065	1950	1834								
		Anteil in %	41,56	46,55	49,29	47,47	48,47	47,88	49,69	52,71	52,26	51,72								
		CI Anteil in %	[40,21; 42,91]	[45,13; 47,96]	[47,92; 50,66]	[46,06; 48,88]	[47,02; 49,91]	[46,40; 49,36]	[48,16; 51,21]	[51,14; 54,27]	[50,66; 53,87]	[50,08; 53,37]								
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	37	40	231	166	150	153	141	139	130	121								
		Anteil in %	0,72	0,84	4,52	3,43	3,27	3,51	3,41	3,55	3,48	3,41								
		CI Anteil in %	[0,49; 0,96]	[0,58; 1,10]	[3,95; 5,09]	[2,92; 3,94]	[2,75; 3,78]	[2,96; 4,05]	[2,85; 3,96]	[2,97; 4,13]	[2,90; 4,07]	[2,81; 4,01]								
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	2089	2170	2290	2132	2076	1935	1915	1926	1820	1713								
		Anteil in %	40,84	45,70	44,77	44,04	45,20	44,37	46,28	49,16	48,78	48,31								
		CI Anteil in %	[39,49; 42,19]	[44,29; 47,12]	[43,41; 46,13]	[42,64; 45,44]	[43,76; 46,64]	[42,90; 45,85]	[44,76; 47,80]	[47,59; 50,72]	[47,18; 50,38]	[46,66; 49,95]								
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2989	2538	2594	2543	2367	2273	2082	1853	1781	1712								
		Anteil in %	58,44	53,45	50,71	52,53	51,53	52,12	50,31	47,29	47,74	48,28								
		CI Anteil in %	[57,09; 59,79]	[52,04; 54,87]	[49,34; 52,08]	[51,12; 53,94]	[50,09; 52,98]	[50,64; 53,60]	[48,79; 51,84]	[45,73; 48,86]	[46,13; 49,34]	[46,63; 49,92]								
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	50	45	140	160	140	120	110	95	76	68								
		Anteil in %	0,98	0,95	2,74	3,31	3,05	2,75	2,66	2,42	2,04	1,92								
		CI Anteil in %	[0,71; 1,25]	[0,67; 1,22]	[2,29; 3,18]	[2,80; 3,81]	[2,55; 3,55]	[2,27; 3,24]	[2,17; 3,15]	[1,94; 2,91]	[1,58; 2,49]	[1,47; 2,37]								
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2481	2183	2160	2087	1972	1874	1734	1557	1503	1455								
		Anteil in %	48,50	45,98	42,23	43,11	42,93	42,97	41,90	39,74	40,28	41,03								
		CI Anteil in %	[47,13; 49,87]	[44,56; 47,40]	[40,87; 43,58]	[41,72; 44,51]	[41,50; 44,37]	[41,50; 44,44]	[40,40; 43,41]	[38,21; 41,27]	[38,71; 41,86]	[39,41; 42,65]								
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	3	16	17	15	16	6	5	9	7									
	Anteil in %	0,02	0,06	0,31	0,35	0,33	0,37	0,14	0,13	0,24	0,20									
	CI Anteil in %	[0,00; 0,06]	[0,00; 0,13]	[0,16; 0,47]	[0,18; 0,52]	[0,16; 0,49]	[0,19; 0,55]	[0,03; 0,26]	[0,02; 0,24]	[0,08; 0,40]	[0,05; 0,34]									
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	457	307	278	279	240	263	232	196	193	182									
	Anteil in %	8,93	6,47	5,43	5,76	5,23	6,03	5,61	5,00	5,17	5,13									
	CI Anteil in %	[8,15; 9,72]	[5,77; 7,17]	[4,81; 6,06]	[5,11; 6,42]	[4,58; 5,87]	[5,32; 6,74]	[4,91; 6,31]	[4,32; 5,69]	[4,46; 5,88]	[4,41; 5,86]									
Patienten insgesamt	Anzahl	7565	7309	6753	6290	5830	5472	5173	4889	4618	4406									

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5733	5543	5215	4840	4516	4251	4036	3836	3655											
	auswertbar	Anzahl	4706	5187	4893	4570	4322	4092	3869	3697	3529											
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1976	2355	2224	2129	1988	1924	1959	1872	1803											
		Anteil in %	41,99	45,40	45,45	46,59	46,00	47,02	50,63	50,64	51,09											
		CI Anteil in %	[40,58; 43,40]	[44,05; 46,76]	[44,06; 46,85]	[45,14; 48,03]	[44,51; 47,48]	[45,49; 48,55]	[49,06; 52,21]	[49,02; 52,25]	[49,44; 52,74]											
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	45	191	162	137	118	119	104	95	96											
		Anteil in %	0,96	3,68	3,31	3,00	2,73	2,91	2,69	2,57	2,72											
		CI Anteil in %	[0,68; 1,23]	[3,17; 4,19]	[2,81; 3,81]	[2,50; 3,49]	[2,24; 3,22]	[2,39; 3,42]	[2,18; 3,20]	[2,06; 3,08]	[2,18; 3,26]											
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1931	2164	2062	1992	1870	1805	1855	1777	1707											
		Anteil in %	41,03	41,72	42,14	43,59	43,27	44,11	47,95	48,07	48,37											
		CI Anteil in %	[39,63; 42,44]	[40,38; 43,06]	[40,76; 43,53]	[42,15; 45,03]	[41,79; 44,74]	[42,59; 45,63]	[46,37; 49,52]	[46,46; 49,68]	[46,72; 50,02]											
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2730	2832	2669	2441	2334	2168	1910	1825	1726											
		Anteil in %	58,01	54,60	54,55	53,41	54,00	52,98	49,37	49,36	48,91											
		CI Anteil in %	[56,60; 59,42]	[53,24; 55,95]	[53,15; 55,94]	[51,97; 54,86]	[52,52; 55,49]	[51,45; 54,51]	[47,79; 50,94]	[47,75; 50,98]	[47,26; 50,56]											
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	43	191	175	146	126	101	91	86	64											
		Anteil in %	0,91	3,68	3,58	3,19	2,92	2,47	2,35	2,33	1,81											
		CI Anteil in %	[0,64; 1,19]	[3,17; 4,19]	[3,06; 4,10]	[2,68; 3,70]	[2,41; 3,42]	[1,99; 2,94]	[1,87; 2,83]	[1,84; 2,81]	[1,37; 2,25]											
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2241	2256	2149	2012	1908	1802	1610	1525	1455											
		Anteil in %	47,62	43,49	43,92	44,03	44,15	44,04	41,61	41,25	41,23											
		CI Anteil in %	[46,19; 49,05]	[42,14; 44,84]	[42,53; 45,31]	[42,59; 45,47]	[42,67; 45,63]	[42,52; 45,56]	[40,06; 43,17]	[39,66; 42,84]	[39,61; 42,85]											
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	5	19	20	19	20	10	16	14	9												
	Anteil in %	0,11	0,37	0,41	0,42	0,46	0,24	0,41	0,38	0,26												
	CI Anteil in %	[0,01; 0,20]	[0,20; 0,53]	[0,23; 0,59]	[0,23; 0,60]	[0,26; 0,67]	[0,09; 0,40]	[0,21; 0,62]	[0,18; 0,58]	[0,09; 0,42]												
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	441	366	325	264	280	255	193	200	198												
	Anteil in %	9,37	7,06	6,64	5,78	6,48	6,23	4,99	5,41	5,61												
	CI Anteil in %	[8,54; 10,20]	[6,36; 7,75]	[5,94; 7,34]	[5,10; 6,45]	[5,74; 7,21]	[5,49; 6,97]	[4,30; 5,67]	[4,68; 6,14]	[4,85; 6,37]												
Patienten insgesamt	Anzahl	7090	6842	6424	5924	5514	5191	4923	4677	4452												
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4012	3904	3672	3421	3189	2998	2835	2679												
	auswertbar	Anzahl	4012	3720	3478	3249	3076	2881	2723	2579												
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1837	1690	1627	1512	1457	1407	1377	1339												
		Anteil in %	45,79	45,43	46,78	46,54	47,37	48,84	50,57	51,92												
		CI Anteil in %	[44,25; 47,33]	[43,83; 47,03]	[45,12; 48,44]	[44,82; 48,25]	[45,60; 49,13]	[47,01; 50,66]	[48,69; 52,45]	[49,99; 53,85]												
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	132	116	126	104	105	94	96	83												
		Anteil in %	3,29	3,12	3,62	3,20	3,41	3,26	3,53	3,22												
		CI Anteil in %	[2,74; 3,84]	[2,56; 3,68]	[3,00; 4,24]	[2,60; 3,81]	[2,77; 4,06]	[2,61; 3,91]	[2,83; 4,22]	[2,54; 3,90]												
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1705	1574	1501	1408	1352	1313	1281	1256												
		Anteil in %	42,50	42,31	43,16	43,34	43,95	45,57	47,04	48,70												
		CI Anteil in %	[40,97; 44,03]	[40,72; 43,90]	[41,51; 44,80]	[41,63; 45,04]	[42,20; 45,71]	[43,76; 47,39]	[45,17; 48,92]	[46,77; 50,63]												
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2175	2030	1851	1737	1619	1474	1346	1240												
		Anteil in %	54,21	54,57	53,22	53,46	52,63	51,16	49,43	48,08												
		CI Anteil in %	[52,67; 55,75]	[52,97; 56,17]	[51,56; 54,88]	[51,75; 55,18]	[50,87; 54,40]	[49,34; 52,99]	[47,55; 51,31]	[46,15; 50,01]												
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	151	130	98	90	84	76	56	53												
		Anteil in %	3,76	3,49	2,82	2,77	2,73	2,64	2,06	2,06												
		CI Anteil in %	[3,17; 4,35]	[2,90; 4,08]	[2,27; 3,37]	[2,21; 3,33]	[2,15; 3,31]	[2,05; 3,22]	[1,52; 2,59]	[1,51; 2,60]												
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1684	1621	1516	1426	1324	1241	1124	1026												
		Anteil in %	41,97	43,58	43,59	43,89	43,04	43,08	41,28	39,78												
		CI Anteil in %	[40,45; 43,50]	[41,98; 45,17]	[41,94; 45,24]	[42,18; 45,60]	[41,29; 44,79]	[41,27; 44,88]	[39,43; 43,13]	[37,89; 41,67]												
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	21	12	11	12	7	4	8	9													
	Anteil in %	0,52	0,32	0,32	0,37	0,23	0,14	0,29	0,35													
	CI Anteil in %	[0,30; 0,75]	[0,14; 0,50]	[0,13; 0,50]	[0,16; 0,58]	[0,06; 0,40]	[0,00; 0,27]	[0,09; 0,50]	[0,12; 0,58]													
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	319	267	226	209	204	153	158	152													
	Anteil in %	7,95	7,18	6,50	6,43	6,63	5,31	5,80	5,89													
	CI Anteil in %	[7,11; 8,79]	[6,35; 8,01]	[5,68; 7,32]	[5,59; 7,28]	[5,75; 7,51]	[4,49; 6,13]	[4,92; 6,68]	[4,98; 6,80]													
Patienten insgesamt	Anzahl	5123	4955	4617	4293	3992	3733	3522	3336													

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3457	3346	3130	2914	2752	2590	2454													
	auswertbar	Anzahl	3456	3213	2973	2788	2640	2492	2384													
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1451	1536	1478	1421	1407	1361	1271													
		Anteil in %	41,98	47,81	49,71	50,97	53,30	54,61	53,31													
		CI Anteil in %	[40,34; 43,63]	[46,08; 49,53]	[47,92; 51,51]	[49,11; 52,82]	[51,39; 55,20]	[52,66; 56,57]	[51,31; 55,32]													
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	94	117	99	96	80	75	70													
		Anteil in %	2,72	3,64	3,33	3,44	3,03	3,01	2,94													
		CI Anteil in %	[2,18; 3,26]	[2,99; 4,29]	[2,68; 3,98]	[2,77; 4,12]	[2,38; 3,68]	[2,34; 3,68]	[2,26; 3,61]													
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1357	1419	1379	1325	1327	1286	1201													
		Anteil in %	39,27	44,16	46,38	47,53	50,27	51,61	50,38													
		CI Anteil in %	[37,64; 40,89]	[42,45; 45,88]	[44,59; 48,18]	[45,67; 49,38]	[48,36; 52,17]	[49,64; 53,57]	[48,37; 52,38]													
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2005	1677	1495	1367	1233	1131	1113													
		Anteil in %	58,02	52,19	50,29	49,03	46,70	45,39	46,69													
		CI Anteil in %	[56,37; 59,66]	[50,47; 53,92]	[48,49; 52,08]	[47,18; 50,89]	[44,80; 48,61]	[43,43; 47,34]	[44,68; 48,69]													
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	148	105	83	68	72	65	53													
		Anteil in %	4,28	3,27	2,79	2,44	2,73	2,61	2,22													
		CI Anteil in %	[3,61; 4,96]	[2,65; 3,88]	[2,20; 3,38]	[1,87; 3,01]	[2,11; 3,35]	[1,98; 3,23]	[1,63; 2,82]													
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1546	1342	1222	1130	1008	947	926													
		Anteil in %	44,73	41,77	41,10	40,53	38,18	38,00	38,84													
		CI Anteil in %	[43,08; 46,39]	[40,06; 43,47]	[39,33; 42,87]	[38,71; 42,35]	[36,33; 40,04]	[36,10; 39,91]	[36,89; 40,80]													
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	22	10	5	6	6	7	6														
	Anteil in %	0,64	0,31	0,17	0,22	0,23	0,28	0,25														
	CI Anteil in %	[0,37; 0,90]	[0,12; 0,50]	[0,02; 0,32]	[0,04; 0,39]	[0,05; 0,41]	[0,07; 0,49]	[0,05; 0,45]														
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	289	220	185	163	147	112	128														
	Anteil in %	8,36	6,85	6,22	5,85	5,57	4,49	5,37														
	CI Anteil in %	[7,44; 9,29]	[5,97; 7,72]	[5,35; 7,09]	[4,98; 6,72]	[4,69; 6,44]	[3,68; 5,31]	[4,46; 6,27]														
Patienten insgesamt	Anzahl	4373	4217	3920	3632	3418	3201	3030														
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3739	3589	3322	3086	2901	2732														
	auswertbar	Anzahl	3739	3426	3174	2973	2802	2654														
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1716	1651	1593	1542	1502	1396														
		Anteil in %	45,89	48,19	50,19	51,87	53,60	52,60														
		CI Anteil in %	[44,30; 47,49]	[46,52; 49,86]	[48,45; 51,93]	[50,07; 53,66]	[51,76; 55,45]	[50,70; 54,50]														
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	140	134	117	113	88	73														
		Anteil in %	3,74	3,91	3,69	3,80	3,14	2,75														
		CI Anteil in %	[3,14; 4,35]	[3,26; 4,56]	[3,03; 4,34]	[3,11; 4,49]	[2,49; 3,79]	[2,13; 3,37]														
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1576	1517	1476	1429	1414	1323														
		Anteil in %	42,15	44,28	46,50	48,07	50,46	49,85														
		CI Anteil in %	[40,57; 43,73]	[42,62; 45,94]	[44,77; 48,24]	[46,27; 49,86]	[48,61; 52,32]	[47,95; 51,75]														
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2023	1775	1581	1431	1300	1258														
		Anteil in %	54,11	51,81	49,81	48,13	46,40	47,40														
		CI Anteil in %	[52,51; 55,70]	[50,14; 53,48]	[48,07; 51,55]	[46,34; 49,93]	[44,55; 48,24]	[45,50; 49,30]														
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	132	99	85	60	73	68														
		Anteil in %	3,53	2,89	2,68	2,02	2,61	2,56														
		CI Anteil in %	[2,94; 4,12]	[2,33; 3,45]	[2,12; 3,24]	[1,51; 2,52]	[2,02; 3,20]	[1,96; 3,16]														
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1591	1443	1323	1214	1090	1078														
		Anteil in %	42,55	42,12	41,68	40,83	38,90	40,62														
		CI Anteil in %	[40,97; 44,14]	[40,47; 43,77]	[39,97; 43,40]	[39,07; 42,60]	[37,10; 40,71]	[38,75; 42,49]														
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	25	14	7	10	7	7															
	Anteil in %	0,67	0,41	0,22	0,34	0,25	0,26															
	CI Anteil in %	[0,41; 0,93]	[0,19; 0,62]	[0,06; 0,38]	[0,13; 0,54]	[0,06; 0,43]	[0,07; 0,46]															
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	275	219	166	147	130	105															
	Anteil in %	7,35	6,39	5,23	4,94	4,64	3,96															
	CI Anteil in %	[6,52; 8,19]	[5,57; 7,21]	[4,46; 6,00]	[4,17; 5,72]	[3,86; 5,42]	[3,21; 4,70]															
Patienten insgesamt	Anzahl	4773	4564	4188	3889	3662	3449															

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4214	4080	3810	3541	3342														
	auswertbar	Anzahl	4214	3945	3618	3409	3230														
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1782	1935	1807	1764	1665														
		Anteil in %	42,29	49,05	49,94	51,75	51,55														
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[40,80; 43,78]	[47,49; 50,61]	[48,32; 51,57]	[50,07; 53,42]	[49,82; 53,27]														
		Anzahl	135	139	104	121	98														
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	3,20	3,52	2,87	3,55	3,03														
		CI Anteil in %	[2,67; 3,74]	[2,95; 4,10]	[2,33; 3,42]	[2,93; 4,17]	[2,44; 3,63]														
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1647	1796	1703	1643	1567														
		Anteil in %	39,08	45,53	47,07	48,20	48,51														
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[37,61; 40,56]	[43,97; 47,08]	[45,44; 48,70]	[46,52; 49,87]	[46,79; 50,24]														
		Anzahl	2432	2010	1811	1645	1565														
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	57,71	50,95	50,06	48,25	48,45														
		CI Anteil in %	[56,22; 59,20]	[49,39; 52,51]	[48,43; 51,68]	[46,58; 49,93]	[46,73; 50,18]														
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	121	101	95	69	71														
		Anteil in %	2,87	2,56	2,63	2,02	2,20														
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[2,37; 3,38]	[2,07; 3,05]	[2,10; 3,15]	[1,55; 2,50]	[1,69; 2,70]														
		Anzahl	1937	1678	1505	1390	1302														
	Patienten insgesamt	Anteil in %	45,97	42,53	41,60	40,77	40,31														
		CI Anteil in %	[44,46; 47,47]	[40,99; 44,08]	[39,99; 43,20]	[39,12; 42,42]	[38,62; 42,00]														
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4191	4020	3761	3497															
	auswertbar	Anzahl	4188	3856	3561	3351															
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1944	1975	1854	1721															
		Anteil in %	46,42	51,22	52,06	51,36															
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[44,91; 47,93]	[49,64; 52,80]	[50,42; 53,71]	[49,67; 53,05]															
		Anzahl	144	138	102	103															
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	3,44	3,58	2,86	3,07															
		CI Anteil in %	[2,89; 3,99]	[2,99; 4,17]	[2,32; 3,41]	[2,49; 3,66]															
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1800	1837	1752	1618															
		Anteil in %	42,98	47,64	49,20	48,28															
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[41,48; 44,48]	[46,06; 49,22]	[47,56; 50,84]	[46,59; 49,98]															
		Anzahl	2244	1881	1707	1630															
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	53,58	48,78	47,94	48,64															
		CI Anteil in %	[52,07; 55,09]	[47,20; 50,36]	[46,29; 49,58]	[46,95; 50,33]															
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	144	103	88	74															
		Anteil in %	3,44	2,67	2,47	2,21															
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[2,89; 3,99]	[2,16; 3,18]	[1,96; 2,98]	[1,71; 2,71]															
		Anzahl	1803	1562	1427	1382															
	Patienten insgesamt	Anteil in %	43,05	40,51	40,07	41,24															
		CI Anteil in %	[41,55; 44,55]	[38,96; 42,06]	[38,46; 41,68]	[39,57; 42,91]															
Patienten insgesamt	Anzahl	28	9	9	7																
	Anteil in %	0,67	0,23	0,25	0,21																
Patienten insgesamt	CI Anteil in %	[0,42; 0,92]	[0,08; 0,39]	[0,09; 0,42]	[0,05; 0,36]																
	Anzahl	269	207	183	167																
Patienten insgesamt	Anteil in %	6,42	5,37	5,14	4,98																
	CI Anteil in %	[5,68; 7,17]	[4,66; 6,08]	[4,41; 5,86]	[4,25; 5,72]																

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3939	3804	3544																	
	auswertbar	Anzahl	3937	3665	3355																	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1784	1865	1776																	
		Anteil in %	45,31	50,89	52,94																	
		CI Anteil in %	[43,76; 46,87]	[49,27; 52,51]	[51,25; 54,63]																	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	122	121	88																	
		Anteil in %	3,10	3,30	2,62																	
		CI Anteil in %	[2,56; 3,64]	[2,72; 3,88]	[2,08; 3,16]																	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1662	1744	1688																	
		Anteil in %	42,21	47,59	50,31																	
		CI Anteil in %	[40,67; 43,76]	[45,97; 49,20]	[48,62; 52,01]																	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2153	1800	1579																	
		Anteil in %	54,69	49,11	47,06																	
		CI Anteil in %	[53,13; 56,24]	[47,49; 50,73]	[45,37; 48,75]																	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	126	98	77																	
		Anteil in %	3,20	2,67	2,30																	
		CI Anteil in %	[2,65; 3,75]	[2,15; 3,20]	[1,79; 2,80]																	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1713	1477	1328																	
		Anteil in %	43,51	40,30	39,58																	
		CI Anteil in %	[41,96; 45,06]	[38,71; 41,89]	[37,93; 41,24]																	
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	25	10	9																		
	Anteil in %	0,64	0,27	0,27																		
	CI Anteil in %	[0,39; 0,88]	[0,10; 0,44]	[0,09; 0,44]																		
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	289	215	165																		
	Anteil in %	7,34	5,87	4,92																		
	CI Anteil in %	[6,53; 8,16]	[5,11; 6,63]	[4,19; 5,65]																		
Patienten insgesamt	Anzahl	4961	4773	4409																		
2011-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3298	3187																		
	auswertbar	Anzahl	3296	3056																		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1549	1540																		
		Anteil in %	47,00	50,39																		
		CI Anteil in %	[45,29; 48,70]	[48,62; 52,17]																		
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	105	107																		
		Anteil in %	3,19	3,50																		
		CI Anteil in %	[2,59; 3,79]	[2,85; 4,15]																		
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1444	1433																		
		Anteil in %	43,81	46,89																		
		CI Anteil in %	[42,12; 45,50]	[45,12; 48,66]																		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1747	1516																		
		Anteil in %	53,00	49,61																		
		CI Anteil in %	[51,30; 54,71]	[47,83; 51,38]																		
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	109	72																		
		Anteil in %	3,31	2,36																		
		CI Anteil in %	[2,70; 3,92]	[1,82; 2,89]																		
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1392	1270																		
		Anteil in %	42,23	41,56																		
		CI Anteil in %	[40,55; 43,92]	[39,81; 43,31]																		
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	19	10																			
	Anteil in %	0,58	0,33																			
	CI Anteil in %	[0,32; 0,83]	[0,12; 0,53]																			
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	227	164																			
	Anteil in %	6,89	5,37																			
	CI Anteil in %	[6,02; 7,75]	[4,57; 6,17]																			
Patienten insgesamt	Anzahl	4123	3969																			

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2012-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3755																		
	auswertbar	Anzahl	3752																		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1790																		
		Anteil in %	47,71																		
		CI Anteil in %	[46,11; 49,31]																		
	Kategorie 1 " <i>normal ohne</i> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	122																		
		Anteil in %	3,25																		
		CI Anteil in %	[2,68; 3,82]																		
	Kategorie 2 " <i>normal mit</i> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1668																		
		Anteil in %	44,46																		
		CI Anteil in %	[42,87; 46,05]																		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1962																		
		Anteil in %	52,29																		
		CI Anteil in %	[50,69; 53,89]																		
	Kategorie 3 " <i>mäßig erhöht ohne</i> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	113																		
		Anteil in %	3,01																		
		CI Anteil in %	[2,46; 3,56]																		
	Kategorie 4 " <i>mäßig erhöht mit</i> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1536																		
		Anteil in %	40,94																		
		CI Anteil in %	[39,36; 42,51]																		
Kategorie 5 " <i>deutlich erhöht</i> <i>ohne</i> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	20																			
	Anteil in %	0,53																			
	CI Anteil in %	[0,30; 0,77]																			
Kategorie 6 " <i>deutlich erhöht mit</i> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	293																			
	Anteil in %	7,81																			
	CI Anteil in %	[6,95; 8,67]																			
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4675</i>																		

In Tabelle A.3.1.5 wird die Entwicklung des **mittleren systolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

In der Kohorte 2003-1 lagen im Beitrittsjahr für 9602 Patienten im Hypertoniker-Kollektiv auswertbare Angaben zum systolischen Blutdruck vor. Der arithmetische Mittelwert lag bei 141,22 mmHg, der Median bei 140,00 mmHg der dafür auswertbaren Patienten. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für 2634 der dann noch eingeschriebenen Patienten auswertbare Angaben vor. Der Mittelwert lag bei 135,41 und der Median bei 135,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle A.3.1.5 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2003-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9602	8835	8069	7404	6780	6342	5917	5092	4754	4383	4206	3953	3752	3580	3370	3162	2993	2848	2704	
	auswertbar	Anzahl	9602	7119	7536	7222	6611	6217	5706	4914	4617	4311	4028	3795	3645	3466	3252	3083	2940	2791	2634	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		141,22	139,28	138,33	138,43	138,13	137,04	137,30	136,53	135,98	135,97	135,82	135,84	136,30	136,01	136,57	136,14	135,77	134,91	135,41
		CI Mean		[140,91; 141,52]	[138,93; 139,63]	[138,01; 138,66]	[138,10; 138,76]	[137,78; 138,49]	[136,68; 137,39]	[136,94; 137,67]	[136,14; 136,92]	[135,58; 136,39]	[135,54; 136,40]	[135,38; 136,26]	[135,37; 136,30]	[135,83; 136,76]	[135,53; 136,50]	[136,06; 137,08]	[135,62; 136,65]	[135,24; 136,30]	[134,39; 135,44]	[134,86; 135,95]
		Median		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	137,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11816</i>	<i>10849</i>	<i>9883</i>	<i>9067</i>	<i>8272</i>	<i>7705</i>	<i>7151</i>	<i>6132</i>	<i>5721</i>	<i>5287</i>	<i>5081</i>	<i>4776</i>	<i>4533</i>	<i>4332</i>	<i>4084</i>	<i>3845</i>	<i>3644</i>	<i>3478</i>	<i>3312</i>		
2003-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8127	7090	6490	5868	5381	4964	4528	4175	3793	3650	3457	3282	3101	2952	2812	2684	2525	2403		
	auswertbar	Anzahl	8127	6346	6276	5725	5258	4785	4378	3960	3707	3480	3295	3131	3006	2863	2737	2592	2456	2341		
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		141,73	140,41	139,67	139,62	138,41	138,29	137,67	137,41	137,28	137,02	137,08	137,17	136,92	137,17	136,60	136,38	136,21	136,29	
		CI Mean		[141,40; 142,07]	[140,04; 140,78]	[139,31; 140,03]	[139,23; 140,01]	[138,01; 138,80]	[137,87; 138,70]	[137,24; 138,11]	[136,95; 137,86]	[136,81; 137,74]	[136,54; 137,50]	[136,57; 137,59]	[136,65; 137,68]	[136,38; 137,47]	[136,62; 137,72]	[136,04; 137,16]	[135,80; 136,97]	[135,63; 136,79]	[135,67; 136,91]	
		Median		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	137,00	135,00	138,00	137,00	136,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10121</i>	<i>8824</i>	<i>8032</i>	<i>7226</i>	<i>6602</i>	<i>6085</i>	<i>5543</i>	<i>5120</i>	<i>4661</i>	<i>4482</i>	<i>4247</i>	<i>4041</i>	<i>3826</i>	<i>3647</i>	<i>3474</i>	<i>3313</i>	<i>3131</i>	<i>2988</i>			
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3639	3265	2896	2641	2399	2154	1998	1824	1734	1630	1535	1452	1390	1309	1251	1194	1151			
	auswertbar	Anzahl	3639	3082	2771	2560	2316	2092	1905	1757	1622	1543	1467	1386	1318	1262	1195	1162	1109			
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		143,69	140,67	140,00	139,50	139,34	138,67	138,06	137,21	137,26	137,65	137,57	137,00	137,81	137,17	136,35	136,23	136,17		
		CI Mean		[143,16; 144,22]	[140,12; 141,21]	[139,43; 140,57]	[138,92; 140,08]	[138,71; 139,96]	[138,03; 139,32]	[137,39; 138,73]	[136,50; 137,95]	[136,57; 137,95]	[136,90; 138,40]	[136,77; 138,36]	[136,22; 137,77]	[137,00; 138,62]	[136,33; 138,00]	[135,48; 137,23]	[135,40; 137,07]	[135,27; 137,07]		
		Median		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	135,00	139,00	140,00	140,00	139,00	139,00	137,50	135,00	135,00	135,00	135,00	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4732</i>	<i>4221</i>	<i>3732</i>	<i>3386</i>	<i>3072</i>	<i>2768</i>	<i>2575</i>	<i>2363</i>	<i>2254</i>	<i>2108</i>	<i>1990</i>	<i>1890</i>	<i>1806</i>	<i>1704</i>	<i>1627</i>	<i>1554</i>	<i>1498</i>				
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2768	2540	2334	2140	1927	1811	1693	1631	1524	1459	1398	1331	1271	1210	1152	1104				
	auswertbar	Anzahl	2768	2394	2235	2061	1820	1698	1584	1474	1398	1331	1296	1222	1167	1110	1061	1010				
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		141,96	140,01	139,45	138,70	137,66	137,30	137,02	137,15	137,73	136,86	136,23	136,81	136,12	135,67	135,52	135,57			
		CI Mean		[141,37; 142,56]	[139,38; 140,64]	[138,84; 140,05]	[138,05; 139,36]	[136,97; 138,36]	[136,57; 138,04]	[136,28; 137,76]	[136,41; 137,88]	[136,95; 138,51]	[136,06; 137,66]	[135,39; 137,07]	[135,98; 137,64]	[135,27; 136,96]	[134,81; 136,53]	[134,68; 136,36]	[134,68; 136,46]			
		Median		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	136,00	135,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3573</i>	<i>3250</i>	<i>2972</i>	<i>2723</i>	<i>2456</i>	<i>2307</i>	<i>2154</i>	<i>2074</i>	<i>1938</i>	<i>1853</i>	<i>1772</i>	<i>1689</i>	<i>1609</i>	<i>1536</i>	<i>1462</i>	<i>1398</i>					
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4099	3845	3520	3151	2872	2683	2562	2412	2299	2173	2066	1962	1884	1802	1730					
	auswertbar	Anzahl	4099	3673	3334	3021	2762	2590	2415	2297	2205	2110	1996	1913	1823	1749	1680					
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		141,71	139,56	139,12	137,75	137,23	137,07	136,48	136,99	136,39	136,51	136,97	136,65	135,64	135,39	135,91				
		CI Mean		[141,22; 142,21]	[139,06; 140,06]	[138,60; 139,64]	[137,21; 138,29]	[136,68; 137,77]	[136,51; 137,63]	[135,90; 137,06]	[136,39; 137,59]	[135,78; 137,01]	[135,85; 137,17]	[136,30; 137,64]	[135,96; 137,33]	[134,98; 136,30]	[134,69; 136,09]	[135,19; 136,62]				
		Median		140,00	140,00	140,00	138,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	134,00	135,00				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5126</i>	<i>4778</i>	<i>4364</i>	<i>3907</i>	<i>3558</i>	<i>3309</i>	<i>3148</i>	<i>2963</i>	<i>2824</i>	<i>2661</i>	<i>2526</i>	<i>2397</i>	<i>2303</i>	<i>2205</i>	<i>2120</i>						
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5331	4939	4543	4177	3868	3674	3427	3260	3085	2924	2741	2596	2474	2358						
	auswertbar	Anzahl	5331	4725	4345	4017	3715	3455	3223	3100	2967	2800	2652	2509	2391	2286						
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		140,91	139,67	138,88	138,23	137,58	137,28	137,77	137,31	137,69	137,57	137,65	136,59	136,29	136,16					
		CI Mean		[140,47; 141,36]	[139,24; 140,11]	[138,43; 139,34]	[137,77; 138,70]	[137,10; 138,06]	[136,79; 137,77]	[137,24; 138,30]	[136,77; 137,85]	[137,15; 138,23]	[136,99; 138,15]	[137,06; 138,24]	[136,02; 137,16]	[135,70; 136,89]	[135,56; 136,77]					
		Median		140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	138,00	139,00	137,00	138,00	136,00	136,00	135,00	135,00	135,00					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6730</i>	<i>6209</i>	<i>5669</i>	<i>5188</i>	<i>4785</i>	<i>4530</i>	<i>4217</i>	<i>3994</i>	<i>3779</i>	<i>3583</i>	<i>3359</i>	<i>3189</i>	<i>3038</i>	<i>2890</i>							
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6057	5703	5247	4886	4680	4364	4151	3929	3735	3524	3352	3172	3061							
	auswertbar	Anzahl	6057	5506	5070	4767	4423	4152	4005	3819	3599	3432	3264	3094	2992							
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		140,97	138,74	138,40	138,00	137,50	137,55	137,70	137,56	137,78	137,69	137,07	136,77	136,33						
		CI Mean		[140,57; 141,37]	[138,33; 139,15]	[137,97; 138,82]	[137,56; 138,43]	[137,06; 137,94]	[137,10; 138,00]	[137,24; 138,16]	[137,08; 138,05]	[137,27; 138,29]	[137,17; 138,21]	[136,55; 137,58]	[136,24; 137,30]	[135,80; 136,86]						
		Median		140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	139,00	140,00	140,00	138,00	138,00	135,00	135,00	135,00						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7701</i>	<i>7230</i>	<i>6624</i>	<i>6126</i>	<i>5851</i>	<i>5453</i>	<i>5178</i>	<i>4900</i>	<i>4649</i>	<i>4384</i>	<i>4171</i>	<i>3943</i>	<i>3796</i>								

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8107	7764	7184	6738	6193	5876	5529	5258	4953	4706	4459	4232									
	auswertbar	Anzahl	8107	7361	6815	6284	5811	5565	5302	5014	4776	4516	4316	4074									
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		139,45	138,55	138,45	137,66	137,83	138,05	137,75	137,97	137,21	136,62	136,72	136,05								
		CI Mean		[139,12; 139,78]	[138,22; 138,89]	[138,10; 138,81]	[137,30; 138,01]	[137,45; 138,21]	[137,65; 138,45]	[137,34; 138,15]	[137,56; 138,38]	[136,80; 137,62]	[136,20; 137,04]	[136,29; 137,15]	[135,61; 136,49]								
		Median		140,00	140,00	140,00	140,00	139,00	140,00	140,00	140,00	135,00	135,00	135,00	135,00								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10039</i>	<i>9574</i>	<i>8808</i>	<i>8261</i>	<i>7597</i>	<i>7190</i>	<i>6749</i>	<i>6421</i>	<i>6044</i>	<i>5752</i>	<i>5457</i>	<i>5188</i>										
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	10644	10204	9639	8828	8336	7853	7425	6967	6616	6278	6010										
	auswertbar	Anzahl	10644	9723	8968	8252	7890	7535	7130	6689	6364	6090	5807										
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		140,77	138,57	138,01	137,82	137,77	137,36	137,72	137,30	136,37	136,15	136,17									
		CI Mean		[140,47; 141,07]	[138,27; 138,86]	[137,70; 138,31]	[137,50; 138,14]	[137,44; 138,11]	[137,03; 137,70]	[137,38; 138,07]	[136,95; 137,65]	[136,01; 136,73]	[135,79; 136,51]	[135,79; 136,55]									
		Median		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	139,00	140,00	136,00	135,00	135,00	135,00									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13038</i>	<i>12428</i>	<i>11713</i>	<i>10706</i>	<i>10073</i>	<i>9485</i>	<i>8960</i>	<i>8421</i>	<i>7998</i>	<i>7586</i>	<i>7253</i>											
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6186	6003	5580	5206	4841	4555	4311	4077	3859	3685											
	auswertbar	Anzahl	6186	5650	5115	4841	4593	4361	4138	3918	3731	3546											
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		140,05	138,10	137,52	137,91	137,36	137,72	137,26	136,67	136,47	136,64										
		CI Mean		[139,65; 140,45]	[137,71; 138,50]	[137,10; 137,94]	[137,48; 138,34]	[136,93; 137,79]	[137,26; 138,17]	[136,81; 137,72]	[136,20; 137,13]	[135,99; 136,95]	[136,15; 137,14]										
		Median		140,00	140,00	135,00	138,00	136,00	137,00	135,00	135,00	135,00	135,00										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7565</i>	<i>7309</i>	<i>6753</i>	<i>6290</i>	<i>5830</i>	<i>5472</i>	<i>5173</i>	<i>4889</i>	<i>4618</i>	<i>4406</i>												
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5733	5543	5215	4840	4516	4251	4036	3836	3655												
	auswertbar	Anzahl	5733	5208	4893	4570	4323	4092	3869	3697	3529												
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		140,68	138,66	138,58	138,04	138,26	137,71	136,80	136,82	136,85											
		CI Mean		[140,25; 141,11]	[138,24; 139,08]	[138,14; 139,01]	[137,60; 138,49]	[137,79; 138,73]	[137,24; 138,18]	[136,33; 137,28]	[136,34; 137,31]	[136,35; 137,35]											
		Median		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	135,00	135,00	135,00										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7090</i>	<i>6842</i>	<i>6424</i>	<i>5924</i>	<i>5514</i>	<i>5191</i>	<i>4923</i>	<i>4677</i>	<i>4452</i>													
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4012	3904	3672	3421	3189	2998	2835	2679													
	auswertbar	Anzahl	4012	3720	3478	3249	3076	2881	2723	2580													
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		138,76	138,02	137,63	137,87	137,50	136,75	136,41	136,88												
		CI Mean		[138,25; 139,27]	[137,48; 138,55]	[137,10; 138,16]	[137,33; 138,42]	[136,93; 138,06]	[136,20; 137,31]	[135,83; 136,98]	[136,26; 137,50]												
		Median		140,00	140,00	139,00	140,00	136,50	135,00	135,00	135,00												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5123</i>	<i>4955</i>	<i>4617</i>	<i>4293</i>	<i>3992</i>	<i>3733</i>	<i>3522</i>	<i>3336</i>														
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3457	3346	3130	2914	2752	2590	2454														
	auswertbar	Anzahl	3457	3214	2974	2789	2640	2492	2385														
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		139,95	137,64	137,19	136,88	136,06	135,73	135,77													
		CI Mean		[139,39; 140,50]	[137,09; 138,18]	[136,63; 137,75]	[136,32; 137,45]	[135,48; 136,63]	[135,12; 136,34]	[135,16; 136,39]													
		Median		140,00	137,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4373</i>	<i>4217</i>	<i>3920</i>	<i>3632</i>	<i>3418</i>	<i>3201</i>	<i>3030</i>															
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3739	3589	3322	3086	2901	2732															
	auswertbar	Anzahl	3739	3426	3175	2974	2803	2655															
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		138,67	137,89	136,89	136,30	135,83	135,94														
		CI Mean		[138,14; 139,20]	[137,36; 138,42]	[136,36; 137,42]	[135,78; 136,83]	[135,29; 136,37]	[135,39; 136,49]														
		Median		140,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4773</i>	<i>4564</i>	<i>4188</i>	<i>3889</i>	<i>3662</i>	<i>3449</i>																
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4214	4080	3810	3541	3342																
	auswertbar	Anzahl	4214	3945	3618	3410	3230																
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean		139,64	137,11	136,58	136,27	136,25															
		CI Mean		[139,14; 140,15]	[136,64; 137,58]	[136,08; 137,07]	[135,76; 136,78]	[135,73; 136,77]															
		Median		140,00	135,00	135,00	135,00	135,00															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5317</i>	<i>5128</i>	<i>4757</i>	<i>4411</i>	<i>4135</i>																	

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4191	4020	3761	3497															
	auswertbar	Anzahl	4191	3859	3564	3353															
		Mean	138,07	136,29	136,31	136,28															
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[137,59; 138,55]	[135,81; 136,77]	[135,82; 136,80]	[135,76; 136,80]															
		Median	140,00	135,00	135,00	135,00															
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5301</i>	<i>5077</i>	<i>4716</i>	<i>4374</i>															
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3939	3804	3544																
	auswertbar	Anzahl	3939	3666	3355																
		Mean	138,77	136,85	136,06																
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[138,25; 139,28]	[136,35; 137,36]	[135,55; 136,57]																
		Median	140,00	135,00	135,00																
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4961</i>	<i>4773</i>	<i>4409</i>																
2011-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3298	3187																	
	auswertbar	Anzahl	3298	3057																	
		Mean	138,12	137,02																	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[137,57; 138,66]	[136,47; 137,58]																	
		Median	139,00	135,00																	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4123</i>	<i>3969</i>																	
2012-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3755																		
	auswertbar	Anzahl	3755																		
		Mean	138,44																		
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[137,92; 138,96]																		
		Median	138,00																		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4675</i>																		

In Tabelle A.3.1.6 wird die Entwicklung des **mittleren diastolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

In der Kohorte 2003-1 lagen im Beitrittsjahr für 9602 Patienten im Hypertoniker-Kollektiv auswertbare Angaben zum diastolischen Blutdruck vor. Der arithmetische Mittelwert lag bei 81,32 mmHg, der Median bei 80,00 mmHg der dafür auswertbaren Patienten. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für 2634 der dann noch eingeschriebenen Patienten auswertbare Angaben vor. Der Mittelwert lag für diese Patienten bei 78,30 und der Median bei 80,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle A.3.1.6 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte ohne Endpunkte

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	9602	8835	8069	7404	6780	6342	5917	5092	4754	4383	4206	3953	3752	3580	3370	3162	2993	2848	2704
	auswertbar	Anzahl	9602	7119	7536	7222	6611	6217	5706	4914	4617	4311	4028	3795	3645	3466	3252	3083	2940	2791	2634
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,32	80,59	80,24	80,18	79,87	79,29	79,37	79,13	78,87	78,82	78,57	78,73	78,92	78,72	78,91	78,72	78,28	78,28	78,30
		CI Mean	[81,15; 81,50]	[80,40; 80,78]	[80,06; 80,42]	[80,00; 80,36]	[79,68; 80,07]	[79,10; 79,49]	[79,16; 79,57]	[78,90; 79,35]	[78,64; 79,10]	[78,57; 79,07]	[78,32; 78,82]	[78,48; 78,99]	[78,66; 79,18]	[78,44; 79,00]	[78,62; 79,21]	[78,42; 79,03]	[77,97; 78,59]	[77,97; 78,60]	[77,98; 78,63]
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>11816</i>	<i>10849</i>	<i>9883</i>	<i>9067</i>	<i>8272</i>	<i>7705</i>	<i>7151</i>	<i>6132</i>	<i>5721</i>	<i>5287</i>	<i>5081</i>	<i>4776</i>	<i>4533</i>	<i>4332</i>	<i>4084</i>	<i>3845</i>	<i>3644</i>	<i>3478</i>	<i>3312</i>	
2003-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8127	7090	6490	5868	5381	4964	4528	4175	3793	3650	3457	3282	3101	2952	2812	2684	2525	2403	
	auswertbar	Anzahl	8127	6346	6276	5725	5258	4785	4378	3960	3707	3480	3295	3131	3006	2863	2737	2592	2456	2341	
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,71	81,14	80,62	80,35	79,71	79,55	79,47	79,43	79,37	79,07	79,14	79,03	78,92	79,05	78,79	78,16	78,34	78,62	
		CI Mean	[81,52; 81,89]	[80,94; 81,34]	[80,42; 80,82]	[80,14; 80,56]	[79,49; 79,93]	[79,32; 79,78]	[79,23; 79,70]	[79,17; 79,68]	[79,10; 79,63]	[78,80; 79,34]	[78,86; 79,42]	[78,74; 79,32]	[78,62; 79,22]	[78,74; 79,36]	[78,48; 79,11]	[77,83; 78,49]	[78,00; 78,67]	[78,28; 78,97]	
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10121</i>	<i>8824</i>	<i>8032</i>	<i>7226</i>	<i>6602</i>	<i>6085</i>	<i>5543</i>	<i>5120</i>	<i>4661</i>	<i>4482</i>	<i>4247</i>	<i>4041</i>	<i>3826</i>	<i>3647</i>	<i>3474</i>	<i>3313</i>	<i>3131</i>	<i>2988</i>		
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3639	3265	2896	2641	2399	2154	1998	1824	1734	1630	1535	1452	1390	1309	1251	1194	1151		
	auswertbar	Anzahl	3639	3082	2771	2560	2316	2092	1905	1757	1622	1543	1467	1386	1318	1262	1195	1162	1109		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,33	80,96	80,62	80,10	79,93	79,86	79,57	79,38	79,06	78,93	79,22	79,30	79,20	78,82	78,71	78,30	78,46		
		CI Mean	[82,04; 82,62]	[80,66; 81,26]	[80,31; 80,93]	[79,79; 80,41]	[79,59; 80,27]	[79,51; 80,22]	[79,20; 79,94]	[79,00; 79,77]	[78,66; 79,45]	[78,52; 79,34]	[78,79; 79,65]	[78,86; 79,73]	[78,74; 79,66]	[78,37; 79,26]	[78,24; 79,18]	[77,84; 78,75]	[77,97; 78,94]		
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4732</i>	<i>4221</i>	<i>3732</i>	<i>3386</i>	<i>3072</i>	<i>2768</i>	<i>2575</i>	<i>2363</i>	<i>2254</i>	<i>2108</i>	<i>1990</i>	<i>1890</i>	<i>1806</i>	<i>1704</i>	<i>1627</i>	<i>1554</i>	<i>1498</i>			
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2768	2540	2334	2140	1927	1811	1693	1631	1524	1459	1398	1331	1271	1210	1152	1104			
	auswertbar	Anzahl	2768	2394	2235	2061	1820	1698	1584	1474	1398	1331	1296	1222	1167	1110	1061	1010			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	82,07	80,89	80,47	80,12	79,78	79,67	79,49	79,55	79,62	79,55	79,34	79,55	79,38	78,83	79,03	78,79			
		CI Mean	[81,75; 82,40]	[80,55; 81,24]	[80,12; 80,81]	[79,76; 80,49]	[79,40; 80,15]	[79,28; 80,06]	[79,08; 79,90]	[79,14; 79,96]	[79,19; 80,05]	[79,10; 80,01]	[78,90; 79,78]	[79,09; 80,01]	[78,88; 79,87]	[78,32; 79,33]	[78,57; 79,49]	[78,28; 79,30]			
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3573</i>	<i>3250</i>	<i>2972</i>	<i>2723</i>	<i>2456</i>	<i>2307</i>	<i>2154</i>	<i>2074</i>	<i>1938</i>	<i>1853</i>	<i>1772</i>	<i>1689</i>	<i>1609</i>	<i>1536</i>	<i>1462</i>	<i>1398</i>				
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4099	3845	3520	3151	2872	2683	2562	2412	2299	2173	2066	1962	1884	1802	1730				
	auswertbar	Anzahl	4099	3673	3334	3021	2762	2590	2415	2297	2205	2110	1996	1913	1823	1749	1680				
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,87	80,48	80,42	79,82	79,65	79,75	79,42	79,48	79,48	79,37	79,25	79,25	78,64	78,87	78,89				
		CI Mean	[81,59; 82,14]	[80,20; 80,75]	[80,14; 80,71]	[79,51; 80,12]	[79,33; 79,97]	[79,42; 80,08]	[79,08; 79,75]	[79,14; 79,82]	[79,12; 79,85]	[79,01; 79,73]	[78,86; 79,64]	[78,89; 79,61]	[78,24; 79,03]	[78,47; 79,27]	[78,49; 79,30]				
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5126</i>	<i>4778</i>	<i>4364</i>	<i>3907</i>	<i>3558</i>	<i>3309</i>	<i>3148</i>	<i>2963</i>	<i>2824</i>	<i>2661</i>	<i>2526</i>	<i>2397</i>	<i>2303</i>	<i>2205</i>	<i>2120</i>					
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5331	4939	4543	4177	3868	3674	3427	3260	3085	2924	2741	2596	2474	2358					
	auswertbar	Anzahl	5331	4725	4345	4017	3715	3455	3223	3100	2967	2800	2652	2509	2391	2286					
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,02	80,45	80,17	80,16	79,95	79,79	79,60	79,57	79,57	79,34	79,42	78,86	79,08	78,82					
		CI Mean	[80,79; 81,25]	[80,21; 80,68]	[79,92; 80,41]	[79,90; 80,42]	[79,68; 80,22]	[79,52; 80,06]	[79,31; 79,89]	[79,28; 79,86]	[79,27; 79,88]	[79,02; 79,66]	[79,09; 79,75]	[78,53; 79,19]	[78,73; 79,42]	[78,47; 79,17]					
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>6730</i>	<i>6209</i>	<i>5669</i>	<i>5188</i>	<i>4785</i>	<i>4530</i>	<i>4217</i>	<i>3994</i>	<i>3779</i>	<i>3583</i>	<i>3359</i>	<i>3189</i>	<i>3038</i>	<i>2890</i>						
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6057	5703	5247	4886	4680	4364	4151	3929	3735	3524	3352	3172	3061						
	auswertbar	Anzahl	6057	5506	5070	4767	4423	4152	4005	3819	3599	3432	3264	3094	2992						
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,43	80,31	80,23	79,81	79,82	79,61	79,53	79,53	79,27	79,29	79,16	79,30	78,77						
		CI Mean	[81,21; 81,65]	[80,09; 80,54]	[79,99; 80,47]	[79,57; 80,06]	[79,57; 80,07]	[79,35; 79,86]	[79,27; 79,79]	[79,26; 79,80]	[78,99; 79,56]	[79,00; 79,59]	[78,87; 79,45]	[79,00; 79,61]	[78,46; 79,08]						
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7701</i>	<i>7230</i>	<i>6624</i>	<i>6126</i>	<i>5851</i>	<i>5453</i>	<i>5178</i>	<i>4900</i>	<i>4649</i>	<i>4384</i>	<i>4171</i>	<i>3943</i>	<i>3796</i>							

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	8107	7764	7184	6738	6193	5876	5529	5258	4953	4706	4459	4232						
	auswertbar	Anzahl	8107	7361	6815	6284	5811	5565	5302	5014	4776	4516	4316	4074						
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,96	80,41	80,32	80,00	80,01	80,04	79,80	79,76	79,47	79,24	79,24	78,91						
		CI Mean	[80,78; 81,15]	[80,22; 80,59]	[80,13; 80,52]	[79,80; 80,20]	[79,81; 80,22]	[79,82; 80,27]	[79,57; 80,02]	[79,53; 79,99]	[79,24; 79,71]	[79,01; 79,48]	[79,00; 79,48]	[78,67; 79,16]						
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>10039</i>	<i>9574</i>	<i>8808</i>	<i>8261</i>	<i>7597</i>	<i>7190</i>	<i>6749</i>	<i>6421</i>	<i>6044</i>	<i>5752</i>	<i>5457</i>	<i>5188</i>							
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	10644	10204	9639	8828	8336	7853	7425	6967	6616	6278	6010							
	auswertbar	Anzahl	10644	9723	8968	8252	7890	7535	7130	6689	6364	6090	5807							
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,23	80,42	80,06	79,90	79,82	79,67	79,75	79,45	78,97	78,89	78,96							
		CI Mean	[81,06; 81,39]	[80,25; 80,59]	[79,89; 80,23]	[79,73; 80,08]	[79,63; 80,01]	[79,48; 79,86]	[79,56; 79,94]	[79,25; 79,65]	[78,77; 79,18]	[78,68; 79,09]	[78,74; 79,17]							
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>13038</i>	<i>12428</i>	<i>11713</i>	<i>10706</i>	<i>10073</i>	<i>9485</i>	<i>8960</i>	<i>8421</i>	<i>7998</i>	<i>7586</i>	<i>7253</i>								
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	6186	6003	5580	5206	4841	4555	4311	4077	3859	3685								
	auswertbar	Anzahl	6186	5650	5115	4841	4593	4361	4138	3918	3731	3546								
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,20	80,31	79,94	79,98	79,64	79,77	79,54	79,20	79,34	79,05								
		CI Mean	[80,97; 81,43]	[80,08; 80,53]	[79,71; 80,18]	[79,75; 80,22]	[79,39; 79,88]	[79,52; 80,02]	[79,28; 79,79]	[78,94; 79,45]	[79,08; 79,61]	[78,78; 79,32]								
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7565</i>	<i>7309</i>	<i>6753</i>	<i>6290</i>	<i>5830</i>	<i>5472</i>	<i>5173</i>	<i>4889</i>	<i>4618</i>	<i>4406</i>									
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	5733	5543	5215	4840	4516	4251	4036	3836	3655									
	auswertbar	Anzahl	5733	5208	4893	4570	4323	4092	3869	3697	3529									
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,44	80,45	80,47	80,27	79,94	79,77	79,39	79,39	79,27									
		CI Mean	[81,21; 81,68]	[80,22; 80,68]	[80,22; 80,71]	[80,01; 80,52]	[79,68; 80,20]	[79,51; 80,04]	[79,13; 79,66]	[79,11; 79,67]	[78,99; 79,54]									
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>7090</i>	<i>6842</i>	<i>6424</i>	<i>5924</i>	<i>5514</i>	<i>5191</i>	<i>4923</i>	<i>4677</i>	<i>4452</i>										
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4012	3904	3672	3421	3189	2998	2835	2679										
	auswertbar	Anzahl	4012	3720	3478	3249	3076	2881	2723	2580										
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,99	80,56	80,36	80,25	80,11	79,34	79,45	79,36										
		CI Mean	[80,71; 81,28]	[80,26; 80,86]	[80,07; 80,66]	[79,95; 80,56]	[79,79; 80,43]	[79,01; 79,66]	[79,12; 79,78]	[79,02; 79,70]										
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5123</i>	<i>4955</i>	<i>4617</i>	<i>4293</i>	<i>3992</i>	<i>3733</i>	<i>3522</i>	<i>3336</i>											
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3457	3346	3130	2914	2752	2590	2454											
	auswertbar	Anzahl	3457	3214	2974	2789	2640	2492	2385											
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,58	80,34	80,24	79,94	79,56	79,55	79,38											
		CI Mean	[81,28; 81,88]	[80,04; 80,64]	[79,93; 80,56]	[79,63; 80,26]	[79,23; 79,90]	[79,21; 79,88]	[79,04; 79,73]											
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4373</i>	<i>4217</i>	<i>3920</i>	<i>3632</i>	<i>3418</i>	<i>3201</i>	<i>3030</i>												
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3739	3589	3322	3086	2901	2732												
	auswertbar	Anzahl	3739	3426	3175	2974	2803	2655												
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,11	80,61	80,06	79,71	79,59	79,72												
		CI Mean	[80,82; 81,40]	[80,31; 80,91]	[79,76; 80,36]	[79,41; 80,02]	[79,27; 79,90]	[79,41; 80,03]												
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4773</i>	<i>4564</i>	<i>4188</i>	<i>3889</i>	<i>3662</i>	<i>3449</i>													
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4214	4080	3810	3541	3342													
	auswertbar	Anzahl	4214	3945	3618	3410	3230													
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,46	80,31	79,75	79,83	79,74													
		CI Mean	[81,18; 81,73]	[80,05; 80,58]	[79,47; 80,04]	[79,54; 80,12]	[79,44; 80,03]													
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5317</i>	<i>5128</i>	<i>4757</i>	<i>4411</i>	<i>4135</i>														

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr			
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	4191	4020	3761	3497																	
	auswertbar	Anzahl	4191	3859	3564	3353																	
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,67	80,05	79,93	79,62																	
		CI Mean	[80,39; 80,95]	[79,77; 80,33]	[79,64; 80,22]	[79,31; 79,92]																	
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00																	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>5301</i>	<i>5077</i>	<i>4716</i>	<i>4374</i>																	
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3939	3804	3544																		
	auswertbar	Anzahl	3939	3666	3355																		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,16	80,23	79,74																		
		CI Mean	[80,87; 81,45]	[79,94; 80,51]	[79,44; 80,03]																		
		Median	80,00	80,00	80,00																		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4961</i>	<i>4773</i>	<i>4409</i>																		
2011-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3298	3187																			
	auswertbar	Anzahl	3298	3057																			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,82	80,11																			
		CI Mean	[80,50; 81,13]	[79,80; 80,42]																			
		Median	80,00	80,00																			
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4123</i>	<i>3969</i>																			
2012-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3755																				
	auswertbar	Anzahl	3755																				
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,01																				
		CI Mean	[80,71; 81,31]																				
		Median	80,00																				
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4675</i>																				

A.3.2 Laborwerte

Neben der Einstellung des erhöhten Blutdrucks in den Normbereich ist bei Diabetikern die Einstellung bei erhöhten Blutzucker-/Glukosekonzentrationen entscheidend für den Therapieerfolg bzw. für das Verhindern von Folgeerkrankungen. Während die Messung des Blutzuckerwertes nur eine Momentaufnahme der aktuellen Stoffwechsellage liefert, kann durch Bestimmung des Anteils von glykolisiertem Hämoglobin (hier gemessen als: HbA1c) als Parameter der diabetischen Stoffwechselkontrolle im Sinne eines „Blutzuckergedächtnisses“ der mittlere Blutzuckerspiegel der vergangenen (4-12) Wochen beurteilt werden. So sind beispielsweise Diabetiker, deren Blutzuckerwerte durch eine intensivierete Insulintherapie dauerhaft gut eingestellt sind und die in der Folge HbA1c-Werte von unter 6,5% aufweisen, deutlich besser vor den Komplikationen und Folgeerkrankungen eines Diabetes mellitus geschützt als solche mit höheren HbA1c-Werten.

In Tabelle A.3.2.1 ist die Entwicklung der **HbA1c**-Konzentration ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnungen, die anschließend ausgewiesen werden. Für die Berechnung der durchschnittlichen Differenz zwischen HbA1c-Konzentration im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtshalbjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitrittsjahr 11816 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 11812 Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei ihnen betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich 6,95 %; der Median lag bei 6,70 %. Im letzten Berichtshalbjahr betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich 7,05 %; der Median lag bei 6,90 %, der dafür auswertbaren Patienten.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle A.3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte ohne Endpunkte

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	11816	10849	9883	9067	8272	7705	7151	6132	5721	5287	5081	4776	4533	4332	4084	3845	3644	3478	3312
	auswertbar	Anzahl	11812	8665	9193	8822	8039	7536	6883	5919	5559	5198	4864	4585	4404	4190	3941	3752	3581	3412	3228
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	6,95	6,70	6,83	6,76	6,90	6,87	6,94	6,83	6,91	6,86	6,95	6,90	7,01	7,03	7,08	6,99	7,04	6,95	7,05
		CI Mean	[6,93; 6,97]	[6,68; 6,72]	[6,81; 6,85]	[6,74; 6,79]	[6,87; 6,92]	[6,85; 6,90]	[6,91; 6,96]	[6,81; 6,86]	[6,88; 6,94]	[6,83; 6,89]	[6,92; 6,98]	[6,87; 6,93]	[6,98; 7,04]	[6,99; 7,06]	[7,04; 7,11]	[6,96; 7,03]	[7,00; 7,07]	[6,91; 6,98]	[7,01; 7,09]
		Median	6,70	6,50	6,60	6,60	6,70	6,70	6,70	6,60	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80	6,90	6,90	6,80	6,90	6,70	6,90
		Fallbasis mittlere Differenz		8664	9192	8821	8039	7536	6883	5919	5559	5198	4864	4585	4404	4190	3941	3752	3581	3412	3228
		Mittlere Differenz zur ED		-0,20	-0,07	-0,13	0,01	0,00	0,07	-0,01	0,07	0,04	0,13	0,09	0,20	0,22	0,28	0,20	0,25	0,16	0,26
		CI mittlere Differenz		[-0,23; -0,18]	[-0,10; -0,05]	[-0,15; -0,11]	[-0,01; 0,04]	[-0,02; 0,03]	[0,04; 0,09]	[-0,04; 0,01]	[0,04; 0,10]	[0,00; 0,07]	[0,09; 0,16]	[0,06; 0,12]	[0,17; 0,24]	[0,18; 0,26]	[0,24; 0,31]	[0,16; 0,24]	[0,21; 0,29]	[0,12; 0,20]	[0,22; 0,30]
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30	0,20	0,30		
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10121	8824	8032	7226	6602	6085	5543	5120	4661	4482	4247	4041	3826	3647	3474	3313	3131	2988	
	auswertbar	Anzahl	10114	7841	7762	7037	6449	5864	5362	4863	4551	4272	4046	3854	3705	3532	3385	3211	3050	2907	
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	6,94	6,84	6,77	6,87	6,86	6,92	6,85	6,92	6,87	6,92	6,87	6,99	6,99	7,07	6,97	7,05	6,97	7,08	
		CI Mean	[6,91; 6,97]	[6,81; 6,86]	[6,74; 6,79]	[6,84; 6,89]	[6,84; 6,89]	[6,89; 6,94]	[6,82; 6,88]	[6,88; 6,95]	[6,84; 6,90]	[6,88; 6,95]	[6,83; 6,90]	[6,95; 7,02]	[6,96; 7,03]	[7,03; 7,11]	[6,93; 7,01]	[7,01; 7,09]	[6,93; 7,01]	[7,04; 7,12]	
		Median	6,70	6,60	6,60	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,80	6,90	
		Fallbasis mittlere Differenz		7834	7756	7031	6444	5858	5356	4860	4547	4268	4043	3852	3704	3531	3384	3211	3050	2907	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,06	-0,11	-0,01	0,00	0,06	-0,01	0,06	0,03	0,08	0,03	0,15	0,15	0,25	0,14	0,23	0,15	0,26	
		CI mittlere Differenz		[-0,09; -0,04]	[-0,14; -0,09]	[-0,04; 0,02]	[-0,03; 0,03]	[0,03; 0,09]	[-0,04; 0,03]	[0,02; 0,09]	[0,00; 0,07]	[0,04; 0,12]	[-0,01; 0,07]	[0,10; 0,19]	[0,11; 0,19]	[0,20; 0,29]	[0,10; 0,19]	[0,19; 0,28]	[0,10; 0,20]	[0,21; 0,31]	
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30	0,20	0,30				
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4732	4221	3732	3386	3072	2768	2575	2363	2254	2108	1990	1890	1806	1704	1627	1554	1498		
	auswertbar	Anzahl	4719	3978	3566	3279	2967	2688	2455	2285	2107	1988	1897	1806	1717	1641	1557	1510	1443		
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,20	6,80	6,91	6,90	6,94	6,89	6,98	6,96	7,01	6,96	7,07	7,05	7,12	7,08	7,15	7,07	7,16		
		CI Mean	[7,16; 7,25]	[6,76; 6,83]	[6,87; 6,95]	[6,86; 6,93]	[6,90; 6,98]	[6,85; 6,93]	[6,94; 7,03]	[6,91; 7,01]	[6,96; 7,06]	[6,91; 7,01]	[7,02; 7,12]	[7,00; 7,11]	[7,06; 7,17]	[7,02; 7,14]	[7,09; 7,21]	[7,01; 7,13]	[7,10; 7,22]		
		Median	6,90	6,60	6,70	6,70	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00		
		Fallbasis mittlere Differenz		3968	3556	3270	2959	2680	2447	2277	2099	1980	1891	1800	1711	1635	1551	1504	1437		
		Mittlere Differenz zur ED		-0,39	-0,27	-0,27	-0,20	-0,25	-0,14	-0,16	-0,10	-0,14	-0,03	-0,04	0,03	-0,01	0,08	0,01	0,09		
		CI mittlere Differenz		[-0,43; -0,36]	[-0,31; -0,23]	[-0,31; -0,22]	[-0,25; -0,15]	[-0,30; -0,20]	[-0,19; -0,09]	[-0,21; -0,10]	[-0,16; -0,05]	[-0,20; -0,08]	[-0,09; 0,03]	[-0,10; 0,03]	[-0,04; 0,10]	[-0,08; 0,06]	[0,01; 0,16]	[-0,06; 0,08]	[0,01; 0,16]		
Median mittlere Differenz		-0,20	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,10	0,20				
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	3573	3250	2972	2723	2456	2307	2154	2074	1938	1853	1772	1689	1609	1536	1462	1398			
	auswertbar	Anzahl	3572	3070	2845	2617	2317	2158	2006	1869	1773	1685	1636	1542	1473	1399	1336	1274			
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,10	6,87	6,83	6,86	6,80	6,86	6,83	6,94	6,92	6,99	6,95	7,02	6,95	7,00	6,97	7,02			
		CI Mean	[7,05; 7,14]	[6,83; 6,91]	[6,79; 6,87]	[6,82; 6,90]	[6,75; 6,84]	[6,82; 6,91]	[6,79; 6,88]	[6,89; 6,99]	[6,86; 6,97]	[6,93; 7,04]	[6,89; 7,00]	[6,97; 7,08]	[6,89; 7,00]	[6,94; 7,06]	[6,91; 7,03]	[6,96; 7,08]			
		Median	6,70	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,70	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,70	6,80			
		Fallbasis mittlere Differenz		3069	2844	2616	2317	2158	2006	1869	1773	1685	1636	1542	1473	1399	1336	1274			
		Mittlere Differenz zur ED		-0,18	-0,21	-0,14	-0,19	-0,11	-0,14	-0,02	-0,03	0,05	0,02	0,11	0,04	0,10	0,06	0,13			
		CI mittlere Differenz		[-0,23; -0,14]	[-0,25; -0,16]	[-0,19; -0,09]	[-0,25; -0,14]	[-0,17; -0,06]	[-0,20; -0,08]	[-0,09; 0,04]	[-0,10; 0,03]	[-0,01; 0,12]	[-0,05; 0,08]	[0,05; 0,18]	[-0,03; 0,11]	[0,02; 0,17]	[-0,02; 0,14]	[0,06; 0,21]			
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,10	0,20	0,10	0,20					
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5126	4778	4364	3907	3558	3309	3148	2963	2824	2661	2526	2397	2303	2205	2120				
	auswertbar	Anzahl	5122	4551	4135	3744	3404	3190	2963	2814	2692	2578	2439	2336	2230	2140	2058				
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,26	6,87	6,94	6,86	6,89	6,86	6,94	6,90	7,01	6,99	7,07	6,97	7,08	7,00	7,07				
		CI Mean	[7,22; 7,31]	[6,84; 6,90]	[6,90; 6,97]	[6,83; 6,90]	[6,86; 6,93]	[6,82; 6,90]	[6,90; 6,98]	[6,86; 6,94]	[6,96; 7,05]	[6,95; 7,03]	[7,03; 7,12]	[6,93; 7,02]	[7,03; 7,13]	[6,96; 7,05]	[7,02; 7,12]				
		Median	6,90	6,60	6,70	6,60	6,70	6,70	6,70	6,70	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,80	6,90				
		Fallbasis mittlere Differenz		4548	4132	3742	3403	3189	2962	2814	2692	2578	2439	2336	2230	2140	2058				
		Mittlere Differenz zur ED		-0,36	-0,28	-0,33	-0,28	-0,31	-0,22	-0,24	-0,13	-0,15	-0,05	-0,13	-0,02	-0,09					
		CI mittlere Differenz		[-0,40; -0,33]	[-0,32; -0,24]	[-0,38; -0,29]	[-0,33; -0,24]	[-0,35; -0,26]	[-0,27; -0,17]	[-0,29; -0,18]	[-0,19; -0,08]	[-0,20; -0,09]	[-0,10; 0,01]	[-0,19; -0,08]	[-0,08; 0,04]	[-0,15; -0,03]	[-0,08; 0,04]				
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10							

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6730	6209	5669	5188	4785	4530	4217	3994	3779	3583	3359	3189	3038	2890					
	auswertbar	Anzahl	6725	5918	5427	4974	4577	4248	3951	3797	3629	3416	3243	3072	2937	2802					
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,16	6,99	6,92	6,97	6,94	7,03	6,98	7,09	7,09	7,16	7,07	7,15	7,09	7,19					
		CI Mean	[7,13; 7,19]	[6,96; 7,02]	[6,89; 6,95]	[6,94; 7,00]	[6,91; 6,97]	[7,00; 7,07]	[6,95; 7,02]	[7,05; 7,13]	[7,05; 7,13]	[7,12; 7,20]	[7,03; 7,12]	[7,11; 7,19]	[7,05; 7,13]	[7,15; 7,24]					
		Median	6,80	6,80	6,70	6,70	6,70	6,80	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	7,00					
		Fallbasis mittlere Differenz		5914	5423	4971	4575	4246	3949	3795	3627	3414	3241	3070	2935	2800					
		Mittlere Differenz zur ED		-0,15	-0,20	-0,15	-0,18	-0,08	-0,12	-0,02	0,00	0,05	-0,03	0,04	-0,01	0,09					
		CI mittlere Differenz		[-0,17; -0,12]	[-0,24; -0,17]	[-0,18; -0,11]	[-0,22; -0,14]	[-0,12; -0,04]	[-0,16; -0,08]	[-0,06; -0,02]	[-0,05; -0,04]	[0,01; 0,10]	[-0,08; 0,01]	[-0,01; 0,09]	[-0,06; 0,04]	[0,04; 0,14]					
Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20							
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7701	7230	6624	6126	5851	5453	5178	4900	4649	4384	4171	3943	3796						
	auswertbar	Anzahl	7691	6978	6378	5963	5522	5164	4983	4748	4475	4267	4051	3842	3708						
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,24	6,93	6,98	6,94	7,00	6,96	7,07	7,09	7,15	7,05	7,13	7,06	7,12						
		CI Mean	[7,21; 7,28]	[6,90; 6,96]	[6,95; 7,00]	[6,91; 6,97]	[6,97; 7,03]	[6,93; 6,99]	[7,04; 7,10]	[7,06; 7,12]	[7,11; 7,18]	[7,02; 7,09]	[7,09; 7,16]	[7,02; 7,09]	[7,09; 7,16]						
		Median	6,90	6,70	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	6,80	6,90						
		Fallbasis mittlere Differenz		6969	6369	5957	5514	5156	4976	4741	4468	4261	4047	3837	3703						
		Mittlere Differenz zur ED		-0,30	-0,24	-0,26	-0,20	-0,24	-0,11	-0,09	-0,02	-0,12	-0,04	-0,11	-0,04						
		CI mittlere Differenz		[-0,33; -0,27]	[-0,27; -0,21]	[-0,29; -0,23]	[-0,23; -0,16]	[-0,27; -0,20]	[-0,15; -0,08]	[-0,13; -0,05]	[-0,07; -0,02]	[-0,16; -0,08]	[-0,09; 0,00]	[-0,16; -0,07]	[-0,08; 0,01]						
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10							
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10039	9574	8808	8261	7597	7190	6749	6421	6044	5752	5457	5188							
	auswertbar	Anzahl	10031	9058	8365	7685	7108	6801	6481	6120	5825	5516	5280	4996							
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,07	6,97	6,92	6,97	6,94	7,05	7,05	7,12	7,04	7,13	7,07	7,14							
		CI Mean	[7,05; 7,10]	[6,95; 7,00]	[6,90; 6,95]	[6,94; 6,99]	[6,91; 6,97]	[7,02; 7,07]	[7,02; 7,08]	[7,09; 7,15]	[7,01; 7,07]	[7,10; 7,16]	[7,04; 7,10]	[7,11; 7,17]							
		Median	6,80	6,70	6,70	6,70	6,70	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90	6,80	6,90							
		Fallbasis mittlere Differenz		9051	8359	7680	7103	6797	6477	6116	5822	5513	5277	4993							
		Mittlere Differenz zur ED		-0,09	-0,12	-0,07	-0,10	0,01	0,02	0,11	0,02	0,13	0,07	0,14							
		CI mittlere Differenz		[-0,11; -0,07]	[-0,15; -0,10]	[-0,10; -0,05]	[-0,13; -0,07]	[-0,02; -0,04]	[-0,01; -0,05]	[0,07; 0,14]	[-0,01; -0,06]	[0,09; 0,16]	[0,04; 0,11]	[0,10; 0,18]							
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20									
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	13038	12428	11713	10706	10073	9485	8960	8421	7998	7586	7253								
	auswertbar	Anzahl	13030	11835	10839	9943	9478	9090	8606	8090	7698	7344	7012								
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,11	6,88	6,92	6,86	6,97	6,97	7,05	6,98	7,05	7,00	7,07								
		CI Mean	[7,09; 7,14]	[6,86; 6,91]	[6,90; 6,95]	[6,84; 6,89]	[6,95; 7,00]	[6,94; 6,99]	[7,03; 7,07]	[6,95; 7,00]	[7,03; 7,08]	[6,97; 7,02]	[7,04; 7,10]								
		Median	6,80	6,60	6,70	6,60	6,70	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80								
		Fallbasis mittlere Differenz		11828	10833	9939	9475	9087	8603	8087	7695	7341	7010								
		Mittlere Differenz zur ED		-0,21	-0,15	-0,20	-0,09	-0,09	0,00	-0,07	0,02	-0,03	0,04								
		CI mittlere Differenz		[-0,23; -0,19]	[-0,18; -0,13]	[-0,22; -0,18]	[-0,12; -0,07]	[-0,11; -0,06]	[-0,03; -0,03]	[-0,10; -0,04]	[-0,01; -0,04]	[-0,06; 0,00]	[0,01; 0,07]								
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10										
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	7565	7309	6753	6290	5830	5472	5173	4889	4618	4406									
	auswertbar	Anzahl	7560	6851	6147	5822	5523	5227	4962	4697	4463	4232									
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,08	6,90	6,84	6,93	6,95	7,01	6,94	7,01	6,95	7,03									
		CI Mean	[7,04; 7,11]	[6,88; 6,93]	[6,82; 6,87]	[6,90; 6,96]	[6,92; 6,98]	[6,98; 7,05]	[6,91; 6,97]	[6,98; 7,05]	[6,92; 6,99]	[7,00; 7,07]									
		Median	6,70	6,60	6,60	6,70	6,70	6,80	6,70	6,80	6,70	6,80									
		Fallbasis mittlere Differenz		6846	6143	5818	5520	5224	4959	4694	4460	4229									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,16	-0,21	-0,11	-0,09	-0,02	-0,09	-0,01	-0,06	0,02									
		CI mittlere Differenz		[-0,19; -0,13]	[-0,24; -0,17]	[-0,14; -0,08]	[-0,12; -0,05]	[-0,06; -0,01]	[-0,13; -0,05]	[-0,05; -0,03]	[-0,10; -0,02]	[-0,02; 0,06]									
Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10											
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7090	6842	6424	5924	5514	5191	4923	4677	4452										
	auswertbar	Anzahl	7082	6392	5984	5587	5269	4990	4723	4492	4294										
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,14	6,82	6,90	6,91	6,95	6,85	6,96	6,88	6,97										
		CI Mean	[7,10; 7,17]	[6,80; 6,85]	[6,87; 6,93]	[6,88; 6,94]	[6,92; 6,98]	[6,82; 6,88]	[6,93; 6,97]	[6,85; 6,91]	[6,94; 7,01]										
		Median	6,70	6,60	6,60	6,70	6,70	6,60	6,70	6,60	6,70										
		Fallbasis mittlere Differenz		6384	5976	5579	5262	4983	4717	4486	4289										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,31	-0,22	-0,19	-0,14	-0,23	-0,12	-0,18	-0,09										
		CI mittlere Differenz		[-0,34; -0,28]	[-0,25; -0,18]	[-0,22; -0,16]	[-0,17; -0,10]	[-0,27; -0,19]	[-0,15; -0,08]	[-0,22; -0,14]	[-0,13; -0,04]										
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5123	4955	4617	4293	3992	3733	3522	3336										
	auswertbar	Anzahl	5118	4673	4346	4057	3836	3576	3380	3208										
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,08	6,90	6,90	6,94	6,87	6,94	6,87	6,94										
		CI Mean	[7,04; 7,11]	[6,87; 6,94]	[6,86; 6,93]	[6,91; 6,98]	[6,83; 6,90]	[6,90; 6,97]	[6,83; 6,90]	[6,90; 6,98]										
		Median	6,70	6,60	6,60	6,70	6,60	6,70	6,60	6,70										
		Fallbasis mittlere Differenz		4669	4343	4054	3833	3573	3377	3205										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,15	-0,13	-0,08	-0,13	-0,05	-0,11	-0,02										
		CI mittlere Differenz		[-0,19; -0,12]	[-0,17; -0,10]	[-0,12; -0,04]	[-0,17; -0,09]	[-0,10; -0,01]	[-0,16; -0,06]	[-0,07; 0,02]										
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10										
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4373	4217	3920	3632	3418	3201	3030											
	auswertbar	Anzahl	4363	4044	3712	3470	3274	3075	2942											
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,19	6,81	6,87	6,77	6,87	6,79	6,88											
		CI Mean	[7,14; 7,23]	[6,77; 6,84]	[6,83; 6,90]	[6,73; 6,80]	[6,84; 6,91]	[6,75; 6,82]	[6,84; 6,92]											
		Median	6,70	6,60	6,60	6,50	6,60	6,50	6,60											
		Fallbasis mittlere Differenz		4036	3704	3468	3272	3074	2941											
		Mittlere Differenz zur ED		-0,38	-0,29	-0,37	-0,26	-0,35	-0,26											
		CI mittlere Differenz		[-0,42; -0,33]	[-0,34; -0,25]	[-0,42; -0,33]	[-0,31; -0,21]	[-0,40; -0,30]	[-0,31; -0,21]											
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	-0,10											
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	4773	4564	4188	3889	3662	3449												
	auswertbar	Anzahl	4767	4332	3993	3745	3523	3339												
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,13	6,85	6,78	6,84	6,77	6,86												
		CI Mean	[7,09; 7,17]	[6,82; 6,88]	[6,75; 6,82]	[6,81; 6,88]	[6,73; 6,80]	[6,82; 6,90]												
		Median	6,70	6,60	6,50	6,60	6,50	6,60												
		Fallbasis mittlere Differenz		4327	3989	3740	3518	3334												
		Mittlere Differenz zur ED		-0,25	-0,30	-0,24	-0,30	-0,21												
		CI mittlere Differenz		[-0,28; -0,21]	[-0,34; -0,26]	[-0,28; -0,19]	[-0,35; -0,26]	[-0,26; -0,17]												
		Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10												
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5317	5128	4757	4411	4135													
	auswertbar	Anzahl	5312	4945	4514	4216	3982													
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,20	6,78	6,81	6,76	6,83													
		CI Mean	[7,16; 7,24]	[6,75; 6,81]	[6,78; 6,84]	[6,73; 6,79]	[6,79; 6,86]													
		Median	6,70	6,50	6,60	6,50	6,60													
		Fallbasis mittlere Differenz		4941	4510	4212	3978													
		Mittlere Differenz zur ED		-0,41	-0,36	-0,39	-0,31													
		CI mittlere Differenz		[-0,44; -0,37]	[-0,40; -0,32]	[-0,43; -0,35]	[-0,35; -0,26]													
		Median mittlere Differenz		-0,20	-0,10	-0,20	-0,10													
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5301	5077	4716	4374														
	auswertbar	Anzahl	5295	4855	4462	4190														
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,08	6,84	6,75	6,82														
		CI Mean	[7,04; 7,12]	[6,81; 6,87]	[6,72; 6,78]	[6,78; 6,85]														
		Median	6,70	6,60	6,50	6,60														
		Fallbasis mittlere Differenz		4850	4457	4185														
		Mittlere Differenz zur ED		-0,22	-0,30	-0,22														
		CI mittlere Differenz		[-0,25; -0,19]	[-0,34; -0,26]	[-0,26; -0,18]														
		Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	-0,10														
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4961	4773	4409															
	auswertbar	Anzahl	4956	4570	4162															
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,14	6,74	6,78															
		CI Mean	[7,10; 7,18]	[6,71; 6,77]	[6,75; 6,81]															
		Median	6,70	6,50	6,50															
		Fallbasis mittlere Differenz		4566	4158															
		Mittlere Differenz zur ED		-0,38	-0,33															
		CI mittlere Differenz		[-0,42; -0,35]	[-0,37; -0,29]															
		Median mittlere Differenz		-0,20	-0,10															

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	4123	3969																				
	auswertbar	Anzahl	4119	3796																				
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,12	6,86																				
		CI Mean	[7,07; 7,16]	[6,83; 6,90]																				
		Median	6,70	6,60																				
		Fallbasis mittlere Differenz		3792																				
		Mittlere Differenz zur ED			-0,26																			
		CI mittlere Differenz			[-0,30; -0,22]																			
		Median mittlere Differenz			-0,10																			
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4675																					
	auswertbar	Anzahl	4667																					
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,14																					
		CI Mean	[7,10; 7,19]																					
		Median	6,70																					
		Fallbasis mittlere Differenz																						
		Mittlere Differenz zur ED																						
		CI mittlere Differenz																						
		Median mittlere Differenz																						

In Tabelle A.3.2.2 wird die Verteilung der Patienten auf die HbA1c-Kategorien dargestellt. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalb-jahr noch Programmteilnehmer waren. In der Zeile „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalb-jahr plausible Angaben zum HbA1c-Wert vorliegen. Anschließend wird für jedes Berichtshalb-jahr dargestellt, wie sich diese auswertbaren Patienten auf die HbA1c-Kategorien verteilen.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts-halb-jahr 11816 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 11812 Patienten lagen auswertbare Daten vor. 51,44 Prozent dieser Patienten lagen mit ihrem gemessenen HbA1c-Wert im „oberen Zielbereich“. Im letzten Berichtshalb-jahr wurden dieser Kategorie 58,49 Prozent, der dann noch eingeschriebenen und auswertbaren Patienten zugeordnet.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation keine Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle A.3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	11816	10849	9883	9067	8272	7705	7151	6132	5721	5287	5081	4776	4533	4332	4084	3845	3644	3478	3312
	auswertbar	Anzahl	11812	8665	9193	8822	8039	7536	6883	5919	5559	5198	4864	4585	4404	4190	3941	3752	3581	3412	3228
		Anzahl	2819	2612	2357	2406	1792	1647	1464	1362	1128	1140	910	903	723	655	608	658	571	661	501
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anteil in %	23,87	30,14	25,64	27,27	22,29	21,86	21,27	23,01	20,29	21,93	18,71	19,69	16,42	15,63	15,43	17,54	15,95	19,37	15,52
		CI Anteil in %	[23,10; 24,63]	[29,18; 31,11]	[24,75; 26,53]	[26,34; 28,20]	[21,38; 23,20]	[20,92; 22,79]	[20,30; 22,24]	[21,94; 24,08]	[19,23; 21,35]	[20,81; 23,06]	[17,61; 19,80]	[18,54; 20,85]	[15,32; 17,51]	[14,53; 16,73]	[14,30; 16,56]	[16,32; 18,75]	[14,75; 17,14]	[18,05; 20,70]	[14,27; 16,77]
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	6076	4476	4849	4731	4451	4294	3832	3329	3203	3013	2831	2710	2609	2506	2252	2193	2095	1958	1888
		Anteil in %	51,44	51,66	52,75	53,63	55,37	56,98	55,67	56,24	57,62	57,96	58,20	59,11	59,24	59,81	57,14	58,45	58,50	57,39	58,49
		CI Anteil in %	[50,54; 52,34]	[50,60; 52,71]	[51,73; 53,77]	[52,59; 54,67]	[54,28; 56,45]	[55,86; 58,10]	[54,50; 56,85]	[54,98; 57,51]	[56,32; 58,92]	[56,62; 59,31]	[56,82; 59,59]	[57,68; 60,53]	[57,79; 60,69]	[58,32; 61,29]	[55,60; 58,69]	[56,87; 60,03]	[56,89; 60,12]	[55,73; 59,05]	[56,79; 60,19]
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1701	1022	1294	1088	1141	1036	1012	831	777	657	728	649	684	676	722	575	585	522	541
		Anteil in %	14,40	11,79	14,08	12,33	14,19	13,75	14,70	14,04	13,98	12,64	14,97	14,15	15,53	16,13	18,32	15,33	16,34	15,30	16,76
		CI Anteil in %	[13,77; 15,03]	[11,12; 12,47]	[13,36; 14,79]	[11,65; 13,02]	[13,43; 14,96]	[12,97; 14,52]	[13,87; 15,54]	[13,15; 14,92]	[13,07; 14,89]	[11,74; 13,54]	[13,96; 15,97]	[13,15; 15,16]	[14,46; 16,60]	[15,02; 17,25]	[17,11; 19,53]	[14,17; 16,48]	[15,13; 17,55]	[14,09; 16,51]	[15,47; 18,05]
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	904	453	551	472	525	451	454	316	359	301	306	265	301	268	284	260	269	209	232
		Anteil in %	7,65	5,23	5,99	5,35	6,53	5,98	6,60	5,34	6,46	5,79	6,29	5,78	6,83	6,40	7,21	6,93	7,51	6,13	7,19
		CI Anteil in %	[7,17; 8,13]	[4,76; 5,70]	[5,51; 6,48]	[4,88; 5,82]	[5,99; 7,07]	[5,45; 6,52]	[6,01; 7,18]	[4,77; 5,91]	[5,81; 7,10]	[5,16; 6,43]	[5,61; 6,97]	[5,10; 6,46]	[6,09; 7,58]	[5,66; 7,14]	[6,40; 8,01]	[6,12; 7,74]	[6,65; 8,38]	[5,32; 6,93]	[6,30; 8,08]
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	312	102	142	125	130	108	121	81	92	87	89	58	87	85	75	66	61	62	66	
	Anteil in %	2,64	1,18	1,54	1,42	1,62	1,43	1,76	1,37	1,65	1,67	1,83	1,26	1,98	2,03	1,90	1,76	1,70	1,82	2,04	
	CI Anteil in %	[2,35; 2,93]	[0,95; 1,40]	[1,29; 1,80]	[1,17; 1,66]	[1,34; 1,89]	[1,16; 1,70]	[1,45; 2,07]	[1,07; 1,66]	[1,32; 1,99]	[1,32; 2,02]	[1,45; 2,21]	[0,94; 1,59]	[1,56; 2,39]	[1,60; 2,46]	[1,48; 2,33]	[1,34; 2,18]	[1,28; 2,13]	[1,37; 2,27]	[1,56; 2,53]	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10121	8824	8032	7226	6602	6085	5543	5120	4661	4482	4247	4041	3826	3647	3474	3313	3131	2988	
	auswertbar	Anzahl	10114	7841	7762	7037	6449	5864	5362	4863	4551	4272	4046	3854	3705	3532	3385	3211	3050	2907	
		Anzahl	2418	2031	2087	1645	1414	1251	1200	997	963	853	842	708	612	532	612	500	518	458	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anteil in %	23,91	25,90	26,89	23,38	21,93	21,33	22,38	20,50	21,16	19,97	20,81	18,37	16,52	15,06	18,08	15,57	16,98	15,76	
		CI Anteil in %	[23,08; 24,74]	[24,93; 26,87]	[25,90; 27,87]	[22,39; 24,37]	[20,92; 22,94]	[20,28; 22,38]	[21,26; 23,50]	[19,37; 21,64]	[19,97; 22,35]	[18,77; 21,17]	[19,56; 22,06]	[17,15; 19,59]	[15,32; 17,71]	[13,88; 16,24]	[16,78; 19,38]	[14,32; 16,83]	[15,65; 18,32]	[14,43; 17,08]	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	5267	4120	4142	3869	3689	3282	3076	2772	2618	2469	2374	2200	2188	2056	1979	1882	1792	1657	
		Anteil in %	52,08	52,54	53,36	54,98	57,20	55,97	57,37	57,00	57,53	57,79	58,68	57,08	59,06	58,21	58,46	58,61	58,75	57,00	
		CI Anteil in %	[51,10; 53,05]	[51,44; 53,65]	[52,25; 54,47]	[53,82; 56,14]	[55,99; 58,41]	[54,70; 57,24]	[56,04; 58,69]	[55,61; 58,39]	[56,09; 58,96]	[56,31; 59,28]	[57,16; 60,19]	[55,52; 58,65]	[57,47; 60,64]	[56,58; 59,84]	[56,80; 60,12]	[56,91; 60,31]	[57,01; 60,50]	[55,20; 58,80]	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1411	1055	1037	985	878	861	701	697	653	631	542	597	589	595	514	526	507	488	
		Anteil in %	13,95	13,45	13,36	14,00	13,61	14,68	13,07	14,33	14,35	14,77	13,40	15,49	15,90	16,85	15,18	16,38	16,02	16,79	
		CI Anteil in %	[13,28; 14,63]	[12,70; 14,21]	[12,60; 14,12]	[13,19; 14,81]	[12,78; 14,45]	[13,78; 15,59]	[12,17; 13,98]	[13,35; 15,32]	[13,33; 15,37]	[13,71; 15,83]	[12,35; 14,45]	[14,35; 16,63]	[14,72; 17,08]	[15,61; 18,08]	[13,98; 16,39]	[15,10; 17,66]	[15,30; 17,94]	[15,43; 18,15]	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	705	501	395	417	371	366	312	310	250	256	232	279	254	274	236	233	182	238	
		Anteil in %	6,97	6,39	5,09	5,93	5,75	6,24	5,82	6,37	5,49	5,99	5,73	7,24	6,86	7,76	6,97	7,26	5,97	8,19	
		CI Anteil in %	[6,47; 7,47]	[5,85; 6,93]	[4,60; 5,58]	[5,37; 6,48]	[5,18; 6,32]	[5,62; 6,86]	[5,19; 6,45]	[5,69; 7,06]	[4,83; 6,16]	[5,28; 6,70]	[5,02; 6,45]	[6,42; 8,06]	[6,04; 7,67]	[6,88; 8,64]	[6,11; 7,83]	[6,36; 8,15]	[5,13; 6,81]	[7,19; 9,18]	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	313	134	101	121	97	104	73	87	67	63	56	70	62	75	44	70	51	66		
	Anteil in %	3,09	1,71	1,30	1,72	1,50	1,77	1,36	1,79	1,47	1,47	1,38	1,82	1,67	2,12	1,30	2,18	1,67	2,27		
	CI Anteil in %	[2,76; 3,43]	[1,42; 2,00]	[1,05; 1,55]	[1,42; 2,02]	[1,21; 1,80]	[1,44; 2,11]	[1,05; 1,67]	[1,42; 2,16]	[1,12; 1,82]	[1,11; 1,84]	[1,02; 1,74]	[1,39; 2,24]	[1,26; 2,09]	[1,65; 2,60]	[0,92; 1,68]	[1,67; 2,69]	[1,22; 2,13]	[1,73; 2,81]		

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4732	4221	3732	3386	3072	2768	2575	2363	2254	2108	1990	1890	1806	1704	1627	1554	1498	
	auswertbar	Anzahl	4719	3978	3566	3279	2967	2688	2455	2285	2107	1988	1897	1806	1717	1641	1557	1510	1443	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	959	1041	807	716	636	599	472	465	367	368	335	288	236	252	206	234	213	
		Anteil in %	20,32	26,17	22,63	21,84	21,44	22,28	19,23	20,35	17,42	18,51	17,66	15,95	13,74	15,36	13,23	15,50	14,76	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[19,17; 21,47]	[24,80; 27,54]	[21,26; 24,00]	[20,42; 23,25]	[19,96; 22,91]	[20,71; 23,86]	[17,67; 20,79]	[18,70; 22,00]	[15,80; 19,04]	[16,80; 20,22]	[15,94; 19,38]	[14,26; 17,64]	[12,12; 15,37]	[13,61; 17,10]	[11,55; 14,91]	[13,67; 17,32]	[12,93; 16,59]	
		Anzahl	2251	2112	1936	1845	1610	1475	1363	1291	1200	1156	1067	1060	1015	981	922	885	817	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	47,70	53,09	54,29	56,27	54,26	54,87	55,52	56,50	56,95	58,15	56,25	58,69	59,11	59,78	59,22	58,61	56,62	
		CI Anteil in %	[46,28; 49,13]	[51,54; 54,64]	[52,66; 55,93]	[54,57; 57,97]	[52,47; 56,06]	[52,99; 56,76]	[53,55; 57,49]	[54,47; 58,53]	[54,84; 59,07]	[55,98; 60,32]	[54,01; 58,48]	[56,42; 60,96]	[56,79; 61,44]	[57,41; 62,15]	[56,77; 61,66]	[56,12; 61,09]	[54,06; 59,18]	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	778	524	503	442	457	402	392	337	350	294	291	301	289	247	264	236	253	
		Anteil in %	16,49	13,17	14,11	13,48	15,40	14,96	15,97	14,75	16,61	14,79	15,34	16,67	16,83	15,05	16,96	15,63	17,53	
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[15,43; 17,55]	[12,12; 14,22]	[12,96; 15,25]	[12,31; 14,65]	[14,10; 16,70]	[13,61; 16,30]	[14,52; 17,42]	[13,29; 16,20]	[15,02; 18,20]	[13,23; 16,35]	[13,72; 16,96]	[14,95; 18,39]	[15,06; 18,60]	[13,32; 16,78]	[15,09; 18,82]	[13,80; 17,46]	[15,57; 19,50]	
		Anzahl	502	248	257	229	202	168	169	134	152	133	152	115	137	116	124	118	123	
		Anteil in %	10,64	6,23	7,21	6,98	6,81	6,25	6,88	5,86	7,21	6,69	8,01	6,37	7,98	7,07	7,96	7,81	8,52	
		CI Anteil in %	[9,76; 11,52]	[5,48; 6,99]	[6,36; 8,06]	[6,11; 7,86]	[5,90; 7,71]	[5,33; 7,17]	[5,88; 7,89]	[4,90; 6,83]	[6,11; 8,32]	[5,59; 7,79]	[6,79; 9,23]	[5,24; 7,49]	[6,70; 9,26]	[5,83; 8,31]	[6,62; 9,31]	[6,46; 9,17]	[7,08; 9,97]	
	Anzahl	229	53	63	47	62	44	59	58	38	37	52	42	40	45	41	37	37		
	Anteil in %	4,85	1,33	1,77	1,43	2,09	1,64	2,40	2,54	1,80	1,86	2,74	2,33	2,33	2,74	2,63	2,45	2,56		
	CI Anteil in %	[4,24; 5,47]	[0,98; 1,69]	[1,33; 2,20]	[1,03; 1,84]	[1,57; 2,60]	[1,16; 2,12]	[1,80; 3,01]	[1,89; 3,18]	[1,24; 2,37]	[1,27; 2,46]	[2,01; 3,48]	[1,63; 3,02]	[1,62; 3,04]	[1,95; 3,53]	[1,84; 3,43]	[1,67; 3,23]	[1,75; 3,38]		
	Anzahl	3573	3250	2972	2723	2456	2307	2154	2074	1938	1853	1772	1689	1609	1536	1462	1398			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	3573	3250	2972	2723	2456	2307	2154	2074	1938	1853	1772	1689	1609	1536	1462	1398		
	auswertbar	Anzahl	3572	3070	2845	2617	2317	2158	2006	1869	1773	1685	1636	1542	1473	1399	1336	1274		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	758	719	691	616	571	459	426	374	378	305	275	225	261	223	212	195		
		Anteil in %	21,22	23,42	24,29	23,54	24,64	21,27	21,24	20,01	21,32	18,10	16,81	14,59	17,72	15,94	15,87	15,31		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[19,88; 22,56]	[21,92; 24,92]	[22,71; 25,86]	[21,91; 25,16]	[22,89; 26,40]	[19,54; 23,00]	[19,45; 23,03]	[18,20; 21,83]	[19,41; 23,23]	[16,26; 19,94]	[15,00; 18,62]	[12,83; 16,35]	[15,77; 19,67]	[14,02; 17,86]	[13,91; 17,83]	[13,33; 17,28]		
		Anzahl	1836	1671	1572	1437	1306	1257	1189	1065	1015	976	1010	927	870	839	840	773		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	51,40	54,43	55,25	54,91	56,37	58,25	59,27	56,98	57,25	57,92	61,74	60,12	59,06	59,97	62,87	60,68		
		CI Anteil in %	[49,76; 53,04]	[52,67; 56,19]	[53,43; 57,08]	[53,00; 56,82]	[54,35; 58,39]	[56,17; 60,33]	[57,12; 61,42]	[54,74; 59,23]	[54,94; 59,55]	[55,56; 60,28]	[59,38; 64,09]	[57,67; 62,56]	[56,55; 61,58]	[57,40; 62,54]	[60,28; 65,47]	[57,99; 63,36]		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	509	425	367	353	287	276	253	261	228	256	228	258	234	231	173	181		
		Anteil in %	14,25	13,84	12,90	13,49	12,39	12,79	12,61	13,96	12,86	15,19	13,94	16,73	15,89	16,51	12,95	14,21		
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[13,10; 15,40]	[12,62; 15,07]	[11,67; 14,13]	[12,18; 14,80]	[11,05; 13,73]	[11,38; 14,20]	[11,16; 14,07]	[12,39; 15,54]	[11,30; 14,42]	[13,48; 16,91]	[12,26; 15,62]	[14,87; 18,60]	[14,02; 17,75]	[14,57; 18,46]	[11,15; 14,75]	[12,29; 16,13]		
		Anzahl	298	198	168	162	113	129	102	133	117	113	94	111	83	71	78	100		
		Anteil in %	8,34	6,45	5,91	6,19	4,88	5,98	5,08	7,12	6,60	6,71	5,75	7,20	5,63	5,08	5,84	7,85		
		CI Anteil in %	[7,44; 9,25]	[5,58; 7,32]	[5,04; 6,77]	[5,27; 7,11]	[4,00; 5,75]	[4,98; 6,98]	[4,12; 6,05]	[5,95; 8,28]	[5,44; 7,75]	[5,51; 7,90]	[4,62; 6,87]	[5,91; 8,49]	[4,46; 6,81]	[3,92; 6,23]	[4,58; 7,10]	[6,37; 9,33]		
	Anzahl	171	57	47	49	40	37	36	36	35	35	29	21	25	35	33	25			
	Anteil in %	4,79	1,86	1,65	1,87	1,73	1,71	1,79	1,93	1,97	2,08	1,77	1,36	1,70	2,50	2,47	1,96			
	CI Anteil in %	[4,09; 5,49]	[1,38; 2,33]	[1,18; 2,12]	[1,35; 2,39]	[1,20; 2,26]	[1,17; 2,26]	[1,21; 2,38]	[1,30; 2,55]	[1,33; 2,62]	[1,40; 2,76]	[1,13; 2,41]	[0,78; 1,94]	[1,04; 2,36]	[1,68; 3,32]	[1,64; 3,30]	[1,20; 2,72]			
	Anzahl	5126	4778	4364	3907	3558	3309	3148	2963	2824	2661	2526	2397	2303	2205	2120				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5126	4778	4364	3907	3558	3309	3148	2963	2824	2661	2526	2397	2303	2205	2120			
	auswertbar	Anzahl	5122	4551	4135	3744	3404	3190	2963	2814	2692	2578	2439	2336	2230	2140	2058			
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	912	1016	865	851	704	686	583	578	490	450	366	428	364	379	340			
		Anteil in %	17,81	22,32	20,92	22,73	20,68	21,50	19,68	20,54	18,20	17,46	15,01	18,32	16,32	17,71	16,52			
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[16,76; 18,85]	[21,11; 23,53]	[19,68; 22,16]	[21,39; 24,07]	[19,32; 22,04]	[20,08; 22,93]	[18,24; 21,11]	[19,05; 22,03]	[16,74; 19,66]	[15,99; 18,92]	[13,59; 16,42]	[16,75; 19,89]	[14,79; 17,86]	[16,09; 19,33]	[14,92; 18,13]			
		Anzahl	2614	2591	2321	2101	1960	1848	1706	1635	1546	1524	1444	1362	1279	1226	1166			
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	51,03	56,93	56,13	56,12	57,58	57,93	57,58	58,10	57,43	59,12	59,20	58,30	57,35	57,29	56,66			
		CI Anteil in %	[49,67; 52,40]	[55,49; 58,37]	[54,62; 57,64]	[54,53; 57,71]	[55,92; 59,24]	[56,22; 59,64]	[55,80; 59,36]	[56,28; 59,93]	[55,56; 59,30]	[57,22; 61,01]	[57,25; 61,16]	[56,30; 60,30]	[55,30; 59,41]	[55,19; 59,39]	[54,52; 58,80]			
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	789	576	581	512	480	414	424	386	404	387	386	361	369	350	336			
		Anteil in %	15,40	12,66	14,05	13,68	14,10	12,98	14,31	13,72	15,01	15,01	15,83	15,45	16,55	16,36	16,33			
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[14,42; 16,39]	[11,69; 13,62]	[12,99; 15,11]	[12,57; 14,78]	[12,93; 15,27]	[11,81; 14,14]	[13,05; 15,57]	[12,45; 14,99]	[13,66; 16,36]	[13,63; 16,39]	[14,38; 17,27]	[13,99; 16,92]	[15,00; 18,09]	[14,79; 17,92]	[14,73; 17,92]			
		Anzahl	472	281	276	205	193	183	188	163	192	162	196	146	163	144	170			
		Anteil in %	9,22	6,17	6,67	5,48	5,67	5,74	6,34	5,79	7,13	6,28	8,04	6,25	7,31	6,73	8,26			
		CI Anteil in %	[8,42; 10,01]	[5,48; 6,87]	[5,91; 7,44]	[4,75; 6,20]	[4,89; 6,45]	[4,93; 6,54]	[5,47; 7,22]	[4,93; 6,66]	[6,16; 8,10]	[5,35; 7,22]	[6,96; 9,12]	[5,27; 7,23]	[6,23; 8,39]	[5,67; 7,79]	[7,07; 9,45]			
	Anzahl	335	87	92	75	67	59	62	52	60	55	47	39	55	41	46				
	Anteil in %	6,54	1,91	2,22	2,00	1,97	1,85	2,09	1,85	2,23	2,13	1,93	1,67	2,47	1,92	2,24				
	CI Anteil in %	[5,86; 7,22]	[1,51; 2,31]	[1,78; 2,67]	[1,55; 2,45]	[1,50; 2,43]	[1,38; 2,32]	[1,58; 2,61]	[1,35; 2,35]	[1,67; 2,79]	[1,58; 2,69]	[1,38; 2,47]	[1,15; 2,19]	[1,82; 3,11]	[1,33; 2,50]	[1,60; 2,87]				

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	6730	6209	5669	5188	4785	4530	4217	3994	3779	3583	3359	3189	3038	2890					
	auswertbar	Anzahl	6725	5918	5427	4974	4577	4248	3951	3797	3629	3416	3243	3072	2937	2802					
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1158	1177	1139	964	935	788	737	620	547	470	514	408	422	356					
		Anteil in %	17,22	19,89	20,99	19,38	20,43	18,55	18,65	16,33	15,07	13,76	15,85	13,28	14,37	12,71					
	CI Anteil in %	[16,32; 18,12]	[18,87; 20,91]	[19,90; 22,07]	[18,28; 20,48]	[19,26; 21,60]	[17,38; 19,72]	[17,44; 19,87]	[15,15; 17,50]	[13,91; 16,24]	[12,60; 14,91]	[14,59; 17,11]	[12,08; 14,48]	[13,10; 15,64]	[11,47; 13,94]						
		oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	3611	3243	3037	2840	2592	2365	2284	2136	2102	1971	1897	1807	1726	1582				
	Anteil in %		53,70	54,80	55,96	57,10	56,63	55,67	57,81	56,25	57,92	57,70	58,50	58,82	58,77	56,46					
	CI Anteil in %	[52,50; 54,89]	[53,53; 56,07]	[54,64; 57,28]	[55,72; 58,47]	[55,20; 58,07]	[54,18; 57,17]	[56,27; 59,35]	[54,68; 57,83]	[56,32; 59,53]	[56,04; 59,36]	[56,80; 60,19]	[57,08; 60,56]	[56,99; 60,55]	[54,62; 58,30]						
		erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1073	926	813	721	666	692	580	651	603	585	504	528	492	547				
	Anteil in %		15,96	15,65	14,98	14,50	14,55	16,29	14,68	17,15	16,62	17,13	15,54	17,19	16,75	19,52					
	CI Anteil in %	[15,08; 16,83]	[14,72; 16,57]	[14,03; 15,93]	[13,52; 15,47]	[13,53; 15,57]	[15,18; 17,40]	[13,58; 15,78]	[15,95; 18,34]	[15,40; 17,83]	[15,86; 18,39]	[14,29; 16,79]	[15,85; 18,52]	[15,40; 18,10]	[18,05; 20,99]						
		Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	600	438	341	350	286	305	261	286	283	290	244	247	223	238				
	Anteil in %		8,92	7,40	6,28	7,04	6,25	7,18	6,61	7,53	7,80	8,49	7,52	8,04	7,59	8,49					
	CI Anteil in %	[8,24; 9,60]	[6,73; 8,07]	[5,64; 6,93]	[6,33; 7,75]	[5,55; 6,95]	[6,40; 7,96]	[5,83; 7,38]	[6,69; 8,37]	[6,93; 8,67]	[7,55; 9,42]	[6,62; 8,43]	[7,08; 9,00]	[6,63; 8,55]	[7,46; 9,53]						
		Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	283	134	97	99	98	98	89	104	94	100	84	82	74	79				
Anteil in %	4,21		2,26	1,79	1,99	2,14	2,31	2,25	2,74	2,59	2,93	2,59	2,67	2,52	2,82						
CI Anteil in %	[3,73; 4,69]	[1,89; 2,64]	[1,43; 2,14]	[1,60; 2,38]	[1,72; 2,56]	[1,86; 2,76]	[1,79; 2,72]	[2,22; 3,26]	[2,07; 3,11]	[2,36; 3,49]	[2,04; 3,14]	[2,10; 3,24]	[1,95; 3,09]	[2,21; 3,43]							
	2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7701	7230	6624	6126	5851	5453	5178	4900	4649	4384	4171	3943	3796					
auswertbar		Anzahl	7691	6978	6378	5963	5522	5164	4983	4748	4475	4267	4051	3842	3708						
normal: HbA1c ≤ 6,0		Anzahl	1270	1502	1240	1225	1024	964	819	665	600	663	531	585	517						
		Anteil in %	16,51	21,52	19,44	20,54	18,54	18,67	16,44	14,01	13,41	15,54	13,11	15,23	13,94						
CI Anteil in %		[15,68; 17,34]	[20,56; 22,49]	[18,47; 20,41]	[19,52; 21,57]	[17,52; 19,57]	[17,60; 19,73]	[15,41; 17,46]	[13,02; 14,99]	[12,41; 14,41]	[14,45; 16,62]	[12,07; 14,15]	[14,09; 16,36]	[12,83; 15,06]							
		oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	4026	3880	3596	3354	3131	3004	2834	2833	2621	2517	2410	2265	2149					
Anteil in %			52,35	55,60	56,38	56,25	56,70	58,17	56,87	59,67	58,57	58,99	59,49	58,95	57,96						
CI Anteil in %		[51,23; 53,46]	[54,44; 56,77]	[55,16; 57,60]	[54,99; 57,51]	[55,39; 58,01]	[56,83; 59,52]	[55,50; 58,25]	[58,27; 61,06]	[57,13; 60,01]	[57,51; 60,46]	[57,98; 61,00]	[57,40; 60,51]	[56,37; 59,54]							
		erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1262	971	957	865	856	744	817	768	778	704	688	629	664					
Anteil in %			16,41	13,92	15,00	14,51	15,50	14,41	16,40	16,18	17,39	16,50	16,98	16,37	17,91						
CI Anteil in %		[15,58; 17,24]	[13,10; 14,73]	[14,13; 15,88]	[13,61; 15,40]	[14,55; 16,46]	[13,45; 15,37]	[15,37; 17,42]	[15,13; 17,22]	[16,27; 18,50]	[15,38; 17,61]	[15,83; 18,14]	[15,20; 17,54]	[16,67; 19,14]							
		Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	717	464	438	375	392	355	380	354	354	288	330	280	297					
Anteil in %			9,32	6,65	6,87	6,29	7,10	6,87	7,63	7,46	7,91	6,75	8,15	7,29	8,01						
CI Anteil in %		[8,67; 9,97]	[6,06; 7,23]	[6,25; 7,49]	[5,67; 6,91]	[6,42; 7,78]	[6,18; 7,56]	[6,89; 8,36]	[6,71; 8,20]	[7,12; 8,70]	[6,00; 7,50]	[7,30; 8,99]	[6,47; 8,11]	[7,14; 8,88]							
		Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	416	161	147	144	119	97	133	128	122	95	92	83	81					
Anteil in %	5,41		2,31	2,30	2,41	2,16	1,88	2,67	2,70	2,73	2,23	2,27	2,16	2,18							
CI Anteil in %	[4,90; 5,91]	[1,95; 2,66]	[1,94; 2,67]	[2,03; 2,80]	[1,77; 2,54]	[1,51; 2,25]	[2,22; 3,12]	[2,24; 3,16]	[2,25; 3,20]	[1,78; 2,67]	[1,81; 2,73]	[1,70; 2,62]	[1,71; 2,66]								
	2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	10039	9574	8808	8261	7597	7190	6749	6421	6044	5752	5457	5188						
auswertbar		Anzahl	10031	9058	8365	7685	7108	6801	6481	6120	5825	5516	5280	4996							
normal: HbA1c ≤ 6,0		Anzahl	1888	1792	1731	1480	1354	1156	1055	909	932	763	814	697							
		Anteil in %	18,82	19,78	20,69	19,26	19,05	17,00	16,28	14,85	16,00	13,83	15,42	13,95							
CI Anteil in %		[18,06; 19,59]	[18,96; 20,60]	[19,83; 21,56]	[18,38; 20,14]	[18,14; 19,96]	[16,10; 17,89]	[15,38; 17,18]	[13,96; 15,74]	[15,06; 16,94]	[12,92; 14,74]	[14,44; 16,39]	[12,99; 14,91]								
		oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	5545	5097	4770	4365	4129	3907	3766	3519	3433	3217	3109	2889						
Anteil in %			55,28	56,27	57,02	56,80	58,09	57,45	58,11	57,50	58,94	58,32	58,88	57,83							
CI Anteil in %		[54,31; 56,25]	[55,25; 57,29]	[55,96; 58,08]	[55,69; 57,91]	[56,94; 59,24]	[56,27; 58,62]	[56,91; 59,31]	[56,26; 58,74]	[57,67; 60,20]	[57,02; 59,62]	[57,56; 60,21]	[56,46; 59,20]								
		erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1428	1327	1114	1155	1032	1024	1005	990	892	966	809	846						
Anteil in %			14,24	14,65	13,32	15,03	14,52	15,06	15,51	16,18	15,31	17,51	15,32	16,93							
CI Anteil in %		[13,55; 14,92]	[13,92; 15,38]	[12,59; 14,05]	[14,23; 15,83]	[13,70; 15,34]	[14,21; 15,91]	[14,63; 16,39]	[15,25; 17,10]	[14,39; 16,24]	[16,51; 18,52]	[14,35; 16,29]	[15,89; 17,97]								
		Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	785	623	567	513	460	526	483	538	431	429	427	449						
Anteil in %			7,83	6,88	6,78	6,68	6,47	7,73	7,45	8,79	7,40	7,78	8,09	8,99							
CI Anteil in %		[7,30; 8,35]	[6,36; 7,40]	[6,24; 7,32]	[6,12; 7,23]	[5,90; 7,04]	[7,10; 8,37]	[6,81; 8,09]	[8,08; 9,50]	[6,73; 8,07]	[7,07; 8,48]	[7,35; 8,82]	[8,19; 9,78]								
		Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	385	219	183	172	133	188	172	164	137	141	121	115						
Anteil in %	3,84		2,42	2,19	2,24	1,87	2,76	2,65	2,68	2,35	2,56	2,29	2,30								
CI Anteil in %	[3,46; 4,21]	[2,10; 2,73]	[1,87; 2,50]	[1,91; 2,57]	[1,56; 2,19]	[2,37; 3,15]	[2,26; 3,05]	[2,28; 3,08]	[1,96; 2,74]	[2,14; 2,97]	[1,89; 2,70]	[1,89; 2,72]									

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr									
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	13038	12428	11713	10706	10073	9485	8960	8421	7998	7586	7253																
	auswertbar	Anzahl	13030	11835	10839	9943	9478	9090	8606	8090	7698	7344	7012																
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	2396	2639	2188	2182	1853	1673	1409	1473	1235	1294	1075																
		Anteil in %	18,39	22,30	20,19	21,95	19,55	18,40	16,37	18,21	16,04	17,62	15,33																
	CI Anteil in %		[17,72; 19,05]	[21,55; 23,05]	[19,43; 20,94]	[21,13; 22,76]	[18,75; 20,35]	[17,61; 19,20]	[15,59; 17,15]	[17,37; 19,05]	[15,22; 16,86]	[16,75; 18,49]	[14,49; 16,17]																
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	7182	6723	6215	5693	5385	5328	4966	4693	4494	4291	4087																
		Anteil in %	55,12	56,81	57,34	57,26	56,82	58,61	57,70	58,01	58,38	58,43	58,29																
	CI Anteil in %		[54,26; 55,97]	[55,91; 57,70]	[56,41; 58,27]	[56,28; 58,23]	[55,82; 57,81]	[57,60; 59,63]	[56,66; 58,75]	[56,93; 59,09]	[57,28; 59,48]	[57,30; 59,56]	[57,13; 59,44]																
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	1829	1507	1528	1303	1375	1306	1428	1229	1200	1097	1133																
		Anteil in %	14,04	12,73	14,10	13,10	14,51	14,37	16,59	15,19	15,59	14,94	16,16																
	CI Anteil in %		[13,44; 14,63]	[12,13; 13,33]	[13,44; 14,75]	[12,44; 13,77]	[13,80; 15,22]	[13,65; 15,09]	[15,81; 17,38]	[14,41; 15,97]	[14,78; 16,40]	[14,12; 15,75]	[15,30; 17,02]																
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	1011	691	687	578	620	583	585	515	591	498	550																	
	Anteil in %	7,76	5,84	6,34	5,81	6,54	6,41	6,80	6,37	7,68	6,78	7,84																	
CI Anteil in %		[7,30; 8,22]	[5,42; 6,26]	[5,88; 6,80]	[5,35; 6,27]	[6,04; 7,04]	[5,91; 6,92]	[6,27; 7,33]	[5,83; 6,90]	[7,08; 8,27]	[6,21; 7,36]	[7,21; 8,47]																	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	612	275	221	187	245	200	218	180	178	164	167																	
	Anteil in %	4,70	2,32	2,04	1,88	2,58	2,20	2,53	2,22	2,31	2,23	2,38																	
CI Anteil in %		[4,33; 5,06]	[2,05; 2,60]	[1,77; 2,31]	[1,61; 2,15]	[2,27; 2,90]	[1,90; 2,50]	[2,20; 2,87]	[1,90; 2,55]	[1,98; 2,65]	[1,90; 2,57]	[2,02; 2,74]																	
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	7565	7309	6753	6290	5830	5472	5173	4889	4618	4406																	
	auswertbar	Anzahl	7560	6851	6147	5822	5523	5227	4962	4697	4463	4232																	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1464	1472	1419	1157	1029	915	945	763	831	716																	
		Anteil in %	19,37	21,49	23,08	19,87	18,63	17,51	19,04	16,24	18,62	16,92																	
	CI Anteil in %		[18,47; 20,26]	[20,51; 22,46]	[22,03; 24,14]	[18,85; 20,90]	[17,60; 19,66]	[16,47; 18,54]	[17,95; 20,14]	[15,19; 17,30]	[17,48; 19,76]	[15,79; 18,05]																	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	4207	3890	3522	3414	3297	3069	2942	2840	2634	2460																	
		Anteil in %	55,65	56,78	57,30	58,64	59,70	58,71	59,29	60,46	59,02	58,13																	
	CI Anteil in %		[54,53; 56,77]	[55,61; 57,95]	[56,06; 58,53]	[57,37; 59,90]	[58,40; 60,99]	[57,38; 60,05]	[57,92; 60,66]	[59,07; 61,86]	[57,58; 60,46]	[56,64; 59,62]																	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	972	887	738	740	723	717	628	625	596	615																	
		Anteil in %	12,86	12,95	12,01	12,71	13,09	13,72	12,66	13,31	13,35	14,53																	
	CI Anteil in %		[12,10; 13,61]	[12,15; 13,74]	[11,19; 12,82]	[11,85; 13,57]	[12,20; 13,98]	[12,78; 14,65]	[11,73; 13,58]	[12,33; 14,28]	[12,36; 14,35]	[13,47; 15,59]																	
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	558	428	344	368	338	378	326	338	290	328																		
	Anteil in %	7,38	6,25	5,60	6,32	6,12	7,23	6,57	7,20	6,50	7,75																		
CI Anteil in %		[6,79; 7,97]	[5,67; 6,82]	[5,02; 6,17]	[5,70; 6,95]	[5,49; 6,75]	[6,53; 7,93]	[5,88; 7,26]	[6,46; 7,94]	[5,77; 7,22]	[6,94; 8,56]																		
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	359	174	124	143	136	148	121	131	112	113																		
	Anteil in %	4,75	2,54	2,02	2,46	2,46	2,83	2,44	2,79	2,51	2,67																		
CI Anteil in %		[4,27; 5,23]	[2,17; 2,91]	[1,67; 2,37]	[2,06; 2,85]	[2,05; 2,87]	[2,38; 3,28]	[2,01; 2,87]	[2,32; 3,26]	[2,05; 2,97]	[2,18; 3,16]																		
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	7090	6842	6424	5924	5514	5191	4923	4677	4452																		
	auswertbar	Anzahl	7082	6392	5984	5587	5269	4990	4723	4492	4294																		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	1269	1507	1286	1074	953	1002	831	875	751																		
		Anteil in %	17,92	23,58	21,49	19,22	18,09	20,08	17,59	19,48	17,49																		
	CI Anteil in %		[17,03; 18,81]	[22,54; 24,62]	[20,45; 22,53]	[18,19; 20,26]	[17,05; 19,13]	[18,97; 21,19]	[16,51; 18,68]	[18,32; 20,64]	[16,35; 18,63]																		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	3947	3657	3417	3377	3133	2999	2813	2701	2512																		
		Anteil in %	55,73	57,21	57,10	60,44	59,46	60,10	59,56	60,13	58,50																		
	CI Anteil in %		[54,58; 56,89]	[56,00; 58,43]	[55,85; 58,36]	[59,16; 61,73]	[58,14; 60,79]	[58,74; 61,46]	[58,16; 60,96]	[58,70; 61,56]	[57,03; 59,97]																		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	958	730	791	690	730	654	676	595	671																		
		Anteil in %	13,53	11,42	13,22	12,35	13,85	13,11	14,31	13,25	15,63																		
	CI Anteil in %		[12,73; 14,32]	[10,64; 12,20]	[12,36; 14,08]	[11,49; 13,21]	[12,92; 14,79]	[12,17; 14,04]	[13,31; 15,31]	[12,25; 14,24]	[14,54; 16,71]																		
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1																													

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5123	4955	4617	4293	3992	3733	3522	3336										
	auswertbar	Anzahl	5118	4673	4346	4057	3836	3576	3380	3208										
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	933	959	813	726	762	650	719	617										
		Anteil in %	18,23	20,52	18,71	17,89	19,86	18,18	21,27	19,23										
	CI Anteil in %	[17,17; 19,29]	[19,36; 21,68]	[17,55; 19,87]	[16,72; 19,07]	[18,60; 21,13]	[16,91; 19,44]	[19,89; 22,65]	[17,87; 20,60]											
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	2908	2742	2647	2451	2321	2163	1986	1891										
		Anteil in %	56,82	58,68	60,91	60,41	60,51	60,49	58,76	58,95										
	CI Anteil in %	[55,46; 58,18]	[57,27; 60,09]	[59,46; 62,36]	[58,91; 61,92]	[58,96; 62,05]	[58,88; 62,09]	[57,10; 60,42]	[57,24; 60,65]											
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	664	582	520	545	463	464	412	427										
		Anteil in %	12,97	12,45	11,97	13,43	12,07	12,98	12,19	13,31										
	CI Anteil in %	[12,05; 13,89]	[11,51; 13,40]	[11,00; 12,93]	[12,38; 14,48]	[11,04; 13,10]	[11,87; 14,08]	[11,09; 13,29]	[12,13; 14,49]											
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	370	258	270	243	206	217	197	199											
	Anteil in %	7,23	5,52	6,21	5,99	5,37	6,07	5,83	6,20											
CI Anteil in %	[6,52; 7,94]	[4,87; 6,18]	[5,49; 6,93]	[5,26; 6,72]	[4,66; 6,08]	[5,29; 6,85]	[5,04; 6,62]	[5,37; 7,04]												
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	243	132	96	92	84	82	66	74											
	Anteil in %	4,75	2,82	2,21	2,27	2,19	2,29	1,95	2,31											
CI Anteil in %	[4,17; 5,33]	[2,35; 3,30]	[1,77; 2,65]	[1,81; 2,73]	[1,73; 2,65]	[1,80; 2,78]	[1,49; 2,42]	[1,79; 2,83]												
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4373	4217	3920	3632	3418	3201	3030											
	auswertbar	Anzahl	4363	4044	3712	3470	3274	3075	2942											
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	745	872	738	802	601	655	566											
		Anteil in %	17,08	21,56	19,88	23,11	18,36	21,30	19,24											
	CI Anteil in %	[15,96; 18,19]	[20,30; 22,83]	[18,60; 21,17]	[21,71; 24,52]	[17,03; 19,68]	[19,85; 22,75]	[17,81; 20,66]												
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	2458	2449	2270	2108	2044	1905	1784											
		Anteil in %	56,34	60,56	61,15	60,75	62,43	61,95	60,64											
	CI Anteil in %	[54,87; 57,81]	[59,05; 62,07]	[59,58; 62,72]	[59,12; 62,37]	[60,77; 64,09]	[60,23; 63,67]	[58,87; 62,40]												
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	564	457	426	344	383	310	374											
		Anteil in %	12,93	11,30	11,48	9,91	11,70	10,08	12,71											
	CI Anteil in %	[11,93; 13,92]	[10,32; 12,28]	[10,45; 12,50]	[8,92; 10,91]	[10,60; 12,80]	[9,02; 11,15]	[11,51; 13,92]												
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	318	190	203	165	176	156	167												
	Anteil in %	7,29	4,70	5,47	4,76	5,38	5,07	5,68												
CI Anteil in %	[6,52; 8,06]	[4,05; 5,35]	[4,74; 6,20]	[4,05; 5,46]	[4,60; 6,15]	[4,30; 5,85]	[4,84; 6,51]													
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	278	76	75	51	70	49	51												
	Anteil in %	6,37	1,88	2,02	1,47	2,14	1,59	1,73												
CI Anteil in %	[5,65; 7,10]	[1,46; 2,30]	[1,57; 2,47]	[1,07; 1,87]	[1,64; 2,63]	[1,15; 2,04]	[1,26; 2,21]													
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	4773	4564	4188	3889	3662	3449												
	auswertbar	Anzahl	4767	4332	3993	3745	3523	3339												
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	758	887	893	757	768	656												
		Anteil in %	15,90	20,48	22,36	20,21	21,80	19,65												
	CI Anteil in %	[14,86; 16,94]	[19,27; 21,68]	[21,07; 23,66]	[18,93; 21,50]	[20,44; 23,16]	[18,30; 20,99]													
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	2852	2625	2400	2294	2201	2032												
		Anteil in %	59,83	60,60	60,11	61,26	62,48	60,86												
	CI Anteil in %	[58,44; 61,22]	[59,14; 62,05]	[58,59; 61,62]	[59,69; 62,82]	[60,88; 64,07]	[59,20; 62,51]													
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	556	492	444	429	330	406												
		Anteil in %	11,66	11,36	11,12	11,46	9,37	12,16												
	CI Anteil in %	[10,75; 12,57]	[10,41; 12,30]	[10,14; 12,09]	[10,44; 12,48]	[8,40; 10,33]	[11,05; 13,27]													
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	343	247	180	185	175	184													
	Anteil in %	7,20	5,70	4,51	4,94	4,97	5,51													
CI Anteil in %	[6,46; 7,93]	[5,01; 6,39]	[3,86; 5,15]	[4,25; 5,63]	[4,25; 5,68]	[4,74; 6,28]														
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	258	81	76	80	49	61													
	Anteil in %	5,41	1,87	1,90	2,14	1,39	1,83													
CI Anteil in %	[4,77; 6,05]	[1,47; 2,27]	[1,48; 2,33]	[1,67; 2,60]	[1,00; 1,78]	[1,37; 2,28]														

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr			
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	5317	5128	4757	4411	4135																
	auswertbar	Anzahl	5312	4945	4514	4216	3982																
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	741	1121	896	987	877																
		Anteil in %	13,95	22,67	19,85	23,41	22,02																
	CI Anteil in %	[13,02; 14,88]	[21,50; 23,84]	[18,69; 21,01]	[22,13; 24,69]	[20,74; 23,31]																	
		oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	3175	2979	2827	2535	2370															
	Anteil in %		59,77	60,24	62,63	60,13	59,52																
	CI Anteil in %	[58,45; 61,09]	[58,88; 61,61]	[61,22; 64,04]	[58,65; 61,61]	[57,99; 61,04]																	
		erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	644	504	490	431	455															
	Anteil in %		12,12	10,19	10,86	10,22	11,43																
	CI Anteil in %	[11,25; 13,00]	[9,35; 11,04]	[9,95; 11,76]	[9,31; 11,14]	[10,44; 12,41]																	
		Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	440	248	224	188	207															
	Anteil in %		8,28	5,02	4,96	4,46	5,20																
	CI Anteil in %	[7,54; 9,02]	[4,41; 5,62]	[4,33; 5,60]	[3,84; 5,08]	[4,51; 5,89]																	
		Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	312	93	77	75	73															
Anteil in %	5,87		1,88	1,71	1,78	1,83																	
CI Anteil in %	[5,24; 6,51]	[1,50; 2,26]	[1,33; 2,08]	[1,38; 2,18]	[1,42; 2,25]																		
	2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	5301	5077	4716	4374																
auswertbar		Anzahl	5295	4855	4462	4190																	
normal: HbA1c ≤ 6,0		Anzahl	851	936	1054	919																	
		Anteil in %	16,07	19,28	23,62	21,93																	
CI Anteil in %		[15,08; 17,06]	[18,17; 20,39]	[22,38; 24,87]	[20,68; 23,19]																		
		oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	3191	3024	2662	2499																
Anteil in %			60,26	62,29	59,66	59,64																	
CI Anteil in %		[58,95; 61,58]	[60,92; 63,65]	[58,22; 61,10]	[58,16; 61,13]																		
		erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	642	550	484	486																
Anteil in %			12,12	11,33	10,85	11,60																	
CI Anteil in %		[11,25; 13,00]	[10,44; 12,22]	[9,93; 11,76]	[10,63; 12,57]																		
		Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	361	261	193	209																
Anteil in %			6,82	5,38	4,33	4,99																	
CI Anteil in %		[6,14; 7,50]	[4,74; 6,01]	[3,73; 4,92]	[4,33; 5,65]																		
		Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	250	84	69	77																
Anteil in %	4,72		1,73	1,55	1,84																		
CI Anteil in %	[4,15; 5,29]	[1,36; 2,10]	[1,18; 1,91]	[1,43; 2,24]																			
	2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4961	4773	4409																	
auswertbar		Anzahl	4956	4570	4162																		
normal: HbA1c ≤ 6,0		Anzahl	713	1111	930																		
		Anteil in %	14,39	24,31	22,35																		
CI Anteil in %		[13,41; 15,36]	[23,07; 25,55]	[21,08; 23,61]																			
		oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	3004	2717	2512																	
Anteil in %			60,61	59,45	60,36																		
CI Anteil in %		[59,25; 61,97]	[58,03; 60,88]	[58,87; 61,84]																			
		erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	619	472	458																	
Anteil in %			12,49	10,33	11,00																		
CI Anteil in %		[11,57; 13,41]	[9,45; 11,21]	[10,05; 11,96]																			
		Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	360	192	198																	
Anteil in %			7,26	4,20	4,76																		
CI Anteil in %		[6,54; 7,99]	[3,62; 4,78]	[4,11; 5,40]																			
		Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	260	78	64																	
Anteil in %	5,25		1,71	1,54																			
CI Anteil in %	[4,63; 5,87]	[1,33; 2,08]	[1,16; 1,91]																				

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte ohne Endpunkte	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	4123	3969																			
	auswertbar	Anzahl	4119	3796																			
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	647	786																			
		Anteil in %		15,71	20,71																		
		CI Anteil in %		[14,60; 16,82]	[19,42; 22,00]																		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	2479	2270																			
		Anteil in %		60,18	59,80																		
		CI Anteil in %		[58,69; 61,68]	[58,24; 61,36]																		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	467	441																			
		Anteil in %		11,34	11,62																		
		CI Anteil in %		[10,37; 12,31]	[10,60; 12,64]																		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	290	209																			
		Anteil in %		7,04	5,51																		
		CI Anteil in %		[6,26; 7,82]	[4,78; 6,23]																		
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	236	90																				
	Anteil in %		5,73	2,37																			
	CI Anteil in %		[5,02; 6,44]	[1,89; 2,85]																			
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4675																				
	auswertbar	Anzahl	4667																				
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	736																				
		Anteil in %		15,77																			
		CI Anteil in %		[14,72; 16,82]																			
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	2755																				
		Anteil in %		59,03																			
		CI Anteil in %		[57,62; 60,44]																			
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	568																				
		Anteil in %		12,17																			
		CI Anteil in %		[11,23; 13,11]																			
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	348																				
		Anteil in %		7,46																			
		CI Anteil in %		[6,70; 8,21]																			
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	260																					
	Anteil in %		5,57																				
	CI Anteil in %		[4,91; 6,23]																				

Anhang B: Auswertung für Patienten mit primären Endpunkten

Im Hauptteil des vorliegenden Evaluationsberichtes wurden in den Auswertungskapiteln 1 und 2 unter anderem tabellarische Auswertungen zu den Patientenzahlen und -merkmalen sowie zu Raucherstatus, Hypertonus und HbA1c-Werten vorgenommen. Diese Auswertungen bezogen sich auf die Gesamtheit der Patienten. Im folgenden Anhang B werden diese Auswertungen nochmals für die Subkohorte der **Patienten mit primären Endpunkten** in der Erstdokumentation vorgenommen. Um den Vergleich zwischen den Auswertungen im Hauptteil und im Anhang zu erleichtern, wurden die Auswertungskapitel und Tabellen im Anhang analog zu zum Hauptteil nummeriert. Da das Auswertungskapitel 2 im Anhang entfällt, folgt auf das Auswertungskapitel B.1 direkt das Auswertungskapitel B.3. Vergleichbares gilt für die Tabellen; deren Nummerierung ist im Anhang daher nicht fortlaufend.

Die Subkohorten werden gebildet, indem die Patienten jeder Kohorte nach dem Schweregrad ihrer Begleit- oder Folgeerkrankungen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation in drei Gruppen unterteilt werden. Bei diesen Begleit- oder Folgeerkrankungen handelt es sich zumeist um schwerste Organschädigungen bzw. Organversagen, verursacht durch eine langjährige diabetische Stoffwechsellage, letztlich bedingt durch Mikro-Gefäßerkrankungen. Die Begleit- oder Folgeerkrankungen werden als „Endpunkte“ bezeichnet. Dieser Begriff ist zentral für die Definition der drei Subkohorten gemäß der BVA-Kriterien:

- Patienten **ohne Endpunkte** in der Erstdokumentation
- Patienten **mit primären, d.h. gravierenden Endpunkten** in der Erstdokumentation (*Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit*)
- Patienten nur mit **sekundären, d.h. weniger gravierenden Endpunkten** (*diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, erheblich auffälliger Fußstatus (Stadium 2 bis Stadium 5 nach Wagner ODER Stadium C bis D nach Armstrong), periphere arterielle Verschlusskrankheit, diabetische Retinopathie*)

Für die Zuordnung der Patienten zu den Subkohorten ist die jeweils gravierendste (Begleit- oder Folge-) Erkrankung entscheidend. Patienten ohne Endpunkte sind Patienten, die nicht den Subkohorten 2 oder 3 zuzuordnen sind. Patienten mit sowohl primären als auch sekundären Endpunkten werden daher der Subkohorte der Patienten mit primären Endpunkten zugeordnet. Die anhand der Erstdokumentation vorgenommene Einteilung in Subkohorten bleibt über den ganzen Berichtszeitraum bestehen, unabhängig davon, ob im weiteren Zeitverlauf Begleit- oder Folgeerkrankungen eines höheren Schweregrads auftreten oder nicht.

Zu beachten ist dabei, dass aufgrund der Änderungen im Dokumentationsbogen durch die 9. RSA-ÄndV nicht alle medizinisch relevanten Kriterien in vergleichbarer Weise für die Halbjahre bis 2004-1 einerseits bzw. ab 2004-2 andererseits vorliegen. Daher kann z.B. das Vorliegen einer Nierenersatztherapie nicht als Kriterium für die Abgrenzung der Subkohorten verwendet werden. Auch werden zwar periphere arterielle Verschlusskrankheiten (pAVK) bei der Bildung der Subkohorten berücksichtigt, nicht aber koronare Herzkrankheiten (KHK). Andere Begleit- oder Folgeerkrankungen wie z.B. Hypertonus werden bei der Abgrenzung der primären und sekundären Endpunkte ebenfalls nicht berücksichtigt.

Auswertungskapitel B.1: Patientenzahlen und -merkmale

In den folgenden vier Tabellen ist die Entwicklung der **Patientenzahlen** ab dem Programmeintritt und in den darauffolgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Alle Patienten eines Beitrittsjahres bilden dabei eine Kohorte. Differenziert wird in den Tabellen nach den folgenden Kriterien:

- Geschlechtsverteilung
- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Alter und Altersverteilung
- mittlere und mediane Beobachtungszeit
- Vorliegen einer medizinischen Dokumentation

In Tabelle B.1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerzahlen im Programm differenziert nach Kohorten und Geschlecht ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patienten jeweils im Beitrittsjahr und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmer waren.

Beispielsweise sind in der Kohorte 2003-1 insgesamt 2536 Teilnehmer in das Programm gestartet. Darunter waren 1387 Männer und 1149 Frauen. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres waren in dieser Kohorte noch 390 Teilnehmer im Programm, 218 Männer und 172 Frauen. Diese Teilnehmer bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle B.1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte mit primären Endpunkten

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2536	2267	1979	1753	1566	1413	1283	1072	963	857	793	715	644	597	549	500	460	427	390
	männlich	Anzahl	1387	1241	1084	961	852	775	714	600	546	474	436	401	362	339	314	287	262	242	218
		Anteil in %	54,69	54,74	54,78	54,82	54,41	54,85	55,65	55,97	56,70	55,31	54,98	56,08	56,21	56,78	57,19	57,40	56,96	56,67	55,90
	weiblich	Anzahl	1149	1026	895	792	714	638	569	472	417	383	357	314	282	258	235	213	198	185	172
Anteil in %		45,31	45,26	45,22	45,18	45,59	45,15	44,35	44,03	43,30	44,69	45,02	43,92	43,79	43,22	42,81	42,60	43,04	43,33	44,10	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	2071	1748	1572	1402	1268	1130	975	882	803	754	690	652	609	565	530	490	454	430	
	männlich	Anzahl	1178	977	887	789	716	630	542	496	450	425	394	369	346	323	304	282	261	247	
		Anteil in %	56,88	55,89	56,42	56,28	56,47	55,75	55,59	56,24	56,04	56,37	57,10	56,60	56,81	57,17	57,36	57,55	57,49	57,44	
	weiblich	Anzahl	893	771	685	613	552	500	433	386	353	329	296	283	263	242	226	208	193	183	
Anteil in %		43,12	44,11	43,58	43,72	43,53	44,25	44,41	43,76	43,96	43,63	42,90	43,40	43,19	42,83	42,64	42,45	42,51	42,56		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	870	773	679	599	529	476	440	387	360	337	309	282	258	243	227	210	198		
	männlich	Anzahl	512	458	404	357	319	283	262	232	216	200	186	169	156	143	134	124	118		
		Anteil in %	58,85	59,25	59,50	59,60	60,30	59,45	59,55	59,95	60,00	59,35	60,19	59,93	60,47	58,85	59,03	59,05	59,60		
	weiblich	Anzahl	358	315	275	242	210	193	178	155	144	137	123	113	102	100	93	86	80		
Anteil in %		41,15	40,75	40,50	40,40	39,70	40,55	40,45	40,05	40,00	40,65	39,81	40,07	39,53	41,15	40,97	40,95	40,40			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	659	590	532	467	416	372	339	320	297	273	262	246	228	213	206	191			
	männlich	Anzahl	342	309	282	249	224	204	186	177	161	146	142	131	123	112	108	99			
		Anteil in %	51,90	52,37	53,01	53,32	53,85	54,84	54,87	55,31	54,21	53,48	54,20	53,25	53,95	52,58	52,43	51,83			
	weiblich	Anzahl	317	281	250	218	192	168	153	143	136	127	120	115	105	101	98	92			
Anteil in %		48,10	47,63	46,99	46,68	46,15	45,16	45,13	44,69	45,79	46,52	45,80	46,75	46,05	47,42	47,57	48,17				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	859	795	730	633	558	489	457	414	387	358	333	307	279	254	233				
	männlich	Anzahl	437	404	378	335	302	270	255	234	221	204	192	179	161	150	132				
		Anteil in %	50,87	50,82	51,78	52,92	54,12	55,21	55,80	56,52	57,11	56,98	57,66	58,31	57,71	59,06	56,65				
	weiblich	Anzahl	422	391	352	298	256	219	202	180	166	154	141	128	118	104	101				
Anteil in %		49,13	49,18	48,22	47,08	45,88	44,79	44,20	43,48	42,89	43,02	42,34	41,69	42,29	40,94	43,35					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1182	1074	947	842	734	687	622	577	528	478	442	410	378	340					
	männlich	Anzahl	656	600	525	472	405	383	349	322	297	268	248	230	214	190					
		Anteil in %	55,50	55,87	55,44	56,06	55,18	55,75	56,11	55,81	56,25	56,07	56,11	56,10	56,61	55,88					
	weiblich	Anzahl	526	474	422	370	329	304	273	255	231	210	194	180	164	150					
Anteil in %		44,50	44,13	44,56	43,94	44,82	44,25	43,89	44,19	43,75	43,93	43,89	43,90	43,39	44,12						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1328	1241	1122	1007	928	844	793	715	659	606	566	516	473						
	männlich	Anzahl	742	695	625	551	513	472	443	404	378	349	329	298	273						
		Anteil in %	55,87	56,00	55,70	54,72	55,28	55,92	55,86	56,50	57,36	57,59	58,13	57,75	57,72						
	weiblich	Anzahl	586	546	497	456	415	372	350	311	281	257	237	218	200						
Anteil in %		44,13	44,00	44,30	45,28	44,72	44,08	44,14	43,50	42,64	42,41	41,87	42,25	42,28							
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1803	1704	1527	1413	1260	1159	1061	964	878	811	753	696							
	männlich	Anzahl	957	905	815	755	679	629	575	530	482	452	420	395							
		Anteil in %	53,08	53,11	53,37	53,43	53,89	54,27	54,19	54,98	54,90	55,73	55,78	56,75							
	weiblich	Anzahl	846	799	712	658	581	530	486	434	396	359	333	301							
Anteil in %		46,92	46,89	46,63	46,57	46,11	45,73	45,81	45,02	45,10	44,27	44,22	43,25								
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2076	1926	1782	1605	1459	1307	1216	1116	1038	958	865								
	männlich	Anzahl	1118	1047	963	858	783	712	668	634	601	556	498								
		Anteil in %	53,85	54,36	54,04	53,46	53,67	54,48	54,93	56,81	57,90	58,04	57,57								
	weiblich	Anzahl	958	879	819	747	676	595	548	482	437	402	367								
Anteil in %		46,15	45,64	45,96	46,54	46,33	45,52	45,07	43,19	42,10	41,96	42,43									

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte mit primären Endpunkten		Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1157	1093	978	888	770	700	618	562	513	476										
	männlich	Anzahl	592	563	503	457	402	366	327	298	272	250										
		Anteil in %	51,17	51,51	51,43	51,46	52,21	52,29	52,91	53,02	53,02	52,52										
	weiblich	Anzahl	565	530	475	431	368	334	291	264	241	226										
		Anteil in %	48,83	48,49	48,57	48,54	47,79	47,71	47,09	46,98	46,98	47,48										
	2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	927	876	802	707	644	585	539	486	458										
männlich		Anzahl	500	470	431	379	349	317	293	265	250											
		Anteil in %	53,94	53,65	53,74	53,61	54,19	54,19	54,36	54,53	54,59											
weiblich		Anzahl	427	406	371	328	295	268	246	221	208											
		Anteil in %	46,06	46,35	46,26	46,39	45,81	45,81	45,64	45,47	45,41											
2008-2		Patienten insgesamt	Anzahl	550	530	474	421	389	362	335	309											
	männlich	Anzahl	292	277	250	222	204	191	179	163												
		Anteil in %	53,09	52,26	52,74	52,73	52,44	52,76	53,43	52,75												
	weiblich	Anzahl	258	253	224	199	185	171	156	146												
		Anteil in %	46,91	47,74	47,26	47,27	47,56	47,24	46,57	47,25												
	2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	395	373	343	308	284	260	247												
männlich		Anzahl	209	196	179	158	147	133	126													
		Anteil in %	52,91	52,55	52,19	51,30	51,76	51,15	51,01													
weiblich		Anzahl	186	177	164	150	137	127	121													
		Anteil in %	47,09	47,45	47,81	48,70	48,24	48,85	48,99													
2009-2		Patienten insgesamt	Anzahl	444	414	368	329	305	286													
	männlich	Anzahl	232	215	189	171	158	152														
		Anteil in %	52,25	51,93	51,36	51,98	51,80	53,15														
	weiblich	Anzahl	212	199	179	158	147	134														
		Anteil in %	47,75	48,07	48,64	48,02	48,20	46,85														
	2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	469	440	392	349	320														
männlich		Anzahl	248	232	201	181	163															
		Anteil in %	52,88	52,73	51,28	51,86	50,94															
weiblich		Anzahl	221	208	191	168	157															
		Anteil in %	47,12	47,27	48,72	48,14	49,06															
2010-2		Patienten insgesamt	Anzahl	467	444	397	353															
	männlich	Anzahl	253	243	219	198																
		Anteil in %	54,18	54,73	55,16	56,09																
	weiblich	Anzahl	214	201	178	155																
		Anteil in %	45,82	45,27	44,84	43,91																
	2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	439	405	364																
männlich		Anzahl	256	238	213																	
		Anteil in %	58,31	58,77	58,52																	
weiblich		Anzahl	183	167	151																	
		Anteil in %	41,69	41,23	41,48																	
2011-2		Patienten insgesamt	Anzahl	419	401																	
	männlich	Anzahl	208	200																		
		Anteil in %	49,64	49,88																		
	weiblich	Anzahl	211	201																		
		Anteil in %	50,36	50,12																		
	2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	441																		
männlich		Anzahl	222																			
		Anteil in %	50,34																			
weiblich		Anzahl	219																			
		Anteil in %	49,66																			

Tabelle B.1.3 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patienten bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patienten aus dem Programm**. Dafür kommen beispielsweise Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse oder Beendigung durch den Patienten in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patienten werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2003-1 mit 2536 Teilnehmern. 2170 von ihnen bzw. 85,57 Prozent waren bis zum Ende des letzten Berichtshalbjahres ausgeschieden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle B.1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit primären Endpunkten

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	269	557	783	970	1123	1253	1464	1573	1679	1743	1821	1892	1939	1987	2036	2076	2109	2146	2170
		Anteil in %	10,61	21,96	30,88	38,25	44,28	49,41	57,73	62,03	66,21	68,73	71,81	74,61	76,46	78,35	80,28	81,86	83,16	84,62	85,57
		CI Anteil in %	[9,41; 11,81]	[20,35; 23,58]	[29,08; 32,67]	[36,36; 40,14]	[42,35; 46,22]	[47,46; 51,35]	[55,81; 59,65]	[60,14; 63,92]	[64,37; 68,05]	[66,93; 70,53]	[70,05; 73,56]	[72,91; 76,30]	[74,81; 78,11]	[76,75; 79,95]	[78,74; 81,83]	[80,36; 83,36]	[81,71; 84,62]	[83,22; 86,03]	[84,20; 86,94]
	davon wegen Tod	Anzahl	7	18	25	30	77	108	145	184	224	256	296	334	359	388	419	444	465	487	502
		Anteil in %	0,28	0,71	0,99	1,18	3,04	4,26	5,72	7,26	8,83	10,09	11,67	13,17	14,16	15,30	16,52	17,51	18,34	19,20	19,79
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	58	156	255	359	441	526	554	579	590	599	609	620	632	640	646	656	661	664	669
		Anteil in %	2,29	6,15	10,06	14,16	17,39	20,74	21,85	22,83	23,26	23,62	24,01	24,45	24,92	25,24	25,47	25,87	26,06	26,18	26,38
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	0	0	12	15	17	18	22	27	31	40	41	47	51	55	58	58	62	64
		Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,47	0,59	0,67	0,71	0,87	1,06	1,22	1,58	1,62	1,85	2,01	2,17	2,29	2,29	2,44	2,52
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	204	383	503	569	590	602	747	788	838	857	876	897	901	908	916	918	925	933	935
Anteil in %		8,04	15,10	19,83	22,44	23,26	23,74	29,46	31,07	33,04	33,79	34,54	35,37	35,53	35,80	36,12	36,20	36,47	36,79	36,87	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	2536	2267	1979	1753	1566	1413	1283	1072	963	857	793	715	644	597	549	500	460	427	390
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	2267	1979	1753	1566	1413	1283	1072	963	857	793	715	644	597	549	500	460	427	390	366
2003-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	323	499	669	803	941	1096	1189	1268	1317	1381	1419	1462	1506	1541	1581	1617	1641	1665	1665
		Anteil in %	15,60	24,09	32,30	38,77	45,44	52,92	57,41	61,23	63,59	66,68	68,52	70,59	72,72	74,41	76,34	78,08	79,24	80,40	80,40
		CI Anteil in %	[14,03; 17,16]	[22,25; 25,94]	[30,29; 34,32]	[36,67; 40,87]	[43,29; 47,58]	[50,77; 55,07]	[55,28; 59,54]	[59,13; 63,33]	[61,52; 65,67]	[64,65; 68,71]	[66,52; 70,52]	[68,63; 72,56]	[70,80; 74,64]	[72,53; 76,29]	[74,51; 78,17]	[76,30; 79,86]	[77,49; 80,98]	[78,69; 82,11]	
	davon wegen Tod	Anzahl	6	12	21	56	94	135	172	200	220	252	275	297	317	341	362	384	400	416	416
		Anteil in %	0,29	0,58	1,01	2,70	4,54	6,52	8,31	9,66	10,62	12,17	13,28	14,34	15,31	16,47	17,48	18,54	19,31	20,09	20,09
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	52	113	219	297	372	428	455	466	473	478	481	487	501	506	518	523	525	526	526
		Anteil in %	2,51	5,46	10,57	14,34	17,96	20,67	21,97	22,50	22,84	23,08	23,23	23,52	24,19	24,43	25,01	25,25	25,35	25,40	25,40
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	2	5	8	9	17	22	28	38	44	47	54	58	61	64	70	73	77	77
		Anteil in %	0,00	0,10	0,24	0,39	0,43	0,82	1,06	1,35	1,83	2,12	2,27	2,61	2,80	2,95	3,09	3,38	3,52	3,72	3,72
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	265	372	424	442	466	516	540	574	586	607	616	624	630	633	637	640	643	646	646
Anteil in %		12,80	17,96	20,47	21,34	22,50	24,92	26,07	27,72	28,30	29,31	29,74	30,13	30,42	30,56	30,76	30,90	31,05	31,19	31,19	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	2071	1748	1572	1402	1268	1130	975	882	803	754	690	652	609	565	530	490	454	430	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1748	1572	1402	1268	1130	975	882	803	754	690	652	609	565	530	490	454	430	406	406
2004-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	97	191	271	341	394	430	483	510	533	561	588	612	627	643	660	672	691	691	691
		Anteil in %	11,15	21,95	31,15	39,20	45,29	49,43	55,52	58,62	61,26	64,48	67,59	70,34	72,07	73,91	75,86	77,24	79,43	79,43	79,43
		CI Anteil in %	[9,06; 13,24]	[19,20; 24,71]	[28,07; 34,23]	[35,95; 42,44]	[41,98; 48,60]	[46,10; 52,75]	[52,21; 58,82]	[55,35; 61,90]	[58,03; 64,50]	[61,30; 67,66]	[64,47; 70,70]	[67,31; 73,38]	[69,09; 75,05]	[70,99; 76,83]	[73,02; 78,71]	[74,45; 80,03]	[76,74; 82,11]		
	davon wegen Tod	Anzahl	1	3	22	46	67	77	103	109	116	128	147	157	166	177	183	189	200	200	200
		Anteil in %	0,11	0,34	2,53	5,29	7,70	8,85	11,84	12,53	13,33	14,71	16,90	18,05	19,08	20,34	21,03	21,72	22,99	22,99	22,99
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	44	92	140	177	186	200	204	215	217	219	223	227	231	232	238	239	240	240	240
		Anteil in %	5,06	10,57	16,09	20,34	21,38	22,99	23,45	24,71	24,94	25,17	25,63	26,09	26,55	26,67	27,36	27,47	27,59	27,59	27,59
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	4	6	8	11	13	18	19	22	25	26	31	32	33	35	39	44	44	44
		Anteil in %	0,00	0,46	0,69	0,92	1,26	1,49	2,07	2,18	2,53	2,87	2,99	3,56	3,68	3,79	4,02	4,48	5,06	5,06	5,06
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	52	92	103	110	130	140	158	167	178	189	192	197	198	201	204	205	207	207	207
Anteil in %		5,98	10,57	11,84	12,64	14,94	16,09	18,16	19,20	20,46	21,72	22,07	22,64	22,76	23,10	23,45	23,56	23,79	23,79	23,79	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	870	773	679	599	529	476	440	387	360	337	309	282	258	243	227	210	198	198	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	773	679	599	529	476	440	387	360	337	309	282	258	243	227	210	198	179	179	179

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	69	127	192	243	287	320	339	362	386	397	413	431	446	453	468	482		
		Anteil in %	10,47	19,27	29,14	36,87	43,55	48,56	51,44	54,93	58,57	60,24	62,67	65,40	67,68	68,74	71,02	73,14		
		CI Anteil in %	[8,13; 12,81]	[16,26; 22,29]	[25,66; 32,61]	[33,19; 40,56]	[39,76; 47,34]	[44,74; 52,38]	[47,62; 55,26]	[51,13; 58,73]	[54,81; 62,34]	[56,50; 63,98]	[58,97; 66,37]	[61,77; 69,04]	[64,10; 71,25]	[65,20; 72,28]	[67,55; 74,48]	[69,75; 76,53]		
	davon wegen Tod	Anzahl	3	19	30	38	50	64	72	80	93	97	106	121	129	132	135	145		
		Anteil in %	0,46	2,88	4,55	5,77	7,59	9,71	10,93	12,14	14,11	14,72	16,08	18,36	19,58	20,03	20,49	22,00		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	47	83	118	132	152	156	161	162	167	170	171	172	176	178	183	185		
		Anteil in %	7,13	12,59	17,91	20,03	23,07	23,67	24,43	24,58	25,34	25,80	25,95	26,10	26,71	27,01	27,77	28,07		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	6	6	7	8	10	12	13	20	22	23	26	26	26	28	30	31		
		Anteil in %	0,91	0,91	1,06	1,21	1,52	1,82	1,97	3,03	3,34	3,49	3,95	3,95	3,95	4,25	4,55	4,70		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	13	19	37	65	75	88	93	100	104	107	110	112	115	120	121			
Anteil in %		1,97	2,88	5,61	9,86	11,38	13,35	14,11	15,17	15,78	16,24	16,69	17,00	17,45	17,45	18,21	18,36			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	659	590	532	467	416	372	339	320	297	273	262	246	228	213	206	191		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	590	532	467	416	372	339	320	297	273	262	246	228	213	206	191	177		
2005-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	64	129	226	301	370	402	445	472	501	526	552	580	605	626	641			
		Anteil in %	7,45	15,02	26,31	35,04	43,07	46,80	51,80	54,95	58,32	61,23	64,26	67,52	70,43	72,88	74,62			
		CI Anteil in %	[5,69; 9,21]	[12,63; 17,41]	[23,36; 29,26]	[31,85; 38,23]	[39,76; 46,39]	[43,46; 50,14]	[48,46; 55,15]	[51,62; 58,28]	[55,02; 61,62]	[57,97; 64,49]	[61,05; 67,47]	[64,39; 70,65]	[67,38; 73,48]	[69,90; 75,85]	[71,71; 77,53]			
	davon wegen Tod	Anzahl	15	28	57	79	100	119	137	149	160	174	180	198	212	224	235			
		Anteil in %	1,75	3,26	6,64	9,20	11,64	13,85	15,95	17,35	18,63	20,26	20,95	23,05	24,68	26,08	27,36			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	44	78	115	144	156	160	167	173	178	181	188	194	201	205	205			
		Anteil in %	5,12	9,08	13,39	16,76	18,16	18,63	19,44	20,14	20,72	21,07	21,89	22,58	23,40	23,86	23,86			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	5	6	8	16	18	31	32	41	44	47	50	53	55	57			
		Anteil in %	0,23	0,58	0,70	0,93	1,86	2,10	3,61	3,73	4,77	5,12	5,47	5,82	6,17	6,40	6,64			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3	18	48	70	98	105	110	118	122	127	137	138	139	142	144			
Anteil in %		0,35	2,10	5,59	8,15	11,41	12,22	12,81	13,74	14,20	14,78	15,95	16,07	16,18	16,53	16,76				
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	859	795	730	633	558	489	457	414	387	358	333	307	279	254	233			
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	795	730	633	558	489	457	414	387	358	333	307	279	254	233	218			
2005-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	108	235	340	448	495	560	605	654	704	740	772	804	842	873				
		Anteil in %	9,14	19,88	28,76	37,90	41,88	47,38	51,18	55,33	59,56	62,61	65,31	68,02	71,24	73,86				
		CI Anteil in %	[7,49; 10,78]	[17,61; 22,16]	[26,18; 31,35]	[35,13; 40,67]	[39,06; 44,69]	[44,53; 50,23]	[48,33; 54,04]	[52,49; 58,17]	[56,76; 62,36]	[59,85; 65,37]	[62,60; 68,03]	[65,36; 70,68]	[68,65; 73,82]	[71,35; 76,36]				
	davon wegen Tod	Anzahl	18	54	94	130	162	194	214	239	262	284	304	321	338	359				
		Anteil in %	1,52	4,57	7,95	11,00	13,71	16,41	18,10	20,22	22,17	24,03	25,72	27,16	28,60	30,37				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	77	119	153	174	176	183	194	206	221	227	235	242	250	251				
		Anteil in %	6,51	10,07	12,94	14,72	14,89	15,48	16,41	17,43	18,70	19,20	19,88	20,47	21,15	21,24				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	4	7	10	16	19	24	24	29	36	40	41	43	51	57				
		Anteil in %	0,34	0,59	0,85	1,35	1,61	2,03	2,03	2,45	3,05	3,38	3,47	3,64	4,31	4,82				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	9	55	83	128	138	159	173	180	185	189	192	198	203	206				
Anteil in %		0,76	4,65	7,02	10,83	11,68	13,45	14,64	15,23	15,65	15,99	16,24	16,75	17,17	17,43					
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1182	1074	947	842	734	687	622	577	528	478	442	410	378	340				
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1074	947	842	734	687	622	577	528	478	442	410	378	340	309				
2006-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	87	206	321	400	484	535	613	669	722	762	812	855	881					
		Anteil in %	6,55	15,51	24,17	30,12	36,45	40,29	46,16	50,38	54,37	57,38	61,14	64,38	66,34					
		CI Anteil in %	[5,22; 7,88]	[13,56; 17,46]	[21,87; 26,48]	[27,65; 32,59]	[33,86; 39,04]	[37,65; 42,93]	[43,48; 48,84]	[47,69; 53,07]	[51,69; 57,05]	[54,72; 60,04]	[58,52; 63,77]	[61,81; 66,96]	[63,80; 68,88]					
	davon wegen Tod	Anzahl	21	64	111	156	198	224	272	297	327	354	378	410	432					
		Anteil in %	1,58	4,82	8,36	11,75	14,91	16,87	20,48	22,36	24,62	26,66	28,46	30,87	32,53					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	54	85	107	122	135	143	156	166	174	182	195	201	202					
		Anteil in %	4,07	6,40	8,06	9,19	10,17	10,77	11,75	12,50	13,10	13,70	14,68	15,14	15,21					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	7	16	24	26	37	40	50	62	71	76	84	85	86					
		Anteil in %	0,53	1,20	1,81	1,96	2,79	3,01	3,77	4,67	5,35	5,72	6,33	6,40	6,48					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	5	41	79	96	114	128	135	144	150	150	155	159	161					
Anteil in %		0,38	3,09	5,95	7,23	8,58	9,64	10,17	10,84	11,30	11,30	11,67	11,97	12,12						
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1328	1241	1122	1007	928	844	793	715	659	606	566	516	473					
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1241	1122	1007	928	844	793	715	659	606	566	516	473	447					

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2006-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	99	276	390	543	644	742	839	925	992	1050	1107	1148								
		Anteil in %	5,49	15,31	21,63	30,12	35,72	41,15	46,53	51,30	55,02	58,24	61,40	63,67								
		CI Anteil in %	[4,44; 6,54]	[13,65; 16,97]	[19,73; 23,53]	[28,00; 32,23]	[33,51; 37,93]	[38,88; 43,43]	[44,23; 48,84]	[49,00; 53,61]	[52,72; 57,32]	[55,96; 60,51]	[59,15; 63,65]	[61,45; 65,89]								
	davon wegen Tod	Anzahl	15	89	132	204	259	312	365	406	442	476	514	543								
		Anteil in %	0,83	4,94	7,32	11,31	14,36	17,30	20,24	22,52	24,51	26,40	28,51	30,12								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	71	115	130	146	156	169	185	201	217	225	232	234								
		Anteil in %	3,94	6,38	7,21	8,10	8,65	9,37	10,26	11,15	12,04	12,48	12,87	12,98								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	4	15	22	49	70	88	101	114	121	126	130	135								
		Anteil in %	0,22	0,83	1,22	2,72	3,88	4,88	5,60	6,32	6,71	6,99	7,21	7,49								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	9	57	106	144	159	173	188	204	212	223	231	236								
Anteil %		0,50	3,16	5,88	7,99	8,82	9,60	10,43	11,31	11,76	12,37	12,81	13,09									
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1803	1704	1527	1413	1260	1159	1061	964	878	811	753	696								
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1704	1527	1413	1260	1159	1061	964	878	811	753	696	655								
2007-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	150	294	471	617	769	860	960	1038	1118	1211	1292									
		Anteil in %	7,23	14,16	22,69	29,72	37,04	41,43	46,24	50,00	53,85	58,33	62,24									
		CI Anteil in %	[6,11; 8,34]	[12,66; 15,66]	[20,89; 24,49]	[27,75; 31,69]	[34,96; 39,12]	[39,31; 43,55]	[44,10; 48,39]	[47,85; 52,15]	[51,71; 56,00]	[56,21; 60,45]	[60,15; 64,32]									
	davon wegen Tod	Anzahl	42	118	185	260	337	386	434	480	532	586	645									
		Anteil in %	2,02	5,68	8,91	12,52	16,23	18,59	20,91	23,12	25,63	28,23	31,07									
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	89	116	142	169	198	221	245	257	268	286	290									
		Anteil in %	4,29	5,59	6,84	8,14	9,54	10,65	11,80	12,38	12,91	13,78	13,97									
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	12	17	62	79	108	120	134	144	152	167	175									
		Anteil in %	0,58	0,82	2,99	3,81	5,20	5,78	6,45	6,94	7,32	8,04	8,43									
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	7	43	82	109	126	133	147	157	166	172	182									
Anteil %		0,34	2,07	3,95	5,25	6,07	6,41	7,08	7,56	8,00	8,29	8,77										
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	2076	1926	1782	1605	1459	1307	1216	1116	1038	958	865	784								
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1926	1782	1605	1459	1307	1216	1116	1038	958	865	784									
2007-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	64	179	269	387	457	539	595	644	681	715										
		Anteil in %	5,53	15,47	23,25	33,45	39,50	46,59	51,43	55,66	58,86	61,80										
		CI Anteil in %	[4,21; 6,85]	[13,39; 17,56]	[20,81; 25,68]	[30,73; 36,17]	[36,68; 42,32]	[43,71; 49,46]	[48,54; 54,31]	[52,80; 58,53]	[56,02; 61,70]	[59,00; 64,60]										
	davon wegen Tod	Anzahl	25	70	112	162	196	235	260	287	312	333										
		Anteil in %	2,16	6,05	9,68	14,00	16,94	20,31	22,47	24,81	26,97	28,78										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	27	48	64	85	99	118	127	139	142	146										
		Anteil in %	2,33	4,15	5,53	7,35	8,56	10,20	10,98	12,01	12,27	12,62										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	4	37	52	88	102	111	127	130	134	141										
		Anteil in %	0,35	3,20	4,49	7,61	8,82	9,59	10,98	11,24	11,58	12,19										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	8	24	41	52	60	75	81	88	93	95										
Anteil %		0,69	2,07	3,54	4,49	5,19	6,48	7,00	7,61	8,04	8,21											
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1157	1093	978	888	770	700	618	562	513	476										
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1093	978	888	770	700	618	562	513	476	442										
2008-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	51	125	220	283	342	388	441	469	501											
		Anteil in %	5,50	13,48	23,73	30,53	36,89	41,86	47,57	50,59	54,05											
		CI Anteil in %	[4,03; 6,97]	[11,28; 15,68]	[20,99; 26,47]	[27,56; 33,49]	[33,79; 40,00]	[38,68; 45,03]	[44,36; 50,79]	[47,37; 53,81]	[50,84; 57,26]											
	davon wegen Tod	Anzahl	24	53	79	109	139	166	191	204	222											
		Anteil in %	2,59	5,72	8,52	11,76	14,99	17,91	20,60	22,01	23,95											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	20	39	65	79	89	98	109	115	119											
		Anteil in %	2,16	4,21	7,01	8,52	9,60	10,57	11,76	12,41	12,84											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	12	36	46	55	59	69	71	74											
		Anteil in %	0,22	1,29	3,88	4,96	5,93	6,36	7,44	7,66	7,98											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	5	21	40	49	59	65	72	79	86											
Anteil %		0,54	2,27	4,31	5,29	6,36	7,01	7,77	8,52	9,28												
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	927	876	802	707	644	585	539	486	458											
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	876	802	707	644	585	539	486	458	426											

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2008-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	20	76	129	161	188	215	241	262											
		Anteil in %	3,64	13,82	23,45	29,27	34,18	39,09	43,82	47,64											
		CI Anteil in %	[2,07; 5,20]	[10,93; 16,70]	[19,91; 27,00]	[25,47; 33,08]	[30,21; 38,15]	[35,01; 43,17]	[39,67; 47,97]	[43,46; 51,81]											
	davon wegen Tod	Anzahl	7	37	58	77	89	103	117	129											
		Anteil in %	1,27	6,73	10,55	14,00	16,18	18,73	21,27	23,45											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	11	18	32	37	41	49	55	57											
		Anteil in %	2,00	3,27	5,82	6,73	7,45	8,91	10,00	10,36											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	9	18	20	24	25	31	36											
		Anteil in %	0,00	1,64	3,27	3,64	4,36	4,55	5,64	6,55											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	12	21	27	34	38	38	40											
Anteil %		0,36	2,18	3,82	4,91	6,18	6,91	6,91	7,27												
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	550	530	474	421	389	362	335	309											
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	530	474	421	389	362	335	309	288											
2009-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	22	52	87	111	135	148	164												
		Anteil in %	5,57	13,16	22,03	28,10	34,18	37,47	41,52												
		CI Anteil in %	[3,31; 7,83]	[9,83; 16,50]	[17,93; 26,12]	[23,66; 32,54]	[29,49; 38,86]	[32,69; 42,25]	[36,65; 46,38]												
	davon wegen Tod	Anzahl	5	17	30	44	58	64	77												
		Anteil in %	1,27	4,30	7,59	11,14	14,68	16,20	19,49												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	14	21	30	34	36	40	40												
		Anteil in %	3,54	5,32	7,59	8,61	9,11	10,13	10,13												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	3	5	12	15	17	20	20												
		Anteil in %	0,76	1,27	3,04	3,80	4,30	5,06	5,06												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	0	9	15	18	24	24	27												
Anteil %		0,00	2,28	3,80	4,56	6,08	6,08	6,84													
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	395	373	343	308	284	260	247												
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	373	343	308	284	260	231													
2009-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	30	76	115	139	158	177													
		Anteil in %	6,76	17,12	25,90	31,31	35,59	39,86													
		CI Anteil in %	[4,42; 9,09]	[13,61; 20,62]	[21,82; 29,98]	[26,99; 35,62]	[31,13; 40,04]	[35,31; 44,42]													
	davon wegen Tod	Anzahl	12	29	47	62	71	82													
		Anteil in %	2,70	6,53	10,59	13,96	15,99	18,47													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	12	25	34	38	42	44													
		Anteil in %	2,70	5,63	7,66	8,56	9,46	9,91													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	4	13	20	22	24	27													
		Anteil in %	0,90	2,93	4,50	4,95	5,41	6,08													
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	9	14	17	21	24													
Anteil %		0,45	2,03	3,15	3,83	4,73	5,41														
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	444	414	368	329	305	286													
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	414	368	329	305	286	267													
2010-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	29	77	120	149	172														
		Anteil in %	6,18	16,42	25,59	31,77	36,67														
		CI Anteil in %	[4,00; 8,37]	[13,06; 19,77]	[21,63; 29,54]	[27,55; 35,99]	[32,31; 41,04]														
	davon wegen Tod	Anzahl	4	27	48	61	73														
		Anteil in %	0,85	5,76	10,23	13,01	15,57														
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	13	22	31	36	39														
		Anteil in %	2,77	4,69	6,61	7,68	8,32														
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	4	15	20	29	32														
		Anteil in %	0,85	3,20	4,26	6,18	6,82														
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	8	13	21	23	28														
Anteil %		1,71	2,77	4,48	4,90	5,97															
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	469	440	392	349	320														
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	440	392	349	320	297														

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2010-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	23	70	114	140															
		Anteil in %	4,93	14,99	24,41	29,98															
		CI Anteil in %	[2,96; 6,89]	[11,75; 18,23]	[20,51; 28,31]	[25,82; 34,14]															
	davon wegen Tod	Anzahl	11	28	44	60															
		Anteil in %	2,36	6,00	9,42	12,85															
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	9	29	41	43															
		Anteil in %	1,93	6,21	8,78	9,21															
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	6	17	22															
		Anteil in %	0,21	1,28	3,64	4,71															
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	7	12	15															
Anteil %		0,43	1,50	2,57	3,21																
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	467	444	397	353															
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	444	397	353	327															
2011-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	34	75	112																
		Anteil in %	7,74	17,08	25,51																
		CI Anteil in %	[5,24; 10,25]	[13,56; 20,61]	[21,43; 29,60]																
	davon wegen Tod	Anzahl	6	28	46																
		Anteil in %	1,37	6,38	10,48																
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	22	33	36																
		Anteil in %	5,01	7,52	8,20																
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	7	17																
		Anteil in %	0,23	1,59	3,87																
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	5	7	13																
Anteil %		1,14	1,59	2,96																	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	439	405	364																
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	405	364	327																
2011-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	18	54																	
		Anteil in %	4,30	12,89																	
		CI Anteil in %	[2,35; 6,24]	[9,68; 16,10]																	
	davon wegen Tod	Anzahl	3	20																	
		Anteil in %	0,72	4,77																	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	11	15																	
		Anteil in %	2,63	3,58																	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	12																	
		Anteil in %	0,48	2,86																	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	7																	
Anteil %		0,48	1,67																		
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	419	401																	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	401	365																	
2012-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	12																		
		Anteil in %	2,72																		
		CI Anteil in %	[1,20; 4,24]																		
	davon wegen Tod	Anzahl	6																		
		Anteil in %	1,36																		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	4																		
		Anteil in %	0,91																		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1																		
		Anteil in %	0,23																		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1																		
Anteil %		0,23																			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	441																		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	429																		

In Tabelle B.1.4 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmer** zur Erstdokumentation ausgewiesen. Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem steht für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

In der Kohorte 2003-1 starteten 2536 Teilnehmer in das Programm. Ihr durchschnittliches Alter betrug im Beitrittsjahr 70,55 Jahre, der Median lag bei 71,00 Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle B.1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitrittsjahr
2003-1	Mean	70,55
	CI Mean	[70,21; 70,90]
	Median	71,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>2536</i>
2003-2	Mean	69,10
	CI Mean	[68,71; 69,49]
	Median	70,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>2071</i>
2004-1	Mean	68,93
	CI Mean	[68,29; 69,57]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>870</i>
2004-2	Mean	69,15
	CI Mean	[68,45; 69,84]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>659</i>
2005-1	Mean	70,49
	CI Mean	[69,86; 71,12]
	Median	71,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>859</i>
2005-2	Mean	70,66
	CI Mean	[70,14; 71,19]
	Median	72,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>1182</i>
2006-1	Mean	70,48
	CI Mean	[69,96; 71,00]
	Median	71,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>1328</i>
2006-2	Mean	70,42
	CI Mean	[69,99; 70,86]
	Median	71,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>1803</i>
2007-1	Mean	71,79
	CI Mean	[71,37; 72,20]
	Median	73,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>2076</i>
2007-2	Mean	71,04
	CI Mean	[70,46; 71,61]
	Median	72,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>1157</i>

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitrittsjahr
2008-1	Mean	71,23
	CI Mean	[70,58; 71,88]
	Median	72,00
	<i>Fallbasis</i>	927
2008-2	Mean	69,98
	CI Mean	[69,07; 70,90]
	Median	72,00
	<i>Fallbasis</i>	550
2009-1	Mean	70,32
	CI Mean	[69,24; 71,40]
	Median	72,00
	<i>Fallbasis</i>	395
2009-2	Mean	71,06
	CI Mean	[70,07; 72,04]
	Median	73,00
	<i>Fallbasis</i>	444
2010-1	Mean	71,53
	CI Mean	[70,53; 72,52]
	Median	73,00
	<i>Fallbasis</i>	469
2010-2	Mean	70,75
	CI Mean	[69,77; 71,73]
	Median	72,00
	<i>Fallbasis</i>	467
2011-1	Mean	70,59
	CI Mean	[69,59; 71,58]
	Median	72,00
	<i>Fallbasis</i>	439
2011-2	Mean	69,32
	CI Mean	[68,27; 70,38]
	Median	71,00
	<i>Fallbasis</i>	419
2012-1	Mean	70,67
	CI Mean	[69,66; 71,67]
	Median	72,00
	<i>Fallbasis</i>	441

In Tabelle B.1.5 ist die **Altersverteilung nach Alterskategorien** für alle Patienten im Beitrittsjahr ausgewiesen. Dargestellt sind die absoluten Anzahlen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem ist zu beachten, dass für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung steht. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird

Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

In der Kohorte 2003-1 entfielen im Beitrittsjahr 915 Patienten auf die Altersklasse "61 bis 70" Jahre.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle B.1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitrittsjahr
2003-1	bis 50	62
	51 bis 60	239
	61 bis 70	915
	71 bis 80	989
	81 und älter	331
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>2536</i>
2003-2	bis 50	71
	51 bis 60	249
	61 bis 70	807
	71 bis 80	757
	81 und älter	187
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>2071</i>
2004-1	bis 50	37
	51 bis 60	101
	61 bis 70	338
	71 bis 80	303
	81 und älter	91
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>870</i>
2004-2	bis 50	24
	51 bis 60	78
	61 bis 70	247
	71 bis 80	254
	81 und älter	56
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>659</i>
2005-1	bis 50	25
	51 bis 60	91
	61 bis 70	295
	71 bis 80	326
	81 und älter	122
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>859</i>
2005-2	bis 50	37
	51 bis 60	124
	61 bis 70	385
	71 bis 80	478
	81 und älter	158
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1182</i>
2006-1	bis 50	54
	51 bis 60	115
	61 bis 70	454
	71 bis 80	523
	81 und älter	182
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1328</i>
2006-2	bis 50	51
	51 bis 60	205
	61 bis 70	606
	71 bis 80	692
	81 und älter	249
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1803</i>

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitrittsjahr
2007-1	bis 50	59
	51 bis 60	199
	61 bis 70	583
	71 bis 80	867
	81 und älter	368
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>2076</i>
2007-2	bis 50	43
	51 bis 60	119
	61 bis 70	333
	71 bis 80	458
	81 und älter	204
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1157</i>
2008-1	bis 50	32
	51 bis 60	121
	61 bis 70	242
	71 bis 80	363
	81 und älter	169
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>927</i>
2008-2	bis 50	28
	51 bis 60	84
	61 bis 70	138
	71 bis 80	210
	81 und älter	90
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>550</i>
2009-1	bis 50	17
	51 bis 60	64
	61 bis 70	100
	71 bis 80	141
	81 und älter	73
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>395</i>
2009-2	bis 50	27
	51 bis 60	52
	61 bis 70	106
	71 bis 80	179
	81 und älter	80
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>444</i>
2010-1	bis 50	24
	51 bis 60	62
	61 bis 70	98
	71 bis 80	182
	81 und älter	103
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>469</i>
2010-2	bis 50	19
	51 bis 60	68
	61 bis 70	120
	71 bis 80	169
	81 und älter	91
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>467</i>
2011-1	bis 50	19
	51 bis 60	63
	61 bis 70	104
	71 bis 80	178
	81 und älter	75
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>439</i>
2011-2	bis 50	24
	51 bis 60	74
	61 bis 70	108
	71 bis 80	152
	81 und älter	61
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>419</i>

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitrittsjahr
2012-1	bis 50	19
	51 bis 60	74
	61 bis 70	92
	71 bis 80	180
	81 und älter	76
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>441</i>

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle B.1.8 noch diejenigen Patienten aufgeführt, für die im jeweils betrachteten Berichtshalbjahr **kein medizinischer Dokumentationsbogen** vorlag. Diese Patienten wurden bei den medizinischen Auswertungen nicht berücksichtigt. Für das Beitrittsjahr sind keine Patienten mit fehlender medizinischer Dokumentation ausgewiesen, da definitionsgemäß nur Patienten mit Erstdokumentation in die Evaluation einfließen können.

In der Kohorte 2003-1 waren im letzten Berichtshalbjahr 390 Patienten in das Programm eingeschrieben. Bei 4 von Ihnen bzw. 1,03 Prozent lagen im letzten Berichtshalbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle B.1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2536	2267	1979	1753	1566	1413	1283	1072	963	857	793	715	644	597	549	500	460	427	390
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		473	115	40	53	32	68	33	38	29	50	35	26	27	14	10	15	9	4
		Anteil in %			20,86	5,81	2,28	3,38	2,26	5,30	3,08	3,95	3,38	6,31	4,90	4,04	4,52	2,55	2,00	3,26	2,11
	CI Anteil in %		[19,19; 22,54]	[4,78; 6,84]	[1,58; 2,98]	[2,49; 4,28]	[1,49; 3,04]	[4,07; 6,53]	[2,04; 4,11]	[2,72; 5,18]	[2,17; 4,60]	[4,61; 8,00]	[3,31; 6,48]	[2,52; 5,56]	[2,85; 6,19]	[1,23; 3,87]	[0,77; 3,23]	[1,64; 4,89]	[0,74; 3,47]	[0,02; 2,03]	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	2071	1748	1572	1402	1268	1130	975	882	803	754	690	652	609	565	530	490	454	430	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		141	48	45	38	46	32	36	20	41	33	29	20	24	15	20	14	18	
		Anteil in %			8,07	3,05	3,21	3,00	4,07	3,28	4,08	2,49	5,44	4,78	4,45	3,28	4,25	2,83	4,08	3,08	4,19
	CI Anteil in %		[6,79; 9,34]	[2,20; 3,90]	[2,29; 4,13]	[2,06; 3,94]	[2,92; 5,22]	[2,16; 4,40]	[2,78; 5,39]	[1,41; 3,57]	[3,82; 7,06]	[3,19; 6,38]	[2,86; 6,03]	[1,87; 4,70]	[2,58; 5,91]	[1,42; 4,24]	[2,33; 5,84]	[1,49; 4,68]	[2,29; 6,08]		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	870	773	679	599	529	476	440	387	360	337	309	282	258	243	227	210	198	198	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		42	39	32	25	12	29	9	23	22	22	19	14	8	11	11	13		
		Anteil in %			5,43	5,74	5,34	4,73	2,52	6,59	2,33	6,39	6,53	7,12	6,74	5,43	3,29	4,85	5,24	6,57	
	CI Anteil in %		[3,83; 7,03]	[3,99; 7,50]	[3,54; 7,14]	[2,92; 6,54]	[1,11; 3,93]	[4,27; 8,91]	[0,82; 3,83]	[3,86; 8,92]	[3,89; 9,17]	[4,25; 9,99]	[3,81; 9,67]	[2,66; 8,20]	[1,04; 5,54]	[2,05; 7,65]	[2,22; 8,26]	[3,11; 10,02]			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	659	590	532	467	416	372	339	320	297	273	262	246	228	213	206	191	191		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		34	23	19	40	34	34	52	38	29	38	38	29	33	28	30			
		Anteil in %			5,76	4,32	4,07	9,62	9,14	10,03	16,25	12,79	10,62	14,50	15,45	12,72	15,49	13,59	15,71		
	CI Anteil in %		[3,88; 7,64]	[2,59; 6,05]	[2,27; 5,86]	[6,78; 12,45]	[6,21; 12,07]	[6,83; 13,23]	[12,20; 20,30]	[8,99; 16,60]	[6,96; 14,28]	[10,23; 18,78]	[10,92; 19,97]	[8,38; 17,05]	[10,62; 20,36]	[8,90; 18,28]	[10,53; 20,88]				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	859	795	730	633	558	489	457	414	387	358	333	307	279	254	233	233	233		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		33	57	27	28	18	29	17	25	16	14	18	14	12	9				
		Anteil in %			4,15	7,81	4,27	5,02	3,68	6,35	4,11	6,46	4,47	4,20	5,86	5,02	4,72	3,86			
	CI Anteil in %		[2,76; 5,54]	[5,86; 9,76]	[2,69; 5,84]	[3,20; 6,83]	[2,01; 5,35]	[4,11; 8,58]	[2,19; 6,02]	[4,01; 8,91]	[2,33; 6,61]	[2,05; 6,36]	[3,23; 8,50]	[2,45; 7,58]	[2,11; 7,34]	[1,38; 6,34]					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1182	1074	947	842	734	687	622	577	528	478	442	410	378	340	340	340	340		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		62	39	47	24	42	34	28	26	24	18	18	19	17					
		Anteil in %			5,77	4,12	5,58	3,27	6,11	5,47	4,85	4,92	5,02	4,07	4,39	5,03					
	CI Anteil in %		[4,38; 7,17]	[2,85; 5,38]	[4,03; 7,13]	[1,98; 4,56]	[4,32; 7,91]	[3,68; 7,25]	[3,10; 6,61]	[3,08; 6,77]	[3,06; 6,98]	[2,23; 5,92]	[2,40; 6,38]	[2,82; 7,23]	[2,68; 7,32]						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1328	1241	1122	1007	928	844	793	715	659	606	566	516	473	473	473	473	473		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		43	57	38	63	40	58	35	30	20	29	27	14						
		Anteil in %			3,46	5,08	3,77	6,79	4,74	7,31	4,90	4,55	3,30	5,12	5,23	2,96					
	CI Anteil in %		[2,45; 4,48]	[3,79; 6,37]	[2,60; 4,95]	[5,17; 8,41]	[3,30; 6,17]	[5,50; 9,13]	[3,31; 6,48]	[2,96; 6,15]	[1,88; 4,72]	[3,31; 6,94]	[3,31; 7,16]	[1,43; 4,49]							
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1803	1704	1527	1413	1260	1159	1061	964	878	811	753	696	696	696	696	696	696		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		133	93	113	113	85	69	52	37	43	39	39							
		Anteil in %			7,81	6,09	8,00	8,97	7,33	6,50	5,39	4,21	5,30	5,18	5,60						
	CI Anteil in %		[6,53; 9,08]	[4,89; 7,29]	[6,58; 9,41]	[7,39; 10,55]	[5,83; 8,84]	[5,02; 7,99]	[3,97; 6,82]	[2,88; 5,54]	[3,76; 6,85]	[3,60; 6,76]	[3,89; 7,31]								
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2076	1926	1782	1605	1459	1307	1216	1116	1038	958	865	865	865	865	865	865	865		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		82	136	121	97	64	58	61	73	54	58								
		Anteil in %			4,26	7,63	7,54	6,65	4,90	4,77	5,47	7,03	5,64	6,71							
	CI Anteil in %		[3,36; 5,16]	[6,40; 8,87]	[6,25; 8,83]	[5,37; 7,93]	[3,73; 6,07]	[3,57; 5,97]	[4,13; 6,80]	[5,48; 8,59]	[4,18; 7,10]	[5,04; 8,37]									
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1157	1093	978	888	770	700	618	562	513	476	476	476	476	476	476	476	476		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		79	114	89	62	48	40	26	31	31									
		Anteil in %			7,23	11,66	10,02	8,05	6,86	6,47	4,63	6,04	6,51								
	CI Anteil in %		[5,69; 8,76]	[9,64; 13,67]	[8,05; 12,00]	[6,13; 9,98]	[4,98; 8,73]	[4,53; 8,41]	[2,89; 6,36]	[3,98; 8,11]	[4,29; 8,73]										
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	927	876	802	707	644	585	539	486	458	458	458	458	458	458	458	458	458		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		62	54	46	44	34	34	18	21										
		Anteil in %			7,08	6,73	6,51	6,83	5,81	6,31	3,70	4,59									
	CI Anteil in %		[5,38; 8,78]	[5,00; 8,47]	[4,69; 8,33]	[4,88; 8,78]	[3,91; 7,71]	[4,25; 8,36]	[2,02; 5,38]	[2,67; 6,50]											
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	550	530	474	421	389	362	335	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		39	38	22	19	16	23	22											
		Anteil in %			7,36	8,02	5,23	4,88	4,42	6,87	7,12										
	CI Anteil in %		[5,13; 9,58]	[5,57; 10,46]	[3,10; 7,35]	[2,74; 7,03]	[2,30; 6,54]	[4,15; 9,58]	[4,25; 9,99]												

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr			
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	395	373	343	308	284	260	247														
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		19	19	15	6	9	7														
		Anteil in %			5,09	5,54	4,87	2,11	3,46	2,83													
		CI Anteil in %			[2,86; 7,33]	[3,12; 7,96]	[2,46; 7,28]	[0,44; 3,79]	[1,24; 5,69]	[0,76; 4,91]													
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	444	414	368	329	305	286															
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		20	21	10	7	11															
		Anteil in %			4,83	5,71	3,04	2,30	3,85														
		CI Anteil in %			[2,76; 6,90]	[3,33; 8,08]	[1,18; 4,90]	[0,61; 3,98]	[1,61; 6,08]														
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	469	440	392	349	320																
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		15	20	21	10																
		Anteil in %			3,41	5,10	6,02	3,13															
		CI Anteil in %			[1,71; 5,11]	[2,92; 7,28]	[3,52; 8,52]	[1,22; 5,03]															
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	467	444	397	353																	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		12	27	17																	
		Anteil in %			2,70	6,80	4,82																
		CI Anteil in %			[1,19; 4,21]	[4,32; 9,28]	[2,58; 7,05]																
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	439	405	364																		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		19	24																		
		Anteil in %			4,69	6,59																	
		CI Anteil in %			[2,63; 6,75]	[4,04; 9,15]																	
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	419	401																			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		16																			
		Anteil in %			3,99																		
		CI Anteil in %			[2,07; 5,91]																		
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	441																				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl																					
		Anteil in %																					
		CI Anteil in %																					

Auswertungskapitel B.3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung

Ein wesentliches Ziel der Evaluation besteht in der Überprüfung der medizinischen Versorgungsqualität der DMP-Patienten. Hierzu werden die patientenbezogenen Angaben zum Krankheitsverlauf nach der Einschreibung in das DMP aus den Dokumentationen der Leistungserbringer ausgewertet.

Die standardisierten Tabellen für den Evaluationsbericht weisen die patientenbezogenen Ergebnisse nach Kohorten getrennt für die folgenden Bereiche und Variablen aus:

Risikofaktoren

- Raucherstatus
- Hypertonus

Laborwerte

- HbA1c-Werte

B.3.1 Risikofaktoren

In diesem Kapitel werden Auswertungen zu zwei Variablen dargestellt. Die Tabelle „Patienten und ihr Body-Mass-Index“ entfällt für die Auswertung nach Subkohorten. Das Kapitel B.3.1 beginnt daher mit der Tabelle B.3.1.2. Zunächst werden Auswertungen zum Raucherstatus vorgenommen. Rauchen stellt einen der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen dar. Eine Reduktion des Raucheranteils der DMP-Patienten ist demnach eine wichtige Zielsetzung der Behandlung.

Schließlich werden Angaben zum Bluthochdruck bzw. Hypertonus gemacht, da dieser eine bedeutende Begleiterkrankung des Diabetes mit potenzierenden negativen Effekten auf die Herz-Kreislaufmorbidity und -mortalität ist. Eine Senkung des Blutdrucks in den Normbereich bei den DMP-Patienten mit erhöhten Blutdruckwerten ist demnach eine weitere wichtige Zielsetzung der Behandlung.

In Tabelle B.3.1.2 wird die Entwicklung des Raucherstatus für die Gruppe der **Raucher (Kollektivmitglieder insgesamt) laut Erstdokumentation** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Raucher waren.

Zunächst wird für jede Kohorte unter „Kollektivmitglieder insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten aus der Gruppe der Raucher im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an dieser Gruppe ist. Da der Anteil der Raucher im Beitrittsjahr definitionsgemäß bei 100 Prozent liegt, wird auf eine Darstellung dieser Information verzichtet.

In der Kohorte 2003-1 waren laut Erstdokumentation 210 Personen Raucher. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für 25 Patienten aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation Angaben vor. Davon waren im letzten Berichtshalbjahr noch 60,00 Prozent Raucher.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle B.3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2003-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	210	181	153	134	124	111	100	85	78	65	61	55	51	45	39	33	30	29	25
	auswertbar	Anzahl		143	144	132	117	110	97	82	78	63	56	50	50	41	38	32	30	27	25
	Raucher	Anzahl		116	116	98	80	74	57	44	45	35	32	33	33	26	23	20	19	16	15
		Anteil in %		81,12	80,56	74,24	68,38	67,27	58,76	53,66	57,69	55,56	57,14	66,00	66,00	63,41	60,53	62,50	63,33	59,26	60,00
		CI Anteil in %		[74,68; 87,56]	[74,07; 87,04]	[66,75; 81,73]	[59,91; 76,84]	[58,46; 76,08]	[48,92; 68,61]	[42,80; 64,52]	[46,66; 68,73]	[43,19; 67,92]	[44,06; 70,22]	[52,74; 79,26]	[52,74; 79,26]	[48,49; 78,34]	[44,78; 76,28]	[45,46; 79,54]	[45,79; 80,87]	[40,37; 78,15]	[40,40; 79,60]
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2536</i>	<i>2267</i>	<i>1979</i>	<i>1753</i>	<i>1566</i>	<i>1413</i>	<i>1283</i>	<i>1072</i>	<i>963</i>	<i>857</i>	<i>793</i>	<i>715</i>	<i>644</i>	<i>597</i>	<i>549</i>	<i>500</i>	<i>460</i>	<i>427</i>	<i>390</i>	
2003-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	176	148	130	116	100	88	74	68	62	57	56	53	50	44	40	40	37	36	
	auswertbar	Anzahl		134	125	113	96	84	72	66	60	55	50	52	45	41	39	38	36	35	
	Raucher	Anzahl		113	92	77	64	53	48	40	36	31	24	27	23	23	23	21	19	19	
		Anteil in %		84,33	73,60	68,14	66,67	63,10	66,67	60,61	60,00	56,36	48,00	51,92	51,11	56,10	58,97	55,26	52,78	54,29	
		CI Anteil in %		[78,15; 90,51]	[65,84; 81,36]	[59,51; 76,77]	[57,19; 76,15]	[52,71; 73,48]	[55,70; 77,63]	[48,73; 72,48]	[47,50; 72,50]	[43,14; 69,59]	[34,01; 61,99]	[38,21; 65,64]	[36,34; 65,88]	[40,72; 71,48]	[43,33; 74,61]	[39,24; 71,28]	[36,24; 69,32]	[37,54; 71,03]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2071</i>	<i>1748</i>	<i>1572</i>	<i>1402</i>	<i>1268</i>	<i>1130</i>	<i>975</i>	<i>882</i>	<i>803</i>	<i>754</i>	<i>690</i>	<i>652</i>	<i>609</i>	<i>565</i>	<i>530</i>	<i>490</i>	<i>454</i>	<i>430</i>		
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	81	72	65	57	48	44	37	33	28	26	26	21	18	15	13	11	11		
	auswertbar	Anzahl		67	62	52	46	44	35	33	28	26	24	19	18	16	14	11	11		
	Raucher	Anzahl		50	46	42	35	31	26	24	18	16	16	10	10	11	8	7	7		
		Anteil in %		74,63	74,19	80,77	76,09	70,45	74,29	72,73	64,29	61,54	66,67	52,63	55,56	68,75	57,14	63,64	63,64		
		CI Anteil in %		[64,13; 85,13]	[63,21; 85,17]	[69,95; 91,59]	[63,62; 88,55]	[56,82; 84,09]	[59,59; 88,98]	[57,30; 88,16]	[46,21; 82,36]	[42,47; 80,61]	[47,40; 85,93]	[29,56; 75,70]	[31,93; 79,18]	[45,29; 92,21]	[30,24; 84,04]	[33,82; 93,45]	[33,82; 93,45]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>870</i>	<i>773</i>	<i>679</i>	<i>599</i>	<i>529</i>	<i>476</i>	<i>440</i>	<i>387</i>	<i>360</i>	<i>337</i>	<i>309</i>	<i>282</i>	<i>258</i>	<i>243</i>	<i>227</i>	<i>210</i>	<i>198</i>			
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	52	40	35	30	26	24	21	19	17	17	16	16	13	12	12	10			
	auswertbar	Anzahl		37	34	30	26	24	21	16	15	16	15	14	13	12	11	10			
	Raucher	Anzahl		32	27	22	20	14	12	10	9	10	9	9	8	6	5	4			
		Anteil in %		86,49	79,41	73,33	76,92	58,33	57,14	62,50	60,00	62,50	60,00	64,29	61,54	50,00	45,45	40,00			
		CI Anteil in %		[75,32; 97,65]	[65,62; 93,21]	[57,24; 89,43]	[60,41; 93,44]	[38,18; 78,48]	[35,45; 78,83]	[38,00; 87,00]	[34,34; 85,66]	[38,00; 87,00]	[34,34; 85,66]	[38,24; 90,33]	[34,01; 89,07]	[20,45; 79,55]	[14,59; 76,32]	[7,99; 72,01]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>659</i>	<i>590</i>	<i>532</i>	<i>467</i>	<i>416</i>	<i>372</i>	<i>339</i>	<i>320</i>	<i>297</i>	<i>273</i>	<i>262</i>	<i>246</i>	<i>228</i>	<i>213</i>	<i>206</i>	<i>191</i>				
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	68	61	54	49	43	38	37	35	33	31	29	28	25	23	18				
	auswertbar	Anzahl		60	51	45	40	37	35	35	33	29	28	26	25	21	18				
	Raucher	Anzahl		50	36	28	26	22	21	20	19	18	18	17	16	13	11				
		Anteil in %		83,33	70,59	62,22	65,00	59,46	60,00	57,14	57,58	62,07	64,29	65,38	64,00	61,90	61,11				
		CI Anteil in %		[73,82; 92,84]	[57,96; 83,22]	[47,90; 76,55]	[50,03; 79,97]	[43,42; 75,50]	[43,53; 76,47]	[40,51; 73,78]	[40,45; 74,70]	[44,10; 80,04]	[46,21; 82,36]	[46,74; 84,03]	[44,80; 83,20]	[40,62; 83,19]	[37,94; 84,29]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>859</i>	<i>795</i>	<i>730</i>	<i>633</i>	<i>558</i>	<i>489</i>	<i>457</i>	<i>414</i>	<i>387</i>	<i>358</i>	<i>333</i>	<i>307</i>	<i>279</i>	<i>254</i>	<i>233</i>					
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	100	91	81	73	59	57	52	48	46	41	37	32	30	29					
	auswertbar	Anzahl		89	73	68	57	53	48	45	42	37	34	31	29	26					
	Raucher	Anzahl		73	47	44	33	30	28	25	23	21	19	17	17	18					
		Anteil in %		82,02	64,38	64,71	57,89	56,60	58,33	55,56	54,76	56,76	55,88	54,84	58,62	69,23					
		CI Anteil in %		[74,00; 90,05]	[53,32; 75,44]	[53,26; 76,15]	[44,96; 70,83]	[43,13; 70,07]	[44,24; 72,43]	[40,87; 70,24]	[39,53; 70,00]	[40,57; 72,94]	[38,94; 72,82]	[37,03; 72,65]	[40,38; 76,86]	[51,14; 87,32]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1182</i>	<i>1074</i>	<i>947</i>	<i>842</i>	<i>734</i>	<i>687</i>	<i>622</i>	<i>577</i>	<i>528</i>	<i>478</i>	<i>442</i>	<i>410</i>	<i>378</i>	<i>340</i>						
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	103	94	79	66	57	53	46	38	34	32	30	27	25						
	auswertbar	Anzahl		89	72	63	50	49	38	36	32	31	28	25	25						
	Raucher	Anzahl		76	53	46	37	31	22	20	18	18	16	14	15						
		Anteil in %		85,39	73,61	73,02	74,00	63,27	57,89	55,56	56,25	58,06	57,14	56,00	60,00						
		CI Anteil in %		[78,01; 92,77]	[63,36; 83,86]	[61,97; 84,06]	[61,72; 86,28]	[49,63; 76,90]	[41,99; 73,80]	[39,09; 72,02]	[38,79; 73,71]	[40,41; 75,72]	[38,48; 75,81]	[36,14; 75,86]	[40,40; 79,60]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1328</i>	<i>1241</i>	<i>1122</i>	<i>1007</i>	<i>928</i>	<i>844</i>	<i>793</i>	<i>715</i>	<i>659</i>	<i>606</i>	<i>566</i>	<i>516</i>	<i>473</i>							

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	159	146	131	117	106	101	93	89	80	71	64	58						
	auswertbar	Anzahl		138	121	107	100	92	85	81	75	64	60	55						
	Raucher	Anzahl		115	92	79	62	57	59	51	46	41	35	34						
		Anteil in %		83,33	76,03	73,83	62,00	61,96	69,41	62,96	61,33	64,06	58,33	61,82						
		CI Anteil in %		[77,09; 89,57]	[68,40; 83,67]	[65,46; 82,20]	[52,44; 71,56]	[51,98; 71,93]	[59,56; 79,27]	[52,38; 73,55]	[50,24; 72,43]	[52,21; 75,91]	[45,75; 70,91]	[48,86; 74,78]						
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1803</i>	<i>1704</i>	<i>1527</i>	<i>1413</i>	<i>1260</i>	<i>1159</i>	<i>1061</i>	<i>964</i>	<i>878</i>	<i>811</i>	<i>753</i>	<i>696</i>						
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	185	171	158	143	134	118	111	101	95	85	77							
	auswertbar	Anzahl		161	142	132	122	110	104	92	87	77	70							
	Raucher	Anzahl		132	116	108	102	88	82	73	70	61	54							
		Anteil in %		81,99	81,69	81,82	83,61	80,00	78,85	79,35	80,46	79,22	77,14							
		CI Anteil in %		[76,03; 87,94]	[75,31; 88,07]	[75,21; 88,42]	[77,01; 90,20]	[72,49; 87,51]	[70,96; 86,73]	[71,03; 87,67]	[72,08; 88,84]	[70,10; 88,34]	[67,23; 87,05]							
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2076</i>	<i>1926</i>	<i>1782</i>	<i>1605</i>	<i>1459</i>	<i>1307</i>	<i>1216</i>	<i>1116</i>	<i>1038</i>	<i>958</i>	<i>865</i>							
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	100	97	89	82	67	61	54	47	44	42								
	auswertbar	Anzahl		93	75	71	62	56	48	46	43	38								
	Raucher	Anzahl		78	55	52	44	37	34	32	30	26								
		Anteil in %		83,87	73,33	73,24	70,97	66,07	70,83	69,57	69,77	68,42								
		CI Anteil in %		[76,36; 91,39]	[63,26; 83,41]	[62,87; 83,61]	[59,58; 82,36]	[53,56; 78,58]	[57,84; 83,83]	[56,12; 83,01]	[55,88; 83,66]	[53,44; 83,40]								
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1157</i>	<i>1093</i>	<i>978</i>	<i>888</i>	<i>770</i>	<i>700</i>	<i>618</i>	<i>562</i>	<i>513</i>	<i>476</i>								
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	107	99	93	80	75	67	63	58	56									
	auswertbar	Anzahl		96	81	74	72	63	57	56	51									
	Raucher	Anzahl		82	69	65	60	53	49	48	42									
		Anteil in %		85,42	85,19	87,84	83,33	84,13	85,96	85,71	82,35									
		CI Anteil in %		[78,32; 92,51]	[77,40; 92,97]	[80,34; 95,34]	[74,66; 92,00]	[75,03; 93,22]	[76,87; 95,06]	[76,47; 94,96]	[71,79; 92,92]									
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>927</i>	<i>876</i>	<i>802</i>	<i>707</i>	<i>644</i>	<i>585</i>	<i>539</i>	<i>486</i>	<i>458</i>									
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	63	60	54	49	46	44	39	36										
	auswertbar	Anzahl		55	50	46	45	44	37	36										
	Raucher	Anzahl		52	46	42	40	39	33	32										
		Anteil in %		94,55	92,00	91,30	88,89	88,64	89,19	88,89										
		CI Anteil in %		[88,49; 100,00]	[84,40; 99,60]	[83,07; 99,54]	[79,60; 98,17]	[79,15; 98,12]	[79,05; 99,33]	[78,48; 99,30]										
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>550</i>	<i>530</i>	<i>474</i>	<i>421</i>	<i>389</i>	<i>362</i>	<i>335</i>	<i>309</i>										
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	47	44	42	36	33	28	28											
	auswertbar	Anzahl		42	39	33	31	28	27											
	Raucher	Anzahl		40	37	31	29	27	24											
		Anteil in %		95,24	94,87	93,94	93,55	96,43	88,89											
		CI Anteil in %		[88,72; 100,00]	[87,86; 100,00]	[85,67; 100,00]	[84,76; 100,00]	[89,43; 100,00]	[76,81; 100,00]											
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>395</i>	<i>373</i>	<i>343</i>	<i>308</i>	<i>284</i>	<i>260</i>	<i>247</i>											
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	53	48	42	37	31	28												
	auswertbar	Anzahl		45	39	35	30	25												
	Raucher	Anzahl		42	35	32	27	22												
		Anteil in %		93,33	89,74	91,43	90,00	88,00												
		CI Anteil in %		[85,96; 100,00]	[80,10; 99,39]	[82,02; 100,00]	[79,08; 100,00]	[75,00; 100,00]												
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>444</i>	<i>414</i>	<i>368</i>	<i>329</i>	<i>305</i>	<i>286</i>												
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	54	50	45	39	37													
	auswertbar	Anzahl		48	42	36	36													
	Raucher	Anzahl		47	41	35	34													
		Anteil in %		97,92	97,62	97,22	94,44													
		CI Anteil in %		[93,83; 100,00]	[92,95; 100,00]	[91,78; 100,00]	[86,86; 100,00]													
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>469</i>	<i>440</i>	<i>392</i>	<i>349</i>	<i>320</i>													

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	45	42	39	38																
	auswertbar	Anzahl		42	39	35																
	Raucher	Anzahl		38	35	29																
		Anteil in %		90,48	89,74	82,86																
		CI Anteil in %		[81,49; 99,46]	[80,10; 99,39]	[70,19; 95,53]																
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>467</i>	<i>444</i>	<i>397</i>	<i>353</i>																
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	58	52	47																	
	auswertbar	Anzahl		48	46																	
	Raucher	Anzahl		48	45																	
		Anteil in %		100,00	97,83																	
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]	[93,57; 100,00]																	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>439</i>	<i>405</i>	<i>364</i>																	
2011-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	54	53																		
	auswertbar	Anzahl		49																		
	Raucher	Anzahl		49																		
		Anteil in %		100,00																		
		CI Anteil in %		[100,00; 100,00]																		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>419</i>	<i>401</i>																		
2012-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	63																			
	auswertbar	Anzahl																				
	Raucher	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>441</i>																			

In Tabelle B.3.1.3 werden Anzahl und Anteile der aktuellen **Raucher (Patienten insgesamt)** dokumentiert. Betrachtet werden dabei alle Patienten, also auch diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Nichtraucher waren. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher im jeweiligen Halbjahr dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ist.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts halbjahr 2536 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 2536 der Patienten lagen auswertbare Daten vor. Davon waren 8,28 Prozent Raucher. Im letzten Berichtshalbjahr waren noch 390 Patienten eingeschrieben. Für 386 dieser Patienten lagen auswertbare Daten vor. Davon waren 5,18 Prozent Raucher.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle B.3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte mit primären Endpunkten

EZ	Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2536	2267	1979	1753	1566	1413	1283	1072	963	857	793	715	644	597	549	500	460	427	390
	auswertbar	Anzahl	2536	1794	1864	1713	1513	1381	1215	1039	925	828	743	680	618	570	535	490	445	418	386
	Raucher	Anzahl	210	132	134	149	107	88	75	56	49	41	37	39	37	31	28	25	24	21	20
	Raucher	Anteil in %	8,28	7,36	7,19	8,70	7,07	6,37	6,17	5,39	5,30	4,95	4,98	5,74	5,99	5,44	5,23	5,10	5,39	5,02	5,18
	CI Anteil in %	[7,21; 9,35]	[6,15; 8,57]	[6,02; 8,36]	[7,36; 10,03]	[5,78; 8,36]	[5,08; 7,66]	[4,82; 7,53]	[4,02; 6,76]	[3,85; 6,74]	[3,47; 6,43]	[3,41; 6,55]	[3,99; 7,48]	[4,12; 7,86]	[3,58; 7,30]	[3,34; 7,12]	[3,15; 7,05]	[3,29; 7,49]	[2,93; 7,12]	[2,97; 7,40]	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	2071	1748	1572	1402	1268	1130	975	882	803	754	690	652	609	565	530	490	454	430	
	auswertbar	Anzahl	2071	1607	1524	1357	1230	1084	943	846	783	713	657	623	589	541	515	470	440	412	
	Raucher	Anzahl	176	133	128	93	76	62	56	45	42	32	29	32	28	27	28	24	21	21	
	Raucher	Anteil in %	8,50	8,28	8,40	6,85	6,18	5,72	5,94	5,32	5,36	4,49	4,41	5,14	4,75	4,99	5,44	5,11	4,77	5,10	
	CI Anteil in %	[7,30; 9,70]	[6,93; 9,62]	[7,01; 9,79]	[5,51; 8,20]	[4,83; 7,52]	[4,34; 7,10]	[4,43; 7,45]	[3,81; 6,83]	[3,78; 6,94]	[2,97; 6,01]	[2,84; 5,99]	[3,40; 6,87]	[3,03; 6,47]	[3,15; 6,83]	[3,48; 7,40]	[3,11; 7,10]	[2,78; 6,77]	[2,97; 7,22]		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	870	773	679	599	529	476	440	387	360	337	309	282	258	243	227	210	198		
	auswertbar	Anzahl	870	731	640	567	504	464	411	378	337	315	287	263	244	235	216	199	185		
	Raucher	Anzahl	81	63	55	48	39	34	29	27	22	20	20	14	15	15	12	10	9		
	Raucher	Anteil in %	9,31	8,62	8,59	8,47	7,74	7,33	7,06	7,14	6,53	6,35	6,97	5,32	6,15	6,38	5,56	5,03	4,86		
	CI Anteil in %	[7,38; 11,24]	[6,58; 10,65]	[6,42; 10,77]	[6,17; 10,76]	[5,40; 10,07]	[4,95; 9,70]	[4,58; 9,53]	[4,54; 9,74]	[3,89; 9,17]	[3,65; 9,05]	[4,02; 9,92]	[2,60; 8,04]	[3,13; 9,17]	[3,25; 9,52]	[2,49; 8,62]	[1,98; 8,07]	[1,76; 7,97]			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	659	590	532	467	416	372	339	320	297	273	262	246	228	213	206	191			
	auswertbar	Anzahl	659	556	509	448	376	338	305	268	259	244	224	208	199	180	178	161			
	Raucher	Anzahl	52	38	34	26	22	14	13	10	11	13	11	10	9	8	7	6			
	Raucher	Anteil in %	7,89	6,83	6,68	5,80	5,85	4,14	4,26	3,73	4,25	5,33	4,91	4,81	4,52	4,44	3,93	3,73			
	CI Anteil in %	[5,83; 9,95]	[4,74; 8,93]	[4,51; 8,85]	[3,64; 7,97]	[3,48; 8,23]	[2,01; 6,27]	[1,99; 6,53]	[1,46; 6,00]	[1,79; 6,71]	[2,50; 8,15]	[2,07; 7,75]	[1,89; 7,72]	[1,63; 7,42]	[1,43; 7,46]	[1,07; 6,80]	[0,79; 6,66]				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	859	795	730	633	558	489	457	414	387	358	333	307	279	254	233				
	auswertbar	Anzahl	859	762	673	606	530	471	428	397	362	342	319	289	265	242	224				
	Raucher	Anzahl	68	61	50	36	33	29	26	25	23	21	21	21	19	14	12				
	Raucher	Anteil in %	7,92	8,01	7,43	5,94	6,23	6,16	6,07	6,30	6,35	6,14	6,58	7,27	7,17	5,79	5,36				
	CI Anteil in %	[6,11; 9,72]	[6,08; 9,93]	[5,45; 9,41]	[4,06; 7,82]	[4,17; 8,29]	[3,98; 8,33]	[3,81; 8,34]	[3,90; 8,69]	[3,84; 8,87]	[3,59; 8,69]	[3,86; 9,31]	[4,27; 10,26]	[4,06; 10,28]	[2,84; 8,73]	[2,40; 8,31]					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1182	1074	947	842	734	687	622	577	528	478	442	410	378	340					
	auswertbar	Anzahl	1182	1012	908	795	710	645	588	549	502	454	424	392	359	323					
	Raucher	Anzahl	100	78	49	50	39	33	36	31	29	29	27	23	23	25					
	Raucher	Anteil in %	8,46	7,71	5,40	6,29	5,49	5,12	6,12	5,65	5,78	6,39	6,37	5,87	6,41	7,74					
	CI Anteil in %	[6,87; 10,05]	[6,06; 9,35]	[3,93; 6,87]	[4,60; 7,98]	[3,82; 7,17]	[3,41; 6,82]	[4,18; 8,06]	[3,71; 7,58]	[3,73; 7,82]	[4,14; 8,64]	[4,04; 8,69]	[3,54; 8,20]	[3,87; 8,94]	[4,82; 10,66]						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1328	1241	1122	1007	928	844	793	715	659	606	566	516	473						
	auswertbar	Anzahl	1328	1198	1065	969	865	804	735	680	629	586	537	489	459						
	Raucher	Anzahl	103	87	61	57	45	44	36	31	31	30	27	26	26						
	Raucher	Anteil in %	7,76	7,26	5,73	5,88	5,20	5,47	4,90	4,56	4,93	5,12	5,03	5,32	5,66						
	CI Anteil in %	[6,32; 9,20]	[5,79; 8,73]	[4,33; 7,12]	[4,40; 7,36]	[3,72; 6,68]	[3,90; 7,05]	[3,34; 6,46]	[2,99; 6,13]	[3,24; 6,62]	[3,33; 6,91]	[3,18; 6,88]	[3,33; 7,31]	[3,55; 7,78]							
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1803	1704	1527	1413	1260	1159	1061	964	878	811	753	696							
	auswertbar	Anzahl	1803	1571	1434	1300	1147	1074	992	912	841	768	714	657							
	Raucher	Anzahl	159	132	105	93	84	78	80	75	68	63	58	55							
	Raucher	Anteil in %	8,82	8,40	7,32	7,15	7,32	7,26	8,06	8,22	8,09	8,20	8,12	8,37							
	CI Anteil in %	[7,51; 10,13]	[7,03; 9,77]	[5,97; 8,67]	[5,75; 8,56]	[5,82; 8,83]	[5,71; 8,82]	[6,37; 9,76]	[6,44; 10,01]	[6,24; 9,93]	[6,26; 10,15]	[6,12; 10,13]	[6,25; 10,49]								
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2076	1926	1782	1605	1459	1307	1216	1116	1038	958	865								
	auswertbar	Anzahl	2076	1844	1646	1484	1362	1243	1158	1055	965	904	807								
	Raucher	Anzahl	185	153	133	131	126	107	103	92	90	78	68								
	Raucher	Anteil in %	8,91	8,30	8,08	8,83	9,25	8,61	8,89	8,72	9,33	8,63	8,43								
	CI Anteil in %	[7,69; 10,14]	[7,04; 9,56]	[6,76; 9,40]	[7,38; 10,27]	[7,71; 10,79]	[7,05; 10,17]	[7,25; 10,53]	[7,02; 10,42]	[7,49; 11,16]	[6,80; 10,46]	[6,51; 10,34]									

EZ	Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1157	1093	978	888	770	700	618	562	513	476								
	auswertbar	Anzahl	1157	1014	864	799	708	652	578	536	482	445								
	Raucher	Anzahl	100	87	65	61	54	47	44	45	43	37								
		Anteil in %	8,64	8,58	7,52	7,63	7,63	7,21	7,61	8,40	8,92	8,31								
	CI Anteil in %	[7,02; 10,26]	[6,86; 10,30]	[5,76; 9,28]	[5,79; 9,48]	[5,67; 9,58]	[5,22; 9,20]	[5,45; 9,78]	[6,05; 10,75]	[6,37; 11,47]	[5,75; 10,88]									
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	927	876	802	707	644	585	539	486	458									
	auswertbar	Anzahl	927	814	748	661	600	551	505	468	437									
	Raucher	Anzahl	107	102	87	82	75	65	59	58	52									
		Anteil in %	11,54	12,53	11,63	12,41	12,50	11,80	11,68	12,39	11,90									
	CI Anteil in %	[9,48; 13,60]	[10,25; 14,81]	[9,33; 13,93]	[9,89; 14,92]	[9,85; 15,15]	[9,10; 14,49]	[8,88; 14,49]	[9,40; 15,38]	[8,86; 14,94]										
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	550	530	474	421	389	362	335	309										
	auswertbar	Anzahl	550	491	436	399	370	346	312	287										
	Raucher	Anzahl	63	59	49	47	46	45	40	36										
		Anteil in %	11,45	12,02	11,24	11,78	12,43	13,01	12,82	12,54										
	CI Anteil in %	[8,79; 14,12]	[9,14; 14,90]	[8,27; 14,21]	[8,61; 14,95]	[9,07; 15,80]	[9,46; 16,56]	[9,10; 16,54]	[8,70; 16,38]											
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	395	373	343	308	284	260	247											
	auswertbar	Anzahl	395	354	324	293	278	251	240											
	Raucher	Anzahl	47	43	39	34	33	30	30											
		Anteil in %	11,90	12,15	12,04	11,60	11,87	11,95	12,50											
	CI Anteil in %	[8,70; 15,10]	[8,74; 15,55]	[8,49; 15,59]	[7,93; 15,28]	[8,06; 15,68]	[7,93; 15,97]	[8,31; 16,69]												
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	444	414	368	329	305	286												
	auswertbar	Anzahl	444	394	347	319	298	275												
	Raucher	Anzahl	53	46	40	36	31	25												
		Anteil in %	11,94	11,68	11,53	11,29	10,40	9,09												
	CI Anteil in %	[8,92; 14,96]	[8,50; 14,85]	[8,16; 14,89]	[7,81; 14,76]	[6,93; 13,87]	[5,69; 12,49]													
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	469	440	392	349	320													
	auswertbar	Anzahl	469	425	372	328	310													
	Raucher	Anzahl	54	52	47	38	38													
		Anteil in %	11,51	12,24	12,63	11,59	12,26													
	CI Anteil in %	[8,62; 14,41]	[9,12; 15,35]	[9,25; 16,02]	[8,12; 15,05]	[8,60; 15,91]														
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	467	444	397	353														
	auswertbar	Anzahl	467	432	370	336														
	Raucher	Anzahl	45	44	41	36														
		Anteil in %	9,64	10,19	11,08	10,71														
	CI Anteil in %	[6,96; 12,32]	[7,33; 13,04]	[7,88; 14,28]	[7,40; 14,03]															
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	439	405	364															
	auswertbar	Anzahl	439	386	340															
	Raucher	Anzahl	58	52	50															
		Anteil in %	13,21	13,47	14,71															
	CI Anteil in %	[10,04; 16,38]	[10,06; 16,88]	[10,94; 18,48]																
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	419	401																
	auswertbar	Anzahl	419	385																
	Raucher	Anzahl	54	56																
		Anteil in %	12,89	14,55																
	CI Anteil in %	[9,68; 16,10]	[11,02; 18,07]																	
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	441																	
	auswertbar	Anzahl	441																	
	Raucher	Anzahl	63																	
		Anteil in %	14,29																	
	CI Anteil in %	[11,02; 17,56]																		

In Tabelle B.3.1.4 wird die Entwicklung des Blutdrucks für das Kollektiv der Patienten mit **Hypertonus** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation als Hypertoniker eingestuft wurden.

Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Für jede Kohorte wird unter „Kollektivmitglieder insgesamt“ zunächst die Anzahl derjenigen Hypertoniker laut Anamnesebefund zur ED angegeben, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Alle Kollektivmitglieder, die im jeweiligen Berichtshalbjahr sowohl eine Angabe zum diastolischen als auch zum systolischen Blutdruck und gleichzeitig Angaben zur antihypertensiven Medikation dokumentiert haben, werden in der Zeile ‚auswertbar‘ abgebildet. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der gut eingestellten Kollektivmitglieder (Normotoniker) dokumentiert, bei denen der systolische und der diastolische Blutdruckwert im Normalbereich liegt und es wird gezeigt, wie hoch ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern ist. Außerdem wird ausgewiesen, welcher Anteil dieser gut eingestellten Kollektivmitglieder eine antihypertensive Therapie erhält bzw. nicht erhält.

Anschließend wird die Anzahl der nicht gut eingestellten Kollektivmitglieder (Hypertoniker) ausgewiesen und ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern dargestellt. Die Hypertoniker werden anhand ihrer Blutdruckwerte und in Abhängigkeit davon, ob eine antihypertensive Therapie (AHT) dokumentiert ist in vier Kategorien einsortiert. Den **Kategorien 3 und 4** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und der diastolische Blutdruckwert mindestens die festgelegten Schwellenwerte von 140mmHg (systolisch) bzw. 90 mmHg (diastolisch) erreicht, jedoch um maximal 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet. Den **Kategorien 5 und 6** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und/oder diastolische Blutdruckwert diese Schwellenwerte um mehr als 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet.

Im Beitrittsjahr können die Kategorien 1 und 2 – definitionsgemäß keine Hypertoniker – nicht besetzt sein, da das Kollektiv der Hypertoniker ohne die Patienten gebildet wird, die laut Erstdokumentation in diese Kategorien fallen würden.

Ferner ist zu beachten, dass durch die 9. Risikostrukturausgleichs-Änderungsverordnung eine Änderung in den Dokumentationsmöglichkeiten erfolgte. Bis einschließlich 2004-1 war bei der AHT ein „ja“ oder „nein“ zu dokumentieren. Ab 2004-2 war nur noch das Ankreuzen eines „ja“-Feldes möglich. Dadurch lässt sich in den Daten nicht mehr zwischen „nein“ und „fehlende Angabe“ unterscheiden. Um durchgehend eine einheitliche Rechenregel zu verwenden, sind daher in der Auswertung - unabhängig von den Dokumentationsmöglichkeiten - alle Fälle, in denen bei der AHT kein „ja“ dokumentiert ist, als „nein“ zu werten. In der Tabelle wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den sechs Kategorien über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern angegeben.

In der Tabelle wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den sechs Kategorien über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern angegeben.

In der Kohorte 2003-1 waren von den 2536 anfangs eingeschriebenen Teilnehmern laut Erstdokumentation 2203 Personen Hypertoniker. Im letzten Berichtshalbjahr umfasst dieses Kollektiv noch 336 Personen. Eine im Zeitverlauf abnehmende Anzahl an Hypertonikern kann zwei Ursachen haben: Zum einen kann es sein, dass Patienten aus dem Programm ausscheiden und damit auch keine Kollektivmitglieder mehr sind. Zum anderen kann es sein, dass sich die Blutdruckwerte der Patienten verbessern und sie daher in späteren Berichtshalbjahren den Kategorien 1 oder 2 zuzuordnen sind, also als Kollektivmitglieder ohne Hypertonus gelten. Daher ist neben der absoluten Anzahl der Hypertoniker auch der entsprechende

Anteilswert zu beachten. So lag im letzten Berichtshalbjahr der Hypertonikeranteil bei 34,04 Prozent der dann auswertbaren Kollektivmitglieder.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle B.3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten

* Die Patienten sind in die für sie jeweils höchste, für sie zutreffende Kategorie einzustufen. Die Kategorisierung hat somit mit der höchsten Kategorie zu beginnen, also Kategorie 5 oder 6 (deutlich erhöhter Blutdruck). Die dort eingestuft Patienten können nicht mehr in eine andere Kategorie eingestuft werden etc.

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2203	1969	1724	1524	1361	1227	1115	933	839	743	689	621	560	518	477	433	400	370	336
	auswertbar	Anzahl	2203	1554	1623	1294	1153	1083	948	809	724	642	590	590	537	492	464	424	386	361	332
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	968	760	807	620	550	542	505	447	424	358	374	345	327	287	291	257	243	235	219
		Anteil in %	43,94	48,91	49,72	47,91	47,70	50,05	53,27	55,25	58,56	55,76	63,39	58,47	60,89	58,33	62,72	60,61	62,95	65,10	65,96
		CI Anteil in %	[41,87; 46,01]	[46,42; 51,39]	[47,29; 52,16]	[45,19; 50,64]	[44,82; 50,59]	[47,07; 53,03]	[50,09; 56,45]	[51,82; 58,68]	[54,97; 62,15]	[51,92; 59,61]	[59,50; 67,28]	[54,49; 62,45]	[56,76; 65,03]	[53,97; 62,69]	[58,31; 67,12]	[55,96; 65,27]	[58,13; 67,78]	[60,17; 70,02]	[60,86; 71,07]
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	31	89	87	20	17	9	13	11	5	8	5	6	13	9	9	8	8	5	5
		Anteil in %	1,41	5,73	5,36	1,55	1,47	0,83	1,37	1,36	0,69	1,25	0,85	1,02	2,42	1,83	1,94	1,89	2,07	1,39	1,51
		CI Anteil in %	[0,92; 1,90]	[4,57; 6,88]	[4,26; 6,46]	[0,87; 2,22]	[0,78; 2,17]	[0,29; 1,37]	[0,63; 2,11]	[0,56; 2,16]	[0,09; 1,29]	[0,39; 2,10]	[0,11; 1,59]	[0,21; 1,83]	[1,12; 3,72]	[0,64; 3,01]	[0,68; 3,20]	[0,59; 3,18]	[0,65; 3,50]	[0,18; 2,59]	[0,19; 2,82]
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	937	671	720	600	533	533	492	436	419	350	369	339	314	278	282	249	235	230	214
		Anteil in %	42,53	43,18	44,36	46,37	46,23	49,22	51,90	53,89	57,87	54,52	62,54	57,46	58,47	56,50	60,78	58,73	60,88	63,71	64,46
		CI Anteil in %	[40,47; 44,60]	[40,72; 45,64]	[41,94; 46,78]	[43,65; 49,09]	[43,35; 49,11]	[46,24; 52,19]	[48,72; 55,08]	[50,46; 57,33]	[54,27; 61,47]	[50,66; 58,37]	[58,63; 66,45]	[53,46; 61,45]	[54,30; 62,64]	[52,12; 60,89]	[56,33; 65,22]	[54,03; 63,42]	[56,01; 65,76]	[58,74; 68,68]	[59,30; 69,61]
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1235	794	816	674	603	541	443	362	300	284	216	245	210	205	173	167	143	126	113
		Anteil in %	56,06	51,09	50,28	52,09	52,30	49,95	46,73	44,75	41,44	44,24	36,61	41,53	39,11	41,67	37,28	39,39	37,05	34,90	34,04
		CI Anteil in %	[53,99; 58,13]	[48,61; 53,58]	[47,84; 52,71]	[49,36; 54,81]	[49,41; 55,18]	[46,97; 52,93]	[43,55; 49,91]	[41,32; 48,18]	[37,85; 45,03]	[40,39; 48,08]	[32,72; 40,50]	[37,55; 45,51]	[34,97; 43,24]	[37,31; 46,03]	[32,88; 41,69]	[34,73; 44,04]	[32,22; 41,87]	[29,98; 39,83]	[28,93; 39,14]
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	26	53	60	9	8	8	3	5	4	3	1	12	2	6	5	5	2	2	0
		Anteil in %	1,18	3,41	3,70	0,70	0,69	0,74	0,32	0,62	0,55	0,47	0,17	2,03	0,37	1,22	1,08	1,18	0,52	0,55	0,00
		CI Anteil in %	[0,73; 1,63]	[2,51; 4,31]	[2,78; 4,62]	[0,24; 1,15]	[0,21; 1,17]	[0,23; 1,25]	[0,00; 0,67]	[0,08; 1,16]	[0,01; 1,09]	[0,00; 1,00]	[0,00; 0,50]	[0,89; 3,17]	[0,00; 0,89]	[0,25; 2,19]	[0,14; 2,02]	[0,15; 2,21]	[0,00; 1,24]	[0,00; 1,32]	[0,00; 0,00]
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1065	650	669	603	547	493	405	335	275	266	204	218	192	185	151	150	131	116	96
		Anteil in %	48,34	41,83	41,22	46,60	47,44	45,52	42,72	41,41	37,98	41,43	34,58	36,95	35,75	37,60	32,54	35,38	33,94	32,13	28,92
		CI Anteil in %	[46,26; 50,43]	[39,37; 44,28]	[38,82; 43,62]	[43,88; 49,32]	[44,56; 50,33]	[42,55; 48,49]	[39,57; 45,87]	[38,01; 44,81]	[34,45; 41,52]	[37,62; 45,25]	[30,74; 38,42]	[33,05; 40,85]	[31,70; 39,81]	[33,32; 41,89]	[28,28; 36,81]	[30,82; 39,93]	[29,21; 38,67]	[27,31; 36,96]	[24,03; 33,80]
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	2	2	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Anteil in %	0,09	0,13	0,68	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
	CI Anteil in %	[0,00; 0,22]	[0,00; 0,31]	[0,28; 1,08]	[0,00; 0,49]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,89]	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	142	89	76	59	48	40	35	22	21	15	11	15	16	14	17	12	10	8	16	
	Anteil in %	6,45	5,73	4,68	4,56	4,16	3,69	3,69	2,72	2,90	2,34	1,86	2,54	2,98	2,85	3,66	2,83	2,59	2,22	4,82	
	CI Anteil in %	[5,42; 7,47]	[4,57; 6,88]	[3,65; 5,71]	[3,42; 5,70]	[3,01; 5,32]	[2,57; 4,82]	[2,49; 4,89]	[1,60; 3,84]	[1,68; 4,12]	[1,17; 3,51]	[0,77; 2,96]	[1,27; 3,81]	[1,54; 4,42]	[1,37; 4,32]	[1,95; 5,38]	[1,25; 4,41]	[1,00; 4,18]	[0,70; 3,74]	[2,51; 7,13]	
Patienten insgesamt	Anzahl	2536	2267	1979	1753	1566	1413	1283	1072	963	857	793	715	644	597	549	500	460	427	390	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr
2003-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1782	1520	1368	1218	1105	985	856	770	700	662	605	574	538	498	464	427	396	373
	auswertbar	Anzahl	1782	1401	1154	1046	963	855	748	680	632	578	575	547	519	476	452	410	383	357
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	772	667	553	527	495	427	401	379	361	348	339	326	303	279	277	248	207	218
		Anteil in %	43,32	47,61	47,92	50,38	51,40	49,94	53,61	55,74	57,12	60,21	58,96	59,60	58,38	58,61	61,28	60,49	54,05	61,06
		CI Anteil in %	[41,02; 45,62]	[44,99; 50,23]	[45,04; 50,80]	[47,35; 53,41]	[48,24; 54,56]	[46,59; 53,30]	[50,03; 57,19]	[52,00; 59,47]	[53,26; 60,98]	[56,21; 64,20]	[54,93; 62,98]	[55,48; 63,71]	[54,14; 62,63]	[54,18; 63,04]	[56,79; 65,78]	[55,75; 65,23]	[49,05; 59,04]	[56,00; 66,13]
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	26	48	9	12	8	7	8	4	9	6	11	9	8	11	6	9	6	6
		Anteil in %	1,46	3,43	0,78	1,15	0,83	0,82	1,07	0,59	1,42	1,04	1,91	1,65	1,54	2,31	1,33	2,20	1,57	1,68
		CI Anteil in %	[0,90; 2,02]	[2,47; 4,38]	[0,27; 1,29]	[0,50; 1,79]	[0,26; 1,40]	[0,21; 1,42]	[0,33; 1,81]	[0,01; 1,16]	[0,50; 2,35]	[0,21; 1,87]	[0,79; 3,03]	[0,58; 2,71]	[0,48; 2,60]	[0,96; 3,66]	[0,27; 2,38]	[0,78; 3,62]	[0,32; 2,81]	[0,35; 3,02]
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	746	619	544	515	487	420	393	375	352	342	328	317	295	268	271	239	201	212
		Anteil in %	41,86	44,18	47,14	49,24	50,57	49,12	52,54	55,15	55,70	59,17	57,04	57,95	56,84	56,30	59,96	58,29	52,48	59,38
		CI Anteil in %	[39,57; 44,15]	[41,58; 46,78]	[44,26; 50,02]	[46,20; 52,27]	[47,41; 53,73]	[45,77; 52,48]	[48,96; 56,12]	[51,41; 58,89]	[51,82; 59,57]	[55,16; 63,18]	[52,99; 61,09]	[53,81; 62,09]	[52,57; 61,11]	[51,84; 60,76]	[55,43; 64,48]	[53,51; 63,07]	[47,47; 57,49]	[54,28; 64,49]
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1010	734	601	519	468	428	347	301	271	230	236	221	216	197	175	162	176	139
		Anteil in %	56,68	52,39	52,08	49,62	48,60	50,06	46,39	44,26	42,88	39,79	41,04	40,40	41,62	41,39	38,72	39,51	45,95	38,94
		CI Anteil in %	[54,38; 58,98]	[49,77; 55,01]	[49,20; 54,96]	[46,59; 52,65]	[45,44; 51,76]	[46,70; 53,41]	[42,81; 49,97]	[40,53; 48,00]	[39,02; 46,74]	[35,80; 43,79]	[37,02; 45,07]	[36,29; 44,52]	[37,37; 45,86]	[36,96; 45,82]	[34,22; 43,21]	[34,77; 44,25]	[40,96; 50,95]	[33,87; 44,00]
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	15	43	6	7	6	12	3	5	3	3	5	7	3	4	6	4	3	3
		Anteil in %	0,84	3,07	0,52	0,67	0,62	1,40	0,40	0,74	0,47	0,52	0,87	1,28	0,58	0,84	1,33	0,98	0,78	0,84
		CI Anteil in %	[0,42; 1,27]	[2,17; 3,97]	[0,10; 0,94]	[0,17; 1,16]	[0,13; 1,12]	[0,61; 2,19]	[0,00; 0,85]	[0,09; 1,38]	[0,00; 1,01]	[0,00; 1,11]	[0,11; 1,63]	[0,34; 2,22]	[0,00; 1,23]	[0,02; 1,66]	[0,27; 2,38]	[0,02; 1,93]	[0,00; 1,67]	[0,00; 1,79]
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	840	597	531	458	418	381	313	268	247	210	206	193	193	185	153	144	163	124
		Anteil in %	47,14	42,61	46,01	43,79	43,41	44,56	41,84	39,41	39,08	36,33	35,83	35,28	37,19	38,87	33,85	35,12	42,56	34,73
		CI Anteil in %	[44,82; 49,46]	[40,02; 45,20]	[43,14; 48,89]	[40,78; 46,79]	[40,27; 46,54]	[41,23; 47,89]	[38,31; 45,38]	[35,74; 43,09]	[35,28; 42,89]	[32,41; 40,26]	[31,90; 39,75]	[31,28; 39,29]	[33,02; 41,35]	[34,48; 43,25]	[29,48; 38,22]	[30,50; 39,75]	[37,60; 47,52]	[29,79; 39,68]
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	2	3	0	1	2	1	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	1	0	
	Anteil in %	0,11	0,21	0,00	0,10	0,21	0,12	0,13	0,00	0,00	0,17	0,35	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	
	CI Anteil in %	[0,00; 0,27]	[0,00; 0,46]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,28]	[0,00; 0,50]	[0,00; 0,35]	[0,00; 0,40]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,51]	[0,00; 0,83]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,57]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,77]	[0,00; 0,00]	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	153	91	64	53	42	34	30	28	21	16	23	21	19	8	16	14	9	12	
	Anteil in %	8,59	6,50	5,55	5,07	4,36	3,98	4,01	4,12	3,32	2,77	4,00	3,84	3,66	1,68	3,54	3,41	2,35	3,36	
	CI Anteil in %	[7,28; 9,89]	[5,20; 7,79]	[4,22; 6,87]	[3,74; 6,40]	[3,07; 5,65]	[2,67; 5,29]	[2,60; 5,42]	[2,62; 5,61]	[1,92; 4,72]	[1,43; 4,11]	[2,40; 5,60]	[2,23; 5,45]	[2,04; 5,28]	[0,52; 2,84]	[1,83; 5,25]	[1,65; 5,17]	[0,83; 3,87]	[1,49; 5,23]	
Patienten insgesamt	Anzahl	2071	1748	1572	1402	1268	1130	975	882	803	754	690	652	609	565	530	490	454	430	
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	766	680	601	532	476	434	402	353	331	308	284	258	236	222	209	192	181	
	auswertbar	Anzahl	766	582	505	453	413	379	337	313	279	290	262	240	223	215	198	183	168	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	331	270	236	220	209	205	179	169	152	155	136	128	130	131	123	99	105	
		Anteil in %	43,21	46,39	46,73	48,57	50,61	54,09	53,12	53,99	54,48	53,45	51,91	53,33	58,30	60,93	62,12	54,10	62,50	
		CI Anteil in %	[39,70; 46,72]	[42,34; 50,45]	[42,38; 51,09]	[43,96; 53,17]	[45,78; 55,43]	[49,07; 59,11]	[47,78; 58,45]	[48,46; 59,52]	[48,63; 60,33]	[47,70; 59,20]	[45,85; 57,97]	[47,01; 59,66]	[51,81; 64,78]	[54,39; 67,47]	[55,35; 68,90]	[46,86; 61,34]	[55,16; 69,84]	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	8	8	3	3	5	3	4	2	1	6	1	2	3	6	4	2	2	
		Anteil in %	1,04	1,37	0,59	0,66	1,21	0,79	1,19	0,64	0,36	2,07	0,38	0,83	1,35	2,79	2,02	1,09	1,19	
		CI Anteil in %	[0,32; 1,76]	[0,43; 2,32]	[0,00; 1,26]	[0,00; 1,41]	[0,15; 2,27]	[0,00; 1,68]	[0,03; 2,34]	[0,00; 1,52]	[0,00; 1,06]	[0,43; 3,71]	[0,00; 1,13]	[0,00; 1,99]	[0,00; 2,86]	[0,58; 5,00]	[0,06; 3,98]	[0,00; 2,60]	[0,00; 2,84]	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	323	262	233	217	204	202	175	167	151	149	135	126	127	125	119	97	103	
		Anteil in %	42,17	45,02	46,14	47,90	49,39	53,30	51,93	53,35	54,12	51,38	51,53	52,50	56,95	58,14	60,10	53,01	61,31	
		CI Anteil in %	[38,67; 45,67]	[40,97; 49,06]	[41,79; 50,49]	[43,30; 52,51]	[44,57; 54,22]	[48,27; 58,33]	[46,59; 57,27]	[47,82; 58,89]	[48,26; 59,98]	[45,62; 57,14]	[45,46; 57,59]	[46,17; 58,83]	[50,44; 63,46]	[51,53; 64,75]	[53,26; 66,94]	[45,75; 60,26]	[53,92; 68,70]	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	435	312	269	233	204	174	158	144	127	135	126	112	93	84	75	84	63	
		Anteil in %	56,79	53,61	53,27	51,43	49,39	45,91	46,88	46,01	45,52	46,55	48,09	46,67	41,70	39,07	37,88	45,90	37,50	
		CI Anteil in %	[53,28; 60,30]	[49,55; 57,66]	[48,91; 57,62]	[46,83; 56,04]	[44,57; 54,22]	[40,89; 50,93]	[41,55; 52,22]	[40,48; 51,54]	[39,67; 51,37]	[40,80; 52,30]	[42,03; 54,15]	[40,34; 52,99]	[35,22; 48,19]	[32,53; 45,61]	[31,10; 44,65]	[38,66; 53,14]	[30,16; 44,84]	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	7	8	10	4	3	1	0	1	1	3	6	5	3	2	3	4	3	
		Anteil in %	0,91	1,37	1,98	0,88	0,73	0,26	0,00	0,32	0,36	1,03	2,29	2,08	1,35	0,93	1,52	2,19	1,79	
		CI Anteil in %	[0,24; 1,59]	[0,43; 2,32]	[0,76; 3,20]	[0,02; 1,75]	[0,00; 1,55]	[0,00; 0,78]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,95]	[0,00; 1,06]	[0,00; 2,20]	[0,48; 4,10]	[0,27; 3,89]	[0,00; 2,86]	[0,00; 2,22]	[0,00; 3,22]	[0,06; 4,31]	[0,00; 3,79]	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	363	261	232	207	181	157	143	127	112	120	108	95	80	73	67	66	54	
		Anteil in %	47,39	44,85	45,94	45,70	43,83	41,42	42,43	40,58	40,14	41,38	41,22	39,58	35,87	33,95	33,84	36,07	32,14	
		CI Anteil in %	[43,85; 50,93]	[40,80; 48,89]	[41,59; 50,29]	[41,10; 50,29]	[39,03; 48,62]	[36,46; 46,39]	[37,15; 47,72]	[35,13; 46,02]	[34,38; 45,91]	[35,70; 47,06]	[35,25; 47,19]	[33,38; 45,78]	[29,57; 42,18]	[27,61; 40,30]	[27,23; 40,45]	[29,09; 43,04]	[25,06; 39,23]	
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
	Anteil in %	0,13	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00		
	CI Anteil in %	[0,00; 0,39]	[0,00; 0,51]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,02]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,62]	[0,00; 0,00]		
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	64	42	27	22	20	16	15	16	14	11	12	12	10	9	5	13	6		
	Anteil in %	8,36	7,22	5,35	4,86	4,84	4,22	4,45	5,11	5,02	3,79	4,58	5,00	4,48	4,19	2,53</				

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	579	524	472	414	368	327	298	283	264	242	231	217	202	187	181	169		
	auswertbar	Anzahl	499	439	412	369	309	276	245	222	230	215	197	183	174	156	154	141		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	234	230	224	198	169	158	134	137	134	131	120	105	107	94	88	88		
		Anteil in %	46,89	52,39	54,37	53,66	54,69	57,25	54,69	61,71	58,26	60,93	60,91	57,38	61,49	60,26	57,14	62,41		
		CI Anteil in %	[42,51; 51,28]	[47,71; 57,07]	[49,55; 59,18]	[48,56; 58,75]	[49,13; 60,25]	[51,40; 63,09]	[48,45; 60,94]	[55,30; 68,12]	[51,87; 64,65]	[54,39; 67,47]	[54,08; 67,74]	[50,19; 64,56]	[54,24; 68,75]	[52,55; 67,96]	[49,30; 64,98]	[54,39; 70,43]		
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	4	5	6	5	3	1	1	1	7	3	2	1	2	2	2	2		
		Anteil in %	0,80	1,14	1,46	1,36	0,97	0,36	0,41	0,45	3,04	1,40	1,02	0,55	1,15	1,28	1,30	1,42		
		CI Anteil in %	[0,02; 1,58]	[0,15; 2,13]	[0,30; 2,61]	[0,17; 2,54]	[0,00; 2,07]	[0,00; 1,07]	[0,00; 1,21]	[0,00; 1,33]	[0,82; 5,27]	[0,00; 2,97]	[0,00; 2,42]	[0,00; 1,62]	[0,00; 2,74]	[0,00; 3,05]	[0,00; 3,09]	[0,00; 3,38]		
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	230	225	218	193	166	157	133	136	127	128	118	104	105	92	86	86		
		Anteil in %	46,09	51,25	52,91	52,30	53,72	56,88	54,29	61,26	55,22	59,53	59,90	56,83	60,34	58,97	55,84	60,99		
		CI Anteil in %	[41,71; 50,47]	[46,57; 55,93]	[48,09; 57,74]	[47,20; 57,41]	[48,15; 59,29]	[51,03; 62,74]	[48,03; 60,54]	[54,84; 67,68]	[48,78; 61,66]	[52,96; 66,11]	[53,04; 66,76]	[49,63; 64,03]	[53,06; 67,63]	[51,23; 66,72]	[47,98; 63,71]	[52,91; 69,07]		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	265	209	188	171	140	118	111	85	96	84	77	78	67	62	66	53		
		Anteil in %	53,11	47,61	45,63	46,34	45,31	42,75	45,31	38,29	41,74	39,07	39,09	42,62	38,51	39,74	42,86	37,59		
		CI Anteil in %	[48,72; 57,49]	[42,93; 52,29]	[40,82; 50,45]	[41,25; 51,44]	[39,75; 50,87]	[36,91; 48,60]	[39,06; 51,55]	[31,88; 44,70]	[35,35; 48,13]	[32,53; 45,61]	[32,26; 45,92]	[35,44; 49,81]	[31,25; 45,76]	[32,04; 47,45]	[35,02; 50,70]	[29,57; 45,61]		
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	4	0	2	1	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0		
		Anteil in %	0,80	0,00	0,49	0,27	0,32	0,00	0,00	0,00	0,87	0,47	0,51	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CI Anteil in %	[0,02; 1,58]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,16]	[0,00; 0,80]	[0,00; 0,96]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 2,07]	[0,00; 1,38]	[0,00; 1,50]	[0,00; 1,62]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]		
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	233	184	167	155	127	107	101	78	87	78	67	71	59	56	57	48		
		Anteil in %	46,69	41,91	40,53	42,01	41,10	38,77	41,22	35,14	37,83	36,28	34,01	38,80	33,91	35,90	37,01	34,04		
		CI Anteil in %	[42,31; 51,08]	[37,29; 46,53]	[35,79; 45,28]	[36,96; 47,05]	[35,61; 46,60]	[33,01; 44,53]	[35,05; 47,40]	[28,84; 41,43]	[31,54; 44,11]	[29,84; 42,72]	[27,38; 40,64]	[31,72; 45,88]	[26,85; 40,96]	[28,35; 43,45]	[29,36; 44,66]	[26,19; 41,89]		
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Anteil in %	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,67]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]			
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	28	24	19	15	12	11	10	7	7	5	9	6	8	6	9	5			
	Anteil in %	5,61	5,47	4,61	4,07	3,88	3,99	4,08	3,15	3,04	2,33	4,57	3,28	4,60	3,85	5,84	3,55			
	CI Anteil in %	[3,59; 7,63]	[3,34; 7,60]	[2,58; 6,64]	[2,05; 6,08]	[1,73; 6,04]	[1,67; 6,30]	[1,60; 6,56]	[0,85; 5,46]	[0,82; 5,27]	[0,31; 4,34]	[1,65; 7,49]	[0,69; 5,87]	[1,48; 7,72]	[0,82; 6,87]	[2,13; 9,56]	[0,48; 6,61]			
Patienten insgesamt	Anzahl	659	590	532	467	416	372	339	320	297	273	262	246	228	213	206	191			
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	770	718	666	578	509	448	418	379	353	329	308	283	255	233	213			
	auswertbar	Anzahl	664	615	551	487	442	394	355	364	334	316	296	265	242	221	204			
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	268	303	269	257	241	196	192	194	179	185	166	174	155	127	136			
		Anteil in %	40,36	49,27	48,82	52,77	54,52	49,75	54,08	53,30	53,59	58,54	56,08	65,66	64,05	57,47	66,67			
		CI Anteil in %	[36,63; 44,10]	[45,31; 53,22]	[44,64; 53,00]	[48,33; 57,21]	[49,88; 59,17]	[44,80; 54,69]	[48,89; 59,28]	[48,16; 58,43]	[48,24; 58,95]	[53,10; 63,98]	[50,42; 61,74]	[59,93; 71,39]	[57,99; 70,11]	[50,93; 64,00]	[60,18; 73,15]			
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	10	9	5	4	6	4	6	7	9	10	8	6	6	4	7			
		Anteil in %	1,51	1,46	0,91	0,82	1,36	1,02	1,69	1,92	2,69	3,16	2,70	2,26	2,48	1,81	3,43			
		CI Anteil in %	[0,58; 2,43]	[0,51; 2,41]	[0,11; 1,70]	[0,02; 1,62]	[0,28; 2,44]	[0,02; 2,01]	[0,35; 3,03]	[0,51; 3,34]	[0,96; 4,43]	[1,23; 5,10]	[0,85; 4,55]	[0,47; 4,06]	[0,52; 4,44]	[0,05; 3,57]	[0,93; 5,94]			
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	258	294	264	253	235	192	186	187	170	175	158	168	149	123	129			
		Anteil in %	38,86	47,80	47,91	51,95	53,17	48,73	52,39	51,37	50,90	55,38	53,38	63,40	61,57	55,66	63,24			
		CI Anteil in %	[35,15; 42,57]	[43,85; 51,76]	[43,74; 52,09]	[47,51; 56,39]	[48,51; 57,82]	[43,79; 53,67]	[47,19; 57,60]	[46,23; 56,52]	[45,53; 56,27]	[49,89; 60,87]	[47,69; 59,07]	[57,59; 69,21]	[55,43; 67,71]	[49,09; 62,22]	[56,60; 69,87]			
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	396	312	282	230	201	198	163	170	155	131	130	91	87	94	68			
		Anteil in %	59,64	50,73	51,18	47,23	45,48	50,25	45,92	46,70	46,41	41,46	43,92	34,34	35,95	42,53	33,33			
		CI Anteil in %	[55,90; 63,37]	[46,78; 54,69]	[47,00; 55,36]	[42,79; 51,67]	[40,83; 50,12]	[45,31; 55,20]	[40,72; 51,11]	[41,57; 51,84]	[41,05; 51,76]	[36,02; 46,90]	[38,26; 49,58]	[28,61; 40,07]	[29,89; 42,01]	[36,00; 49,07]	[26,85; 39,82]			
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	5	1	5	5	2	3	2	4	3	1	2	2	0	1	2			
		Anteil in %	0,75	0,16	0,91	1,03	0,45	0,76	0,56	1,10	0,90	0,32	0,68	0,75	0,00	0,45	0,98			
		CI Anteil in %	[0,09; 1,41]	[0,00; 0,48]	[0,11; 1,70]	[0,13; 1,92]	[0,00; 1,08]	[0,00; 1,62]	[0,00; 1,34]	[0,03; 2,17]	[0,00; 1,91]	[0,00; 0,94]	[0,00; 1,61]	[0,00; 1,80]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,34]	[0,00; 2,34]			
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	336	272	243	202	179	184	144	145	128	117	111	77	79	85	61			
		Anteil in %	50,60	44,23	44,10	41,48	40,50	46,70	40,56	39,84	38,32	37,03	37,50	29,06	32,64	38,46	29,90			
		CI Anteil in %	[46,80; 54,41]	[40,30; 48,16]	[39,95; 48,25]	[37,10; 45,86]	[35,92; 45,08]	[41,77; 51,63]	[35,45; 45,68]	[34,80; 44,87]	[33,10; 43,55]	[31,69; 42,36]	[31,98; 43,02]	[23,58; 34,53]	[26,72; 38,56]	[32,03; 44,89]	[23,60; 36,20]			
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Anteil in %	0,15	0,16	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CI Anteil in %	[0,00; 0,45]	[0,00; 0,48]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,67]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]				
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	54	38	34	23	19	11	17	21	24	13	17	12	8	8	5				
	Anteil in %	8,13	6,18	6,17	4,72	4,30	2,79	4,79	5,77	7,19	4,11	5,74	4,53	3,31	3,62	2,45				
	CI Anteil in %	[6,05; 10,21]	[4,27; 8,08]	[4,16; 8,18]	[2,84; 6,61]	[2,41; 6,19]	[1,16; 4,42]	[2,56; 7,01]	[3,37; 8,17]	[4,41; 9,96]	[1,92; 6,31]	[3,09; 8,40]	[2,02; 7,04]	[1,05; 5,56]	[1,15; 6,09]	[0,32; 4,58]				
Patienten insgesamt	Anzahl	859	795	730	633	558	489	457	414	387	358	333	307	279	254	233				

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1060	960	846	747	652	608	553	514	470	428	400	371	342	307				
	auswertbar	Anzahl	903	797	706	620	565	516	525	492	449	407	384	354	325	289				
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	445	399	383	335	299	293	285	270	257	234	226	209	192	179				
		Anteil in %	49,28	50,06	54,25	54,03	52,92	56,78	54,29	54,88	57,24	57,49	58,85	59,04	59,08	61,94				
		CI Anteil in %	[46,02; 52,54]	[46,59; 53,54]	[50,57; 57,93]	[50,11; 57,96]	[48,80; 57,04]	[52,50; 61,06]	[50,02; 58,55]	[50,48; 59,28]	[52,66; 61,82]	[52,69; 62,30]	[53,93; 63,78]	[53,91; 64,17]	[53,72; 64,43]	[56,33; 67,55]				
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	9	8	8	6	5	10	12	8	7	7	9	9	7	6				
		Anteil in %	1,00	1,00	1,13	0,97	0,88	1,94	2,29	1,63	1,56	1,72	2,34	2,54	2,15	2,08				
		CI Anteil in %	[0,35; 1,64]	[0,31; 1,70]	[0,35; 1,91]	[0,20; 1,74]	[0,11; 1,66]	[0,75; 3,13]	[1,01; 3,57]	[0,51; 2,74]	[0,41; 2,71]	[0,46; 2,98]	[0,83; 3,86]	[0,90; 4,18]	[0,57; 3,73]	[0,43; 3,72]				
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	436	391	375	329	294	283	273	262	250	227	217	200	185	173				
		Anteil in %	48,28	49,06	53,12	53,06	52,04	54,84	52,00	53,25	55,68	55,77	56,51	56,50	56,92	59,86				
		CI Anteil in %	[45,02; 51,54]	[45,59; 52,53]	[49,43; 56,80]	[49,13; 57,00]	[47,91; 56,16]	[50,55; 59,14]	[47,72; 56,28]	[48,84; 57,67]	[51,08; 60,28]	[50,94; 60,61]	[51,55; 61,48]	[51,33; 61,67]	[51,53; 62,32]	[54,20; 65,52]				
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	458	398	323	285	266	223	240	222	192	173	158	145	133	110				
		Anteil in %	50,72	49,94	45,75	45,97	47,08	43,22	45,71	45,12	42,76	42,51	41,15	40,96	40,92	38,06				
		CI Anteil in %	[47,46; 53,98]	[46,46; 53,41]	[42,07; 49,43]	[42,04; 49,89]	[42,96; 51,20]	[38,94; 47,50]	[41,45; 49,98]	[40,72; 49,52]	[38,18; 47,34]	[37,70; 47,31]	[36,22; 46,07]	[35,83; 46,09]	[35,57; 46,28]	[32,45; 43,67]				
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	5	5	5	7	5	2	9	6	7	5	6	4	3	5				
		Anteil in %	0,55	0,63	0,71	1,13	0,88	0,39	1,71	1,22	1,56	1,23	1,56	1,13	0,92	1,73				
		CI Anteil in %	[0,07; 1,04]	[0,08; 1,18]	[0,09; 1,33]	[0,30; 1,96]	[0,11; 1,66]	[0,00; 0,92]	[0,60; 2,83]	[0,25; 2,19]	[0,41; 2,71]	[0,16; 2,30]	[0,32; 2,80]	[0,03; 2,23]	[0,00; 1,96]	[0,22; 3,24]				
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	400	349	273	243	231	199	210	191	167	145	137	127	124	97				
		Anteil in %	44,30	43,79	38,67	39,19	40,88	38,57	40,00	38,82	37,19	35,63	35,68	35,88	38,15	33,56				
		CI Anteil in %	[41,06; 47,54]	[40,34; 47,24]	[35,07; 42,26]	[35,35; 43,04]	[36,83; 44,94]	[34,36; 42,77]	[35,81; 44,19]	[34,51; 43,13]	[32,72; 41,67]	[30,97; 40,28]	[30,88; 40,47]	[30,87; 40,88]	[32,86; 43,44]	[28,11; 39,02]				
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0					
	Anteil in %	0,11	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,56	0,31	0,00					
	CI Anteil in %	[0,00; 0,33]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,52]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,60]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,35]	[0,00; 0,91]	[0,00; 0,00]					
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	52	44	45	35	29	22	21	24	18	23	15	12	5	8					
	Anteil in %	5,76	5,52	6,37	5,65	5,13	4,26	4,00	4,88	4,01	5,65	3,91	3,39	1,54	2,77					
	CI Anteil in %	[4,24; 7,28]	[3,93; 7,11]	[4,57; 8,18]	[3,83; 7,46]	[3,31; 6,95]	[2,52; 6,01]	[2,32; 5,68]	[2,97; 6,78]	[2,19; 5,83]	[3,41; 7,90]	[1,97; 5,85]	[1,50; 5,28]	[0,20; 2,88]	[0,87; 4,66]					
Patienten insgesamt	Anzahl	1182	1074	947	842	734	687	622	577	528	478	442	410	378	340					
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1190	1111	1008	905	834	755	710	642	593	548	513	470	433					
	auswertbar	Anzahl	1070	980	871	794	716	720	661	611	568	531	488	447	420					
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	490	509	447	419	391	383	363	328	318	292	271	254	229					
		Anteil in %	45,79	51,94	51,32	52,77	54,61	53,19	54,92	53,68	55,99	54,99	55,53	56,82	54,52					
		CI Anteil in %	[42,81; 48,78]	[48,81; 55,07]	[48,00; 54,64]	[49,30; 56,25]	[50,96; 58,26]	[49,55; 56,84]	[51,12; 58,71]	[49,73; 57,64]	[51,90; 60,07]	[50,75; 59,23]	[51,12; 59,95]	[52,23; 61,42]	[49,76; 59,29]					
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	9	12	12	16	7	13	8	6	4	4	5	5	6					
		Anteil in %	0,84	1,22	1,38	2,02	0,98	1,81	1,21	0,98	0,70	0,75	1,02	1,12	1,43					
		CI Anteil in %	[0,29; 1,39]	[0,54; 1,91]	[0,60; 2,15]	[1,04; 2,99]	[0,26; 1,70]	[0,83; 2,78]	[0,38; 2,04]	[0,20; 1,76]	[0,02; 1,39]	[0,02; 1,49]	[0,13; 1,92]	[0,14; 2,09]	[0,29; 2,56]					
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	481	497	435	403	384	370	355	322	314	288	266	249	223					
		Anteil in %	44,95	50,71	49,94	50,76	53,63	51,39	53,71	52,70	55,28	54,24	54,51	55,70	53,10					
		CI Anteil in %	[41,97; 47,94]	[47,58; 53,85]	[46,62; 53,27]	[47,28; 54,24]	[49,98; 57,29]	[47,74; 55,04]	[49,90; 57,51]	[48,74; 56,66]	[51,19; 59,37]	[50,00; 58,48]	[50,09; 58,93]	[51,09; 60,31]	[48,32; 57,87]					
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	580	471	424	375	325	337	298	283	250	239	217	193	191					
		Anteil in %	54,21	48,06	48,68	47,23	45,39	46,81	45,08	46,32	44,01	45,01	44,47	43,18	45,48					
		CI Anteil in %	[51,22; 57,19]	[44,93; 51,19]	[45,36; 52,00]	[43,75; 50,70]	[41,74; 49,04]	[43,16; 50,45]	[41,29; 48,88]	[42,36; 50,27]	[39,93; 48,10]	[40,77; 49,25]	[40,05; 48,88]	[38,58; 47,77]	[40,71; 50,24]					
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	13	8	4	4	9	8	9	8	5	5	6	4	2					
		Anteil in %	1,21	0,82	0,46	0,50	1,26	1,11	1,36	1,31	0,88	0,94	1,23	0,89	0,48					
		CI Anteil in %	[0,56; 1,87]	[0,25; 1,38]	[0,01; 0,91]	[0,01; 1,00]	[0,44; 2,07]	[0,34; 1,88]	[0,48; 2,25]	[0,41; 2,21]	[0,11; 1,65]	[0,12; 1,76]	[0,25; 2,21]	[0,02; 1,77]	[0,00; 1,14]					
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	487	402	361	320	282	295	257	244	219	206	185	169	170					
		Anteil in %	45,51	41,02	41,45	40,30	39,39	40,97	38,88	39,93	38,56	38,79	37,91	37,81	40,48					
		CI Anteil in %	[42,53; 48,50]	[37,94; 44,10]	[38,17; 44,72]	[36,89; 43,72]	[35,80; 42,97]	[37,38; 44,57]	[35,16; 42,60]	[36,05; 43,82]	[34,55; 42,56]	[34,65; 42,94]	[33,60; 42,22]	[33,31; 42,31]	[35,78; 45,18]					
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0						
	Anteil in %	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	0,00						
	CI Anteil in %	[0,00; 0,28]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,45]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,52]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,61]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]						
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	79	61	59	51	34	34	31	31	25	28	25	20	19						
	Anteil in %	7,38	6,22	6,77	6,42	4,75	4,72	4,69	5,07	4,40	5,27	5,12	4,47	4,52						
	CI Anteil in %	[5,82; 8,95]	[4,71; 7,74]	[5,10; 8,44]	[4,72; 8,13]	[3,19; 6,31]	[3,17; 6,27]	[3,08; 6,30]	[3,33; 6,82]	[2,71; 6,09]	[3,37; 7,18]	[3,16; 7,08]	[2,56; 6,39]	[2,53; 6,51]						
Patienten insgesamt	Anzahl	1328	1241	1122	1007	928	844	793	715	659	606	566	516	473						

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1611	1525	1369	1269	1132	1041	954	866	787	727	676	627						
	auswertbar	Anzahl	1434	1279	1173	1086	1031	967	895	817	753	687	638	590						
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	707	686	600	584	544	530	484	448	411	415	366	351						
		Anteil in %	49,30	53,64	51,15	53,78	52,76	54,81	54,08	54,83	54,58	60,41	57,37	59,49						
		CI Anteil in %	[46,71; 51,89]	[50,90; 56,37]	[48,29; 54,01]	[50,81; 56,74]	[49,72; 55,81]	[51,67; 57,95]	[50,81; 57,34]	[51,42; 58,25]	[51,02; 58,14]	[51,02; 64,07]	[56,75; 61,21]	[53,53; 63,46]	[55,53; 63,46]					
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	16	15	11	9	25	12	12	11	7	9	11	6						
		Anteil in %	1,12	1,17	0,94	0,83	2,42	1,24	1,34	1,35	0,93	1,31	1,72	1,02						
		CI Anteil in %	[0,57; 1,66]	[0,58; 1,76]	[0,39; 1,49]	[0,29; 1,37]	[1,49; 3,36]	[0,54; 1,94]	[0,59; 2,09]	[0,56; 2,14]	[0,24; 1,62]	[0,46; 2,16]	[0,71; 2,74]	[0,21; 1,83]						
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	691	671	589	575	519	518	472	437	404	406	355	345						
		Anteil in %	48,19	52,46	50,21	52,95	50,34	53,57	52,74	53,49	53,65	59,10	55,64	58,47						
		CI Anteil in %	[45,60; 50,77]	[49,72; 55,20]	[47,35; 53,08]	[49,98; 55,92]	[47,29; 53,39]	[50,42; 56,71]	[49,46; 56,01]	[50,07; 57,22]	[50,09; 62,78]	[55,42; 62,78]	[51,78; 59,50]	[54,49; 62,45]						
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	727	593	573	502	487	437	411	369	342	272	272	239						
		Anteil in %	50,70	46,36	48,85	46,22	47,24	45,19	45,92	45,17	45,42	39,59	42,63	40,51						
		CI Anteil in %	[48,11; 53,29]	[43,63; 49,10]	[45,99; 51,71]	[43,26; 49,19]	[44,19; 50,28]	[42,05; 48,33]	[42,66; 49,19]	[41,75; 48,58]	[41,86; 48,98]	[35,93; 43,25]	[38,79; 46,47]	[36,54; 44,47]						
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	10	6	6	10	16	10	9	4	7	8	5	8						
		Anteil in %	0,70	0,47	0,51	0,92	1,55	1,03	1,01	0,49	0,93	1,16	0,78	1,36						
		CI Anteil in %	[0,27; 1,13]	[0,09; 0,84]	[0,10; 0,92]	[0,35; 1,49]	[0,80; 2,31]	[0,40; 1,67]	[0,35; 1,66]	[0,01; 0,97]	[0,24; 1,62]	[0,36; 1,97]	[0,10; 1,47]	[0,42; 2,29]						
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	648	519	512	439	411	378	364	330	306	242	245	213						
		Anteil in %	45,19	40,58	43,65	40,42	39,86	39,09	40,67	40,39	40,64	35,23	38,40	36,10						
		CI Anteil in %	[42,61; 47,77]	[37,89; 43,27]	[40,81; 46,49]	[37,50; 43,34]	[36,87; 42,85]	[36,01; 42,17]	[37,45; 43,89]	[37,02; 43,76]	[37,13; 44,15]	[31,65; 38,80]	[34,62; 42,18]	[32,22; 39,98]						
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0							
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,11	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
	CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,29]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,33]	[0,00; 0,58]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]							
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	69	68	55	53	59	49	37	33	29	22	22	18							
	Anteil in %	4,81	5,32	4,69	4,88	5,72	5,07	4,13	4,04	3,85	3,20	3,45	3,05							
	CI Anteil in %	[3,70; 5,92]	[4,09; 6,55]	[3,48; 5,90]	[3,60; 6,16]	[4,30; 7,14]	[3,68; 6,45]	[2,83; 5,44]	[2,69; 5,39]	[2,48; 5,23]	[1,88; 4,52]	[2,03; 4,87]	[1,66; 4,44]							
Patienten insgesamt	Anzahl	1803	1704	1527	1413	1260	1159	1061	964	878	811	753	696							
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1884	1755	1631	1473	1341	1204	1120	1025	954	882	798							
	auswertbar	Anzahl	1680	1530	1373	1365	1253	1146	1066	972	887	835	745							
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	796	794	741	741	686	606	581	539	501	483	429							
		Anteil in %	47,38	51,90	53,97	54,29	54,75	52,88	54,50	55,45	56,48	57,84	57,58							
		CI Anteil in %	[44,99; 49,77]	[49,39; 54,40]	[51,33; 56,61]	[51,64; 56,93]	[51,99; 57,51]	[49,99; 55,77]	[51,51; 57,49]	[52,33; 58,58]	[53,22; 59,75]	[54,49; 61,20]	[54,03; 61,14]							
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	21	22	22	34	29	27	21	18	14	13	9							
		Anteil in %	1,25	1,44	1,60	2,49	2,31	2,36	1,97	1,85	1,58	1,56	1,21							
		CI Anteil in %	[0,72; 1,78]	[0,84; 2,03]	[0,94; 2,27]	[1,66; 3,32]	[1,48; 3,15]	[1,48; 3,23]	[1,14; 2,80]	[1,00; 2,70]	[0,76; 2,40]	[0,72; 2,40]	[0,42; 1,99]							
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	775	772	719	707	657	579	560	521	487	470	420							
		Anteil in %	46,13	50,46	52,37	51,79	52,43	50,52	52,53	53,60	54,90	56,29	56,38							
		CI Anteil in %	[43,75; 48,52]	[47,95; 52,96]	[49,72; 55,01]	[49,14; 54,45]	[49,67; 55,20]	[47,63; 53,42]	[49,53; 55,53]	[50,46; 56,74]	[51,63; 58,18]	[52,92; 59,65]	[52,81; 59,94]							
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	884	736	632	624	567	540	485	433	386	352	316							
		Anteil in %	52,62	48,10	46,03	45,71	45,25	47,12	45,50	44,55	43,52	42,16	42,42							
		CI Anteil in %	[50,23; 55,01]	[45,60; 50,61]	[43,39; 48,67]	[43,07; 48,36]	[42,49; 48,01]	[44,23; 50,01]	[42,51; 48,49]	[41,42; 47,67]	[40,25; 46,78]	[38,80; 45,51]	[38,86; 45,97]							
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	14	15	11	20	18	14	12	7	5	2	5							
		Anteil in %	0,83	0,98	0,80	1,47	1,44	1,22	1,13	0,72	0,56	0,24	0,67							
		CI Anteil in %	[0,40; 1,27]	[0,49; 1,47]	[0,33; 1,27]	[0,83; 2,10]	[0,78; 2,10]	[0,59; 1,86]	[0,49; 1,76]	[0,19; 1,25]	[0,07; 1,06]	[0,00; 0,57]	[0,08; 1,26]							
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	747	634	544	527	489	466	412	382	338	320	283							
		Anteil in %	44,46	41,44	39,62	38,61	39,03	40,66	38,65	39,30	38,11	38,32	37,99							
		CI Anteil in %	[42,09; 46,84]	[38,97; 43,91]	[37,03; 42,21]	[36,02; 41,19]	[36,32; 41,73]	[37,82; 43,51]	[35,72; 41,57]	[36,23; 42,37]	[34,91; 41,30]	[35,02; 41,62]	[34,50; 41,47]							
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0								
	Anteil in %	0,06	0,07	0,07	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	CI Anteil in %	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,19]	[0,00; 0,22]	[0,00; 0,35]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]								
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	122	86	76	75	60	60	61	44	43	30	28								
	Anteil in %	7,26	5,62	5,54	5,49	4,79	5,24	5,72	4,53	4,85	3,59	3,76								
	CI Anteil in %	[6,02; 8,50]	[4,47; 6,78]	[4,33; 6,75]	[4,29; 6,70]	[3,61; 5,97]	[3,95; 6,53]	[4,33; 7,12]	[3,22; 5,83]	[3,43; 6,26]	[2,33; 4,86]	[2,39; 5,13]								
Patienten insgesamt	Anzahl	2076	1926	1782	1605	1459	1307	1216	1116	1038	958	865								

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr			
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1039	981	878	798	694	631	557	511	465	433											
	auswertbar	Anzahl	925	822	776	719	638	589	525	487	435	410											
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	484	442	415	400	355	310	280	286	252	235											
		Anteil in %	52,32	53,77	53,48	55,63	55,64	52,63	53,33	58,73	57,93	57,32											
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[49,10; 55,54]	[50,36; 57,18]	[49,97; 56,99]	[52,00; 59,27]	[51,78; 59,50]	[48,60; 56,67]	[49,06; 57,60]	[54,35; 63,10]	[53,29; 62,58]	[52,52; 62,11]											
		Anzahl	7	6	12	12	9	8	9	6	9	6											
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	0,76	0,73	1,55	1,67	1,41	1,36	1,71	1,23	2,07	1,46											
		CI Anteil in %	[0,20; 1,32]	[0,15; 1,31]	[0,68; 2,42]	[0,73; 2,61]	[0,49; 2,33]	[0,42; 2,29]	[0,60; 2,83]	[0,25; 2,21]	[0,73; 3,41]	[0,30; 2,63]											
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	477	436	403	388	346	302	271	280	243	229											
		Anteil in %	51,57	53,04	51,93	53,96	54,23	51,27	51,62	57,49	55,86	55,85											
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[48,35; 54,79]	[49,63; 56,46]	[48,42; 55,45]	[50,32; 57,61]	[50,36; 58,10]	[47,23; 55,31]	[47,34; 55,90]	[53,10; 61,89]	[51,19; 60,53]	[51,04; 60,67]											
		Anzahl	441	380	361	319	283	279	245	201	183	175											
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	47,68	46,23	46,52	44,37	44,36	47,37	46,67	41,27	42,07	42,68											
		CI Anteil in %	[44,46; 50,90]	[42,82; 49,64]	[43,01; 50,03]	[40,73; 48,00]	[40,50; 48,22]	[43,33; 51,40]	[42,40; 50,94]	[36,90; 45,65]	[37,42; 46,71]	[37,89; 47,48]											
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	13	8	16	12	7	5	3	3	1	7											
		Anteil in %	1,41	0,97	2,06	1,67	1,10	0,85	0,57	0,62	0,23	1,71											
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,65; 2,16]	[0,30; 1,64]	[1,06; 3,06]	[0,73; 2,61]	[0,29; 1,91]	[0,11; 1,59]	[0,00; 1,22]	[0,00; 1,31]	[0,00; 0,68]	[0,45; 2,96]											
		Anzahl	382	329	302	262	241	213	170	163	148												
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	41,30	40,02	38,92	36,44	37,77	40,92	40,57	34,91	37,47	36,10											
		CI Anteil in %	[38,12; 44,47]	[36,67; 43,38]	[35,48; 42,35]	[32,92; 39,96]	[34,01; 41,54]	[36,94; 44,89]	[36,37; 44,78]	[30,67; 39,15]	[32,92; 42,03]	[31,44; 40,75]											
Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1	1	0	1	1	2	0	1	0	0												
	Anteil in %	0,11	0,12	0,00	0,14	0,16	0,34	0,00	0,21	0,00	0,00												
Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[0,00; 0,32]	[0,00; 0,36]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,41]	[0,00; 0,46]	[0,00; 0,81]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,61]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]												
	Anzahl	45	42	43	44	34	31	29	27	19	20												
Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	4,86	5,11	5,54	6,12	5,33	5,26	5,52	5,54	4,37	4,88												
	CI Anteil in %	[3,48; 6,25]	[3,60; 6,62]	[3,93; 7,15]	[4,37; 7,87]	[3,58; 7,07]	[3,46; 7,07]	[3,57; 7,48]	[3,51; 7,58]	[2,44; 6,29]	[2,79; 6,97]												
Patienten insgesamt	Anzahl	1157	1093	978	888	770	700	618	562	513	476												
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	837	791	726	644	586	531	491	441	416												
	auswertbar	Anzahl	754	735	679	599	545	498	461	426	398												
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	350	370	342	320	281	267	265	247	233												
		Anteil in %	46,42	50,34	50,37	53,42	51,56	53,61	57,48	57,98	58,54												
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	CI Anteil in %	[42,86; 49,98]	[46,72; 53,96]	[46,60; 54,13]	[49,42; 57,42]	[47,36; 55,76]	[49,23; 58,00]	[52,97; 62,00]	[53,29; 62,67]	[53,70; 63,39]												
		Anzahl	9	14	15	12	12	12	9	8	3												
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	1,19	1,90	2,21	2,00	2,20	2,41	1,95	1,88	0,75												
		CI Anteil in %	[0,42; 1,97]	[0,92; 2,89]	[1,10; 3,32]	[0,88; 3,13]	[0,97; 3,43]	[1,06; 3,76]	[0,69; 3,22]	[0,59; 3,17]	[0,00; 1,60]												
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	341	356	327	308	269	255	256	239	230												
		Anteil in %	45,23	48,44	48,16	51,42	49,36	51,20	55,53	56,10	57,79												
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[41,67; 48,78]	[44,82; 52,05]	[44,40; 51,92]	[47,41; 55,42]	[45,16; 53,56]	[46,81; 55,60]	[50,99; 60,07]	[51,39; 60,82]	[52,93; 62,65]												
		Anzahl	404	365	337	279	264	231	196	179	165												
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	53,58	49,66	49,63	46,58	48,44	46,39	42,52	42,02	41,46												
		CI Anteil in %	[50,02; 57,14]	[46,04; 53,28]	[45,87; 53,40]	[42,58; 50,58]	[44,24; 52,64]	[42,00; 50,77]	[38,00; 47,03]	[37,33; 46,71]	[36,61; 46,30]												
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	5	13	5	7	4	3	3	2	3												
		Anteil in %	0,66	1,77	0,74	1,17	0,73	0,60	0,65	0,47	0,75												
	Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	CI Anteil in %	[0,08; 1,24]	[0,82; 2,72]	[0,09; 1,38]	[0,31; 2,03]	[0,02; 1,45]	[0,00; 1,28]	[0,00; 1,39]	[0,00; 1,12]	[0,00; 1,60]												
		Anzahl	338	309	288	239	235	209	174	155	139												
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anteil in %	44,83	42,04	42,42	39,90	43,12	41,97	37,74	36,38	34,92												
		CI Anteil in %	[41,28; 48,38]	[38,47; 45,61]	[38,70; 46,14]	[35,97; 43,82]	[38,96; 47,28]	[37,63; 46,31]	[33,31; 42,17]	[31,81; 40,96]	[30,24; 39,61]												
Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1	0	2	0	0	0	0	0	0													
	Anteil in %	0,13	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	CI Anteil in %	[0,00; 0,39]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,70]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]													
	Anzahl	60	43	42	33	25	19	19	22	23													
Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anteil in %	7,96	5,85	6,19	5,51	4,59	3,82	4,12	5,16	5,78													
	CI Anteil in %	[6,02; 9,89]	[4,15; 7,55]	[4,37; 8,00]	[3,68; 7,34]	[2,83; 6,35]	[2,13; 5,50]	[2,30; 5,94]	[3,06; 7,27]	[3,48; 8,07]													
Patienten insgesamt	Anzahl	927	876	802	707	644	585	539	486	458													

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	477	462	409	363	339	315	294	271											
	auswertbar	Anzahl	477	426	378	345	321	302	272	252											
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	246	232	216	194	182	177	164	152											
		Anteil in %	51,57	54,46	57,14	56,23	56,70	58,61	60,29	60,32											
		CI Anteil in %	[47,08; 56,06]	[49,73; 59,19]	[52,15; 62,14]	[50,99; 61,47]	[51,27; 62,13]	[53,05; 64,17]	[54,47; 66,12]	[54,26; 66,37]											
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	8	8	6	5	6	6	7	5											
		Anteil in %	1,68	1,88	1,59	1,45	1,87	1,99	2,57	1,98											
		CI Anteil in %	[0,52; 2,83]	[0,59; 3,17]	[0,33; 2,85]	[0,19; 2,71]	[0,39; 3,35]	[0,41; 3,56]	[0,69; 4,46]	[0,26; 3,71]											
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	238	224	210	189	176	171	157	147											
		Anteil in %	49,90	52,58	55,56	54,78	54,83	56,62	57,72	58,33											
		CI Anteil in %	[45,40; 54,39]	[47,83; 57,33]	[50,54; 60,57]	[49,52; 60,04]	[49,38; 60,28]	[51,02; 62,22]	[51,84; 63,60]	[52,23; 64,43]											
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	231	194	162	151	139	125	108	100											
		Anteil in %	48,43	45,54	42,86	43,77	43,30	41,39	39,71	39,68											
		CI Anteil in %	[43,94; 52,92]	[40,81; 50,27]	[37,86; 47,85]	[38,53; 49,01]	[37,87; 48,73]	[35,83; 46,95]	[33,88; 45,53]	[33,63; 45,74]											
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	11	13	9	6	4	4	3	4											
		Anteil in %	2,31	3,05	2,38	1,74	1,25	1,32	1,10	1,59											
		CI Anteil in %	[0,96; 3,65]	[1,42; 4,69]	[0,84; 3,92]	[0,36; 3,12]	[0,03; 2,46]	[0,03; 2,62]	[0,00; 2,35]	[0,04; 3,13]											
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	185	161	137	129	122	106	88	83											
		Anteil in %	38,78	37,79	36,24	37,39	38,01	35,10	32,35	32,94											
		CI Anteil in %	[34,41; 43,16]	[33,18; 42,40]	[31,39; 41,10]	[32,28; 42,50]	[32,69; 43,32]	[29,71; 40,49]	[26,78; 37,92]	[27,12; 38,75]											
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	1	1	0	0	0	0	1												
	Anteil in %	0,21	0,23	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40												
	CI Anteil in %	[0,00; 0,62]	[0,00; 0,69]	[0,00; 0,78]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,17]												
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	34	19	15	16	13	15	17	12												
	Anteil in %	7,13	4,46	3,97	4,64	4,05	4,97	6,25	4,76												
	CI Anteil in %	[4,82; 9,44]	[2,50; 6,42]	[2,00; 5,94]	[2,42; 6,86]	[1,89; 6,21]	[2,51; 7,42]	[3,37; 9,13]	[2,13; 7,40]												
Patienten insgesamt	Anzahl	550	530	474	421	389	362	335	309												
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	355	337	310	279	257	235	222												
	auswertbar	Anzahl	355	318	295	264	252	227	216												
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	182	170	167	146	148	123	116												
		Anteil in %	51,27	53,46	56,61	55,30	58,73	54,19	53,70												
		CI Anteil in %	[46,06; 56,47]	[47,97; 58,95]	[50,94; 62,28]	[49,29; 61,31]	[52,64; 64,82]	[47,69; 60,68]	[47,04; 60,37]												
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1	1	1	0	0	1	1												
		Anteil in %	0,28	0,31	0,34	0,00	0,00	0,44	0,46												
		CI Anteil in %	[0,00; 0,83]	[0,00; 0,93]	[0,00; 1,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,30]	[0,00; 1,37]												
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	181	169	166	146	148	122	115												
		Anteil in %	50,99	53,14	56,27	55,30	58,73	53,74	53,24												
		CI Anteil in %	[45,78; 56,19]	[47,65; 58,64]	[50,60; 61,94]	[49,29; 61,31]	[52,64; 64,82]	[47,24; 60,25]	[46,57; 59,91]												
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	173	148	128	118	104	104	100												
		Anteil in %	48,73	46,54	43,39	44,70	41,27	45,81	46,30												
		CI Anteil in %	[43,53; 53,94]	[41,05; 52,03]	[37,72; 49,06]	[38,69; 50,71]	[35,18; 47,36]	[39,32; 52,31]	[39,63; 52,96]												
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	4	0	1	3	1	2	3												
		Anteil in %	1,13	0,00	0,34	1,14	0,40	0,88	1,39												
		CI Anteil in %	[0,03; 2,23]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,00]	[0,00; 2,42]	[0,00; 1,17]	[0,00; 2,10]	[0,00; 2,95]												
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	146	133	115	108	93	85													
		Anteil in %	41,13	41,82	38,98	40,91	36,90	41,41	39,35												
		CI Anteil in %	[36,00; 46,25]	[36,39; 47,25]	[33,41; 44,56]	[34,97; 46,85]	[30,93; 42,87]	[34,99; 47,83]	[32,82; 45,88]												
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	0	0	1	0	2	0	0													
	Anteil in %	0,00	0,00	0,34	0,00	0,79	0,00	0,00													
	CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,89]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]													
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	23	15	11	7	8	8	12													
	Anteil in %	6,48	4,72	3,73	2,65	3,17	3,52	5,56													
	CI Anteil in %	[3,91; 9,04]	[2,38; 7,05]	[1,56; 5,89]	[0,71; 4,59]	[1,01; 5,34]	[1,12; 5,93]	[2,49; 8,62]													
Patienten insgesamt	Anzahl	395	373	343	308	284	260	247													

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	405	380	338	304	283	264															
	auswertbar	Anzahl	405	361	320	296	276	253															
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	218	188	177	174	158	140															
		Anteil in %	53,83	52,08	55,31	58,78	57,25	55,34															
		CI Anteil in %	[48,97; 58,69]	[46,92; 57,24]	[49,86; 60,77]	[53,17; 64,40]	[51,40; 63,09]	[49,20; 61,47]															
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	10	6	8	9	9	6															
		Anteil in %	2,47	1,66	2,50	3,04	3,26	2,37															
		CI Anteil in %	[0,96; 3,98]	[0,34; 2,98]	[0,79; 4,21]	[1,08; 5,00]	[1,16; 5,36]	[0,49; 4,25]															
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	208	182	169	165	149	134															
		Anteil in %	51,36	50,42	52,81	55,74	53,99	52,96															
		CI Anteil in %	[46,48; 56,23]	[45,25; 55,58]	[47,33; 58,29]	[50,08; 61,41]	[48,09; 59,88]	[46,80; 59,13]															
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	187	173	143	122	118	113															
		Anteil in %	46,17	47,92	44,69	41,22	42,75	44,66															
		CI Anteil in %	[41,31; 51,03]	[42,76; 53,08]	[39,23; 50,14]	[35,60; 46,83]	[36,91; 48,60]	[38,53; 50,80]															
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	2	7	5	2	2	3															
		Anteil in %	0,49	1,94	1,56	0,68	0,72	1,19															
		CI Anteil in %	[0,00; 1,18]	[0,51; 3,36]	[0,20; 2,92]	[0,00; 1,61]	[0,00; 1,73]	[0,00; 2,52]															
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	153	147	121	108	102	100															
		Anteil in %	37,78	40,72	37,81	36,49	36,96	39,53															
		CI Anteil in %	[33,05; 42,51]	[35,64; 45,80]	[32,49; 43,13]	[30,99; 41,98]	[31,25; 42,66]	[33,49; 45,56]															
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	3	2	0	1	1	1																
	Anteil in %	0,74	0,55	0,00	0,34	0,36	0,40																
	CI Anteil in %	[0,00; 1,58]	[0,00; 1,32]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,00]	[0,00; 1,07]	[0,00; 1,17]																
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	29	17	17	11	13	9																
	Anteil in %	7,16	4,71	5,31	3,72	4,71	3,56																
	CI Anteil in %	[4,65; 9,67]	[2,52; 6,90]	[2,85; 7,77]	[1,56; 5,87]	[2,21; 7,21]	[1,27; 5,84]																
Patienten insgesamt	Anzahl	444	414	368	329	305	286																
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	421	396	353	315	288																
	auswertbar	Anzahl	421	383	335	297	279																
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	215	221	201	177	172																
		Anteil in %	51,07	57,70	60,00	59,60	61,65																
		CI Anteil in %	[46,29; 55,85]	[52,75; 62,66]	[54,75; 65,25]	[54,01; 65,19]	[55,93; 67,36]																
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	12	10	6	4	3																
		Anteil in %	2,85	2,61	1,79	1,35	1,08																
		CI Anteil in %	[1,26; 4,44]	[1,01; 4,21]	[0,37; 3,21]	[0,03; 2,66]	[0,00; 2,29]																
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	203	211	195	173	169																
		Anteil in %	48,22	55,09	58,21	58,25	60,57																
		CI Anteil in %	[43,44; 53,00]	[50,10; 60,08]	[52,92; 63,50]	[52,63; 63,87]	[54,83; 66,32]																
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	206	162	134	120	107																
		Anteil in %	48,93	42,30	40,00	40,40	38,35																
		CI Anteil in %	[44,15; 53,71]	[37,34; 47,25]	[34,75; 45,25]	[34,81; 45,99]	[32,64; 44,07]																
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	6	8	5	6	6																
		Anteil in %	1,43	2,09	1,49	2,02	2,15																
		CI Anteil in %	[0,29; 2,56]	[0,65; 3,52]	[0,19; 2,79]	[0,42; 3,62]	[0,45; 3,86]																
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	171	134	109	100	90																
		Anteil in %	40,62	34,99	32,54	33,67	32,26																
		CI Anteil in %	[35,92; 45,31]	[30,20; 39,77]	[27,51; 37,56]	[28,29; 39,05]	[26,76; 37,75]																
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	0	0	1	0																	
	Anteil in %	0,24	0,00	0,00	0,34	0,00																	
	CI Anteil in %	[0,00; 0,70]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,00]	[0,00; 0,00]																	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	28	20	20	13	11																	
	Anteil in %	6,65	5,22	5,97	4,38	3,94																	
	CI Anteil in %	[4,27; 9,03]	[2,99; 7,45]	[3,43; 8,51]	[2,05; 6,71]	[1,65; 6,23]																	
Patienten insgesamt	Anzahl	469	440	392	349	320																	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	426	405	363	324																
	auswertbar	Anzahl	426	393	337	311																
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	219	226	206	182																
		Anteil in %	51,41	57,51	61,13	58,52																
		CI Anteil in %	[46,66; 56,16]	[52,61; 62,40]	[55,92; 66,34]	[53,04; 64,01]																
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	9	10	12	10																
		Anteil in %	2,11	2,54	3,56	3,22																
		CI Anteil in %	[0,75; 3,48]	[0,99; 4,10]	[1,58; 5,54]	[1,25; 5,18]																
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	210	216	194	172																
		Anteil in %	49,30	54,96	57,57	55,31																
		CI Anteil in %	[44,54; 54,05]	[50,04; 59,89]	[52,28; 62,85]	[49,77; 60,84]																
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	207	167	131	129																
		Anteil in %	48,59	42,49	38,87	41,48																
		CI Anteil in %	[43,84; 53,34]	[37,60; 47,39]	[33,66; 44,08]	[35,99; 46,96]																
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	10	7	1	0																
		Anteil in %	2,35	1,78	0,30	0,00																
		CI Anteil in %	[0,91; 3,79]	[0,47; 3,09]	[0,00; 0,88]	[0,00; 0,00]																
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	169	139	110	115																
		Anteil in %	39,67	35,37	32,64	36,98																
		CI Anteil in %	[35,02; 44,32]	[30,64; 40,10]	[27,63; 37,65]	[31,60; 42,35]																
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	0	0	0	1																	
	Anteil in %	0,00	0,00	0,00	0,32																	
	CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,95]																	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	28	21	20	13																	
	Anteil in %	6,57	5,34	5,93	4,18																	
	CI Anteil in %	[4,22; 8,93]	[3,12; 7,57]	[3,41; 8,46]	[1,95; 6,41]																	
Patienten insgesamt	Anzahl	467	444	397	353																	
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	407	375	335																	
	auswertbar	Anzahl	407	356	312																	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	210	205	172																	
		Anteil in %	51,60	57,58	55,13																	
		CI Anteil in %	[46,74; 56,46]	[52,44; 62,73]	[49,60; 60,66]																	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	10	8	5																	
		Anteil in %	2,46	2,25	1,60																	
		CI Anteil in %	[0,95; 3,96]	[0,71; 3,79]	[0,21; 3,00]																	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	200	197	167																	
		Anteil in %	49,14	55,34	53,53																	
		CI Anteil in %	[44,28; 54,00]	[50,17; 60,51]	[47,98; 59,07]																	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	197	151	140																	
		Anteil in %	48,40	42,42	44,87																	
		CI Anteil in %	[43,54; 53,26]	[37,27; 47,56]	[39,34; 50,40]																	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	5	3	3																	
		Anteil in %	1,23	0,84	0,96																	
		CI Anteil in %	[0,16; 2,30]	[0,00; 1,79]	[0,00; 2,05]																	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	170	133	124																	
		Anteil in %	41,77	37,36	39,74																	
		CI Anteil in %	[36,97; 46,57]	[32,33; 42,39]	[34,30; 45,18]																	
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	0	0	1																		
	Anteil in %	0,00	0,00	0,32																		
	CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,95]																		
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	22	15	12																		
	Anteil in %	5,41	4,21	3,85																		
	CI Anteil in %	[3,21; 7,60]	[2,12; 6,30]	[1,71; 5,98]																		
Patienten insgesamt	Anzahl	439	405	364																		

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	384	366																		
	auswertbar	Anzahl	384	350																		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	211	199																		
		Anteil in %		54,95	56,86																	
		CI Anteil in %		[49,96; 59,93]	[51,66; 62,05]																	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	13	9																		
		Anteil in %		3,39	2,57																	
		CI Anteil in %		[1,57; 5,20]	[0,91; 4,23]																	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	198	190																		
		Anteil in %		51,56	54,29																	
		CI Anteil in %		[46,56; 56,57]	[49,06; 59,51]																	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	173	151																		
		Anteil in %		45,05	43,14																	
		CI Anteil in %		[40,07; 50,04]	[37,95; 48,34]																	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	4	3																		
		Anteil in %		1,04	0,86																	
		CI Anteil in %		[0,02; 2,06]	[0,00; 1,82]																	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	137	127																		
		Anteil in %		35,68	36,29																	
		CI Anteil in %		[30,88; 40,47]	[31,24; 41,33]																	
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	0																			
	Anteil in %		0,26	0,00																		
	CI Anteil in %		[0,00; 0,77]	[0,00; 0,00]																		
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	31	21																			
	Anteil in %		8,07	6,00																		
	CI Anteil in %		[5,34; 10,80]	[3,51; 8,49]																		
Patienten insgesamt	Anzahl	419	401																			
2012-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	407																			
	auswertbar	Anzahl	406																			
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	217																			
		Anteil in %		53,45																		
		CI Anteil in %		[48,59; 58,31]																		
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	5																			
		Anteil in %		1,23																		
		CI Anteil in %		[0,16; 2,31]																		
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	212																			
		Anteil in %		52,22																		
		CI Anteil in %		[47,35; 57,08]																		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	189																			
		Anteil in %		46,55																		
		CI Anteil in %		[41,69; 51,41]																		
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	6																			
		Anteil in %		1,48																		
		CI Anteil in %		[0,30; 2,65]																		
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	159																			
		Anteil in %		39,16																		
		CI Anteil in %		[34,41; 43,92]																		
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	0																				
	Anteil in %		0,00																			
	CI Anteil in %		[0,00; 0,00]																			
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	24																				
	Anteil in %		5,91																			
	CI Anteil in %		[3,61; 8,21]																			
Patienten insgesamt	Anzahl	441																				

In Tabelle B.3.1.5 wird die Entwicklung des **mittleren systolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

In der Kohorte 2003-1 lagen im Beitrittsjahr für 2203 Patienten im Hypertoniker-Kollektiv auswertbare Angaben zum systolischen Blutdruck vor. Der arithmetische Mittelwert lag bei 138,42 mmHg, der Median bei 140,00 mmHg der dafür auswertbaren Patienten. Im letzten Berichtsjahr lagen für 332 der dann noch eingeschriebenen Patienten auswertbare Angaben vor. Der Mittelwert lag bei 132,89 und der Median bei 130,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle B.3.1.5 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2203	1969	1724	1524	1361	1227	1115	933	839	743	689	621	560	518	477	433	400	370	336
	auswertbar	Anzahl	2203	1554	1623	1489	1321	1200	1056	902	804	716	645	590	537	492	464	424	386	361	332
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,42	137,31	136,76	136,70	136,39	135,05	134,63	133,44	133,37	133,64	132,11	133,13	132,84	132,84	132,48	132,83	132,31	132,01	132,89
		CI Mean	[137,76; 139,09]	[136,53; 138,09]	[136,03; 137,48]	[135,95; 137,45]	[135,60; 137,17]	[134,22; 135,87]	[133,76; 135,51]	[132,50; 134,38]	[132,36; 134,37]	[132,58; 134,69]	[131,10; 133,11]	[131,97; 134,29]	[131,64; 134,03]	[131,57; 134,12]	[131,20; 133,75]	[131,49; 134,18]	[130,94; 133,68]	[130,74; 133,28]	[131,27; 134,52]
		Median	140,00	136,00	135,00	138,00	138,00	135,00	135,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2536</i>	<i>2267</i>	<i>1979</i>	<i>1753</i>	<i>1566</i>	<i>1413</i>	<i>1283</i>	<i>1072</i>	<i>963</i>	<i>857</i>	<i>793</i>	<i>715</i>	<i>644</i>	<i>597</i>	<i>549</i>	<i>500</i>	<i>460</i>	<i>427</i>	<i>390</i>	
2003-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1782	1520	1368	1218	1105	985	856	770	700	662	605	574	538	498	464	427	396	373	
	auswertbar	Anzahl	1782	1401	1326	1176	1074	949	827	739	685	626	575	547	519	476	452	410	383	357	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,99	137,51	137,34	136,36	135,93	135,61	134,70	134,36	134,35	133,82	134,30	134,08	134,05	133,96	133,76	132,85	134,37	133,33	
		CI Mean	[138,18; 139,79]	[136,66; 138,36]	[136,50; 138,17]	[135,48; 137,23]	[135,04; 136,83]	[134,67; 136,55]	[133,70; 135,69]	[133,29; 135,43]	[133,26; 135,45]	[132,68; 134,96]	[133,08; 135,52]	[132,84; 135,31]	[132,81; 135,28]	[132,82; 135,10]	[132,43; 135,09]	[131,34; 134,37]	[132,89; 135,84]	[131,85; 134,82]	
		Median	140,00	140,00	140,00	136,00	135,00	135,00	135,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	133,00	130,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2071</i>	<i>1748</i>	<i>1572</i>	<i>1402</i>	<i>1268</i>	<i>1130</i>	<i>975</i>	<i>882</i>	<i>803</i>	<i>754</i>	<i>690</i>	<i>652</i>	<i>609</i>	<i>565</i>	<i>530</i>	<i>490</i>	<i>454</i>	<i>430</i>		
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	766	680	601	532	476	434	402	353	331	308	284	258	236	222	209	192	181		
	auswertbar	Anzahl	766	644	570	505	455	423	375	344	310	290	262	240	223	215	198	183	168		
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,87	138,04	137,12	135,86	136,87	135,53	134,86	135,48	135,28	135,09	135,11	135,30	134,14	132,97	132,75	135,96	132,44		
		CI Mean	[138,62; 141,13]	[136,77; 139,32]	[135,84; 138,41]	[134,50; 137,23]	[135,40; 138,34]	[134,24; 136,82]	[133,40; 136,32]	[133,89; 137,07]	[133,66; 136,91]	[133,38; 136,80]	[133,25; 136,96]	[133,24; 137,36]	[132,08; 136,21]	[130,74; 135,19]	[130,46; 135,04]	[133,28; 138,64]	[130,04; 134,84]		
		Median	140,00	140,00	140,00	136,00	135,00	135,00	132,00	133,00	134,00	135,00	135,00	134,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>870</i>	<i>773</i>	<i>679</i>	<i>599</i>	<i>529</i>	<i>476</i>	<i>440</i>	<i>387</i>	<i>360</i>	<i>337</i>	<i>309</i>	<i>282</i>	<i>258</i>	<i>243</i>	<i>227</i>	<i>210</i>	<i>198</i>			
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	579	524	472	414	368	327	298	283	264	242	231	217	202	187	181	169			
	auswertbar	Anzahl	579	492	452	396	331	296	266	238	230	215	197	183	174	156	154	141			
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	137,83	135,90	135,35	136,31	134,81	134,39	134,40	132,65	133,54	133,79	134,02	134,23	133,36	133,21	133,32	131,96			
		CI Mean	[136,50; 139,17]	[134,50; 137,30]	[134,00; 136,70]	[134,85; 137,77]	[133,08; 136,54]	[132,76; 136,02]	[132,65; 136,15]	[130,92; 134,39]	[131,65; 135,44]	[131,78; 135,79]	[131,82; 136,22]	[131,98; 136,49]	[130,98; 135,73]	[130,79; 135,63]	[130,55; 136,10]	[129,66; 134,27]			
		Median	139,00	135,00	135,00	135,00	130,00	134,00	135,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>659</i>	<i>590</i>	<i>532</i>	<i>467</i>	<i>416</i>	<i>372</i>	<i>339</i>	<i>320</i>	<i>297</i>	<i>273</i>	<i>262</i>	<i>246</i>	<i>228</i>	<i>213</i>	<i>206</i>	<i>191</i>				
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	770	718	666	578	509	448	418	379	353	329	308	283	255	233	213				
	auswertbar	Anzahl	770	690	616	552	487	432	390	364	334	316	296	265	242	221	204				
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,98	137,73	137,15	135,57	134,98	135,87	135,72	135,79	136,21	134,73	135,59	132,94	132,57	133,16	131,36				
		CI Mean	[138,81; 141,15]	[136,52; 138,95]	[135,92; 138,38]	[134,27; 136,88]	[133,63; 136,34]	[134,52; 137,23]	[134,06; 137,37]	[134,10; 137,48]	[134,48; 137,94]	[133,10; 136,36]	[133,68; 137,50]	[131,04; 134,84]	[130,56; 134,57]	[131,13; 135,19]	[129,30; 133,42]				
		Median	140,00	137,50	138,50	135,00	132,00	135,00	135,00	135,00	134,50	135,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>859</i>	<i>795</i>	<i>730</i>	<i>633</i>	<i>558</i>	<i>489</i>	<i>457</i>	<i>414</i>	<i>387</i>	<i>358</i>	<i>333</i>	<i>307</i>	<i>279</i>	<i>254</i>	<i>233</i>					
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1060	960	846	747	652	608	553	514	470	428	400	371	342	307					
	auswertbar	Anzahl	1060	905	810	704	630	571	525	492	449	407	384	354	325	290					
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	136,44	136,01	135,56	135,20	135,30	134,82	134,72	134,60	134,54	134,22	133,36	133,51	133,25	132,72					
		CI Mean	[135,49; 137,40]	[134,95; 137,08]	[134,44; 136,68]	[134,04; 136,36]	[134,06; 136,54]	[133,51; 136,14]	[133,41; 136,04]	[133,16; 136,04]	[133,09; 136,00]	[132,68; 135,76]	[131,79; 134,94]	[131,80; 135,21]	[131,74; 134,75]	[130,96; 134,48]					
		Median	135,00	135,00	135,00	130,00	135,00	134,00	135,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1182</i>	<i>1074</i>	<i>947</i>	<i>842</i>	<i>734</i>	<i>687</i>	<i>622</i>	<i>577</i>	<i>528</i>	<i>478</i>	<i>442</i>	<i>410</i>	<i>378</i>	<i>340</i>						
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1190	1111	1008	905	834	755	710	642	593	548	513	470	433						
	auswertbar	Anzahl	1190	1073	956	869	775	720	661	611	568	531	488	447	420						
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	137,61	135,44	135,43	135,04	134,82	134,90	134,90	135,07	134,75	134,26	134,36	133,76	134,87						
		CI Mean	[136,64; 138,59]	[134,45; 136,44]	[134,39; 136,47]	[133,97; 136,12]	[133,71; 135,93]	[133,81; 135,98]	[133,71; 136,09]	[133,79; 136,35]	[133,43; 136,06]	[132,87; 135,65]	[132,99; 135,72]	[132,29; 135,22]	[133,47; 136,27]						
		Median	140,00	135,00	134,50	133,00	133,00	133,50	131,00	135,00	132,00	132,00	130,00	132,00	135,00						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1328</i>	<i>1241</i>	<i>1122</i>	<i>1007</i>	<i>928</i>	<i>844</i>	<i>793</i>	<i>715</i>	<i>659</i>	<i>606</i>	<i>566</i>	<i>516</i>	<i>473</i>							

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1611	1525	1369	1269	1132	1041	954	866	787	727	676	627							
	auswertbar	Anzahl	1611	1409	1287	1177	1032	969	897	819	754	688	639	591							
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	136,93	135,80	136,17	135,34	135,74	135,10	134,77	134,71	134,79	132,96	134,01	133,39							
		CI Mean	[136,15; 137,71]	[135,00; 136,60]	[135,31; 137,03]	[134,44; 136,23]	[134,75; 136,72]	[134,08; 136,11]	[133,74; 135,79]	[133,67; 135,75]	[133,70; 135,88]	[131,87; 134,05]	[132,86; 135,15]	[132,21; 134,56]							
		Median	139,00	135,00	135,00	135,00	135,00	134,00	135,00	132,00	133,50	130,00	130,00	130,00							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1803</i>	<i>1704</i>	<i>1527</i>	<i>1413</i>	<i>1260</i>	<i>1159</i>	<i>1061</i>	<i>964</i>	<i>878</i>	<i>811</i>	<i>753</i>	<i>696</i>								
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1884	1755	1631	1473	1341	1204	1120	1025	954	882	798								
	auswertbar	Anzahl	1884	1683	1514	1365	1253	1146	1066	972	888	835	745								
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	137,71	136,01	136,06	135,62	135,49	135,89	135,81	135,12	134,46	134,21	134,65								
		CI Mean	[136,97; 138,45]	[135,24; 136,77]	[135,25; 136,87]	[134,76; 136,48]	[134,62; 136,36]	[134,98; 136,80]	[134,85; 136,77]	[134,14; 136,10]	[133,43; 135,50]	[133,20; 135,21]	[133,56; 135,74]								
		Median	140,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	133,50	132,00	132,00	130,00	130,00								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2076</i>	<i>1926</i>	<i>1782</i>	<i>1605</i>	<i>1459</i>	<i>1307</i>	<i>1216</i>	<i>1116</i>	<i>1038</i>	<i>958</i>	<i>865</i>									
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1039	981	878	798	694	631	557	511	465	433									
	auswertbar	Anzahl	1039	910	776	719	638	589	525	487	435	410									
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	135,94	135,84	136,16	135,36	134,82	135,78	135,17	134,08	134,19	134,40									
		CI Mean	[134,97; 136,91]	[134,85; 136,83]	[134,98; 137,35]	[134,14; 136,58]	[133,57; 136,08]	[134,51; 137,06]	[133,78; 136,57]	[132,67; 135,49]	[132,67; 135,70]	[132,80; 135,99]									
		Median	135,00	135,00	135,00	130,00	132,50	135,00	133,00	130,00	130,00	130,00									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1157</i>	<i>1093</i>	<i>978</i>	<i>888</i>	<i>770</i>	<i>700</i>	<i>618</i>	<i>562</i>	<i>513</i>	<i>476</i>										
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	837	791	726	644	586	531	491	441	416										
	auswertbar	Anzahl	837	737	679	599	545	498	461	426	398										
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	137,66	135,88	136,13	134,94	134,63	134,95	133,95	134,03	134,11										
		CI Mean	[136,51; 138,81]	[134,71; 137,05]	[134,85; 137,42]	[133,66; 136,22]	[133,34; 135,92]	[133,63; 136,28]	[132,61; 135,30]	[132,62; 135,43]	[132,58; 135,65]										
		Median	140,00	135,00	135,00	132,00	135,00	135,00	132,00	130,00	130,00										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>927</i>	<i>876</i>	<i>802</i>	<i>707</i>	<i>644</i>	<i>585</i>	<i>539</i>	<i>486</i>	<i>458</i>											
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	477	462	409	363	339	315	294	271											
	auswertbar	Anzahl	477	426	378	345	321	302	272	252											
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	136,29	135,29	134,21	134,46	133,91	133,88	134,58	134,32											
		CI Mean	[134,63; 137,96]	[133,76; 136,81]	[132,60; 135,81]	[132,81; 136,12]	[132,23; 135,60]	[132,14; 135,63]	[132,46; 136,71]	[132,44; 136,20]											
		Median	135,00	133,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>550</i>	<i>530</i>	<i>474</i>	<i>421</i>	<i>389</i>	<i>362</i>	<i>335</i>	<i>309</i>												
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	355	337	310	279	257	235	222												
	auswertbar	Anzahl	355	318	295	264	252	227	216												
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	136,80	134,54	134,46	134,40	134,56	135,14	135,17												
		CI Mean	[135,06; 138,53]	[132,85; 136,22]	[132,68; 136,23]	[132,66; 136,14]	[132,85; 136,27]	[133,16; 137,12]	[133,11; 137,22]												
		Median	135,00	132,00	130,00	130,50	130,00	135,00	134,00												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>395</i>	<i>373</i>	<i>343</i>	<i>308</i>	<i>284</i>	<i>260</i>	<i>247</i>													
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	405	380	338	304	283	264													
	auswertbar	Anzahl	405	361	320	296	276	253													
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	135,33	136,14	135,06	134,54	135,36	133,85													
		CI Mean	[133,65; 137,00]	[134,51; 137,76]	[133,26; 136,86]	[132,75; 136,33]	[133,47; 137,25]	[132,06; 135,65]													
		Median	134,00	135,00	132,00	130,00	132,00	130,00													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>444</i>	<i>414</i>	<i>368</i>	<i>329</i>	<i>305</i>	<i>286</i>														
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	421	396	353	315	288														
	auswertbar	Anzahl	421	383	335	297	279														
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	136,96	134,09	134,39	133,35	133,77														
		CI Mean	[135,28; 138,64]	[132,50; 135,68]	[132,64; 136,13]	[131,50; 135,20]	[131,84; 135,69]														
		Median	135,00	130,00	130,00	130,00	130,00														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>469</i>	<i>440</i>	<i>392</i>	<i>349</i>	<i>320</i>															

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	426	405	363	324																
	auswertbar	Anzahl	426	393	337	311																
		Mean	135,42	134,19	133,51	133,29																
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[133,78; 137,07]	[132,47; 135,90]	[131,65; 135,38]	[131,49; 135,09]																
		Median	134,00	130,00	130,00	130,00																
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>467</i>	<i>444</i>	<i>397</i>	<i>353</i>																
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	407	375	335																	
	auswertbar	Anzahl	407	356	312																	
		Mean	135,27	133,29	134,08																	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[133,71; 136,84]	[131,58; 135,00]	[132,35; 135,80]																	
		Median	135,00	130,00	133,00																	
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>439</i>	<i>405</i>	<i>364</i>																	
2011-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	384	366																		
	auswertbar	Anzahl	384	350																		
		Mean	136,32	135,51																		
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[134,50; 138,13]	[133,80; 137,22]																		
		Median	133,50	135,00																		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>419</i>	<i>401</i>																		
2012-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	407																			
	auswertbar	Anzahl	407																			
		Mean	135,74																			
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	CI Mean	[134,18; 137,29]																			
		Median	135,00																			
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>441</i>																			

In Tabelle B.3.1.6 wird die Entwicklung des **mittleren diastolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutraf:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

In der Kohorte 2003-1 lagen im Beitrittsjahr für 2203 Patienten im Hypertoniker-Kollektiv auswertbare Angaben zum diastolischen Blutdruck vor. Der arithmetische Mittelwert lag bei 79,36 mmHg, der Median bei 80,00 mmHg der dafür auswertbaren Patienten. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für 332 der dann noch eingeschriebenen Patienten auswertbare Angaben vor. Der Mittelwert lag für diese Patienten bei 77,08 und der Median bei 80,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle B.3.1.6 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit primären Endpunkten

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2003-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2203	1969	1724	1524	1361	1227	1115	933	839	743	689	621	560	518	477	433	400	370	336	
	auswertbar	Anzahl	2203	1554	1623	1489	1321	1200	1056	902	804	716	645	590	537	492	464	424	386	361	332	
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean		79,36	79,16	78,94	78,38	78,12	77,62	77,82	77,30	77,13	77,30	76,66	76,91	76,73	76,74	76,67	76,81	76,74	77,34	77,08
		CI Mean		[78,99; 79,73]	[78,69; 79,62]	[78,54; 79,35]	[77,95; 78,81]	[77,65; 78,58]	[77,15; 78,08]	[77,29; 78,34]	[76,72; 77,88]	[76,52; 77,74]	[76,67; 77,93]	[76,00; 77,32]	[76,21; 77,60]	[75,97; 77,49]	[75,99; 77,47]	[75,87; 77,63]	[75,98; 77,64]	[75,84; 77,64]	[76,41; 78,27]	[76,15; 78,01]
		Median		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2536</i>	<i>2267</i>	<i>1979</i>	<i>1753</i>	<i>1566</i>	<i>1413</i>	<i>1283</i>	<i>1072</i>	<i>963</i>	<i>857</i>	<i>793</i>	<i>715</i>	<i>644</i>	<i>597</i>	<i>549</i>	<i>500</i>	<i>460</i>	<i>427</i>	<i>390</i>		
2003-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1782	1520	1368	1218	1105	985	856	770	700	662	605	574	538	498	464	427	396	373		
	auswertbar	Anzahl	1782	1401	1326	1176	1074	949	827	739	685	626	575	547	519	476	452	410	383	357		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean		79,87	79,55	78,72	78,60	78,48	78,23	78,22	78,12	78,14	77,65	77,89	77,97	77,38	77,78	77,77	77,06	77,14	77,56	
		CI Mean		[79,45; 80,29]	[79,12; 79,62]	[78,27; 79,16]	[78,13; 79,07]	[77,97; 78,98]	[77,70; 78,76]	[77,67; 78,77]	[77,58; 78,66]	[77,57; 78,71]	[77,04; 78,26]	[77,23; 78,56]	[77,32; 78,61]	[76,62; 78,14]	[77,09; 78,47]	[76,99; 78,55]	[76,22; 77,91]	[76,30; 77,91]	[76,71; 78,41]	
		Median		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2071</i>	<i>1748</i>	<i>1572</i>	<i>1402</i>	<i>1268</i>	<i>1130</i>	<i>975</i>	<i>882</i>	<i>803</i>	<i>754</i>	<i>690</i>	<i>652</i>	<i>609</i>	<i>565</i>	<i>530</i>	<i>490</i>	<i>454</i>	<i>430</i>			
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	766	680	601	532	476	434	402	353	331	308	284	258	236	222	209	192	181			
	auswertbar	Anzahl	766	644	570	505	455	423	375	344	310	290	262	240	223	215	198	183	168			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean		80,48	79,39	78,78	77,99	78,09	77,43	77,81	77,29	77,84	77,83	77,24	77,08	76,43	76,36	75,48	76,39	75,75		
		CI Mean		[79,80; 81,15]	[78,73; 80,05]	[78,09; 79,47]	[77,25; 78,73]	[77,31; 78,87]	[76,64; 78,21]	[77,03; 78,60]	[76,38; 78,87]	[76,82; 78,79]	[76,87; 78,81]	[76,17; 78,31]	[75,96; 78,20]	[75,15; 77,70]	[75,00; 77,72]	[74,15; 76,81]	[75,01; 77,78]	[74,37; 77,13]		
		Median		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>870</i>	<i>773</i>	<i>679</i>	<i>599</i>	<i>529</i>	<i>476</i>	<i>440</i>	<i>387</i>	<i>360</i>	<i>337</i>	<i>309</i>	<i>282</i>	<i>258</i>	<i>243</i>	<i>227</i>	<i>210</i>	<i>198</i>				
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	579	524	472	414	368	327	298	283	264	242	231	217	202	187	181	169				
	auswertbar	Anzahl	579	492	452	396	331	296	266	238	230	215	197	183	174	156	154	141				
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean		79,62	78,62	78,10	78,47	78,56	77,50	77,95	77,89	77,65	77,78	77,65	78,18	77,24	77,17	77,37	76,65			
		CI Mean		[78,90; 80,34]	[77,88; 79,36]	[77,30; 78,90]	[77,66; 79,27]	[77,66; 79,47]	[76,57; 78,43]	[77,07; 78,83]	[76,90; 78,87]	[76,49; 78,81]	[76,54; 79,02]	[76,48; 78,83]	[76,85; 79,51]	[75,93; 78,54]	[75,81; 78,54]	[75,96; 78,78]	[75,09; 78,20]			
		Median		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>659</i>	<i>590</i>	<i>532</i>	<i>467</i>	<i>416</i>	<i>372</i>	<i>339</i>	<i>320</i>	<i>297</i>	<i>273</i>	<i>262</i>	<i>246</i>	<i>228</i>	<i>213</i>	<i>206</i>	<i>191</i>					
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	770	718	666	578	509	448	418	379	353	329	308	283	255	233	213					
	auswertbar	Anzahl	770	690	616	552	487	432	390	364	334	316	296	265	242	221	204					
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean		80,36	79,12	78,92	78,41	77,95	78,55	78,02	78,10	78,12	76,96	77,34	77,61	77,00	77,87	77,19				
		CI Mean		[79,76; 80,96]	[78,49; 79,74]	[78,17; 79,67]	[77,66; 79,17]	[77,16; 78,74]	[77,76; 79,34]	[77,13; 78,91]	[77,20; 79,00]	[77,13; 79,10]	[75,96; 77,95]	[76,24; 78,44]	[76,54; 78,68]	[75,86; 78,13]	[76,77; 78,97]	[75,97; 78,41]				
		Median		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>859</i>	<i>795</i>	<i>730</i>	<i>633</i>	<i>558</i>	<i>489</i>	<i>457</i>	<i>414</i>	<i>387</i>	<i>358</i>	<i>333</i>	<i>307</i>	<i>279</i>	<i>254</i>	<i>233</i>						
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1060	960	846	747	652	608	553	514	470	428	400	371	342	307						
	auswertbar	Anzahl	1060	905	810	704	630	571	525	492	449	407	384	354	325	290						
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean		79,03	78,36	78,41	78,47	78,07	78,02	77,69	77,83	77,87	77,46	77,24	77,32	77,07	76,96					
		CI Mean		[78,51; 79,55]	[77,81; 78,91]	[77,83; 78,99]	[77,88; 79,06]	[77,41; 78,72]	[77,35; 78,70]	[76,95; 78,42]	[77,03; 78,62]	[77,05; 78,69]	[76,65; 78,26]	[76,37; 78,12]	[76,42; 78,23]	[76,19; 77,94]	[76,00; 77,92]					
		Median		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1182</i>	<i>1074</i>	<i>947</i>	<i>842</i>	<i>734</i>	<i>687</i>	<i>622</i>	<i>577</i>	<i>528</i>	<i>478</i>	<i>442</i>	<i>410</i>	<i>378</i>	<i>340</i>							
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1190	1111	1008	905	834	755	710	642	593	548	513	470	433							
	auswertbar	Anzahl	1190	1073	956	869	775	720	661	611	568	531	488	447	420							
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean		79,13	77,96	78,14	78,20	77,92	78,40	77,56	77,49	77,48	77,62	77,48	76,66	76,81						
		CI Mean		[78,63; 79,64]	[77,42; 78,51]	[77,57; 78,71]	[77,59; 78,82]	[77,28; 78,55]	[77,75; 79,05]	[76,91; 78,22]	[76,78; 78,19]	[76,75; 78,21]	[76,80; 78,43]	[76,67; 78,28]	[75,82; 77,51]	[76,01; 77,61]						
		Median		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1328</i>	<i>1241</i>	<i>1122</i>	<i>1007</i>	<i>928</i>	<i>844</i>	<i>793</i>	<i>715</i>	<i>659</i>	<i>606</i>	<i>566</i>	<i>516</i>	<i>473</i>								

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1611	1525	1369	1269	1132	1041	954	866	787	727	676	627						
	auswertbar	Anzahl	1611	1409	1287	1177	1032	969	897	819	754	688	639	591						
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,28	78,24	78,65	77,91	78,05	78,22	77,76	77,65	77,65	76,85	77,24	77,22						
		CI Mean	[78,85; 79,71]	[77,78; 78,71]	[78,18; 79,12]	[77,43; 78,40]	[77,52; 78,58]	[77,68; 78,77]	[77,19; 78,33]	[77,05; 78,24]	[77,03; 78,26]	[76,20; 77,49]	[76,60; 77,88]	[76,53; 77,91]						
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1803</i>	<i>1704</i>	<i>1527</i>	<i>1413</i>	<i>1260</i>	<i>1159</i>	<i>1061</i>	<i>964</i>	<i>878</i>	<i>811</i>	<i>753</i>	<i>696</i>							
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1884	1755	1631	1473	1341	1204	1120	1025	954	882	798							
	auswertbar	Anzahl	1884	1683	1514	1365	1253	1146	1066	972	888	835	745							
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,08	78,17	78,42	78,07	78,09	78,22	77,97	77,40	77,65	77,32	77,33							
		CI Mean	[78,68; 79,48]	[77,74; 78,59]	[77,97; 78,87]	[77,59; 78,54]	[77,60; 78,58]	[77,71; 78,73]	[77,45; 78,50]	[76,85; 77,95]	[77,07; 78,23]	[76,75; 77,90]	[76,72; 77,93]							
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2076</i>	<i>1926</i>	<i>1782</i>	<i>1605</i>	<i>1459</i>	<i>1307</i>	<i>1216</i>	<i>1116</i>	<i>1038</i>	<i>958</i>	<i>865</i>								
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1039	981	878	798	694	631	557	511	465	433								
	auswertbar	Anzahl	1039	910	776	719	638	589	525	487	435	410								
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	78,50	78,18	78,08	77,93	77,68	78,09	77,44	77,13	77,14	77,18								
		CI Mean	[77,99; 79,01]	[77,61; 78,76]	[77,44; 78,72]	[77,28; 78,58]	[77,02; 78,35]	[77,39; 78,79]	[76,66; 78,50]	[76,32; 77,93]	[76,30; 77,98]	[76,30; 78,07]								
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1157</i>	<i>1093</i>	<i>978</i>	<i>888</i>	<i>770</i>	<i>700</i>	<i>618</i>	<i>562</i>	<i>513</i>	<i>476</i>									
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	837	791	726	644	586	531	491	441	416									
	auswertbar	Anzahl	837	737	679	599	545	498	461	426	398									
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,56	78,91	78,56	78,55	78,15	78,02	77,89	77,61	77,59									
		CI Mean	[78,96; 80,16]	[78,27; 79,55]	[77,91; 79,20]	[77,87; 79,23]	[77,44; 78,87]	[77,25; 78,78]	[77,10; 78,67]	[76,76; 78,45]	[76,71; 78,47]									
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>927</i>	<i>876</i>	<i>802</i>	<i>707</i>	<i>644</i>	<i>585</i>	<i>539</i>	<i>486</i>	<i>458</i>										
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	477	462	409	363	339	315	294	271										
	auswertbar	Anzahl	477	426	378	345	321	302	272	252										
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	78,73	77,61	78,47	78,41	78,18	78,12	78,01	78,12										
		CI Mean	[77,90; 79,56]	[76,73; 78,48]	[77,62; 79,32]	[77,43; 79,38]	[77,22; 79,14]	[77,09; 79,15]	[76,92; 79,10]	[77,07; 79,17]										
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>550</i>	<i>530</i>	<i>474</i>	<i>421</i>	<i>389</i>	<i>362</i>	<i>335</i>	<i>309</i>											
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	355	337	310	279	257	235	222											
	auswertbar	Anzahl	355	318	295	264	252	227	216											
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,01	78,96	78,95	78,73	78,17	78,87	78,04											
		CI Mean	[78,02; 80,01]	[77,93; 79,98]	[77,85; 80,05]	[77,58; 79,87]	[77,18; 79,17]	[77,78; 79,96]	[76,91; 79,18]											
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>395</i>	<i>373</i>	<i>343</i>	<i>308</i>	<i>284</i>	<i>260</i>	<i>247</i>												
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	405	380	338	304	283	264												
	auswertbar	Anzahl	405	361	320	296	276	253												
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	78,54	78,80	77,74	77,69	78,16	78,24												
		CI Mean	[77,63; 79,44]	[77,81; 79,78]	[76,75; 78,74]	[76,77; 78,60]	[77,13; 79,20]	[77,20; 79,28]												
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>444</i>	<i>414</i>	<i>368</i>	<i>329</i>	<i>305</i>	<i>286</i>													
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	421	396	353	315	288													
	auswertbar	Anzahl	421	383	335	297	279													
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	78,87	78,55	77,51	77,98	78,42													
		CI Mean	[77,92; 79,82]	[77,57; 79,53]	[76,53; 78,49]	[76,93; 79,04]	[77,32; 79,52]													
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>469</i>	<i>440</i>	<i>392</i>	<i>349</i>	<i>320</i>														

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	426	405	363	324																		
	auswertbar	Anzahl	426	393	337	311																		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	78,83	77,80	77,56	77,61																		
		CI Mean	[77,91; 79,74]	[76,81; 78,80]	[76,54; 78,59]	[76,59; 78,63]																		
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00																		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>467</i>	<i>444</i>	<i>397</i>	<i>353</i>																		
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	407	375	335																			
	auswertbar	Anzahl	407	356	312																			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	78,51	77,97	78,32																			
		CI Mean	[77,58; 79,44]	[76,99; 78,94]	[77,29; 79,36]																			
		Median	80,00	80,00	80,00																			
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>439</i>	<i>405</i>	<i>364</i>																			
2011-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	384	366																				
	auswertbar	Anzahl	384	350																				
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,14	78,67																				
		CI Mean	[78,19; 80,09]	[77,74; 79,60]																				
		Median	80,00	80,00																				
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>419</i>	<i>401</i>																				
2012-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	407																					
	auswertbar	Anzahl	407																					
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	78,96																					
		CI Mean	[78,02; 79,90]																					
		Median	80,00																					
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>441</i>																					

B.3.2 Laborwerte

Neben der Einstellung des erhöhten Blutdrucks in den Normbereich ist bei Diabetikern die Einstellung bei erhöhten Blutzucker-/Glukosekonzentrationen entscheidend für den Therapieerfolg bzw. für das Verhindern von Folgeerkrankungen. Während die Messung des Blutzuckerwertes nur eine Momentaufnahme der aktuellen Stoffwechsellage liefert, kann durch Bestimmung des Anteils von glykolisiertem Hämoglobin (hier gemessen als: HbA1c) als Parameter der diabetischen Stoffwechselkontrolle im Sinne eines „Blutzuckergedächtnisses“ der mittlere Blutzuckerspiegel der vergangenen (4-12) Wochen beurteilt werden. So sind beispielsweise Diabetiker, deren Blutzuckerwerte durch eine intensivierete Insulintherapie dauerhaft gut eingestellt sind und die in der Folge HbA1c-Werte von unter 6,5% aufweisen, deutlich besser vor den Komplikationen und Folgeerkrankungen eines Diabetes mellitus geschützt als solche mit höheren HbA1c-Werten.

In Tabelle B.3.2.1 ist die Entwicklung der **HbA1c**-Konzentration ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnungen, die anschließend ausgewiesen werden. Für die Berechnung der durchschnittlichen Differenz zwischen HbA1c-Konzentration im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtshalbjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts-halbjahr 2536 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 2533 Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei ihnen betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich 7,21 %; der Median lag bei 7,00 %. Im letzten Berichtshalbjahr betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich 7,21 %; der Median lag bei 7,00 %, der dafür auswertbaren Patienten.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle B.3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit primären Endpunkten

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2536	2267	1979	1753	1566	1413	1283	1072	963	857	793	715	644	597	549	500	460	427	390
	auswertbar	Anzahl	2533	1793	1864	1713	1513	1379	1215	1039	925	828	743	680	618	570	534	490	445	418	386
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,21	7,00	7,11	7,00	7,14	7,07	7,18	7,08	7,11	7,06	7,14	7,14	7,21	7,22	7,22	7,11	7,23	7,14	7,21
		CI Mean	[7,16; 7,26]	[6,94; 7,05]	[7,06; 7,17]	[6,94; 7,05]	[7,08; 7,21]	[7,01; 7,14]	[7,11; 7,25]	[7,00; 7,16]	[7,04; 7,19]	[6,98; 7,14]	[7,07; 7,22]	[7,06; 7,23]	[7,12; 7,30]	[7,12; 7,31]	[7,12; 7,32]	[7,01; 7,21]	[7,12; 7,34]	[7,03; 7,25]	[7,10; 7,33]
		Median	7,00	6,80	6,95	6,80	6,90	6,90	7,00	6,80	6,90	6,85	7,00	6,90	7,00	7,00	7,00	6,90	7,00	6,90	7,00
		Fallbasis mittlere Differenz		1793	1864	1713	1513	1379	1215	1039	925	828	743	680	618	570	534	490	445	418	386
		Mittlere Differenz zur ED		-0,19	-0,06	-0,12	0,03	-0,03	0,07	-0,03	0,02	-0,03	0,05	0,07	0,13	0,14	0,16	0,08	0,24	0,13	0,20
		CI mittlere Differenz		[-0,23; -0,14]	[-0,11; -0,01]	[-0,18; -0,07]	[-0,04; -0,09]	[-0,09; -0,03]	[0,00; 0,14]	[-0,11; -0,05]	[-0,06; -0,10]	[-0,12; -0,05]	[-0,03; -0,14]	[-0,03; -0,16]	[0,03; 0,23]	[0,03; 0,25]	[0,05; 0,27]	[-0,03; -0,19]	[0,13; 0,35]	[0,02; 0,25]	[0,08; 0,32]
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,10	0,30	0,20	0,30	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	2071	1748	1572	1402	1268	1130	975	882	803	754	690	652	609	565	530	490	454	430	
	auswertbar	Anzahl	2067	1607	1523	1357	1229	1084	943	845	783	713	656	623	589	541	515	470	440	412	
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,19	7,11	7,00	7,10	7,09	7,15	7,08	7,12	7,10	7,15	7,13	7,23	7,22	7,38	7,20	7,29	7,11	7,26	
		CI Mean	[7,14; 7,25]	[7,04; 7,17]	[6,94; 7,06]	[7,04; 7,17]	[7,02; 7,15]	[7,08; 7,22]	[7,00; 7,16]	[7,04; 7,20]	[7,02; 7,18]	[7,07; 7,24]	[7,04; 7,22]	[7,13; 7,34]	[7,12; 7,32]	[7,27; 7,49]	[7,10; 7,30]	[7,18; 7,40]	[7,00; 7,22]	[7,15; 7,38]	
		Median	6,90	6,90	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00	7,00	7,20	7,00	7,10	6,85	7,05	
		Fallbasis mittlere Differenz		1604	1520	1354	1227	1082	941	843	781	711	654	621	587	539	513	468	439	411	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,05	-0,13	0,02	-0,02	0,03	-0,02	0,02	-0,02	0,06	0,03	0,18	0,16	0,34	0,17	0,27	0,11	0,28	
		CI mittlere Differenz		[-0,11; 0,01]	[-0,19; -0,08]	[-0,05; -0,08]	[-0,09; -0,04]	[-0,04; -0,10]	[-0,11; -0,06]	[-0,07; -0,11]	[-0,11; -0,08]	[-0,04; -0,17]	[-0,08; -0,13]	[0,07; 0,29]	[0,04; 0,27]	[0,22; 0,47]	[0,05; 0,30]	[0,13; 0,41]	[-0,03; -0,25]	[0,14; 0,42]	
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	0,40	0,20	0,30	0,20	0,40			
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	870	773	679	599	529	476	440	387	360	337	309	282	258	243	227	210	198		
	auswertbar	Anzahl	868	730	640	567	504	464	411	378	337	315	287	263	244	235	216	199	185		
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,37	7,02	7,10	7,08	7,20	7,10	7,19	7,10	7,09	7,09	7,27	7,13	7,14	7,13	7,13	7,15	7,21		
		CI Mean	[7,27; 7,48]	[6,94; 7,11]	[7,01; 7,19]	[6,98; 7,17]	[7,09; 7,30]	[6,99; 7,22]	[7,07; 7,31]	[6,98; 7,22]	[6,97; 7,20]	[6,96; 7,22]	[7,05; 7,35]	[7,00; 7,26]	[7,01; 7,28]	[6,99; 7,26]	[6,98; 7,27]	[7,01; 7,29]	[7,05; 7,37]		
		Median	7,00	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	7,00	6,90	6,90	6,80	6,90	7,00	6,90	6,90	6,90	7,00	7,10		
		Fallbasis mittlere Differenz		729	639	566	503	463	410	377	336	314	287	263	244	235	216	199	185		
		Mittlere Differenz zur ED		-0,36	-0,22	-0,20	-0,10	-0,16	-0,08	-0,17	-0,11	-0,16	0,00	-0,07	-0,06	-0,07	0,05	0,03	0,18		
		CI mittlere Differenz		[-0,45; -0,27]	[-0,33; -0,11]	[-0,31; -0,08]	[-0,23; -0,03]	[-0,30; -0,01]	[-0,23; -0,07]	[-0,33; -0,01]	[-0,27; -0,04]	[-0,34; -0,02]	[-0,19; -0,19]	[-0,26; -0,12]	[-0,27; -0,14]	[-0,27; -0,13]	[-0,15; -0,25]	[-0,18; -0,24]	[-0,04; -0,39]		
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,20	0,30				
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	659	590	532	467	416	372	339	320	297	273	262	246	228	213	206	191			
	auswertbar	Anzahl	658	556	508	448	376	337	305	268	259	244	224	208	199	180	178	160			
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,34	7,16	7,14	7,15	7,02	7,13	7,06	7,07	7,09	7,29	7,28	7,38	7,33	7,37	7,30	7,31			
		CI Mean	[7,23; 7,45]	[7,05; 7,27]	[7,03; 7,24]	[7,03; 7,26]	[6,90; 7,15]	[6,99; 7,27]	[6,93; 7,20]	[6,93; 7,20]	[6,95; 7,23]	[7,12; 7,45]	[7,12; 7,45]	[7,20; 7,57]	[7,15; 7,52]	[7,17; 7,57]	[7,10; 7,49]	[7,11; 7,51]			
		Median	7,05	6,90	6,90	6,90	6,80	6,80	6,80	6,90	6,90	7,10	7,10	7,10	7,00	7,15	7,00	7,00			
		Fallbasis mittlere Differenz		556	508	448	376	337	305	268	259	244	224	208	199	180	178	160			
		Mittlere Differenz zur ED		-0,17	-0,17	-0,13	-0,23	-0,12	-0,14	-0,10	-0,07	0,10	0,08	0,16	0,15	0,24	0,16	0,26			
		CI mittlere Differenz		[-0,27; -0,06]	[-0,28; -0,05]	[-0,25; -0,02]	[-0,37; -0,10]	[-0,27; -0,03]	[-0,29; -0,02]	[-0,24; -0,04]	[-0,23; -0,08]	[-0,07; -0,28]	[-0,11; -0,26]	[-0,05; -0,36]	[-0,05; -0,35]	[0,04; 0,44]	[-0,05; -0,36]	[0,06; 0,47]			
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,10	0,10	0,15	0,10	0,25	0,10	0,25					
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	859	795	730	633	558	489	457	414	387	358	333	307	279	254	233				
	auswertbar	Anzahl	855	762	673	606	530	471	428	397	362	342	319	289	265	242	224				
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,36	7,12	7,16	7,03	7,11	7,08	7,16	7,16	7,31	7,32	7,34	7,20	7,23	7,23	7,17				
		CI Mean	[7,27; 7,45]	[7,03; 7,21]	[7,07; 7,26]	[6,94; 7,13]	[7,01; 7,22]	[6,97; 7,19]	[7,04; 7,28]	[7,04; 7,28]	[7,18; 7,45]	[7,18; 7,46]	[7,20; 7,48]	[7,05; 7,35]	[7,09; 7,38]	[7,07; 7,39]	[7,02; 7,32]				
		Median	7,10	6,90	7,00	6,90	6,90	6,80	7,00	6,90	7,10	7,10	7,10	7,00	7,00	6,90	6,95				
		Fallbasis mittlere Differenz		758	669	605	529	470	427	397	362	342	319	289	265	242	224				
		Mittlere Differenz zur ED		-0,25	-0,18	-0,32	-0,21	-0,23	-0,14	-0,13	0,01	0,09	0,15	0,01	0,00	0,02	0,00				
		CI mittlere Differenz		[-0,33; -0,18]	[-0,27; -0,09]	[-0,41; -0,22]	[-0,32; -0,10]	[-0,35; -0,11]	[-0,26; -0,02]	[-0,25; -0,00]	[-0,13; -0,15]	[-0,04; -0,23]	[0,01; 0,29]	[-0,14; -0,16]	[-0,15; -0,15]	[-0,14; -0,18]	[-0,17; -0,16]				
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,20	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,00	0,10	0,10	0,10						

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1182	1074	947	842	734	687	622	577	528	478	442	410	378	340				
	auswertbar	Anzahl	1179	1012	908	794	710	644	587	549	502	453	424	391	359	323				
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,30	7,17	7,08	7,13	7,05	7,15	7,11	7,17	7,23	7,29	7,29	7,19	7,11	7,22				
		CI Mean	[7,22; 7,38]	[7,10; 7,25]	[7,00; 7,16]	[7,05; 7,22]	[6,96; 7,14]	[7,05; 7,24]	[7,02; 7,20]	[7,07; 7,28]	[7,12; 7,33]	[7,18; 7,40]	[7,17; 7,41]	[7,07; 7,31]	[6,99; 7,23]	[7,10; 7,35]				
		Median	7,00	7,00	6,90	6,90	6,80	7,00	6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00				
		Fallbasis mittlere Differenz		1009	905	791	708	642	585	547	500	452	423	391	359	323				
		Mittlere Differenz zur ED		-0,11	-0,16	-0,11	-0,17	-0,08	-0,10	-0,01	0,05	0,11	0,11	0,04	-0,05	0,07				
		CI mittlere Differenz		[-0,18; -0,04]	[-0,24; -0,09]	[-0,19; -0,02]	[-0,26; -0,08]	[-0,18; -0,01]	[-0,20; 0,00]	[-0,12; 0,10]	[-0,07; 0,17]	[-0,01; 0,24]	[-0,02; 0,25]	[-0,10; 0,18]	[-0,20; 0,09]	[-0,08; 0,23]				
Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,20	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1328	1241	1122	1007	928	844	793	715	659	606	566	516	473					
	auswertbar	Anzahl	1328	1198	1065	969	865	804	734	680	629	586	537	489	459					
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,47	7,20	7,20	7,17	7,23	7,19	7,35	7,34	7,40	7,28	7,39	7,31	7,39					
		CI Mean	[7,39; 7,55]	[7,13; 7,26]	[7,13; 7,27]	[7,10; 7,25]	[7,15; 7,31]	[7,11; 7,27]	[7,26; 7,44]	[7,25; 7,43]	[7,31; 7,50]	[7,18; 7,37]	[7,28; 7,49]	[7,21; 7,41]	[7,27; 7,50]					
		Median	7,20	7,00	7,00	6,90	7,10	7,00	7,10	7,10	7,20	7,10	7,20	7,10	7,20					
		Fallbasis mittlere Differenz		1198	1065	969	865	804	734	680	629	586	537	489	459					
		Mittlere Differenz zur ED		-0,29	-0,27	-0,28	-0,22	-0,24	-0,09	-0,08	0,00	-0,10	0,01	-0,06	0,04					
		CI mittlere Differenz		[-0,35; -0,22]	[-0,35; -0,20]	[-0,37; -0,19]	[-0,31; -0,12]	[-0,34; -0,14]	[-0,20; 0,02]	[-0,19; 0,03]	[-0,11; 0,11]	[-0,22; 0,01]	[-0,12; 0,15]	[-0,19; 0,07]	[-0,11; 0,18]					
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10							
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1803	1704	1527	1413	1260	1159	1061	964	878	811	753	696						
	auswertbar	Anzahl	1802	1571	1434	1300	1147	1074	991	911	841	768	714	656						
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,23	7,21	7,10	7,19	7,11	7,24	7,21	7,28	7,22	7,27	7,20	7,31						
		CI Mean	[7,17; 7,29]	[7,14; 7,27]	[7,03; 7,16]	[7,12; 7,26]	[7,04; 7,18]	[7,16; 7,31]	[7,14; 7,29]	[7,20; 7,36]	[7,14; 7,30]	[7,19; 7,35]	[7,11; 7,28]	[7,21; 7,40]						
		Median	7,00	6,90	6,80	7,00	6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,10	7,00	7,20						
		Fallbasis mittlere Differenz		1570	1433	1299	1146	1074	991	911	841	768	714	656						
		Mittlere Differenz zur ED		-0,05	-0,14	-0,05	-0,11	0,02	0,03	0,11	0,03	0,07	0,01	0,12						
		CI mittlere Differenz		[-0,10; 0,00]	[-0,20; -0,08]	[-0,12; 0,01]	[-0,19; -0,04]	[-0,05; 0,10]	[-0,05; 0,11]	[0,02; 0,20]	[-0,07; 0,12]	[-0,03; 0,17]	[-0,10; 0,11]	[0,01; 0,24]						
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,20							
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2076	1926	1782	1605	1459	1307	1216	1116	1038	958	865							
	auswertbar	Anzahl	2076	1844	1646	1484	1353	1241	1158	1055	965	904	806							
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,27	7,11	7,19	7,11	7,20	7,17	7,26	7,22	7,31	7,19	7,29							
		CI Mean	[7,21; 7,33]	[7,05; 7,17]	[7,13; 7,26]	[7,04; 7,17]	[7,13; 7,27]	[7,10; 7,24]	[7,19; 7,33]	[7,15; 7,30]	[7,23; 7,39]	[7,11; 7,26]	[7,20; 7,37]							
		Median	7,00	6,90	7,00	6,90	6,90	7,00	7,00	7,00	7,10	7,00	7,10							
		Fallbasis mittlere Differenz		1844	1646	1484	1353	1241	1158	1055	965	904	806							
		Mittlere Differenz zur ED		-0,16	-0,07	-0,15	-0,07	-0,07	0,02	-0,01	0,07	-0,04	0,08							
		CI mittlere Differenz		[-0,21; -0,11]	[-0,13; -0,01]	[-0,22; -0,02]	[-0,14; 0,00]	[-0,14; 0,01]	[-0,06; 0,09]	[-0,10; 0,07]	[-0,03; 0,16]	[-0,13; 0,06]	[-0,02; 0,17]							
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10								
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1157	1093	978	888	770	700	618	562	513	476								
	auswertbar	Anzahl	1155	1014	863	794	708	652	578	535	482	444								
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,23	7,14	7,03	7,14	7,10	7,24	7,12	7,19	7,09	7,11								
		CI Mean	[7,15; 7,31]	[7,06; 7,21]	[6,94; 7,11]	[7,05; 7,23]	[7,01; 7,18]	[7,14; 7,34]	[7,01; 7,22]	[7,08; 7,29]	[6,98; 7,20]	[6,99; 7,22]								
		Median	6,90	6,90	6,80	6,90	6,90	7,00	6,80	6,90	6,80	6,80								
		Fallbasis mittlere Differenz		1013	862	793	707	651	577	534	481	443								
		Mittlere Differenz zur ED		-0,09	-0,16	-0,03	-0,03	0,15	0,03	0,10	0,04	0,07								
		CI mittlere Differenz		[-0,16; -0,02]	[-0,24; -0,08]	[-0,12; 0,06]	[-0,12; 0,05]	[0,05; 0,24]	[-0,08; 0,13]	[-0,01; 0,21]	[-0,07; 0,16]	[-0,05; 0,20]								
Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00										
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	927	876	802	707	644	585	539	486	458									
	auswertbar	Anzahl	926	814	748	661	600	550	505	468	437									
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,28	7,08	7,14	7,11	7,20	7,11	7,13	7,00	7,05									
		CI Mean	[7,19; 7,37]	[6,99; 7,17]	[7,05; 7,22]	[7,02; 7,20]	[7,10; 7,31]	[7,00; 7,21]	[7,02; 7,24]	[6,90; 7,11]	[6,95; 7,16]									
		Median	6,90	6,80	6,80	6,90	6,90	6,90	6,90	6,80	6,80									
		Fallbasis mittlere Differenz		813	747	660	599	549	504	467	437									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,21	-0,14	-0,16	-0,08	-0,13	-0,08	-0,16	-0,10									
		CI mittlere Differenz		[-0,30; -0,13]	[-0,23; -0,05]	[-0,26; -0,06]	[-0,19; 0,02]	[-0,23; -0,02]	[-0,20; 0,04]	[-0,27; -0,05]	[-0,22; 0,01]									
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00											

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr			
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	550	530	474	421	389	362	335	309													
	auswertbar	Anzahl	547	490	435	399	370	346	312	287													
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,11	7,08	7,05	7,17	7,02	7,09	6,92	6,95													
		CI Mean	[7,00; 7,22]	[6,97; 7,19]	[6,94; 7,15]	[7,06; 7,29]	[6,91; 7,14]	[6,97; 7,21]	[6,80; 7,04]	[6,83; 7,08]													
		Median	6,80	6,80	6,80	7,00	6,80	6,90	6,70	6,80													
		Fallbasis mittlere Differenz		487	432	397	368	344	310	285													
		Mittlere Differenz zur ED		-0,01	-0,03	0,16	0,01	0,10	-0,06	-0,01													
		CI mittlere Differenz		[-0,10; 0,08]	[-0,13; 0,08]	[0,05; 0,28]	[-0,11; 0,13]	[-0,03; 0,23]	[-0,20; 0,08]	[-0,17; 0,15]													
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00													
	2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	395	373	343	308	284	260	247													
auswertbar		Anzahl	394	354	324	293	278	251	240														
Auswertungsergebnisse zum HbA1c		Mean	7,34	7,02	7,10	7,00	7,07	7,00	7,11														
		CI Mean	[7,19; 7,50]	[6,90; 7,14]	[6,98; 7,23]	[6,88; 7,12]	[6,94; 7,21]	[6,86; 7,15]	[6,96; 7,25]														
		Median	7,00	6,70	7,00	6,90	6,95	6,80	6,90														
		Fallbasis mittlere Differenz		353	323	292	278	251	240														
		Mittlere Differenz zur ED		-0,29	-0,21	-0,30	-0,22	-0,30	-0,14														
		CI mittlere Differenz		[-0,43; -0,15]	[-0,37; -0,06]	[-0,47; -0,14]	[-0,39; -0,04]	[-0,49; -0,11]	[-0,33; -0,05]														
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10														
2009-2		Patienten insgesamt	Anzahl	444	414	368	329	305	286														
	auswertbar	Anzahl	444	394	347	319	298	275															
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,34	7,25	7,11	7,15	6,98	6,97															
		CI Mean	[7,20; 7,49]	[7,12; 7,38]	[6,97; 7,24]	[7,01; 7,30]	[6,84; 7,11]	[6,84; 7,09]															
		Median	7,00	6,90	6,80	6,90	6,70	6,70															
		Fallbasis mittlere Differenz		394	347	319	298	275															
		Mittlere Differenz zur ED		-0,09	-0,22	-0,18	-0,32	-0,36															
		CI mittlere Differenz		[-0,23; 0,05]	[-0,37; -0,07]	[-0,34; -0,02]	[-0,49; -0,15]	[-0,54; -0,17]															
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	-0,10	-0,20	-0,10															
	2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	469	440	392	349	320															
auswertbar		Anzahl	468	424	372	327	310																
Auswertungsergebnisse zum HbA1c		Mean	7,39	7,11	7,07	7,04	7,14																
		CI Mean	[7,24; 7,53]	[6,98; 7,23]	[6,94; 7,19]	[6,90; 7,17]	[7,00; 7,28]																
		Median	7,00	6,80	6,80	6,80	6,90																
		Fallbasis mittlere Differenz		423	371	326	309																
		Mittlere Differenz zur ED		-0,31	-0,31	-0,38	-0,27																
		CI mittlere Differenz		[-0,46; -0,15]	[-0,46; -0,16]	[-0,56; -0,19]	[-0,46; -0,09]																
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	-0,10																
2010-2		Patienten insgesamt	Anzahl	467	444	397	353																
	auswertbar	Anzahl	467	432	370	336																	
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,18	7,02	6,91	7,01																	
		CI Mean	[7,06; 7,30]	[6,90; 7,13]	[6,81; 7,02]	[6,90; 7,13]																	
		Median	6,90	6,70	6,70	6,80																	
		Fallbasis mittlere Differenz		432	370	336																	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,14	-0,20	-0,12																	
		CI mittlere Differenz		[-0,25; -0,03]	[-0,32; -0,09]	[-0,25; -0,01]																	
		Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	0,00																	
	2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	439	405	364																	
auswertbar		Anzahl	439	386	340																		
Auswertungsergebnisse zum HbA1c		Mean	7,26	7,05	7,09																		
		CI Mean	[7,14; 7,38]	[6,93; 7,18]	[6,96; 7,21]																		
		Median	7,00	6,80	6,85																		
		Fallbasis mittlere Differenz		386	340																		
		Mittlere Differenz zur ED		-0,17	-0,10																		
		CI mittlere Differenz		[-0,26; -0,08]	[-0,21; -0,02]																		
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10																		

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr				
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	419	401																				
	auswertbar	Anzahl	419	385																				
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,25	7,01																				
		CI Mean	[7,11; 7,39]	[6,89; 7,13]																				
		Median	6,80	6,70																				
		Fallbasis mittlere Differenz		385																				
		Mittlere Differenz zur ED			-0,23																			
		CI mittlere Differenz			[-0,35; -0,11]																			
		Median mittlere Differenz			-0,10																			
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	441																					
	auswertbar	Anzahl	440																					
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,43																					
		CI Mean	[7,28; 7,58]																					
		Median	7,00																					
		Fallbasis mittlere Differenz																						
		Mittlere Differenz zur ED																						
		CI mittlere Differenz																						
		Median mittlere Differenz																						

In Tabelle B.3.2.2 wird die Verteilung der Patienten auf die HbA1c-Kategorien dargestellt. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalb-jahr noch Programmteilnehmer waren. In der Zeile „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalb-jahr plausible Angaben zum HbA1c-Wert vorliegen. Anschließend wird für jedes Berichtshalb-jahr dargestellt, wie sich diese auswertbaren Patienten auf die HbA1c-Kategorien verteilen.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts-halb-jahr 2536 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 2533 Patienten lagen auswertbare Daten vor. 48,95 Prozent dieser Patienten lagen mit ihrem gemessenen HbA1c-Wert im „oberen Zielbereich“. Im letzten Berichtshalb-jahr wurden dieser Kategorie 54,15 Prozent, der dann noch eingeschriebenen und auswertbaren Patienten zugeordnet.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation primäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle B.3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halb-jahr	2. Halb-jahr	3. Halb-jahr	4. Halb-jahr	5. Halb-jahr	6. Halb-jahr	7. Halb-jahr	8. Halb-jahr	9. Halb-jahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2536	2267	1979	1753	1566	1413	1283	1072	963	857	793	715	644	597	549	500	460	427	390
	auswertbar	Anzahl	2533	1793	1864	1713	1513	1379	1215	1039	925	828	743	680	618	570	534	490	445	418	386
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	450	411	346	346	270	245	204	177	144	141	94	92	74	67	65	66	52	60	50
		Anteil in %	17,77	22,92	18,56	20,20	17,85	17,77	16,79	17,04	15,57	17,03	12,65	13,53	11,97	11,75	12,17	13,47	11,69	14,35	12,95
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[16,28; 19,25]	[20,98; 24,87]	[16,80; 20,33]	[18,30; 22,10]	[15,92; 19,78]	[15,75; 19,78]	[14,69; 18,89]	[14,75; 19,32]	[13,23; 17,91]	[14,47; 19,59]	[10,26; 15,04]	[10,96; 16,10]	[9,41; 14,54]	[9,11; 14,40]	[9,40; 14,95]	[10,44; 16,50]	[8,70; 14,67]	[10,99; 17,72]	[9,60; 16,31]
		Anzahl	1240	884	962	911	783	751	643	585	521	467	427	386	360	326	302	287	252	234	209
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	48,95	49,30	51,61	53,18	51,75	54,46	52,92	56,30	56,32	56,40	57,47	56,76	58,25	57,19	56,55	58,57	56,63	55,98	54,15
		CI Anteil in %	[47,01; 50,90]	[46,99; 51,62]	[49,34; 53,88]	[50,82; 55,55]	[49,23; 54,27]	[51,83; 57,09]	[50,11; 55,73]	[53,29; 59,32]	[53,13; 59,52]	[53,02; 59,78]	[53,91; 61,03]	[53,04; 60,49]	[54,36; 62,14]	[53,13; 61,26]	[52,35; 60,76]	[54,21; 62,94]	[52,02; 61,24]	[51,22; 60,75]	[49,17; 59,12]
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	472	296	333	282	281	234	218	169	157	135	141	125	112	109	93	90	85	77	77
		Anteil in %	18,63	16,51	17,86	16,46	18,57	16,97	17,94	16,27	16,97	16,30	18,98	18,38	18,12	19,12	17,42	18,37	19,10	18,42	19,95
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[17,12; 20,15]	[14,79; 18,23]	[16,13; 19,60]	[14,71; 18,22]	[16,61; 20,53]	[14,99; 18,95]	[15,78; 20,10]	[14,02; 18,51]	[14,55; 19,39]	[13,79; 18,82]	[16,16; 21,80]	[15,47; 21,30]	[15,08; 21,16]	[15,89; 22,35]	[14,20; 20,64]	[14,94; 21,80]	[15,44; 22,76]	[14,70; 22,14]	[15,96; 23,94]
		Anzahl	284	165	181	141	136	118	112	75	80	71	71	62	56	56	65	42	43	42	44
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	11,21	9,20	9,71	8,23	8,99	8,56	9,22	7,22	8,65	8,57	9,56	9,12	9,06	9,82	12,17	8,57	9,66	10,05	11,40
		CI Anteil in %	[9,98; 12,44]	[7,86; 10,54]	[8,37; 11,05]	[6,93; 9,53]	[7,55; 10,43]	[7,08; 10,03]	[7,59; 10,85]	[5,64; 8,79]	[6,84; 10,46]	[6,67; 10,48]	[7,44; 11,67]	[6,95; 11,28]	[6,80; 11,33]	[7,38; 12,27]	[9,40; 14,95]	[6,09; 11,05]	[6,91; 12,41]	[7,16; 12,93]	[8,22; 14,57]
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	87	37	42	33	43	31	38	33	23	14	10	15	16	12	9	5	13	5	6	
	Anteil in %	3,43	2,06	2,25	1,93	2,84	2,25	3,13	3,18	2,49	1,69	1,35	2,21	2,59	2,11	1,69	1,02	2,92	1,20	1,55	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[2,73; 4,14]	[1,41; 2,72]	[1,58; 2,93]	[1,28; 2,58]	[2,00; 3,68]	[1,47; 3,03]	[2,15; 4,11]	[2,11; 4,24]	[1,48; 3,49]	[0,81; 2,57]	[0,52; 2,18]	[1,10; 3,31]	[1,34; 3,84]	[0,93; 3,28]	[0,59; 2,78]	[0,13; 1,91]	[1,35; 4,49]	[0,15; 2,24]	[0,32; 2,79]	
	Anzahl	2071	1748	1572	1402	1268	1130	975	882	803	754	690	652	609	565	530	490	454	430		
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	2071	1748	1572	1402	1268	1130	975	882	803	754	690	652	609	565	530	490	454	430	
	auswertbar	Anzahl	2067	1607	1523	1357	1229	1084	943	845	783	713	656	623	589	541	515	470	440	412	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	391	323	305	276	204	157	176	148	134	107	112	101	87	71	79	63	67	52	
		Anteil in %	18,92	20,10	20,03	20,34	16,60	14,48	18,66	17,51	17,11	15,01	17,07	16,21	14,77	13,12	15,34	13,40	15,23	12,62	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[17,23; 20,61]	[18,14; 22,06]	[18,02; 22,04]	[18,20; 22,48]	[14,52; 18,68]	[12,39; 16,58]	[16,18; 21,15]	[14,95; 20,08]	[14,47; 19,75]	[12,38; 17,63]	[14,19; 19,95]	[13,32; 19,11]	[11,90; 17,64]	[10,28; 15,97]	[12,22; 18,46]	[10,32; 16,49]	[11,87; 18,59]	[9,41; 15,83]	
		Anzahl	1003	790	812	681	684	599	503	439	429	385	346	316	314	252	271	243	243	212	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	48,52	49,16	53,32	50,18	55,66	55,26	53,34	51,95	54,79	54,00	52,74	50,72	53,31	46,58	52,62	51,70	55,23	51,46	
		CI Anteil in %	[46,37; 50,68]	[46,71; 51,60]	[50,81; 55,82]	[47,52; 52,85]	[52,88; 58,43]	[52,30; 58,22]	[50,15; 56,53]	[48,58; 55,32]	[51,30; 58,28]	[50,34; 57,66]	[48,92; 56,57]	[46,79; 54,65]	[49,28; 57,34]	[42,37; 50,79]	[48,30; 56,94]	[47,18; 56,22]	[50,58; 59,88]	[46,62; 56,29]	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	371	313	267	236	221	205	165	160	132	139	126	116	109	134	98	102	85	87	
		Anteil in %	17,95	19,48	17,53	17,39	17,98	18,91	17,50	18,93	16,86	19,50	19,21	18,62	18,51	24,77	19,03	21,70	19,32	21,12	
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[16,29; 19,60]	[17,54; 21,41]	[15,62; 19,44]	[15,37; 19,41]	[15,83; 20,13]	[16,58; 21,24]	[15,07; 19,92]	[16,29; 21,58]	[14,23; 19,48]	[16,59; 22,41]	[16,19; 22,22]	[15,56; 21,68]	[15,37; 21,64]	[21,13; 28,41]	[15,64; 22,42]	[17,97; 25,43]	[15,63; 23,01]	[17,17; 25,06]	
		Anzahl	216	135	105	128	96	94	75	77	73	63	57	64	61	65	54	44	32	53	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	10,45	8,40	6,89	9,43	7,81	8,67	7,95	9,11	9,32	8,84	8,69	10,27	10,36	12,01	10,49	9,36	7,27	12,86	
		CI Anteil in %	[9,13; 11,77]	[7,04; 9,76]	[5,62; 8,17]	[7,88; 10,99]	[6,31; 9,31]	[7,00; 10,35]	[6,23; 9,68]	[7,17; 11,05]	[7,29; 11,36]	[6,75; 10,92]	[6,53; 10,85]	[7,89; 12,66]	[7,89; 12,82]	[9,27; 14,76]	[7,84; 13,13]	[6,73; 12,00]	[4,84; 9,70]	[9,63; 16,10]	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	86	46	34	36	24	29	24	21	15	19	15	26	18	19	13	18	13	8		
	Anteil in %	4,16	2,86	2,23	2,65	1,95	2,68	2,55	2,49	1,92	2,66	2,29	4,17	3,06	3,51	2,52	3,83	2,95	1,94		
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[3,30; 5,02]	[2,05; 3,68]	[1,49; 2,97]	[1,80; 3,51]	[1,18; 2,73]	[1,71; 3,64]	[1,54; 3,55]	[1,43; 3,54]	[0,95; 2,88]	[1,48; 3,85]	[1,14; 3,43]	[2,60; 5,74]	[1,66; 4,45]	[1,96; 5,06]	[1,17; 3,88]	[2,09; 5,57]	[1,37; 4,54]	[0,61; 3,28]		

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	870	773	679	599	529	476	440	387	360	337	309	282	258	243	227	210	198	
	auswertbar	Anzahl	868	730	640	567	504	464	411	378	337	315	287	263	244	235	216	199	185	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	159	147	99	92	81	77	67	61	52	52	42	30	27	28	27	21	18	
		Anteil in %	18,32	20,14	15,47	16,23	16,07	16,59	16,30	16,14	15,43	16,51	14,63	11,41	11,07	11,91	12,50	10,55	9,73	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[15,74; 20,89]	[17,23; 23,05]	[12,66; 18,27]	[13,19; 19,26]	[12,86; 19,28]	[13,21; 19,98]	[12,73; 19,88]	[12,42; 19,85]	[11,57; 19,29]	[12,40; 20,61]	[10,54; 18,73]	[7,56; 15,26]	[7,12; 15,01]	[7,76; 16,07]	[8,08; 16,92]	[6,27; 14,83]	[5,45; 14,01]	
		Anzahl	395	389	366	320	267	262	220	220	185	172	157	157	143	137	130	116	102	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	45,51	53,29	57,19	56,44	52,98	56,47	53,53	58,20	54,90	54,60	54,70	59,70	58,61	58,30	60,19	58,29	55,14	
		CI Anteil in %	[42,19; 48,82]	[49,67; 56,91]	[53,35; 61,02]	[52,35; 60,52]	[48,61; 57,34]	[51,95; 60,98]	[48,70; 58,36]	[53,22; 63,18]	[49,58; 60,22]	[49,10; 60,11]	[48,93; 60,47]	[53,76; 65,64]	[52,41; 64,80]	[51,98; 64,62]	[53,64; 66,73]	[51,42; 65,16]	[47,95; 62,32]	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	143	117	109	94	84	67	73	49	68	60	50	47	50	46	35	41	44	
		Anteil in %	16,47	16,03	17,03	16,58	16,67	14,44	17,76	12,96	20,18	19,05	17,42	17,87	20,49	19,57	16,20	20,60	23,78	
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[14,01; 18,94]	[13,36; 18,69]	[14,12; 19,95]	[13,51; 19,64]	[13,41; 19,92]	[11,24; 17,64]	[14,06; 21,46]	[9,57; 16,35]	[15,89; 24,47]	[14,70; 23,39]	[13,03; 21,82]	[13,23; 22,51]	[15,42; 25,57]	[14,49; 24,66]	[11,28; 21,13]	[14,97; 26,24]	[17,63; 29,94]	
		Anzahl	119	60	50	49	57	47	33	37	27	21	28	24	19	22	20	20	18	
		Anteil in %	13,71	8,22	7,81	8,64	11,31	10,13	8,03	9,79	8,01	6,67	9,76	9,13	7,79	9,36	9,26	10,05	9,73	
		CI Anteil in %	[11,42; 16,00]	[6,23; 10,21]	[5,73; 9,89]	[6,33; 10,96]	[8,54; 14,08]	[7,38; 12,88]	[5,40; 10,66]	[6,79; 12,79]	[5,11; 10,91]	[3,91; 9,43]	[6,32; 13,20]	[5,64; 12,61]	[4,42; 11,16]	[5,63; 13,09]	[5,38; 13,13]	[5,86; 14,24]	[5,45; 14,01]	
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	659	590	532	467	416	372	339	320	297	273	262	246	228	213	206	191		
	auswertbar	Anzahl	658	556	508	448	376	337	305	268	259	244	224	208	199	180	178	160		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	101	105	94	70	70	53	47	38	35	33	32	23	23	16	23	21		
		Anteil in %	15,35	18,88	18,50	15,63	18,62	15,73	15,41	14,18	13,51	13,52	14,29	11,06	11,56	8,89	12,92	13,13		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[12,59; 18,11]	[15,63; 22,14]	[15,12; 21,88]	[12,26; 18,99]	[14,68; 22,56]	[11,83; 19,62]	[11,35; 19,47]	[9,99; 18,36]	[9,34; 17,69]	[9,22; 17,82]	[9,69; 18,88]	[6,79; 15,33]	[7,10; 16,01]	[4,72; 13,06]	[7,98; 17,86]	[7,88; 18,37]		
		Anzahl	307	293	259	252	209	185	181	162	151	127	119	114	113	104	98	85		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	46,66	52,70	50,98	56,25	55,59	54,90	59,34	60,45	58,30	52,05	53,13	54,81	56,78	57,78	55,06	53,13		
		CI Anteil in %	[42,84; 50,47]	[48,54; 56,85]	[46,63; 55,34]	[51,65; 60,85]	[50,56; 60,61]	[49,58; 60,22]	[53,82; 64,87]	[54,58; 66,31]	[52,28; 64,32]	[45,77; 58,33]	[46,58; 59,67]	[48,03; 61,59]	[49,88; 63,68]	[50,54; 65,01]	[47,73; 62,38]	[45,37; 60,88]		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	131	89	95	74	60	53	45	44	46	46	39	39	31	35	34	32		
		Anteil in %	19,91	16,01	18,70	16,52	15,96	15,73	14,75	16,42	17,76	18,85	17,41	18,75	15,58	19,44	19,10	20,00		
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[16,86; 22,96]	[12,96; 19,06]	[15,31; 22,09]	[13,08; 19,96]	[12,25; 19,66]	[11,83; 19,62]	[10,77; 18,74]	[11,97; 20,86]	[13,10; 22,42]	[13,93; 23,77]	[12,43; 22,39]	[13,43; 24,07]	[10,53; 20,63]	[13,65; 25,24]	[13,31; 24,89]	[13,78; 26,22]		
		Anzahl	86	45	43	36	25	36	26	21	23	27	29	21	23	18	17	16		
		Anteil in %	13,07	8,09	8,46	8,04	6,65	10,68	8,52	7,84	8,88	11,07	12,95	10,10	11,56	10,00	9,55	10,00		
		CI Anteil in %	[10,49; 15,65]	[5,82; 10,36]	[6,04; 10,89]	[5,52; 10,56]	[4,13; 9,17]	[7,38; 13,99]	[5,39; 11,66]	[4,61; 11,06]	[5,41; 12,35]	[7,12; 15,01]	[8,54; 17,35]	[5,99; 14,20]	[7,10; 16,01]	[5,61; 14,39]	[5,22; 13,88]	[5,34; 14,66]		
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	859	795	730	633	558	489	457	414	387	358	333	307	279	254	233			
	auswertbar	Anzahl	855	762	673	606	530	471	428	397	362	342	319	289	265	242	224			
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	132	138	113	115	102	89	78	61	50	41	36	42	37	29	25			
		Anteil in %	15,44	18,11	16,79	18,98	19,25	18,90	18,22	15,37	13,81	11,99	11,29	14,53	13,96	11,98	11,16			
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[13,02; 17,86]	[15,37; 20,85]	[13,96; 19,62]	[15,85; 22,10]	[15,89; 22,60]	[15,36; 22,44]	[14,56; 21,89]	[11,81; 18,92]	[10,25; 17,37]	[8,54; 15,44]	[7,81; 14,76]	[10,46; 18,60]	[9,78; 18,14]	[7,88; 16,08]	[7,03; 15,29]			
		Anzahl	396	390	345	326	259	242	210	210	189	184	178	161	144	138	132			
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	46,32	51,18	51,26	53,80	48,87	51,38	49,07	52,90	52,21	53,80	55,80	55,71	54,34	57,02	58,93			
		CI Anteil in %	[42,97; 49,66]	[47,63; 54,73]	[47,48; 55,04]	[49,82; 57,77]	[44,61; 53,13]	[46,86; 55,90]	[44,32; 53,81]	[47,98; 57,81]	[47,06; 57,36]	[48,51; 59,09]	[50,34; 61,26]	[49,97; 61,45]	[48,33; 60,35]	[50,77; 63,27]	[52,47; 65,39]			
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	173	140	138	102	105	89	84	80	65	61	61	50	48	38	39			
		Anteil in %	20,23	18,37	20,51	16,83	19,81	18,90	19,63	20,15	17,96	17,84	19,12	17,30	18,11	15,70	17,41			
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[17,54; 22,93]	[15,62; 21,12]	[17,45; 23,56]	[13,85; 19,81]	[16,41; 23,21]	[15,36; 22,44]	[15,86; 23,39]	[16,20; 24,10]	[14,00; 21,92]	[13,77; 21,90]	[14,80; 23,44]	[12,93; 21,67]	[13,47; 22,76]	[11,11; 20,30]	[12,43; 22,39]			
		Anzahl	121	76	52	49	49	36	43	35	41	41	28	24	27	29	22			
		Anteil in %	14,15	9,97	7,73	8,09	9,25	7,64	10,05	8,82	11,33	11,99	8,78	8,30	10,19	11,98	9,82			
		CI Anteil in %	[11,81; 16,49]	[7,84; 12,10]	[5,71; 9,75]	[5,91; 10,26]	[6,78; 11,71]	[5,24; 10,05]	[7,20; 12,90]	[6,02; 11,61]	[8,06; 14,60]	[8,54; 15,44]	[5,67; 11,89]	[5,12; 11,49]	[6,54; 13,84]	[7,88; 16,08]	[5,92; 13,73]			
	Anzahl	33	18	25	14	15	15	13	11	17	15	16	12	9	8	6				
	Anteil in %	3,86	2,36	3,71	2,31	2,83	3,18	3,04	2,77	4,70	4,39	5,02	4,15	3,40	3,31	2,68				
	CI Anteil in %	[2,57; 5,15]	[1,28; 3,44]	[2,28; 5,14]	[1,11; 3,51]	[1,42; 4,24]	[1,60; 4,77]	[1,41; 4,67]	[1,15; 4,39]	[2,51; 6,88]	[2,21; 6,56]	[2,62; 7,41]	[1,85; 6,46]	[1,21; 5,58]	[1,05; 5,56]	[0,56; 4,80]				

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1182	1074	947	842	734	687	622	577	528	478	442	410	378	340					
	auswertbar	Anzahl	1179	1012	908	794	710	644	587	549	502	453	424	391	359	323					
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	165	158	168	141	136	110	87	69	59	58	60	61	58	35					
		Anteil in %	13,99	15,61	18,50	17,76	19,15	17,08	14,82	12,57	11,75	12,80	14,15	15,60	16,16	10,84					
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[12,01; 15,98]	[13,38; 17,85]	[15,98; 21,03]	[15,10; 20,42]	[16,26; 22,05]	[14,17; 19,99]	[11,94; 17,70]	[9,79; 15,34]	[8,93; 14,57]	[9,72; 15,88]	[10,83; 17,47]	[12,00; 19,20]	[12,34; 19,97]	[7,44; 14,23]					
		Anzahl	612	527	469	406	384	329	339	323	286	238	222	203	202	182					
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	51,91	52,08	51,65	51,13	54,08	51,09	57,75	58,83	56,97	52,54	52,36	51,92	56,27	56,35					
		CI Anteil in %	[49,06; 54,76]	[49,00; 55,15]	[48,40; 54,90]	[47,65; 54,61]	[50,42; 57,75]	[47,22; 54,95]	[53,75; 61,75]	[54,71; 62,95]	[52,64; 61,31]	[47,94; 57,14]	[47,60; 57,12]	[46,96; 56,88]	[51,13; 61,41]	[50,93; 61,76]					
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	233	214	176	146	117	128	89	99	97	94	86	78	64	75					
		Anteil in %	19,76	21,15	19,38	18,39	16,48	19,88	15,16	18,03	19,32	20,75	20,28	19,95	17,83	23,22					
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[17,49; 22,04]	[18,63; 23,66]	[16,81; 21,96]	[15,69; 21,08]	[13,75; 19,21]	[16,79; 22,96]	[12,26; 18,07]	[14,81; 21,25]	[15,87; 22,78]	[17,01; 24,49]	[16,45; 24,12]	[15,98; 23,91]	[13,86; 21,79]	[18,61; 27,83]					
		Anzahl	117	87	74	84	57	62	57	42	45	47	39	39	26	23					
		Anteil in %	9,92	8,60	8,15	10,58	8,03	9,63	9,71	7,65	8,96	10,38	9,20	9,97	7,24	7,12					
		CI Anteil in %	[8,22; 11,63]	[6,87; 10,32]	[6,37; 9,93]	[8,44; 12,72]	[6,03; 10,03]	[7,35; 11,91]	[7,31; 12,11]	[5,42; 9,88]	[6,46; 11,47]	[7,56; 13,19]	[6,44; 11,95]	[7,00; 12,95]	[4,56; 9,93]	[4,31; 9,93]					
	Anzahl	52	26	21	17	16	15	15	16	15	16	17	10	9	8						
	Anteil in %	4,41	2,57	2,31	2,14	2,25	2,33	2,56	2,91	2,99	3,53	4,01	2,56	2,51	2,48						
	CI Anteil in %	[3,24; 5,58]	[1,59; 3,54]	[1,33; 3,29]	[1,13; 3,15]	[1,16; 3,35]	[1,16; 3,50]	[1,28; 3,83]	[1,51; 4,32]	[1,50; 4,48]	[1,83; 5,23]	[2,14; 5,88]	[0,99; 4,12]	[0,89; 4,13]	[0,78; 4,17]						
	Patienten insgesamt	Anzahl	1328	1241	1122	1007	928	844	793	715	659	606	566	516	473						
2006-1	auswertbar	Anzahl	1328	1198	1065	969	865	804	734	680	629	586	537	489	459						
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	157	184	142	138	104	98	74	74	53	65	52	53	46						
		Anteil in %	11,82	15,36	13,33	14,24	12,02	12,19	10,08	10,88	8,43	11,09	9,68	10,84	10,02						
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[10,09; 13,56]	[13,32; 17,40]	[11,29; 15,38]	[12,04; 16,44]	[9,85; 14,19]	[9,93; 14,45]	[7,90; 12,26]	[8,54; 13,22]	[6,25; 10,60]	[8,55; 13,64]	[7,18; 12,19]	[8,08; 13,60]	[7,27; 12,77]						
		Anzahl	654	605	585	541	477	458	405	368	344	325	291	264	243						
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	49,25	50,50	54,93	55,83	55,14	56,97	55,18	54,12	54,69	55,46	54,19	53,99	52,94						
		CI Anteil in %	[46,56; 51,94]	[47,67; 53,33]	[51,94; 57,92]	[52,70; 58,96]	[51,83; 58,46]	[53,54; 60,39]	[51,58; 58,78]	[50,37; 57,87]	[50,80; 58,58]	[51,43; 59,49]	[49,97; 58,41]	[49,57; 58,41]	[48,37; 57,51]						
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	267	264	211	175	183	160	138	141	133	115	108	106	104						
		Anteil in %	20,11	22,04	19,81	18,06	21,16	19,90	18,80	20,74	21,14	19,62	20,11	21,68	22,66						
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[17,95; 22,26]	[19,69; 24,38]	[17,42; 22,21]	[15,64; 20,48]	[18,43; 23,88]	[17,14; 22,66]	[15,97; 21,63]	[17,69; 23,78]	[17,95; 24,34]	[16,41; 22,84]	[16,72; 23,51]	[18,02; 25,33]	[18,82; 26,49]						
		Anzahl	176	117	101	90	82	70	90	69	78	69	67	55	53						
		Anteil in %	13,25	9,77	9,48	9,29	9,48	8,71	12,26	10,15	12,40	11,77	12,48	11,25	11,55						
		CI Anteil in %	[11,43; 15,08]	[8,08; 11,45]	[7,72; 11,24]	[7,46; 11,12]	[7,53; 11,43]	[6,76; 10,66]	[9,89; 14,64]	[7,88; 12,42]	[9,82; 14,98]	[9,16; 14,39]	[9,68; 15,27]	[8,44; 14,05]	[8,62; 14,47]						
		Anzahl	74	28	26	25	19	18	27	28	21	12	19	11	13						
Anteil in %		5,57	2,34	2,44	2,58	2,20	2,24	3,68	4,12	3,34	2,05	3,54	2,25	2,83							
	CI Anteil in %	[4,34; 6,81]	[1,48; 3,19]	[1,51; 3,37]	[1,58; 3,58]	[1,22; 3,17]	[1,22; 3,26]	[2,32; 5,04]	[2,62; 5,61]	[1,93; 4,74]	[0,90; 3,20]	[1,97; 5,10]	[0,93; 3,57]	[1,31; 4,35]							
	Patienten insgesamt	Anzahl	1803	1704	1527	1413	1260	1159	1061	964	878	811	753	696							
2006-2	auswertbar	Anzahl	1802	1571	1434	1300	1147	1074	991	911	841	768	714	656							
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	276	219	222	191	184	157	133	103	112	97	102	80							
		Anteil in %	15,32	13,94	15,48	14,69	16,04	14,62	13,42	11,31	13,32	12,63	14,29	12,20							
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[13,65; 16,98]	[12,23; 15,65]	[13,61; 17,35]	[12,77; 16,62]	[13,92; 18,17]	[12,50; 16,73]	[11,30; 15,54]	[9,25; 13,36]	[11,02; 15,62]	[10,28; 14,98]	[11,72; 16,85]	[9,69; 14,70]							
		Anzahl	942	871	816	705	640	571	539	507	444	412	389	345							
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	52,28	55,44	56,90	54,23	55,80	53,17	54,39	55,65	52,79	53,65	54,48	52,59							
		CI Anteil in %	[49,97; 54,58]	[52,98; 57,90]	[54,34; 59,47]	[51,52; 56,94]	[52,92; 58,67]	[50,18; 56,15]	[51,29; 57,49]	[52,43; 58,88]	[49,42; 56,17]	[50,12; 57,17]	[50,83; 58,14]	[48,77; 56,42]							
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	317	274	237	231	192	208	201	178	184	157	134	142							
		Anteil in %	17,59	17,44	16,53	17,77	16,74	19,37	20,28	19,54	21,88	20,44	18,77	21,65							
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[15,83; 19,35]	[15,56; 19,32]	[14,60; 18,45]	[15,69; 19,85]	[14,58; 18,90]	[17,00; 21,73]	[17,78; 22,79]	[16,96; 22,12]	[19,08; 24,67]	[17,59; 23,30]	[15,90; 21,63]	[18,49; 24,80]							
		Anzahl	200	156	118	135	106	104	86	91	80	78	68	67							
		Anteil in %	11,10	9,93	8,23	10,38	9,24	9,68	8,68	9,99	9,51	10,16	9,52	10,21							
		CI Anteil in %	[9,65; 12,55]	[8,45; 11,41]	[6,81; 9,65]	[8,73; 12,04]	[7,56; 10,92]	[7,91; 11,45]	[6,92; 10,43]	[8,04; 11,94]	[7,53; 11,50]	[8,02; 12,29]	[7,37; 11,68]	[7,89; 12,53]							
		Anzahl	67	51	41	38	25	34	32	32	21	24	21	22							
Anteil in %		3,72	3,25	2,86	2,92	2,18	3,17	3,23	3,51	2,50	3,13	2,94	3,35								
	CI Anteil in %	[2,84; 4,59]	[2,37; 4,12]	[2,00; 3,72]	[2,01; 3,84]	[1,33; 3,03]	[2,12; 4,21]	[2,13; 4,33]	[2,32; 4,71]	[1,44; 3,55]	[1,89; 4,36]	[1,70; 4,18]	[1,97; 4,73]								

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2076	1926	1782	1605	1459	1307	1216	1116	1038	958	865									
	auswertbar	Anzahl	2076	1844	1646	1484	1353	1241	1158	1055	965	904	806									
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	333	318	278	273	212	196	160	152	136	137	101									
		Anteil in %	16,04	17,25	16,89	18,40	15,67	15,79	13,82	14,41	14,09	15,15	12,53									
	CI Anteil in %	[14,46; 17,62]	[15,52; 18,97]	[15,08; 18,70]	[16,42; 20,37]	[13,73; 17,61]	[13,76; 17,82]	[11,83; 15,81]	[12,29; 16,53]	[11,90; 16,29]	[12,82; 17,49]	[10,24; 14,82]										
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	1064	1010	860	790	713	658	605	570	495	486	426									
		Anteil in %	51,25	54,77	52,25	53,23	52,70	53,02	52,25	54,03	51,30	53,76	52,85									
	CI Anteil in %	[49,10; 53,40]	[52,50; 57,04]	[49,83; 54,66]	[50,70; 55,77]	[50,04; 55,36]	[50,24; 55,80]	[49,37; 55,12]	[51,02; 57,04]	[48,14; 54,45]	[50,51; 57,01]	[49,41; 56,30]										
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	369	300	281	243	245	236	231	186	186	170	168									
		Anteil in %	17,77	16,27	17,07	16,37	18,11	19,02	19,95	17,63	19,27	18,81	20,84									
	CI Anteil in %	[16,13; 19,42]	[14,58; 17,95]	[15,25; 18,89]	[14,49; 18,26]	[16,06; 20,16]	[16,83; 21,20]	[17,65; 22,25]	[15,33; 19,93]	[16,78; 21,76]	[16,26; 21,35]	[18,04; 23,65]										
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	213	154	169	139	142	118	124	119	119	93	92										
	Anteil in %	10,26	8,35	10,27	9,37	10,50	9,51	10,71	11,28	12,33	10,29	11,41										
CI Anteil in %	[8,95; 11,57]	[7,09; 9,61]	[8,80; 11,73]	[7,88; 10,85]	[8,86; 12,13]	[7,88; 11,14]	[8,93; 12,49]	[9,37; 13,19]	[10,26; 14,41]	[8,31; 12,27]	[9,22; 13,61]											
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	97	62	58	39	41	33	38	28	29	18	19										
	Anteil in %	4,67	3,36	3,52	2,63	3,03	2,66	3,28	2,65	3,01	1,99	2,36										
CI Anteil in %	[3,76; 5,58]	[2,54; 4,19]	[2,63; 4,41]	[1,81; 3,44]	[2,12; 3,94]	[1,76; 3,55]	[2,25; 4,31]	[1,68; 3,62]	[1,93; 4,08]	[1,08; 2,90]	[1,31; 3,41]											
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1157	1093	978	888	770	700	618	562	513	476										
	auswertbar	Anzahl	1155	1014	863	794	708	652	578	535	482	444										
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	181	163	161	128	109	95	90	76	74	72										
		Anteil in %	15,67	16,07	18,66	16,12	15,40	14,57	15,57	14,21	15,35	16,22										
	CI Anteil in %	[13,57; 17,77]	[13,81; 18,34]	[16,06; 21,26]	[13,56; 18,68]	[12,74; 18,06]	[11,86; 17,28]	[12,61; 18,53]	[11,24; 17,17]	[12,13; 18,57]	[12,78; 19,65]											
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	606	557	475	427	401	346	318	301	274	240										
		Anteil in %	52,47	54,93	55,04	53,78	56,64	53,07	55,02	56,26	56,85	54,05										
	CI Anteil in %	[49,59; 55,35]	[51,87; 58,00]	[51,72; 58,36]	[50,31; 57,25]	[52,99; 60,29]	[49,23; 56,90]	[50,96; 59,08]	[52,05; 60,47]	[52,42; 61,27]	[49,41; 58,69]											
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	196	171	128	143	124	115	108	96	82	88										
		Anteil in %	16,97	16,86	14,83	18,01	17,51	17,64	18,69	17,94	17,01	19,82										
	CI Anteil in %	[14,80; 19,14]	[14,56; 19,17]	[12,46; 17,20]	[15,34; 20,68]	[14,71; 20,32]	[14,71; 20,57]	[15,50; 21,87]	[14,69; 21,20]	[13,65; 20,37]	[16,11; 23,53]											
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	127	92	77	70	59	74	42	46	39	32											
	Anteil in %	11,00	9,07	8,92	8,82	8,33	11,35	7,27	8,60	8,09	7,21											
CI Anteil in %	[9,19; 12,80]	[7,30; 10,84]	[7,02; 10,83]	[6,84; 10,79]	[6,30; 10,37]	[8,91; 13,79]	[5,15; 9,38]	[6,22; 10,98]	[5,65; 10,53]	[4,80; 9,62]												
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	45	31	22	26	15	22	20	16	13	12											
	Anteil in %	3,90	3,06	2,55	3,27	2,12	3,37	3,46	2,99	2,70	2,70											
CI Anteil in %	[2,78; 5,01]	[2,00; 4,12]	[1,50; 3,60]	[2,04; 4,51]	[1,06; 3,18]	[1,99; 4,76]	[1,97; 4,95]	[1,55; 4,44]	[1,25; 4,14]	[1,19; 4,21]												
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	927	876	802	707	644	585	539	486	458											
	auswertbar	Anzahl	926	814	748	661	600	550	505	468	437											
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	144	144	117	114	87	88	69	84	70											
		Anteil in %	15,55	17,69	15,64	17,25	14,50	16,00	13,66	17,95	16,02											
	CI Anteil in %	[13,22; 17,89]	[15,07; 20,31]	[13,04; 18,25]	[14,36; 20,13]	[11,68; 17,32]	[12,93; 19,07]	[10,66; 16,66]	[14,47; 21,43]	[12,58; 19,46]												
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	485	443	418	355	334	319	295	275	245											
		Anteil in %	52,38	54,42	55,88	53,71	55,67	58,00	58,42	58,76	56,06											
	CI Anteil in %	[49,16; 55,59]	[51,00; 57,85]	[52,32; 59,44]	[49,90; 57,51]	[51,69; 59,65]	[53,87; 62,13]	[54,11; 62,72]	[54,30; 63,23]	[51,41; 60,72]												
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	160	128	120	114	102	82	86	68	83											
		Anteil in %	17,28	15,72	16,04	17,25	17,00	14,91	17,03	14,53	18,99											
	CI Anteil in %	[14,84; 19,72]	[13,22; 18,23]	[13,41; 18,67]	[14,36; 20,13]	[13,99; 20,01]	[11,93; 17,89]	[13,75; 20,31]	[11,33; 17,73]	[15,31; 22,68]												
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	90	75	72	61	52	39	40	30	31												
	Anteil in %	9,72	9,21	9,63	9,23	8,67	7,09	7,92	6,41	7,09												
CI Anteil in %	[7,81; 11,63]	[7,23; 11,20]	[7,51; 11,74]	[7,02; 11,44]	[6,41; 10,92]	[4,94; 9,24]	[5,56; 10,28]	[4,19; 8,63]	[4,68; 9,50]													
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	47	24	21	17	25	22	15	11	8												
	Anteil in %	5,08	2,95	2,81	2,57	4,17	4,00	2,97	2,35	1,83												
CI Anteil in %	[3,66; 6,49]	[1,79; 4,11]	[1,62; 3,99]	[1,36; 3,78]	[2,57; 5,77]	[2,36; 5,64]	[1,49; 4,45]	[0,98; 3,72]	[0,57; 3,09]													

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	550	530	474	421	389	362	335	309										
	auswertbar	Anzahl	547	490	435	399	370	346	312	287										
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	96	85	74	59	57	47	61	45										
		Anteil in %	17,55	17,35	17,01	14,79	15,41	13,58	19,55	15,68										
	CI Anteil in %	[14,36; 20,74]	[13,99; 20,70]	[13,48; 20,55]	[11,30; 18,27]	[11,72; 19,09]	[9,97; 17,20]	[15,14; 23,96]	[11,47; 19,89]											
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	290	265	240	213	222	201	185	180										
		Anteil in %	53,02	54,08	55,17	53,38	60,00	58,09	59,29	62,72										
	CI Anteil in %	[48,83; 57,20]	[49,66; 58,50]	[50,49; 59,85]	[48,48; 58,28]	[55,00; 65,00]	[52,89; 63,30]	[53,83; 64,76]	[57,11; 68,32]											
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	98	83	77	75	56	62	40	43										
		Anteil in %	17,92	16,94	17,70	18,80	15,14	17,92	12,82	14,98										
	CI Anteil in %	[14,70; 21,13]	[13,61; 20,26]	[14,11; 21,29]	[14,96; 22,64]	[11,48; 18,79]	[13,87; 21,97]	[9,10; 16,54]	[10,85; 19,12]											
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	49	42	37	41	29	27	21	16										
Anteil in %		8,96	8,57	8,51	10,28	7,84	7,80	6,73	5,57											
CI Anteil in %	[6,56; 11,35]	[6,09; 11,05]	[5,88; 11,13]	[7,29; 13,26]	[5,10; 10,58]	[4,97; 10,63]	[3,95; 9,52]	[2,92; 8,23]												
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	14	15	7	11	6	9	5	3											
	Anteil in %	2,56	3,06	1,61	2,76	1,62	2,60	1,60	1,05											
CI Anteil in %	[1,23; 3,88]	[1,53; 4,59]	[0,43; 2,79]	[1,15; 4,37]	[0,33; 2,91]	[0,92; 4,28]	[0,21; 3,00]	[0,00; 2,22]												
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	395	373	343	308	284	260	247											
	auswertbar	Anzahl	394	354	324	293	278	251	240											
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	61	66	49	55	55	54	46											
		Anteil in %	15,48	18,64	15,12	18,77	19,78	21,51	19,17											
	CI Anteil in %	[11,91; 19,06]	[14,58; 22,71]	[11,22; 19,03]	[14,29; 23,25]	[15,09; 24,48]	[16,42; 26,61]	[14,18; 24,16]												
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	194	195	191	163	144	131	124											
		Anteil in %	49,24	55,08	58,95	55,63	51,80	52,19	51,67											
	CI Anteil in %	[44,30; 54,18]	[49,90; 60,27]	[53,59; 64,32]	[49,93; 61,33]	[45,91; 57,68]	[46,00; 58,38]	[45,33; 58,00]												
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	79	54	48	50	47	40	43											
		Anteil in %	20,05	15,25	14,81	17,06	16,91	15,94	17,92											
	CI Anteil in %	[16,09; 24,01]	[11,50; 19,01]	[10,94; 18,69]	[12,75; 21,38]	[12,49; 21,32]	[11,40; 20,47]	[13,05; 22,78]												
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	36	31	29	22	28	20	22											
Anteil in %		9,14	8,76	8,95	7,51	10,07	7,97	9,17												
CI Anteil in %	[6,29; 11,99]	[5,81; 11,71]	[5,84; 12,06]	[4,49; 10,53]	[6,53; 13,62]	[4,61; 11,32]	[5,51; 12,83]													
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	24	8	7	3	4	6	5												
	Anteil in %	6,09	2,26	2,16	1,02	1,44	2,39	2,08												
CI Anteil in %	[3,73; 8,46]	[0,71; 3,81]	[0,57; 3,75]	[0,00; 2,18]	[0,04; 2,84]	[0,50; 4,28]	[0,27; 3,89]													
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	444	414	368	329	305	286												
	auswertbar	Anzahl	444	394	347	319	298	275												
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	61	56	54	48	57	47												
		Anteil in %	13,74	14,21	15,56	15,05	19,13	17,09												
	CI Anteil in %	[10,53; 16,94]	[10,76; 17,67]	[11,74; 19,38]	[11,12; 18,98]	[14,65; 23,60]	[12,63; 21,55]													
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	243	217	197	183	167	161												
		Anteil in %	54,73	55,08	56,77	57,37	56,04	58,55												
	CI Anteil in %	[50,09; 59,36]	[50,16; 59,99]	[51,55; 61,99]	[51,93; 62,80]	[50,40; 61,69]	[52,71; 64,38]													
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	68	53	56	49	49	45												
		Anteil in %	15,32	13,45	16,14	15,36	16,44	16,36												
	CI Anteil in %	[11,96; 18,67]	[10,08; 16,83]	[12,26; 20,01]	[11,40; 19,32]	[12,23; 20,66]	[11,98; 20,74]													
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	43	51	29	28	15	17												
Anteil in %		9,68	12,94	8,36	8,78	5,03	6,18													
CI Anteil in %	[6,93; 12,44]	[9,63; 16,26]	[5,44; 11,27]	[5,67; 11,89]	[2,55; 7,52]	[3,33; 9,03]														
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	29	17	11	11	10	5													
	Anteil in %	6,53	4,31	3,17	3,45	3,36	1,82													
CI Anteil in %	[4,23; 8,83]	[2,31; 6,32]	[1,32; 5,02]	[1,44; 5,45]	[1,31; 5,40]	[0,24; 3,40]														

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	469	440	392	349	320																
	auswertbar	Anzahl	468	424	372	327	310																
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	59	80	66	64	53																
		Anteil in %	12,61	18,87	17,74	19,57	17,10																
	CI Anteil in %	[9,60; 15,62]	[15,14; 22,60]	[13,85; 21,63]	[15,26; 23,88]	[12,90; 21,29]																	
		Anteil in %	52,35	54,48	55,11	55,66	53,55																
	CI Anteil in %	[47,82; 56,88]	[49,74; 59,23]	[50,05; 60,17]	[50,26; 61,05]	[47,99; 59,11]																	
		Anteil in %	19,23	14,39	18,01	14,68	18,39																
	CI Anteil in %	[15,66; 22,81]	[11,04; 17,73]	[14,10; 21,92]	[10,84; 18,52]	[14,07; 22,71]																	
		Anteil in %	10,04	8,49	5,65	6,42	8,06																
	CI Anteil in %	[7,32; 12,77]	[5,83; 11,15]	[3,30; 7,99]	[3,76; 9,08]	[5,03; 11,10]																	
		Anteil in %	5,77	3,77	3,49	3,67	2,90																
	CI Anteil in %	[3,65; 7,88]	[1,96; 5,59]	[1,63; 5,36]	[1,63; 5,71]	[1,03; 4,78]																	
		Anteil in %	4,07	2,55	1,62	2,38																	
CI Anteil in %	[2,27; 5,86]	[1,06; 4,03]	[0,33; 2,91]	[0,75; 4,01]																			
	Anteil in %	4,07	2,55	1,62	2,38																		
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	467	444	397	353																	
	auswertbar	Anzahl	467	432	370	336																	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	66	74	68	56																	
		Anteil in %	14,13	17,13	18,38	16,67																	
	CI Anteil in %	[10,97; 17,30]	[13,57; 20,69]	[14,43; 22,33]	[12,68; 20,66]																		
		Anteil in %	58,46	58,80	60,00	60,12																	
	CI Anteil in %	[53,98; 62,93]	[54,15; 63,44]	[55,00; 65,00]	[54,88; 65,36]																		
		Anteil in %	14,56	13,43	14,05	12,80																	
	CI Anteil in %	[11,36; 17,76]	[10,21; 16,64]	[10,51; 17,60]	[9,22; 16,37]																		
		Anteil in %	8,78	8,10	5,95	8,04																	
	CI Anteil in %	[6,21; 11,35]	[5,53; 10,68]	[3,53; 8,36]	[5,12; 10,95]																		
		Anteil in %	4,07	2,55	1,62	2,38																	
	CI Anteil in %	[2,27; 5,86]	[1,06; 4,03]	[0,33; 2,91]	[0,75; 4,01]																		
		Anteil in %	4,07	2,55	1,62	2,38																	
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	439	405	364																		
	auswertbar	Anzahl	439	386	340																		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	50	68	58																		
		Anteil in %	11,39	17,62	17,06																		
	CI Anteil in %	[8,41; 14,36]	[13,81; 21,42]	[13,05; 21,06]																			
		Anteil in %	57,40	56,74	55,59																		
	CI Anteil in %	[52,77; 62,03]	[51,79; 61,68]	[50,30; 60,88]																			
		Anteil in %	15,72	14,77	17,35																		
	CI Anteil in %	[12,31; 19,13]	[11,22; 18,31]	[13,32; 21,38]																			
		Anteil in %	12,30	7,51	6,76																		
	CI Anteil in %	[9,22; 15,38]	[4,88; 10,15]	[4,09; 9,44]																			
		Anteil in %	3,19	3,37	3,24																		
	CI Anteil in %	[1,54; 4,83]	[1,57; 5,17]	[1,35; 5,12]																			
		Anteil in %	3,19	3,37	3,24																		

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit primären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	419	401																		
	auswertbar	Anzahl	419	385																		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	50	65																		
		Anteil in %	11,93	16,88																		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[8,83; 15,04]	[13,14; 20,63]																		
		Anzahl	251	229																		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	59,90	59,48																		
		CI Anteil in %	[55,21; 64,60]	[54,57; 64,39]																		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	49	51																		
		Anteil in %	11,69	13,25																		
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[8,61; 14,78]	[9,86; 16,64]																		
		Anzahl	47	30																		
		Anteil in %	11,22	7,79																		
		CI Anteil in %	[8,19; 14,24]	[5,11; 10,47]																		
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	441																			
	auswertbar	Anzahl	440																			
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	64																			
		Anteil in %	14,55																			
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[11,25; 17,84]																			
		Anzahl	226																			
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	51,36																			
		CI Anteil in %	[46,69; 56,04]																			
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	65																			
		Anteil in %	14,77																			
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[11,45; 18,09]																			
		Anzahl	53																			
		Anteil in %	12,05																			
		CI Anteil in %	[9,00; 15,09]																			
	Anzahl	32																				
	Anteil in %	7,27																				
	CI Anteil in %	[4,84; 9,70]																				

Anhang C: Auswertung für Patienten nur mit sekundären Endpunkten

Im Hauptteil des vorliegenden Evaluationsberichtes wurden in den Auswertungskapiteln 1 und 2 unter anderem tabellarische Auswertungen zu den Patientenzahlen und -merkmalen sowie zu Raucherstatus, Hypertonus und HbA1c-Werten vorgenommen. Diese Auswertungen bezogen sich auf die Gesamtheit der Patienten. Im folgenden Anhang C werden diese Auswertungen nochmals für die Subkohorte der **Patienten mit sekundären Endpunkten** in der Erstdokumentation vorgenommen. Um den Vergleich zwischen den Auswertungen im Hauptteil und im Anhang zu erleichtern, wurden die Auswertungskapitel und Tabellen im Anhang analog zu zum Hauptteil nummeriert. Da das Auswertungskapitel 2 im Anhang entfällt, folgt auf das Auswertungskapitel C.1 direkt das Auswertungskapitel C.3. Vergleichbares gilt für die Tabellen; deren Nummerierung ist im Anhang daher nicht fortlaufend.

Die Subkohorten werden gebildet, indem die Patienten jeder Kohorte nach dem Schweregrad ihrer Begleit- oder Folgeerkrankungen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation in drei Gruppen unterteilt werden. Bei diesen Begleit- oder Folgeerkrankungen handelt es sich zumeist um schwerste Organschädigungen bzw. Organversagen, verursacht durch eine langjährige diabetische Stoffwechsellage, letztlich bedingt durch Mikro-Gefäßerkrankungen. Die Begleit- oder Folgeerkrankungen werden als „Endpunkte“ bezeichnet. Dieser Begriff ist zentral für die Definition der drei Subkohorten gemäß der BVA-Kriterien:

- Patienten **ohne Endpunkte** in der Erstdokumentation
- Patienten **mit primären, d.h. gravierenden Endpunkten** in der Erstdokumentation (*Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation, Blindheit*)
- Patienten nur mit **sekundären, d.h. weniger gravierenden Endpunkten** (*diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, erheblich auffälliger Fußstatus (Stadium 2 bis Stadium 5 nach Wagner ODER Stadium C bis D nach Armstrong), periphere arterielle Verschlusskrankheit, diabetische Retinopathie*)

Für die Zuordnung der Patienten zu den Subkohorten ist die jeweils gravierendste (Begleit- oder Folge-) Erkrankung entscheidend. Patienten ohne Endpunkte sind Patienten, die nicht den Subkohorten 2 oder 3 zuzuordnen sind. Patienten mit sowohl primären als auch sekundären Endpunkten werden daher der Subkohorte der Patienten mit primären Endpunkten zugeordnet. Die anhand der Erstdokumentation vorgenommene Einteilung in Subkohorten bleibt über den ganzen Berichtszeitraum bestehen, unabhängig davon, ob im weiteren Zeitverlauf Begleit- oder Folgeerkrankungen eines höheren Schweregrads auftreten oder nicht.

Zu beachten ist dabei, dass aufgrund der Änderungen im Dokumentationsbogen durch die 9. RSA-ÄndV nicht alle medizinisch relevanten Kriterien in vergleichbarer Weise für die Halbjahre bis 2004-1 einerseits bzw. ab 2004-2 andererseits vorliegen. Daher kann z.B. das Vorliegen einer Nierenersatztherapie nicht als Kriterium für die Abgrenzung der Subkohorten verwendet werden. Auch werden zwar periphere arterielle Verschlusskrankheiten (pAVK) bei der Bildung der Subkohorten berücksichtigt, nicht aber koronare Herzkrankheiten (KHK). Andere Begleit- oder Folgeerkrankungen wie z.B. Hypertonus werden bei der Abgrenzung der primären und sekundären Endpunkte ebenfalls nicht berücksichtigt.

Auswertungskapitel C.1: Patientenzahlen und -merkmale

In den folgenden vier Tabellen ist die Entwicklung der **Patientenzahlen** ab dem Programmeintritt und in den darauffolgenden jeweiligen Berichtshalbjahren dargestellt. Alle Patienten eines Beitrittsjahres bilden dabei eine Kohorte. Differenziert wird in den Tabellen nach den folgenden Kriterien:

- Geschlechtsverteilung
- Gründe für Ausscheiden aus dem Programm
- Alter und Altersverteilung
- mittlere und mediane Beobachtungszeit
- Vorliegen einer medizinischen Dokumentation

In Tabelle C.1.1 ist die Entwicklung der Teilnehmerzahlen im Programm differenziert nach Kohorten und Geschlecht ausgewiesen. Es wird dargestellt, wie viele Patienten jeweils im Beitrittsjahr und zu Beginn der folgenden Berichtshalbjahre (noch) Programmteilnehmer waren.

Beispielsweise sind in der Kohorte 2003-1 insgesamt 4180 Teilnehmer in das Programm gestartet. Darunter waren 1693 Männer und 2487 Frauen. Zu Beginn des letzten Berichtshalbjahres waren in dieser Kohorte noch 862 Teilnehmer im Programm, 336 Männer und 526 Frauen. Diese Teilnehmer bilden die entsprechende "Restkohorte" des letzten Berichtshalbjahres.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle C.1.1 Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte mit sekundären Endpunkten

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4180	3803	3367	2999	2686	2457	2223	1847	1673	1510	1428	1306	1236	1155	1091	1032	978	912	862
	männlich	Anzahl	1693	1523	1329	1180	1040	941	845	704	645	580	548	503	474	449	426	403	382	352	336
		Anteil in %	40,50	40,05	39,47	39,35	38,72	38,30	38,01	38,12	38,55	38,41	38,38	38,51	38,35	38,87	39,05	39,05	39,06	38,60	38,98
	weiblich	Anzahl	2487	2280	2038	1819	1646	1516	1378	1143	1028	930	880	803	762	706	665	629	596	560	526
Anteil in %		59,50	59,95	60,53	60,65	61,28	61,70	61,99	61,88	61,45	61,59	61,62	61,49	61,65	61,13	60,95	60,95	60,94	61,40	61,02	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	3146	2692	2391	2109	1897	1699	1524	1359	1213	1145	1060	1007	948	884	825	772	719	676	
	männlich	Anzahl	1333	1123	1003	880	783	710	634	577	510	482	447	429	402	376	351	330	303	287	
		Anteil in %	42,37	41,72	41,95	41,73	41,28	41,79	41,60	42,46	42,04	42,10	42,17	42,60	42,41	42,53	42,55	42,75	42,14	42,46	
	weiblich	Anzahl	1813	1569	1388	1229	1114	989	890	782	703	663	613	578	546	508	474	442	416	389	
Anteil in %		57,63	58,28	58,05	58,27	58,72	58,21	58,40	57,54	57,96	57,90	57,83	57,40	57,59	57,47	57,45	57,25	57,86	57,54		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1120	985	883	798	695	610	557	500	466	428	391	360	337	316	293	268	255		
	männlich	Anzahl	501	441	394	357	310	265	235	213	198	181	167	150	139	133	120	108	104		
		Anteil in %	44,73	44,77	44,62	44,74	44,60	43,44	42,19	42,60	42,49	42,29	42,71	41,67	41,25	42,09	40,96	40,30	40,78		
	weiblich	Anzahl	619	544	489	441	385	345	322	287	268	247	224	210	198	183	173	160	151		
Anteil in %		55,27	55,23	55,38	55,26	55,40	56,56	57,81	57,40	57,51	57,71	57,29	58,33	58,75	57,91	59,04	59,70	59,22			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	977	875	794	707	634	582	545	516	475	445	412	386	367	353	337	317			
	männlich	Anzahl	466	419	372	334	299	276	262	251	227	212	200	183	176	168	158	148			
		Anteil in %	47,70	47,89	46,85	47,24	47,16	47,42	48,07	48,64	47,79	47,64	48,54	47,41	47,96	47,59	46,88	46,69			
	weiblich	Anzahl	511	456	422	373	335	306	283	265	248	233	212	203	191	185	179	169			
Anteil in %		52,30	52,11	53,15	52,76	52,84	52,58	51,93	51,36	52,21	52,36	51,46	52,59	52,04	52,41	53,12	53,31				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1341	1246	1115	979	876	786	735	689	638	604	556	512	482	456	416				
	männlich	Anzahl	608	555	485	413	370	322	296	277	257	242	225	211	200	190	171				
		Anteil in %	45,34	44,54	43,50	42,19	42,24	40,97	40,27	40,20	40,28	40,07	40,47	41,21	41,49	41,67	41,11				
	weiblich	Anzahl	733	691	630	566	506	464	439	412	381	362	331	301	282	266	245				
Anteil in %		54,66	55,46	56,50	57,81	57,76	59,03	59,73	59,80	59,72	59,93	59,53	58,79	58,51	58,33	58,89					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1866	1706	1548	1396	1271	1185	1094	1014	933	852	778	722	685	641					
	männlich	Anzahl	849	780	716	645	587	548	503	468	431	393	358	333	318	293					
		Anteil in %	45,50	45,72	46,25	46,20	46,18	46,24	45,98	46,15	46,20	46,13	46,02	46,12	46,42	45,71					
	weiblich	Anzahl	1017	926	832	751	684	637	591	546	502	459	420	389	367	348					
Anteil in %		54,50	54,28	53,75	53,80	53,82	53,76	54,02	53,85	53,80	53,87	53,98	53,88	53,58	54,29						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2166	2034	1807	1621	1514	1405	1318	1212	1127	1026	955	873	815						
	männlich	Anzahl	947	891	794	709	658	611	570	527	485	440	410	376	355						
		Anteil in %	43,72	43,81	43,94	43,74	43,46	43,49	43,25	43,48	43,03	42,88	42,93	43,07	43,56						
	weiblich	Anzahl	1219	1143	1013	912	856	794	748	685	642	586	545	497	460						
Anteil in %		56,28	56,19	56,06	56,26	56,54	56,51	56,75	56,52	56,97	57,12	57,07	56,93	56,44							
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	2651	2513	2278	2097	1861	1731	1580	1480	1370	1258	1164	1081							
	männlich	Anzahl	1171	1111	1017	929	833	771	713	665	614	565	530	484							
		Anteil in %	44,17	44,21	44,64	44,30	44,76	44,54	45,13	44,93	44,82	44,91	45,53	44,77							
	weiblich	Anzahl	1480	1402	1261	1168	1028	960	867	815	756	693	634	597							
Anteil in %		55,83	55,79	55,36	55,70	55,24	55,46	54,87	55,07	55,18	55,09	54,47	55,23								
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	3003	2836	2647	2355	2190	2031	1894	1746	1599	1490	1402								
	männlich	Anzahl	1313	1236	1154	1032	963	888	812	749	681	634	599								
		Anteil in %	43,72	43,58	43,60	43,82	43,97	43,72	42,87	42,90	42,59	42,55	42,72								
	weiblich	Anzahl	1690	1600	1493	1323	1227	1143	1082	997	918	856	803								
Anteil in %		56,28	56,42	56,40	56,18	56,03	56,28	57,13	57,10	57,41	57,45	57,28									

EZ	Patientenzahlen und Geschlechtsverteilung, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1608	1538	1387	1257	1135	1033	940	866	805	744									
	männlich	Anzahl	735	706	623	566	512	470	431	398	371	341									
		Anteil in %	45,71	45,90	44,92	45,03	45,11	45,50	45,85	45,96	46,09	45,83									
	weiblich	Anzahl	873	832	764	691	623	563	509	468	434	403									
Anteil in %		54,29	54,10	55,08	54,97	54,89	54,50	54,15	54,04	53,91	54,17										
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1413	1356	1237	1102	998	925	869	796	733										
	männlich	Anzahl	632	607	552	491	441	412	387	355	330										
		Anteil in %	44,73	44,76	44,62	44,56	44,19	44,54	44,53	44,60	45,02										
	weiblich	Anzahl	781	749	685	611	557	513	482	441	403										
Anteil in %		55,27	55,24	55,38	55,44	55,81	55,46	55,47	55,40	54,98											
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	879	835	760	685	627	579	537	502											
	männlich	Anzahl	411	390	349	316	294	269	251	238											
		Anteil in %	46,76	46,71	45,92	46,13	46,89	46,46	46,74	47,41											
	weiblich	Anzahl	468	445	411	369	333	310	286	264											
Anteil in %		53,24	53,29	54,08	53,87	53,11	53,54	53,26	52,59												
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	759	709	644	573	519	481	447												
	männlich	Anzahl	342	326	299	268	244	228	209												
		Anteil in %	45,06	45,98	46,43	46,77	47,01	47,40	46,76												
	weiblich	Anzahl	417	383	345	305	275	253	238												
Anteil in %		54,94	54,02	53,57	53,23	52,99	52,60	53,24													
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	765	727	649	584	516	473													
	männlich	Anzahl	369	350	319	289	257	241													
		Anteil in %	48,24	48,14	49,15	49,49	49,81	50,95													
	weiblich	Anzahl	396	377	330	295	259	232													
Anteil in %		51,76	51,86	50,85	50,51	50,19	49,05														
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	844	795	710	649	600														
	männlich	Anzahl	386	366	335	311	288														
		Anteil in %	45,73	46,04	47,18	47,92	48,00														
	weiblich	Anzahl	458	429	375	338	312														
Anteil in %		54,27	53,96	52,82	52,08	52,00															
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	914	879	799	716															
	männlich	Anzahl	429	413	376	335															
		Anteil in %	46,94	46,99	47,06	46,79															
	weiblich	Anzahl	485	466	423	381															
Anteil in %		53,06	53,01	52,94	53,21																
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	952	920	836																
	männlich	Anzahl	437	423	391																
		Anteil in %	45,90	45,98	46,77																
	weiblich	Anzahl	515	497	445																
Anteil in %		54,10	54,02	53,23																	
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	823	787																	
	männlich	Anzahl	402	387																	
		Anteil in %	48,85	49,17																	
	weiblich	Anzahl	421	400																	
Anteil in %		51,15	50,83																		
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	875																		
	männlich	Anzahl	407																		
		Anteil in %	46,51																		
	weiblich	Anzahl	468																		
Anteil in %		53,49																			

Tabelle C.1.3 gibt Auskunft darüber, wie viele der ursprünglich eingeschriebenen Patienten bis zum Ende des Berichtshalbjahres ausgeschieden sind. Es werden also kumulierte Werte ausgewiesen. Differenziert wird dabei nach den möglichen Gründen für ein **Ausscheiden der Patienten aus dem Programm**. Dafür kommen beispielsweise Tod, Ausschluss durch die Krankenkasse oder Beendigung durch den Patienten in Betracht. Neben den kumulierten Absolutzahlen der ausgeschiedenen Patienten werden auch Anteilswerte ausgewiesen. Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder im Beitrittsjahr.

Beispielsweise startete die Kohorte 2003-1 mit 4180 Teilnehmern. 3370 von ihnen bzw. 80,62 Prozent waren bis zum Ende des letzten Berichtshalbjahres ausgeschieden.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle C.1.3 Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit sekundären Endpunkten

Bezugsgröße für die Anteilswerte ist die Zahl der ursprünglichen Kohortenmitglieder zum Eintrittszeitpunkt

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	377	813	1181	1494	1723	1957	2333	2507	2670	2752	2874	2944	3025	3089	3148	3202	3268	3318	3370
		Anteil in %	9,02	19,45	28,25	35,74	41,22	46,82	55,81	59,98	63,88	65,84	68,76	70,43	72,37	73,90	75,31	76,60	78,18	79,38	80,62
		CI Anteil in %	[8,15; 9,89]	[18,25; 20,65]	[26,89; 29,62]	[34,29; 37,19]	[39,73; 42,71]	[45,31; 48,33]	[54,31; 57,32]	[58,49; 61,46]	[62,42; 65,33]	[64,40; 67,28]	[67,35; 70,16]	[69,05; 71,81]	[71,01; 73,72]	[72,57; 75,23]	[74,00; 76,62]	[75,32; 77,89]	[76,93; 79,43]	[78,15; 80,60]	[79,42; 81,82]
	davon wegen Tod	Anzahl	6	16	24	31	92	147	198	250	288	324	384	417	460	495	532	564	594	621	656
		Anteil in %	0,14	0,38	0,57	0,74	2,20	3,52	4,74	5,98	6,89	7,75	9,19	9,98	11,00	11,84	12,73	13,49	14,21	14,86	15,69
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	60	261	461	662	793	940	995	1042	1060	1078	1087	1098	1115	1130	1134	1144	1159	1166	1171
		Anteil in %	1,44	6,24	11,03	15,84	18,97	22,49	23,80	24,93	25,36	25,79	26,00	26,27	26,67	27,03	27,13	27,37	27,73	27,89	28,01
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	1	5	20	29	31	36	42	54	57	80	84	96	101	109	114	121	128	132
		Anteil in %	0,02	0,02	0,12	0,48	0,69	0,74	0,86	1,00	1,29	1,36	1,91	2,01	2,30	2,42	2,61	2,73	2,89	3,06	3,16
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	310	535	691	781	809	839	1104	1173	1268	1293	1323	1345	1354	1363	1373	1380	1394	1403	1411
Anteil in %		7,42	12,80	16,53	18,68	19,35	20,07	26,41	28,06	30,33	30,93	31,65	32,18	32,39	32,61	32,85	33,01	33,35	33,56	33,76	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	4180	3803	3367	2999	2686	2457	2223	1847	1673	1510	1428	1306	1236	1155	1091	1032	978	912	862
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	3803	3367	2999	2686	2457	2223	1847	1673	1510	1428	1306	1236	1155	1091	1032	978	912	862	810
2003-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	454	755	1037	1249	1447	1622	1787	1933	2001	2086	2139	2198	2262	2321	2374	2427	2470	2510	2510
		Anteil in %	14,43	24,00	32,96	39,70	45,99	51,56	56,80	61,44	63,60	66,31	67,99	69,87	71,90	73,78	75,46	77,15	78,51	79,78	79,78
		CI Anteil in %	[13,20; 15,66]	[22,51; 25,49]	[31,32; 34,61]	[37,99; 41,41]	[44,25; 47,74]	[49,81; 53,30]	[55,07; 58,53]	[59,74; 63,14]	[61,92; 65,29]	[64,65; 67,96]	[66,36; 69,62]	[68,26; 71,47]	[70,33; 73,47]	[72,24; 75,31]	[73,96; 76,96]	[75,68; 78,61]	[77,08; 79,95]	[78,38; 81,19]	
	davon wegen Tod	Anzahl	8	13	20	55	99	144	184	219	253	281	313	346	373	400	427	454	482	509	509
		Anteil in %	0,25	0,41	0,64	1,75	3,15	4,58	5,85	6,96	8,04	8,93	9,95	11,00	11,86	12,71	13,57	14,43	15,32	16,18	16,18
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	87	199	390	539	663	716	764	782	787	798	803	806	821	833	841	852	857	860	860
		Anteil in %	2,77	6,33	12,40	17,13	21,07	22,76	24,28	24,86	25,02	25,37	25,52	25,62	26,10	26,48	26,73	27,08	27,24	27,34	27,34
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	4	20	22	28	28	32	40	48	65	69	80	95	101	110	116	120	123	123
		Anteil in %	0,03	0,13	0,64	0,70	0,89	0,89	1,02	1,27	1,53	2,07	2,19	2,54	3,02	3,21	3,50	3,69	3,81	3,91	3,91
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	358	539	607	633	657	734	807	892	913	942	954	966	973	987	996	1005	1011	1018	1018
Anteil in %		11,38	17,13	19,29	20,12	20,88	23,33	25,65	28,35	29,02	29,94	30,32	30,71	30,93	31,37	31,66	31,95	32,14	32,36	32,36	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	3146	2692	2391	2109	1897	1699	1524	1359	1213	1145	1060	1007	948	884	825	772	719	676	676
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	2692	2391	2109	1897	1699	1524	1359	1213	1145	1060	1007	948	884	825	772	719	676	636	636
2004-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	135	237	322	425	510	563	620	654	692	729	760	783	804	827	852	865	874	874	874
		Anteil in %	12,05	21,16	28,75	37,95	45,54	50,27	55,36	58,39	61,79	65,09	67,86	69,91	71,79	73,84	76,07	77,23	78,04	78,04	78,04
		CI Anteil in %	[10,15; 13,96]	[18,77; 23,55]	[26,10; 31,40]	[35,10; 40,79]	[42,62; 48,45]	[47,34; 53,20]	[52,44; 58,27]	[55,50; 61,28]	[58,94; 64,63]	[62,30; 67,88]	[65,12; 70,59]	[67,22; 72,60]	[69,15; 74,42]	[71,26; 76,41]	[73,57; 78,57]	[74,78; 79,69]	[75,61; 80,46]		
	davon wegen Tod	Anzahl	1	1	11	36	55	73	89	106	121	134	149	159	168	179	191	199	204	204	204
		Anteil in %	0,09	0,09	0,98	3,21	4,91	6,52	7,95	9,46	10,80	11,96	13,30	14,20	15,00	15,98	17,05	17,77	18,21	18,21	18,21
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	55	115	171	233	268	282	290	292	296	301	305	308	311	315	321	324	324	324	324
		Anteil in %	4,91	10,27	15,27	20,80	23,93	25,18	25,89	26,07	26,43	26,88	27,23	27,50	27,77	28,13	28,66	28,93	28,93	28,93	28,93
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	1	8	11	14	16	17	24	26	34	36	41	49	54	58	61	63	65	65	65
		Anteil in %	0,09	0,71	0,98	1,25	1,43	1,52	2,14	2,32	3,04	3,21	3,66	4,38	4,82	5,18	5,45	5,63	5,80	5,80	5,80
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	78	113	129	142	171	191	217	230	241	258	265	267	271	275	279	279	281	281	281
Anteil in %		6,96	10,09	11,52	12,68	15,27	17,05	19,38	20,54	21,52	23,04	23,66	23,84	24,20	24,55	24,91	24,91	25,09	25,09	25,09	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1120	985	883	798	695	610	557	500	466	428	391	360	337	316	293	268	255	255	255
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	985	883	798	695	610	557	500	466	428	391	360	337	316	293	268	255	246	246	246

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	102	183	270	343	395	432	461	502	532	565	591	610	624	640	660	671		
		Anteil in %	10,44	18,73	27,64	35,11	40,43	44,22	47,19	51,38	54,45	57,83	60,49	62,44	63,87	65,51	67,55	68,68		
		CI Anteil in %	[8,52; 12,36]	[16,28; 21,18]	[24,83; 30,44]	[32,11; 38,10]	[37,35; 43,51]	[41,10; 47,33]	[44,05; 50,32]	[48,25; 54,52]	[51,33; 57,58]	[54,73; 60,93]	[57,42; 63,56]	[59,40; 65,47]	[60,86; 66,88]	[62,52; 68,49]	[64,62; 70,49]	[65,77; 71,59]		
	davon wegen Tod	Anzahl	1	8	24	42	54	63	75	91	103	113	123	129	141	145	155	162		
		Anteil in %	0,10	0,82	2,46	4,30	5,53	6,45	7,68	9,31	10,54	11,57	12,59	13,20	14,43	14,84	15,86	16,58		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	83	143	198	227	251	258	264	274	278	288	293	296	297	302	309	309		
		Anteil in %	8,50	14,64	20,27	23,23	25,69	26,41	27,02	28,05	28,45	29,48	29,99	30,30	30,40	30,91	31,63	31,63		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	8	13	13	13	16	19	24	30	33	39	45	50	50	56	56	60		
		Anteil in %	0,82	1,33	1,33	1,33	1,64	1,94	2,46	3,07	3,38	3,99	4,61	5,12	5,12	5,73	5,73	6,14		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	10	19	35	61	74	92	98	107	118	125	130	135	136	137	140	140		
Anteil in %		1,02	1,94	3,58	6,24	7,57	9,42	10,03	10,95	12,08	12,79	13,31	13,82	13,92	14,02	14,33	14,33			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	977	875	794	707	634	582	545	516	475	445	412	386	367	353	337	317		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	875	794	707	634	582	545	516	475	445	412	386	367	353	337	317	306		
2005-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	95	226	362	465	555	606	652	703	737	785	829	859	885	925	938			
		Anteil in %	7,08	16,85	26,99	34,68	41,39	45,19	48,62	52,42	54,96	58,54	61,82	64,06	66,00	68,98	69,95			
		CI Anteil in %	[5,71; 8,46]	[14,85; 18,86]	[24,62; 29,37]	[32,13; 37,22]	[38,75; 44,02]	[42,53; 47,85]	[45,94; 51,30]	[49,75; 55,10]	[52,30; 57,62]	[55,90; 61,18]	[59,22; 64,42]	[61,49; 66,63]	[63,46; 68,53]	[66,50; 71,46]	[67,49; 72,40]			
	davon wegen Tod	Anzahl	5	30	69	96	116	141	155	179	193	214	241	255	273	293	302			
		Anteil in %	0,37	2,24	5,15	7,16	8,65	10,51	11,56	13,35	14,39	15,96	17,97	19,02	20,36	21,85	22,52			
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	78	152	197	238	251	255	259	272	279	288	294	301	304	309	310			
		Anteil in %	5,82	11,33	14,69	17,75	18,72	19,02	19,31	20,28	20,81	21,48	21,92	22,45	22,67	23,04	23,12			
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	7	11	15	20	25	35	41	48	58	61	66	69	73	75			
		Anteil in %	0,15	0,52	0,82	1,12	1,49	1,86	2,61	3,06	3,58	4,33	4,55	4,92	5,15	5,44	5,59			
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	10	37	85	116	168	185	203	211	217	225	233	237	239	250	251			
Anteil in %		0,75	2,76	6,34	8,65	12,53	13,80	15,14	15,73	16,18	16,78	17,38	17,67	17,82	18,64	18,72				
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1341	1246	1115	979	876	786	735	689	638	604	556	512	482	456	416			
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1246	1115	979	876	786	735	689	638	604	556	512	482	456	416	403			
2005-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	160	318	470	595	681	772	852	933	1014	1088	1144	1181	1225	1267				
		Anteil in %	8,57	17,04	25,19	31,89	36,50	41,37	45,66	50,00	54,34	58,31	61,31	63,29	65,65	67,90				
		CI Anteil in %	[7,30; 9,85]	[15,34; 18,75]	[23,22; 27,16]	[29,77; 34,00]	[34,31; 38,68]	[39,14; 43,61]	[43,40; 47,92]	[47,73; 52,27]	[52,08; 56,60]	[56,07; 60,54]	[59,10; 63,52]	[61,10; 65,48]	[63,49; 67,80]	[65,78; 70,02]				
	davon wegen Tod	Anzahl	17	54	92	122	154	183	212	252	291	328	360	379	402	430				
		Anteil in %	0,91	2,89	4,93	6,54	8,25	9,81	11,36	13,50	15,59	17,58	19,29	20,31	21,54	23,04				
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	128	185	241	262	275	291	313	323	339	350	359	366	370	372				
		Anteil in %	6,86	9,91	12,92	14,04	14,74	15,59	16,77	17,31	18,17	18,76	19,24	19,61	19,83	19,94				
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	7	14	20	28	37	59	63	84	95	106	110	112	120	125				
		Anteil in %	0,38	0,75	1,07	1,50	1,98	3,16	3,38	4,50	5,09	5,68	5,89	6,00	6,43	6,70				
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	8	65	117	183	215	239	264	274	289	304	315	324	333	340				
Anteil in %		0,43	3,48	6,27	9,81	11,52	12,81	14,15	14,68	15,49	16,29	16,88	17,36	17,85	18,22					
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1866	1706	1548	1396	1271	1185	1094	1014	933	852	778	722	685	641				
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	1706	1548	1396	1271	1185	1094	1014	933	852	778	722	685	641	599				
2006-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	132	359	545	652	761	848	954	1039	1140	1211	1293	1351	1387					
		Anteil in %	6,09	16,57	25,16	30,10	35,13	39,15	44,04	47,97	52,63	55,91	59,70	62,37	64,04					
		CI Anteil in %	[5,09; 7,10]	[15,01; 18,14]	[23,33; 26,99]	[28,17; 32,03]	[33,12; 37,14]	[37,09; 41,21]	[41,95; 46,14]	[45,86; 50,07]	[50,53; 54,73]	[53,82; 58,00]	[57,63; 61,76]	[60,33; 64,41]	[62,01; 66,06]					
	davon wegen Tod	Anzahl	22	69	113	157	199	246	293	336	374	408	451	486	507					
		Anteil in %	1,02	3,19	5,22	7,25	9,19	11,36	13,53	15,51	17,27	18,84	20,82	22,44	23,41					
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	93	183	223	239	252	267	297	315	333	353	363	376	380					
		Anteil in %	4,29	8,45	10,30	11,03	11,63	12,33	13,71	14,54	15,37	16,30	16,76	17,36	17,54					
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	4	17	29	37	53	60	77	88	109	119	133	137	142					
		Anteil in %	0,18	0,78	1,34	1,71	2,45	2,77	3,55	4,06	5,03	5,49	6,14	6,33	6,56					
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	13	90	180	219	257	275	287	300	324	331	346	352	358					
Anteil in %		0,60	4,16	8,31	10,11	11,87	12,70	13,25	13,85	14,96	15,28	15,97	16,25	16,53						
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	2166	2034	1807	1621	1514	1405	1318	1212	1127	1026	955	873	815					
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	2034	1807	1621	1514	1405	1318	1212	1127	1026	955	873	815	779					

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2006-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	138	373	554	790	920	1071	1171	1281	1393	1487	1570	1624								
		Anteil in %	5,21	14,07	20,90	29,80	34,70	40,40	44,17	48,32	52,55	56,09	59,22	61,26								
		CI Anteil in %	[4,36; 6,05]	[12,75; 15,39]	[19,35; 22,45]	[28,06; 31,54]	[32,89; 36,52]	[38,53; 42,27]	[42,28; 46,06]	[46,42; 50,22]	[50,64; 54,45]	[54,20; 57,98]	[57,35; 61,09]	[59,41; 63,11]								
	davon wegen Tod	Anzahl	21	87	160	244	306	385	424	481	533	581	629	669								
		Anteil in %	0,79	3,28	6,04	9,20	11,54	14,52	15,99	18,14	20,11	21,92	23,73	25,24								
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	97	163	190	227	244	266	289	310	330	352	364	368								
		Anteil in %	3,66	6,15	7,17	8,56	9,20	10,03	10,90	11,69	12,45	13,28	13,73	13,88								
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	7	29	37	83	101	137	162	178	197	211	226	231								
		Anteil in %	0,26	1,09	1,40	3,13	3,81	5,17	6,11	6,71	7,43	7,96	8,53	8,71								
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	13	94	167	236	269	283	296	312	333	343	351	356								
		Anteil %	0,49	3,55	6,30	8,90	10,15	10,68	11,17	11,77	12,56	12,94	13,24	13,43								
	Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	2651	2513	2278	2097	1861	1731	1580	1480	1370	1258	1164	1081							
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	2513	2278	2097	1861	1731	1580	1480	1370	1258	1164	1081	1027							
	2007-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	167	356	648	813	972	1109	1257	1404	1513	1601	1682								
Anteil in %			5,56	11,85	21,58	27,07	32,37	36,93	41,86	46,75	50,38	53,31	56,01									
CI Anteil in %			[4,74; 6,38]	[10,70; 13,01]	[20,11; 23,05]	[25,48; 28,66]	[30,69; 34,04]	[35,20; 38,66]	[40,09; 43,62]	[44,97; 48,54]	[48,59; 52,17]	[51,53; 55,10]	[54,23; 57,79]									
davon wegen Tod		Anzahl	38	117	208	275	357	417	485	559	627	674	720									
		Anteil in %	1,27	3,90	6,93	9,16	11,89	13,89	16,15	18,61	20,88	22,44	23,98									
davon wegen Ausschluss		Anzahl	102	133	168	202	226	250	290	317	334	352	362									
		Anteil in %	3,40	4,43	5,59	6,73	7,53	8,33	9,66	10,56	11,12	11,72	12,05									
davon wegen Beendigung durch Pat.		Anzahl	14	28	123	147	180	208	228	251	261	273	284									
		Anteil in %	0,47	0,93	4,10	4,90	5,99	6,93	7,59	8,36	8,69	9,09	9,46									
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund		Anzahl	13	78	149	189	209	234	254	277	291	302	316									
		Anteil %	0,43	2,60	4,96	6,29	6,96	7,79	8,46	9,22	9,69	10,06	10,52									
Patienten insgesamt:		zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	3003	2836	2647	2355	2190	2031	1894	1746	1599	1490	1402								
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	2836	2647	2355	2190	2031	1894	1746	1599	1490	1402	1321								
2007-2		ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	70	221	351	473	575	668	742	803	864	905									
	Anteil in %		4,35	13,74	21,83	29,42	35,76	41,54	46,14	49,94	53,73	56,28										
	CI Anteil in %		[3,36; 5,35]	[12,06; 15,43]	[19,81; 23,85]	[27,19; 31,64]	[33,42; 38,10]	[39,13; 43,95]	[43,71; 48,58]	[47,49; 52,38]	[51,29; 56,17]	[53,86; 58,71]										
	davon wegen Tod	Anzahl	18	76	126	167	211	249	287	320	348	374										
		Anteil in %	1,12	4,73	7,84	10,39	13,12	15,49	17,85	19,90	21,64	23,26										
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	34	62	85	110	133	149	164	173	190	192										
		Anteil in %	2,11	3,86	5,29	6,84	8,27	9,27	10,20	10,76	11,82	11,94										
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	13	51	69	105	128	153	166	177	188	197										
		Anteil in %	0,81	3,17	4,29	6,53	7,96	9,51	10,32	11,01	11,69	12,25										
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	5	32	71	91	103	117	125	133	138	142										
		Anteil %	0,31	1,99	4,42	5,66	6,41	7,28	7,77	8,27	8,58	8,83										
	Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1608	1538	1387	1257	1135	1033	940	866	805	744									
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	1538	1387	1257	1135	1033	940	866	805	744	703									
	2008-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	57	176	311	415	488	544	617	680	732										
Anteil in %			4,03	12,46	22,01	29,37	34,54	38,50	43,67	48,12	51,80											
CI Anteil in %			[3,01; 5,06]	[10,73; 14,18]	[19,85; 24,17]	[26,99; 31,75]	[32,06; 37,02]	[35,96; 41,04]	[41,08; 46,25]	[45,52; 50,73]	[49,20; 54,41]											
davon wegen Tod		Anzahl	20	47	97	139	165	184	226	260	289											
		Anteil in %	1,42	3,33	6,86	9,84	11,68	13,02	15,99	18,40	20,45											
davon wegen Ausschluss		Anzahl	28	59	82	106	119	131	146	155	160											
		Anteil in %	1,98	4,18	5,80	7,50	8,42	9,27	10,33	10,97	11,32											
davon wegen Beendigung durch Pat.		Anzahl	3	21	59	83	101	112	120	124	134											
		Anteil in %	0,21	1,49	4,18	5,87	7,15	7,93	8,49	8,78	9,48											
davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund		Anzahl	6	49	73	87	103	117	125	141	149											
		Anteil %	0,42	3,47	5,17	6,16	7,29	8,28	8,85	9,98	10,54											
Patienten insgesamt:		zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	1413	1356	1237	1102	998	925	869	796	733										
		am Ende des Halbjahres	Anzahl	1356	1237	1102	998	925	869	796	733	681										

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2008-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	44	119	194	252	300	342	377	406											
		Anteil in %	5,01	13,54	22,07	28,67	34,13	38,91	42,89	46,19											
		CI Anteil in %	[3,56; 6,45]	[11,28; 15,80]	[19,33; 24,81]	[25,68; 31,66]	[30,99; 37,27]	[35,68; 42,13]	[39,62; 46,16]	[42,89; 49,49]											
	davon wegen Tod	Anzahl	13	41	67	91	115	134	152	172											
		Anteil in %	1,48	4,66	7,62	10,35	13,08	15,24	17,29	19,57											
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	27	40	58	72	76	82	87	88											
		Anteil in %	3,07	4,55	6,60	8,19	8,65	9,33	9,90	10,01											
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	3	17	35	46	56	63	70	76											
		Anteil in %	0,34	1,93	3,98	5,23	6,37	7,17	7,96	8,65											
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1	21	34	43	53	63	68	70											
Anteil %		0,11	2,39	3,87	4,89	6,03	7,17	7,74	7,96												
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	879	835	760	685	627	579	537	502											
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	835	760	685	627	579	537	502	473											
2009-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	50	115	186	240	278	312	344												
		Anteil in %	6,59	15,15	24,51	31,62	36,63	41,11	45,32												
		CI Anteil in %	[4,82; 8,35]	[12,60; 17,70]	[21,44; 27,57]	[28,31; 34,93]	[33,20; 40,06]	[37,60; 44,61]	[41,78; 48,87]												
	davon wegen Tod	Anzahl	18	46	65	90	105	120	141												
		Anteil in %	2,37	6,06	8,56	11,86	13,83	15,81	18,58												
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	21	36	51	64	68	75	79												
		Anteil in %	2,77	4,74	6,72	8,43	8,96	9,88	10,41												
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	4	19	42	53	62	72	75												
		Anteil in %	0,53	2,50	5,53	6,98	8,17	9,49	9,88												
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	7	14	28	33	43	45	49												
Anteil %		0,92	1,84	3,69	4,35	5,67	5,93	6,46													
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	759	709	644	573	519	481	447												
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	709	644	573	519	481	447	415												
2009-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	38	116	181	249	292	316													
		Anteil in %	4,97	15,16	23,66	32,55	38,17	41,31													
		CI Anteil in %	[3,43; 6,51]	[12,62; 17,71]	[20,65; 26,67]	[29,23; 35,87]	[34,73; 41,61]	[37,82; 44,80]													
	davon wegen Tod	Anzahl	13	36	61	86	103	115													
		Anteil in %	1,70	4,71	7,97	11,24	13,46	15,03													
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	20	36	47	56	65	68													
		Anteil in %	2,61	4,71	6,14	7,32	8,50	8,89													
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	22	43	68	80	81													
		Anteil in %	0,26	2,88	5,62	8,89	10,46	10,59													
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3	22	30	39	44	52													
Anteil %		0,39	2,88	3,92	5,10	5,75	6,80														
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	765	727	649	584	516	473													
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	727	649	584	516	473	449													
2010-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	49	134	195	244	289														
		Anteil in %	5,81	15,88	23,10	28,91	34,24														
		CI Anteil in %	[4,23; 7,38]	[13,41; 18,34]	[20,26; 25,95]	[25,85; 31,97]	[31,04; 37,44]														
	davon wegen Tod	Anzahl	11	41	64	83	97														
		Anteil in %	1,30	4,86	7,58	9,83	11,49														
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	31	49	61	67	68														
		Anteil in %	3,67	5,81	7,23	7,94	8,06														
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	3	16	33	45	60														
		Anteil in %	0,36	1,90	3,91	5,33	7,11														
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	4	28	37	49	64														
Anteil %		0,47	3,32	4,38	5,81	7,58															
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	844	795	710	649	600														
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	795	710	649	600	555														

EZ	Bis Ende des Berichtshalbjahres ausgeschiedene Patienten (Werte kumuliert), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2010-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	35	115	198	233															
		Anteil in %	3,83	12,58	21,66	25,49															
		CI Anteil in %	[2,58; 5,07]	[10,43; 14,73]	[18,99; 24,34]	[22,67; 28,32]															
	davon wegen Tod	Anzahl	9	38	64	85															
		Anteil in %	0,98	4,16	7,00	9,30															
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	24	39	53	53															
		Anteil in %	2,63	4,27	5,80	5,80															
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	0	25	52	61															
		Anteil in %	0,00	2,74	5,69	6,67															
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	2	13	29	34															
Anteil %		0,22	1,42	3,17	3,72																
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	914	879	799	716															
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	879	799	716	681															
2011-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	32	116	174																
		Anteil in %	3,36	12,18	18,28																
		CI Anteil in %	[2,22; 4,51]	[10,11; 14,26]	[15,82; 20,73]																
	davon wegen Tod	Anzahl	6	30	54																
		Anteil in %	0,63	3,15	5,67																
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	21	33	38																
		Anteil in %	2,21	3,47	3,99																
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2	28	49																
		Anteil in %	0,21	2,94	5,15																
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	3	25	33																
Anteil %		0,32	2,63	3,47																	
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	952	920	836																
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	920	836	778																
2011-2	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	36	104																	
		Anteil in %	4,37	12,64																	
		CI Anteil in %	[2,98; 5,77]	[10,37; 14,91]																	
	davon wegen Tod	Anzahl	5	25																	
		Anteil in %	0,61	3,04																	
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	19	29																	
		Anteil in %	2,31	3,52																	
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	6	32																	
		Anteil in %	0,73	3,89																	
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	6	18																	
Anteil %		0,73	2,19																		
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	823	787																	
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	787	719																	
2012-1	ausgeschiedene Patienten insgesamt	Anzahl	18																		
		Anteil in %	2,06																		
		CI Anteil in %	[1,12; 3,00]																		
	davon wegen Tod	Anzahl	10																		
		Anteil in %	1,14																		
	davon wegen Ausschluss	Anzahl	5																		
		Anteil in %	0,57																		
	davon wegen Beendigung durch Pat.	Anzahl	2																		
		Anteil in %	0,23																		
	davon aus sonstigem oder unbekanntem Grund	Anzahl	1																		
Anteil %		0,11																			
Patienten insgesamt:	zu Beginn des Halbjahres	Anzahl	875																		
	am Ende des Halbjahres	Anzahl	857																		

In Tabelle C.1.4 ist das **mittlere Alter der Programmteilnehmer** zur Erstdokumentation ausgewiesen. Deren Anzahl ist in der Zeile „Fallbasis“ ausgewiesen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem steht für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

In der Kohorte 2003-1 starteten 4180 Teilnehmer in das Programm. Ihr durchschnittliches Alter betrug im Beitrittsjahr 69,01 Jahre, der Median lag bei 69,00 Jahren.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle C.1.4 Mittleres Alter laut Erstdokumentation in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitrittsjahr
2003-1	Mean	69,01
	CI Mean	[68,71; 69,30]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>4180</i>
2003-2	Mean	67,90
	CI Mean	[67,55; 68,24]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>3146</i>
2004-1	Mean	67,42
	CI Mean	[66,83; 68,01]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>1120</i>
2004-2	Mean	66,96
	CI Mean	[66,30; 67,62]
	Median	68,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>977</i>
2005-1	Mean	68,21
	CI Mean	[67,63; 68,79]
	Median	69,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>1341</i>
2005-2	Mean	68,83
	CI Mean	[68,37; 69,29]
	Median	70,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>1866</i>
2006-1	Mean	69,84
	CI Mean	[69,42; 70,25]
	Median	71,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>2166</i>
2006-2	Mean	69,45
	CI Mean	[69,07; 69,83]
	Median	70,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>2651</i>
2007-1	Mean	70,61
	CI Mean	[70,24; 70,97]
	Median	72,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>3003</i>
2007-2	Mean	69,82
	CI Mean	[69,30; 70,35]
	Median	71,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>1608</i>

EZ	Mittleres Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitrittsjahr
2008-1	Mean	70,20
	CI Mean	[69,64; 70,76]
	Median	71,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>1413</i>
2008-2	Mean	69,23
	CI Mean	[68,49; 69,97]
	Median	71,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>879</i>
2009-1	Mean	69,95
	CI Mean	[69,15; 70,76]
	Median	71,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>759</i>
2009-2	Mean	68,91
	CI Mean	[68,09; 69,73]
	Median	70,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>765</i>
2010-1	Mean	69,27
	CI Mean	[68,53; 70,01]
	Median	71,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>844</i>
2010-2	Mean	69,20
	CI Mean	[68,45; 69,95]
	Median	71,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>914</i>
2011-1	Mean	69,07
	CI Mean	[68,35; 69,78]
	Median	71,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>952</i>
2011-2	Mean	68,12
	CI Mean	[67,33; 68,92]
	Median	70,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>823</i>
2012-1	Mean	69,05
	CI Mean	[68,29; 69,82]
	Median	71,00
	<i>Fallbasis</i>	<i>875</i>

In Tabelle C.1.5 ist die **Altersverteilung nach Alterskategorien** für alle Patienten im Beitrittsjahr ausgewiesen. Dargestellt sind die absoluten Anzahlen. Bei der Interpretation der Altersklassen ist eine Besonderheit zu beachten. Die Auswertung ist nach „vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vorzunehmen. Zudem ist zu beachten, dass für die Auswertung lediglich das Geburtsjahr, nicht aber das Geburtsdatum zur Verfügung steht. Dies bedeutet, dass das rechnerische „Alter in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres“ vom tatsächlichen Lebensalter abweichen kann. So wird

Erwachsenen, die zum Zeitpunkt des Programmbeitritts bereits **51 Jahre alt waren**, das rechnerische Alter „50“ zugewiesen, wenn sie nicht schon am 1. Januar des Beitrittsjahres 51 Jahre alt waren.

In der Kohorte 2003-1 entfielen im Beitrittsjahr 1593 Patienten auf die Altersklasse "61 bis 70" Jahre.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle C.1.5 Alter laut Erstdokumentation – Verteilung auf Altersklassen für vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitrittsjahr
2003-1	bis 50	207
	51 bis 60	459
	61 bis 70	1593
	71 bis 80	1463
	81 und älter	458
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>4180</i>
2003-2	bis 50	187
	51 bis 60	405
	61 bis 70	1227
	71 bis 80	1051
	81 und älter	276
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>3146</i>
2004-1	bis 50	69
	51 bis 60	172
	61 bis 70	429
	71 bis 80	361
	81 und älter	89
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1120</i>
2004-2	bis 50	80
	51 bis 60	133
	61 bis 70	384
	71 bis 80	297
	81 und älter	83
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>977</i>
2005-1	bis 50	96
	51 bis 60	188
	61 bis 70	441
	71 bis 80	478
	81 und älter	138
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1341</i>
2005-2	bis 50	102
	51 bis 60	238
	61 bis 70	669
	71 bis 80	635
	81 und älter	222
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1866</i>
2006-1	bis 50	87
	51 bis 60	254
	61 bis 70	739
	71 bis 80	820
	81 und älter	266
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>2166</i>
2006-2	bis 50	128
	51 bis 60	317
	61 bis 70	886
	71 bis 80	1000
	81 und älter	319
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>2650</i>

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitrittsjahr
2007-1	bis 50	137
	51 bis 60	333
	61 bis 70	846
	71 bis 80	1219
	81 und älter	468
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>3003</i>
2007-2	bis 50	83
	51 bis 60	221
	61 bis 70	447
	71 bis 80	629
	81 und älter	228
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1608</i>
2008-1	bis 50	81
	51 bis 60	175
	61 bis 70	417
	71 bis 80	516
	81 und älter	224
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>1413</i>
2008-2	bis 50	61
	51 bis 60	131
	61 bis 70	238
	71 bis 80	327
	81 und älter	122
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>879</i>
2009-1	bis 50	43
	51 bis 60	119
	61 bis 70	196
	71 bis 80	257
	81 und älter	144
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>759</i>
2009-2	bis 50	59
	51 bis 60	112
	61 bis 70	212
	71 bis 80	269
	81 und älter	113
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>765</i>
2010-1	bis 50	56
	51 bis 60	135
	61 bis 70	228
	71 bis 80	301
	81 und älter	124
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>844</i>
2010-2	bis 50	65
	51 bis 60	138
	61 bis 70	240
	71 bis 80	331
	81 und älter	140
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>914</i>
2011-1	bis 50	60
	51 bis 60	164
	61 bis 70	233
	71 bis 80	349
	81 und älter	146
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>952</i>
2011-2	bis 50	69
	51 bis 60	147
	61 bis 70	218
	71 bis 80	285
	81 und älter	104
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>823</i>

EZ	Alter (laut ED) in vollendeten Lebensjahren zum 1.1. des Beitrittsjahres, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitrittsjahr
2012-1	bis 50	66
	51 bis 60	141
	61 bis 70	201
	71 bis 80	342
	81 und älter	125
	<i>Patienten zusammen</i>	<i>875</i>

Zur ergänzenden Information sind in der nachfolgenden Tabelle C.1.8 noch diejenigen Patienten aufgeführt, für die im jeweils betrachteten Berichtshalbjahr **kein medizinischer Dokumentationsbogen** vorlag. Diese Patienten wurden bei den medizinischen Auswertungen nicht berücksichtigt. Für das Beitrittsjahr sind keine Patienten mit fehlender medizinischer Dokumentation ausgewiesen, da definitionsgemäß nur Patienten mit Erstdokumentation in die Evaluation einfließen können.

In der Kohorte 2003-1 waren im letzten Berichtshalbjahr 862 Patienten in das Programm eingeschrieben. Bei 24 von Ihnen bzw. 2,78 Prozent lagen im letzten Berichtshalbjahr keine medizinischen Dokumentationsbögen vor.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle C.1.8 Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4180	3803	3367	2999	2686	2457	2223	1847	1673	1510	1428	1306	1236	1155	1091	1032	978	912	862
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		759	191	61	70	41	128	47	48	39	76	54	34	33	29	29	28	17	24
		Anteil in %		19,96	5,67	2,03	2,61	1,67	5,76	2,54	2,87	2,58	5,32	4,13	2,75	2,86	2,66	2,81	2,86	1,86	2,78
	CI Anteil in %		[18,69; 21,23]	[4,89; 6,45]	[1,53; 2,54]	[2,00; 3,21]	[1,16; 2,18]	[4,79; 6,73]	[1,83; 3,26]	[2,07; 3,67]	[1,78; 3,38]	[4,16; 6,49]	[3,05; 5,22]	[1,84; 3,66]	[1,90; 3,82]	[1,70; 3,61]	[1,80; 3,82]	[1,82; 3,91]	[0,99; 2,74]	[1,69; 3,88]	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	3146	2692	2391	2109	1897	1699	1524	1359	1213	1145	1060	1007	948	884	825	772	719	676	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		241	76	61	55	74	60	58	33	45	45	51	30	25	23	18	19	23	
		Anteil in %		8,95	3,18	2,89	2,90	4,36	3,94	4,27	2,72	3,93	4,25	5,06	3,16	2,83	2,79	2,33	2,64	3,40	
	CI Anteil in %		[7,87; 10,03]	[2,48; 3,88]	[2,18; 3,61]	[2,14; 3,65]	[3,38; 5,33]	[2,96; 4,91]	[3,19; 5,34]	[1,80; 3,64]	[2,80; 5,06]	[3,03; 5,46]	[3,71; 6,42]	[2,05; 4,28]	[1,73; 3,92]	[1,66; 3,91]	[1,27; 3,40]	[1,47; 3,82]	[2,03; 4,77]		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1120	985	883	798	695	610	557	500	466	428	391	360	337	316	293	268	255		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		48	32	28	26	31	20	30	44	29	28	21	17	21	15	15	15		
		Anteil in %		4,87	3,62	3,51	3,74	5,08	3,59	6,00	9,44	6,78	7,16	5,83	5,04	6,65	5,12	5,60	5,88		
	CI Anteil in %		[3,53; 6,22]	[2,39; 4,86]	[2,23; 4,79]	[2,33; 5,15]	[3,34; 6,83]	[2,04; 5,14]	[3,92; 8,08]	[6,78; 12,10]	[4,39; 9,16]	[4,60; 9,72]	[3,41; 8,26]	[2,70; 7,38]	[3,89; 9,40]	[2,59; 7,65]	[2,84; 8,35]	[2,99; 8,78]			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	977	875	794	707	634	582	545	516	475	445	412	386	367	353	337	317			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		47	29	24	60	59	58	65	66	62	57	58	53	54	55	55			
		Anteil in %		5,37	3,65	3,39	9,46	10,14	10,64	12,60	13,89	13,93	13,84	15,03	14,44	15,30	16,32	17,35			
	CI Anteil in %		[3,88; 6,87]	[2,35; 4,96]	[2,06; 4,73]	[7,18; 11,74]	[7,68; 12,59]	[8,05; 13,23]	[9,73; 15,46]	[10,78; 17,01]	[10,71; 17,15]	[10,50; 17,17]	[11,46; 18,60]	[10,84; 18,04]	[11,54; 19,06]	[12,37; 20,27]	[13,17; 21,53]				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1341	1246	1115	979	876	786	735	689	638	604	556	512	482	456	416				
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		72	62	37	43	36	29	29	29	21	18	12	22	24	10				
		Anteil in %		5,78	5,56	3,78	4,91	4,58	3,95	4,21	4,55	3,48	3,24	2,34	4,56	5,26	2,40				
	CI Anteil in %		[4,48; 7,07]	[4,21; 6,91]	[2,58; 4,97]	[3,48; 6,34]	[3,12; 6,04]	[2,54; 5,35]	[2,71; 5,71]	[2,93; 6,16]	[2,01; 4,94]	[1,76; 4,71]	[1,03; 3,66]	[2,70; 6,43]	[3,21; 7,31]	[0,93; 3,88]					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1866	1706	1548	1396	1271	1185	1094	1014	933	852	778	722	685	641					
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		81	78	62	50	58	51	66	47	41	25	14	25	28					
		Anteil in %		4,75	5,04	4,44	3,93	4,89	4,66	6,51	5,04	4,81	3,21	1,94	3,65	4,37					
	CI Anteil in %		[3,74; 5,76]	[3,95; 6,13]	[3,36; 5,52]	[2,86; 5,00]	[3,67; 6,12]	[3,41; 5,91]	[4,99; 8,03]	[3,63; 6,44]	[3,37; 6,25]	[1,97; 4,45]	[0,93; 2,95]	[2,24; 5,05]	[2,78; 5,95]						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2166	2034	1807	1621	1514	1405	1318	1212	1127	1026	955	873	815						
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		74	104	60	97	64	65	51	61	34	45	30	23						
		Anteil in %		3,64	5,76	3,70	6,41	4,56	4,93	4,21	5,41	3,31	4,71	3,44	2,82						
	CI Anteil in %		[2,82; 4,45]	[4,68; 6,83]	[2,78; 4,62]	[5,17; 7,64]	[3,46; 5,65]	[3,76; 6,10]	[3,08; 5,34]	[4,09; 6,73]	[2,22; 4,41]	[3,37; 6,06]	[2,23; 4,65]	[1,68; 3,96]							
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	2651	2513	2278	2097	1861	1731	1580	1480	1370	1258	1164	1081							
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		146	149	177	140	133	69	88	86	74	52	43							
		Anteil in %		5,81	6,54	8,44	7,52	7,68	4,37	5,95	6,28	5,88	4,47	3,98							
	CI Anteil in %		[4,89; 6,72]	[5,53; 7,56]	[7,25; 9,63]	[6,32; 8,72]	[6,43; 8,94]	[3,36; 5,38]	[4,74; 7,15]	[4,99; 7,56]	[4,58; 7,18]	[3,28; 5,65]	[2,81; 5,14]								
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	3003	2836	2647	2355	2190	2031	1894	1746	1599	1490	1402								
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		150	209	155	141	92	76	83	61	47	52								
		Anteil in %		5,29	7,90	6,58	6,44	4,53	4,01	4,75	3,81	3,15	3,71								
	CI Anteil in %		[4,47; 6,11]	[6,87; 8,92]	[5,58; 7,58]	[5,41; 7,47]	[3,63; 5,43]	[3,13; 4,90]	[3,76; 5,75]	[2,88; 4,75]	[2,27; 4,04]	[2,72; 4,70]									
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1608	1538	1387	1257	1135	1033	940	866	805	744									
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		101	137	100	65	57	50	47	31	34									
		Anteil in %		6,57	9,88	7,96	5,73	5,52	5,32	5,43	3,85	4,57									
	CI Anteil in %		[5,33; 7,81]	[8,31; 11,45]	[6,46; 9,45]	[4,37; 7,08]	[4,12; 6,91]	[3,88; 6,75]	[3,92; 6,94]	[2,52; 5,18]	[3,07; 6,07]										
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1413	1356	1237	1102	998	925	869	796	733										
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		104	100	62	45	36	35	32	39										
		Anteil in %		7,67	8,08	5,63	4,51	3,89	4,03	4,02	5,32										
	CI Anteil in %		[6,25; 9,09]	[6,56; 9,60]	[4,26; 6,99]	[3,22; 5,80]	[2,64; 5,14]	[2,72; 5,34]	[2,65; 5,39]	[3,69; 6,95]											
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	879	835	760	685	627	579	537	502											
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		41	52	38	33	30	26	29											
		Anteil in %		4,91	6,84	5,55	5,26	5,18	4,84	5,78											
	CI Anteil in %		[3,44; 6,38]	[5,05; 8,64]	[3,83; 7,26]	[3,51; 7,01]	[3,37; 6,99]	[3,02; 6,66]	[3,73; 7,82]												

EZ	Patienten ohne medizinische Dokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	759	709	644	573	519	481	447													
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		38	42	30	29	21	19													
		Anteil in %			5,36	6,52	5,24	5,59	4,37	4,25												
		CI Anteil in %			[3,70; 7,02]	[4,61; 8,43]	[3,41; 7,06]	[3,61; 7,57]	[2,54; 6,19]	[2,38; 6,12]												
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	765	727	649	584	516	473														
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		34	56	41	25	24														
		Anteil in %			4,68	8,63	7,02	4,85	5,07													
		CI Anteil in %			[3,14; 6,21]	[6,47; 10,79]	[4,95; 9,09]	[2,99; 6,70]	[3,09; 7,05]													
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	844	795	710	649	600															
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		32	36	27	36															
		Anteil in %			4,03	5,07	4,16	6,00														
		CI Anteil in %			[2,66; 5,39]	[3,46; 6,69]	[2,62; 5,70]	[4,10; 7,90]														
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	914	879	799	716																
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		37	60	26																
		Anteil in %			4,21	7,51	3,63															
		CI Anteil in %			[2,88; 5,54]	[5,68; 9,34]	[2,26; 5,00]															
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	952	920	836																	
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		38	42																	
		Anteil in %			4,13	5,02																
		CI Anteil in %			[2,84; 5,42]	[3,54; 6,51]																
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	823	787																		
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl		24																		
		Anteil in %			3,05																	
		CI Anteil in %			[1,85; 4,25]																	
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	875																			
	ohne medizinische Dokumentation	Anzahl																				
		Anteil in %																				
		CI Anteil in %																				

Auswertungskapitel C.3: Krankheitsverlauf nach Einschreibung

Ein wesentliches Ziel der Evaluation besteht in der Überprüfung der medizinischen Versorgungsqualität der DMP-Patienten. Hierzu werden die patientenbezogenen Angaben zum Krankheitsverlauf nach der Einschreibung in das DMP aus den Dokumentationen der Leistungserbringer ausgewertet.

Die standardisierten Tabellen für den Evaluationsbericht weisen die patientenbezogenen Ergebnisse nach Kohorten getrennt für die folgenden Bereiche und Variablen aus:

Risikofaktoren

- Raucherstatus
- Hypertonus

Laborwerte

- HbA1c-Werte

C.3.1 Risikofaktoren

In diesem Kapitel werden Auswertungen zu zwei Variablen dargestellt. Die Tabelle „Patienten und ihr Body-Mass-Index“ entfällt für die Auswertung nach Subkohorten. Das Kapitel C.3.1 beginnt daher mit der Tabelle C.3.1.2. Zunächst werden Auswertungen zum Raucherstatus vorgenommen. Rauchen stellt einen der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen dar. Eine Reduktion des Raucheranteils der DMP-Patienten ist demnach eine wichtige Zielsetzung der Behandlung.

Schließlich werden Angaben zum Bluthochdruck bzw. Hypertonus gemacht, da dieser eine bedeutende Begleiterkrankung des Diabetes mit potenzierenden negativen Effekten auf die Herz-Kreislaufmorbidity und -mortalität ist. Eine Senkung des Blutdrucks in den Normbereich bei den DMP-Patienten mit erhöhten Blutdruckwerten ist demnach eine weitere wichtige Zielsetzung der Behandlung.

In Tabelle C.3.1.2 wird die Entwicklung des Raucherstatus für die Gruppe der **Raucher (Kollektivmitglieder insgesamt) laut Erstdokumentation** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Raucher waren.

Zunächst wird für jede Kohorte unter „Kollektivmitglieder insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten aus der Gruppe der Raucher im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an dieser Gruppe ist. Da der Anteil der Raucher im Beitrittsjahr definitionsgemäß bei 100 Prozent liegt, wird auf eine Darstellung dieser Information verzichtet.

In der Kohorte 2003-1 waren laut Erstdokumentation 447 Personen Raucher. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für 77 Patienten aus der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation Angaben vor. Davon waren im letzten Berichtshalbjahr noch 44,16 Prozent Raucher.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle C.3.1.2 Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	447	399	350	298	263	240	220	193	173	148	137	126	122	114	111	100	93	83	77
	auswertbar	Anzahl		326	326	289	256	237	212	185	165	141	126	119	120	107	105	96	89	79	77
	Raucher	Anzahl		270	259	217	156	129	111	92	80	67	62	58	57	48	44	40	38	34	34
		Anteil in %		82,82	79,45	75,09	60,94	54,43	52,36	49,73	48,48	47,52	49,21	48,74	47,50	44,86	41,90	41,67	42,70	43,04	44,16
		CI Anteil in %		[78,72; 86,92]	[75,05; 83,84]	[70,09; 80,08]	[54,95; 66,93]	[48,08; 60,78]	[45,62; 59,10]	[42,51; 56,95]	[40,84; 56,13]	[39,25; 55,79]	[40,44; 57,97]	[39,72; 57,76]	[38,53; 56,47]	[35,39; 54,33]	[32,42; 51,39]	[31,75; 51,58]	[32,36; 53,03]	[32,05; 54,03]	[32,99; 55,32]
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4180</i>	<i>3803</i>	<i>3367</i>	<i>2999</i>	<i>2686</i>	<i>2457</i>	<i>2223</i>	<i>1847</i>	<i>1673</i>	<i>1510</i>	<i>1428</i>	<i>1306</i>	<i>1236</i>	<i>1155</i>	<i>1091</i>	<i>1032</i>	<i>978</i>	<i>912</i>	<i>862</i>	
2003-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	359	285	246	218	182	156	134	123	106	99	87	83	77	69	65	64	59	55	
	auswertbar	Anzahl		253	235	209	173	146	130	115	104	96	82	77	76	69	65	61	57	54	
	Raucher	Anzahl		215	161	127	101	82	68	53	48	46	37	33	34	31	28	27	26	26	
		Anteil in %		84,98	68,51	60,77	58,38	56,16	52,31	46,09	46,15	47,92	45,12	42,86	44,74	44,93	43,08	44,26	45,61	48,15	
		CI Anteil in %		[80,57; 89,39]	[62,56; 74,46]	[54,13; 67,40]	[51,01; 65,75]	[48,09; 64,24]	[43,69; 60,93]	[36,94; 55,24]	[36,53; 55,78]	[37,87; 57,96]	[34,29; 55,96]	[31,73; 53,98]	[33,48; 55,99]	[33,10; 56,75]	[30,94; 55,21]	[31,69; 56,83]	[32,57; 58,66]	[34,70; 61,60]	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3146</i>	<i>2692</i>	<i>2391</i>	<i>2109</i>	<i>1897</i>	<i>1699</i>	<i>1524</i>	<i>1359</i>	<i>1213</i>	<i>1145</i>	<i>1060</i>	<i>1007</i>	<i>948</i>	<i>884</i>	<i>825</i>	<i>772</i>	<i>719</i>	<i>676</i>		
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	140	112	98	89	74	63	55	52	49	44	40	34	31	30	27	24	23		
	auswertbar	Anzahl		104	93	87	71	58	52	48	41	40	34	32	29	29	26	23	21		
	Raucher	Anzahl		87	66	60	41	37	30	24	18	21	18	15	13	13	11	9	7		
		Anteil in %		83,65	70,97	68,97	57,75	63,79	57,69	50,00	43,90	52,50	52,94	46,88	44,83	44,83	42,31	39,13	33,33		
		CI Anteil in %		[76,51; 90,80]	[61,69; 80,24]	[59,19; 78,74]	[46,17; 69,32]	[51,32; 76,27]	[44,13; 71,25]	[35,71; 64,29]	[28,52; 59,28]	[36,83; 68,17]	[35,91; 69,97]	[29,31; 64,44]	[26,41; 63,25]	[26,41; 63,25]	[22,94; 61,67]	[18,74; 59,52]	[12,67; 53,99]		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1120</i>	<i>985</i>	<i>883</i>	<i>798</i>	<i>695</i>	<i>610</i>	<i>557</i>	<i>500</i>	<i>466</i>	<i>428</i>	<i>391</i>	<i>360</i>	<i>337</i>	<i>316</i>	<i>293</i>	<i>268</i>	<i>255</i>			
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	111	91	77	73	66	61	57	52	46	42	37	34	33	31	31	28			
	auswertbar	Anzahl		90	75	71	58	51	50	43	38	32	30	27	26	24	22	21			
	Raucher	Anzahl		76	53	53	43	39	32	31	30	23	21	19	19	18	15	15			
		Anteil in %		84,44	70,67	74,65	74,14	76,47	64,00	72,09	78,95	71,88	70,00	70,37	73,08	75,00	68,18	71,43			
		CI Anteil in %		[76,91; 91,97]	[60,29; 81,04]	[64,46; 84,84]	[62,77; 85,51]	[64,71; 88,23]	[50,56; 77,44]	[58,53; 85,66]	[65,81; 92,08]	[56,05; 87,70]	[53,32; 86,68]	[52,82; 87,92]	[55,69; 90,46]	[57,30; 92,70]	[48,26; 88,10]	[51,63; 91,23]			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>977</i>	<i>875</i>	<i>794</i>	<i>707</i>	<i>634</i>	<i>582</i>	<i>545</i>	<i>516</i>	<i>475</i>	<i>445</i>	<i>412</i>	<i>386</i>	<i>367</i>	<i>353</i>	<i>337</i>	<i>317</i>				
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	160	146	126	108	98	88	81	76	71	64	57	56	50	47	44				
	auswertbar	Anzahl		135	119	102	90	86	77	72	63	61	57	50	48	44					
	Raucher	Anzahl		110	87	68	60	49	43	44	39	33	31	31	30	26	22				
		Anteil in %		81,48	73,11	66,67	66,67	56,98	55,84	61,11	61,90	54,10	54,39	62,00	62,50	59,09	55,00				
		CI Anteil in %		[74,90; 88,06]	[65,11; 81,11]	[57,47; 75,86]	[56,87; 76,46]	[46,45; 67,50]	[44,68; 67,01]	[49,77; 72,45]	[49,82; 73,99]	[41,49; 66,71]	[41,34; 67,43]	[48,41; 75,59]	[48,66; 76,34]	[44,40; 73,79]	[39,39; 70,61]				
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1341</i>	<i>1246</i>	<i>1115</i>	<i>979</i>	<i>876</i>	<i>786</i>	<i>735</i>	<i>689</i>	<i>638</i>	<i>604</i>	<i>556</i>	<i>512</i>	<i>482</i>	<i>456</i>	<i>416</i>					
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	191	166	152	138	118	111	102	96	88	82	79	73	69	62					
	auswertbar	Anzahl		156	139	127	112	103	98	88	82	80	77	69	64	60					
	Raucher	Anzahl		126	98	86	73	64	51	45	41	40	40	37	32	29					
		Anteil in %		80,77	70,50	67,72	65,18	62,14	52,04	51,14	50,00	50,00	51,95	53,62	50,00	48,33					
		CI Anteil in %		[74,56; 86,97]	[62,89; 78,11]	[59,55; 75,88]	[56,32; 74,04]	[52,72; 71,55]	[42,10; 61,98]	[40,63; 61,64]	[39,11; 60,89]	[38,97; 61,03]	[40,72; 63,18]	[41,77; 65,48]	[37,65; 62,35]	[35,58; 61,08]					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1866</i>	<i>1706</i>	<i>1548</i>	<i>1396</i>	<i>1271</i>	<i>1185</i>	<i>1094</i>	<i>1014</i>	<i>933</i>	<i>852</i>	<i>778</i>	<i>722</i>	<i>685</i>	<i>641</i>						
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	209	198	171	151	143	136	125	115	110	104	98	89	81						
	auswertbar	Anzahl		188	158	149	131	127	118	111	104	100	90	86	79						
	Raucher	Anzahl		163	117	108	85	84	82	73	72	64	57	55	50						
		Anteil in %		86,70	74,05	72,48	64,89	66,14	69,49	65,77	69,23	64,00	63,33	63,95	63,29						
		CI Anteil in %		[81,84; 91,57]	[67,19; 80,91]	[65,29; 79,68]	[56,68; 73,09]	[57,88; 74,40]	[61,15; 77,83]	[56,90; 74,63]	[60,32; 78,14]	[54,54; 73,46]	[53,32; 73,35]	[53,75; 74,16]	[52,59; 73,99]						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2166</i>	<i>2034</i>	<i>1807</i>	<i>1621</i>	<i>1514</i>	<i>1405</i>	<i>1318</i>	<i>1212</i>	<i>1127</i>	<i>1026</i>	<i>955</i>	<i>873</i>	<i>815</i>							

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	270	252	227	205	180	160	151	142	133	120	112	105						
	auswertbar	Anzahl		237	204	186	163	151	143	133	126	114	107	100						
	Raucher	Anzahl		194	155	131	108	95	86	78	77	71	64	61						
		Anteil in %		81,86	75,98	70,43	66,26	62,91	60,14	58,65	61,11	62,28	59,81	61,00						
		CI Anteil in %		[76,94; 86,77]	[70,10; 81,86]	[63,85; 77,01]	[58,98; 73,54]	[55,18; 70,64]	[52,09; 68,19]	[50,25; 67,05]	[52,56; 69,66]	[53,34; 71,22]	[50,48; 69,15]	[51,39; 70,61]						
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2651</i>	<i>2513</i>	<i>2278</i>	<i>2097</i>	<i>1861</i>	<i>1731</i>	<i>1580</i>	<i>1480</i>	<i>1370</i>	<i>1258</i>	<i>1164</i>	<i>1081</i>						
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	321	302	279	247	224	203	185	169	154	143	133							
	auswertbar	Anzahl		284	254	231	206	190	179	163	147	142	130							
	Raucher	Anzahl		257	208	174	149	137	125	120	100	92	85							
		Anteil in %		90,49	81,89	75,32	72,33	72,11	69,83	73,62	68,03	64,79	65,38							
		CI Anteil in %		[87,08; 93,91]	[77,14; 86,64]	[69,75; 80,90]	[66,21; 78,45]	[65,71; 78,50]	[63,09; 76,58]	[66,83; 80,41]	[60,46; 75,59]	[56,90; 72,67]	[57,17; 73,59]							
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3003</i>	<i>2836</i>	<i>2647</i>	<i>2355</i>	<i>2190</i>	<i>2031</i>	<i>1894</i>	<i>1746</i>	<i>1599</i>	<i>1490</i>	<i>1402</i>							
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	199	190	172	156	147	135	123	109	100	89								
	auswertbar	Anzahl		172	150	143	140	129	115	102	94	85								
	Raucher	Anzahl		144	115	111	109	99	90	75	70	64								
		Anteil in %		83,72	76,67	77,62	77,86	76,74	78,26	73,53	74,47	75,29								
		CI Anteil in %		[78,19; 89,25]	[69,88; 83,46]	[70,77; 84,48]	[70,95; 84,76]	[69,43; 84,06]	[70,69; 85,83]	[64,93; 82,13]	[65,61; 83,33]	[66,07; 84,52]								
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1608</i>	<i>1538</i>	<i>1387</i>	<i>1257</i>	<i>1135</i>	<i>1033</i>	<i>940</i>	<i>866</i>	<i>805</i>	<i>744</i>								
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	150	146	134	117	105	101	94	86	77									
	auswertbar	Anzahl		130	124	115	101	98	90	83	73									
	Raucher	Anzahl		113	100	92	83	81	74	67	59									
		Anteil in %		86,92	80,65	80,00	82,18	82,65	82,22	80,72	80,82									
		CI Anteil in %		[81,10; 92,74]	[73,66; 87,63]	[72,66; 87,34]	[74,68; 89,68]	[75,12; 90,19]	[74,28; 90,17]	[72,18; 89,26]	[71,73; 89,92]									
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1413</i>	<i>1356</i>	<i>1237</i>	<i>1102</i>	<i>998</i>	<i>925</i>	<i>869</i>	<i>796</i>	<i>733</i>									
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	129	121	104	90	81	77	71	66										
	auswertbar	Anzahl		110	98	84	78	72	66	64										
	Raucher	Anzahl		105	87	74	66	61	55	52										
		Anteil in %		95,45	88,78	88,10	84,62	84,72	83,33	81,25										
		CI Anteil in %		[91,54; 99,37]	[82,49; 95,06]	[81,13; 95,06]	[76,56; 92,67]	[76,35; 93,09]	[74,27; 92,39]	[71,61; 90,89]										
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>879</i>	<i>835</i>	<i>760</i>	<i>685</i>	<i>627</i>	<i>579</i>	<i>537</i>	<i>502</i>										
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	98	92	83	76	71	66	61											
	auswertbar	Anzahl		90	76	73	67	65	59											
	Raucher	Anzahl		82	68	62	56	51	46											
		Anteil in %		91,11	89,47	84,93	83,58	78,46	77,97											
		CI Anteil in %		[85,20; 97,02]	[82,53; 96,42]	[76,67; 93,19]	[74,64; 92,52]	[68,39; 88,53]	[67,30; 88,63]											
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>759</i>	<i>709</i>	<i>644</i>	<i>573</i>	<i>519</i>	<i>481</i>	<i>447</i>											
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	101	98	88	78	67	59												
	auswertbar	Anzahl		92	79	72	61	56												
	Raucher	Anzahl		86	74	63	48	43												
		Anteil in %		93,48	93,67	87,50	78,69	76,79												
		CI Anteil in %		[88,41; 98,55]	[88,27; 99,07]	[79,81; 95,19]	[68,33; 89,05]	[65,63; 87,94]												
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>765</i>	<i>727</i>	<i>649</i>	<i>584</i>	<i>516</i>	<i>473</i>												
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	99	95	82	74	64													
	auswertbar	Anzahl		90	72	66	59													
	Raucher	Anzahl		87	69	62	56													
		Anteil in %		96,67	95,83	93,94	94,92													
		CI Anteil in %		[92,94; 100,00]	[91,19; 100,00]	[88,14; 99,74]	[89,26; 100,00]													
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>844</i>	<i>795</i>	<i>710</i>	<i>649</i>	<i>600</i>													

EZ	Raucher in der Gruppe der Raucher laut Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb-jahr	11. Halb-jahr	12. Halb-jahr	13. Halb-jahr	14. Halb-jahr	15. Halb-jahr	16. Halb-jahr	17. Halb-jahr	18. Halb-jahr	19. Halb-jahr
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	132	124	108	92														
	auswertbar	Anzahl		118	98	89														
	Raucher	Anzahl		112	90	78														
		Anteil in %		94,92	91,84	87,64														
		CI Anteil in %		[90,93; 98,90]	[86,39; 97,29]	[80,76; 94,52]														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>914</i>	<i>879</i>	<i>799</i>	<i>716</i>															
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	128	123	113															
	auswertbar	Anzahl		118	104															
	Raucher	Anzahl		115	97															
		Anteil in %		97,46	93,27															
		CI Anteil in %		[94,61; 100,00]	[88,43; 98,11]															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>952</i>	<i>920</i>	<i>836</i>																
2011-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	133	128																
	auswertbar	Anzahl		126																
	Raucher	Anzahl		122																
		Anteil in %		96,83																
		CI Anteil in %		[93,75; 99,90]																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>823</i>	<i>787</i>																	
2012-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	138																	
	auswertbar	Anzahl																		
	Raucher	Anzahl																		
		Anteil in %																		
		CI Anteil in %																		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>875</i>																		

In Tabelle C.3.1.3 werden Anzahl und Anteile der aktuellen **Raucher (Patienten insgesamt)** dokumentiert. Betrachtet werden dabei alle Patienten, also auch diejenigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdokumentation Nichtraucher waren. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ angegeben, wie viele Patienten noch Programmteilnehmer waren. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der Raucher im jeweiligen Halbjahr dokumentiert und es wird ausgewiesen, wie hoch ihr Anteil an der Gruppe der auswertbaren Patienten ist.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts halbjahr 4180 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 4180 der Patienten lagen auswertbare Daten vor. Davon waren 10,69 Prozent Raucher. Im letzten Berichtshalbjahr waren noch 862 Patienten eingeschrieben. Für 838 dieser Patienten lagen auswertbare Daten vor. Davon waren 5,73 Prozent Raucher.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle C.3.1.3 Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte mit sekundären Endpunkten

EZ	Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4180	3803	3367	2999	2686	2457	2223	1847	1673	1510	1428	1306	1236	1155	1091	1032	978	912	862
	auswertbar	Anzahl	4180	3044	3176	2938	2616	2416	2095	1800	1625	1471	1352	1252	1202	1122	1062	1003	950	895	838
	Raucher	Anzahl	447	302	292	292	189	168	141	120	100	83	77	81	79	69	63	56	52	47	48
		Anteil in %	10,69	9,92	9,19	9,94	7,22	6,95	6,73	6,67	6,15	5,64	5,70	6,47	6,57	6,15	5,93	5,58	5,47	5,25	5,73
	CI Anteil in %	[9,76; 11,63]	[8,86; 10,98]	[8,19; 10,20]	[8,86; 11,02]	[6,23; 8,22]	[5,94; 7,97]	[5,66; 7,80]	[5,51; 7,82]	[4,99; 7,32]	[4,46; 6,82]	[4,46; 6,93]	[5,11; 7,83]	[5,17; 7,97]	[4,74; 7,56]	[4,51; 7,35]	[4,16; 7,00]	[4,03; 6,92]	[3,79; 6,71]	[4,15; 7,30]	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	3146	2692	2391	2109	1897	1699	1524	1359	1213	1145	1060	1007	948	884	825	772	719	676	
	auswertbar	Anzahl	3146	2451	2315	2048	1842	1625	1464	1301	1180	1100	1015	956	918	859	802	754	700	653	
	Raucher	Anzahl	359	231	216	159	131	99	85	62	55	54	44	39	38	36	33	30	32	31	
		Anteil in %	11,41	9,42	9,33	7,76	7,11	6,09	5,81	4,77	4,66	4,91	4,33	4,08	4,14	4,19	4,11	3,98	4,57	4,75	
	CI Anteil in %	[10,30; 12,52]	[8,27; 10,58]	[8,15; 10,52]	[6,60; 8,92]	[5,94; 8,29]	[4,93; 7,26]	[4,61; 7,00]	[3,61; 5,92]	[3,46; 5,86]	[3,63; 6,19]	[3,08; 5,59]	[2,82; 5,33]	[2,85; 5,43]	[2,85; 5,53]	[2,74; 5,49]	[2,58; 5,37]	[3,02; 6,12]	[3,12; 6,38]		
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1120	985	883	798	695	610	557	500	466	428	391	360	337	316	293	268	255		
	auswertbar	Anzahl	1120	937	851	770	669	579	537	470	422	399	363	339	320	295	278	253	240		
	Raucher	Anzahl	140	105	81	66	46	44	39	32	26	30	24	19	16	15	13	10	8		
		Anteil in %	12,50	11,21	9,52	8,57	6,88	7,60	7,26	6,81	6,16	7,52	6,61	5,60	5,00	5,08	4,68	3,95	3,33		
	CI Anteil in %	[10,56; 14,44]	[9,19; 13,23]	[7,55; 11,49]	[6,59; 10,55]	[4,96; 8,79]	[5,44; 9,76]	[5,07; 9,46]	[4,53; 9,09]	[3,86; 8,46]	[4,93; 10,11]	[4,05; 9,17]	[3,15; 8,06]	[2,61; 7,39]	[2,57; 7,60]	[2,19; 7,16]	[1,55; 6,36]	[1,06; 5,61]			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	977	875	794	707	634	582	545	516	475	445	412	386	367	353	337	317			
	auswertbar	Anzahl	977	828	765	683	574	523	487	451	409	383	355	328	314	299	282	262			
	Raucher	Anzahl	111	96	66	61	52	50	43	40	40	31	28	25	25	24	21	19			
		Anteil in %	11,36	11,59	8,63	8,93	9,06	9,56	8,83	8,87	9,78	8,09	7,89	7,62	7,96	8,03	7,45	7,25			
	CI Anteil in %	[9,37; 13,35]	[9,41; 13,78]	[6,64; 10,62]	[6,79; 11,07]	[6,71; 11,41]	[7,04; 12,08]	[6,31; 11,35]	[6,24; 11,50]	[6,90; 12,66]	[5,36; 10,83]	[5,08; 10,70]	[4,75; 10,50]	[4,96; 10,96]	[4,94; 11,11]	[4,38; 10,52]	[4,11; 10,40]				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1341	1246	1115	979	876	786	735	689	638	604	556	512	482	456	416				
	auswertbar	Anzahl	1341	1174	1053	942	833	750	706	660	609	583	538	500	460	432	406				
	Raucher	Anzahl	160	125	106	84	76	64	56	56	49	44	43	40	40	36	30				
		Anteil in %	11,93	10,65	10,07	8,92	9,12	8,53	7,93	8,48	8,05	7,55	7,99	8,00	8,70	8,33	7,39				
	CI Anteil in %	[10,20; 13,67]	[8,88; 12,41]	[8,25; 11,88]	[7,10; 10,74]	[7,17; 11,08]	[6,53; 10,53]	[5,94; 9,93]	[6,36; 10,61]	[5,88; 10,21]	[5,40; 9,69]	[5,70; 10,29]	[5,62; 10,38]	[6,12; 11,27]	[5,72; 10,94]	[4,84; 9,94]					
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1866	1706	1548	1396	1271	1185	1094	1014	933	852	778	722	685	641					
	auswertbar	Anzahl	1866	1625	1470	1334	1221	1127	1043	948	886	811	753	708	660	613					
	Raucher	Anzahl	191	139	106	95	81	71	65	57	54	52	51	47	41	38					
		Anteil in %	10,24	8,55	7,21	7,12	6,63	6,30	6,23	6,01	6,09	6,41	6,77	6,64	6,21	6,20					
	CI Anteil in %	[8,86; 11,61]	[7,19; 9,91]	[5,89; 8,53]	[5,74; 8,50]	[5,24; 8,03]	[4,88; 7,72]	[4,76; 7,70]	[4,50; 7,53]	[4,52; 7,67]	[4,72; 8,10]	[4,98; 8,57]	[4,80; 8,47]	[4,37; 8,06]	[4,29; 8,11]						
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2166	2034	1807	1621	1514	1405	1318	1212	1127	1026	955	873	815						
	auswertbar	Anzahl	2166	1960	1703	1561	1417	1341	1253	1161	1066	992	910	843	792						
	Raucher	Anzahl	209	180	133	127	103	110	101	99	96	86	79	75	74						
		Anteil in %	9,65	9,18	7,81	8,14	7,27	8,20	8,06	8,53	9,01	8,67	8,68	8,90	9,34						
	CI Anteil in %	[8,41; 10,89]	[7,90; 10,46]	[6,53; 9,08]	[6,78; 9,49]	[5,92; 8,62]	[6,73; 9,67]	[6,55; 9,57]	[6,92; 10,13]	[7,29; 10,72]	[6,92; 10,42]	[6,85; 10,51]	[6,97; 10,82]	[7,32; 11,37]							
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	2651	2513	2278	2097	1861	1731	1580	1480	1370	1258	1164	1081							
	auswertbar	Anzahl	2651	2367	2129	1920	1721	1598	1511	1392	1284	1184	1112	1038							
	Raucher	Anzahl	270	217	173	148	146	133	119	115	107	97	89	86							
		Anteil in %	10,18	9,17	8,13	7,71	8,48	8,32	7,88	8,26	8,33	8,19	8,00	8,29							
	CI Anteil in %	[9,03; 11,34]	[8,00; 10,33]	[6,96; 9,29]	[6,51; 8,90]	[7,17; 9,80]	[6,97; 9,68]	[6,52; 9,23]	[6,81; 9,71]	[6,82; 9,85]	[6,63; 9,76]	[6,41; 9,60]	[6,61; 9,96]								
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	3003	2836	2647	2355	2190	2031	1894	1746	1599	1490	1402								
	auswertbar	Anzahl	3003	2686	2438	2200	2049	1939	1818	1663	1538	1443	1350								
	Raucher	Anzahl	321	282	230	220	192	177	160	158	132	120	112								
		Anteil in %	10,69	10,50	9,43	10,00	9,37	9,13	8,80	9,50	8,58	8,32	8,30								
	CI Anteil in %	[9,58; 11,79]	[9,34; 11,66]	[8,27; 10,59]	[8,75; 11,25]	[8,11; 10,63]	[7,85; 10,41]	[7,50; 10,10]	[8,09; 10,91]	[7,18; 9,98]	[6,89; 9,74]	[6,82; 9,77]									

EZ	Raucherquote bei allen Patienten, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1608	1538	1387	1257	1135	1033	940	866	805	744									
	auswertbar	Anzahl	1608	1437	1250	1157	1070	976	890	819	774	710									
	Raucher	Anzahl	199	158	136	133	131	115	109	93	86	79									
		Anteil in %	12,38	11,00	10,88	11,50	12,24	11,78	12,25	11,36	11,11	11,13									
	CI Anteil in %	[10,77; 13,99]	[9,38; 12,61]	[9,15; 12,61]	[9,66; 13,33]	[10,28; 14,21]	[9,76; 13,81]	[10,09; 14,40]	[9,18; 13,53]	[8,90; 13,33]	[8,81; 13,44]										
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1413	1356	1237	1102	998	925	869	796	733										
	auswertbar	Anzahl	1413	1252	1137	1040	953	889	834	764	694										
	Raucher	Anzahl	150	136	124	115	104	103	93	85	76										
		Anteil in %	10,62	10,86	10,91	11,06	10,91	11,59	11,15	11,13	10,95										
	CI Anteil in %	[9,01; 12,22]	[9,14; 12,59]	[9,09; 12,72]	[9,15; 12,96]	[8,93; 12,89]	[9,48; 13,69]	[9,01; 13,29]	[8,89; 13,36]	[8,63; 13,28]											
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	879	835	760	685	627	579	537	502											
	auswertbar	Anzahl	879	794	708	647	594	549	511	473											
	Raucher	Anzahl	129	112	93	81	73	65	62	60											
		Anteil in %	14,68	14,11	13,14	12,52	12,29	11,84	12,13	12,68											
	CI Anteil in %	[12,34; 17,02]	[11,68; 16,53]	[10,65; 15,63]	[9,97; 15,07]	[9,65; 14,93]	[9,13; 14,54]	[9,30; 14,97]	[9,68; 15,69]												
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	759	709	644	573	519	481	447												
	auswertbar	Anzahl	759	671	602	543	490	460	428												
	Raucher	Anzahl	98	89	74	69	62	59	55												
		Anteil in %	12,91	13,26	12,29	12,71	12,65	12,83	12,85												
	CI Anteil in %	[10,52; 15,30]	[10,70; 15,83]	[9,67; 14,92]	[9,90; 15,51]	[9,71; 15,60]	[9,77; 15,89]	[9,68; 16,02]													
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	765	727	649	584	516	473													
	auswertbar	Anzahl	765	693	593	543	491	449													
	Raucher	Anzahl	101	93	80	71	57	51													
		Anteil in %	13,20	13,42	13,49	13,08	11,61	11,36													
	CI Anteil in %	[10,80; 15,60]	[10,88; 15,96]	[10,74; 16,24]	[10,24; 15,91]	[8,77; 14,45]	[8,42; 14,30]														
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	844	795	710	649	600														
	auswertbar	Anzahl	844	763	674	622	564														
	Raucher	Anzahl	99	93	78	68	65														
		Anteil in %	11,73	12,19	11,57	10,93	11,52														
	CI Anteil in %	[9,56; 13,90]	[9,87; 14,51]	[9,16; 13,99]	[8,48; 13,39]	[8,89; 14,16]															
2010-2	Patienten insgesamt	Anzahl	914	879	799	716															
	auswertbar	Anzahl	914	842	739	690															
	Raucher	Anzahl	132	120	95	82															
		Anteil in %	14,44	14,25	12,86	11,88															
	CI Anteil in %	[12,16; 16,72]	[11,89; 16,61]	[10,44; 15,27]	[9,47; 14,30]																
2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	952	920	836																
	auswertbar	Anzahl	952	882	794																
	Raucher	Anzahl	128	123	105																
		Anteil in %	13,45	13,95	13,22																
	CI Anteil in %	[11,28; 15,61]	[11,66; 16,23]	[10,87; 15,58]																	
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	823	787																	
	auswertbar	Anzahl	823	763																	
	Raucher	Anzahl	133	131																	
		Anteil in %	16,16	17,17																	
	CI Anteil in %	[13,64; 18,68]	[14,49; 19,85]																		
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	875																		
	auswertbar	Anzahl	875																		
	Raucher	Anzahl	138																		
		Anteil in %	15,77																		
	CI Anteil in %	[13,36; 18,19]																			

In Tabelle C.3.1.4 wird die Entwicklung des Blutdrucks für das Kollektiv der Patienten mit **Hypertonus** dokumentiert, also für diejenigen Patienten, die laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation als Hypertoniker eingestuft wurden.

Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Für jede Kohorte wird unter „Kollektivmitglieder insgesamt“ zunächst die Anzahl derjenigen Hypertoniker laut Anamnesebefund zur ED angegeben, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Alle Kollektivmitglieder, die im jeweiligen Berichtshalbjahr sowohl eine Angabe zum diastolischen als auch zum systolischen Blutdruck und gleichzeitig Angaben zur antihypertensiven Medikation dokumentiert haben, werden in der Zeile ‚auswertbar‘ abgebildet. Anschließend wird für die jeweiligen Berichtshalbjahre die Anzahl der gut eingestellten Kollektivmitglieder (Normotoniker) dokumentiert, bei denen der systolische und der diastolische Blutdruckwert im Normalbereich liegt und es wird gezeigt, wie hoch ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern ist. Außerdem wird ausgewiesen, welcher Anteil dieser gut eingestellten Kollektivmitglieder eine antihypertensive Therapie erhält bzw. nicht erhält.

Anschließend wird die Anzahl der nicht gut eingestellten Kollektivmitglieder (Hypertoniker) ausgewiesen und ihr Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern dargestellt. Die Hypertoniker werden anhand ihrer Blutdruckwerte und in Abhängigkeit davon, ob eine antihypertensive Therapie (AHT) dokumentiert ist in vier Kategorien einsortiert. Den **Kategorien 3 und 4** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und der diastolische Blutdruckwert mindestens die festgelegten Schwellenwerte von 140mmHg (systolisch) bzw. 90 mmHg (diastolisch) erreicht, jedoch um maximal 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet. Den **Kategorien 5 und 6** (ohne bzw. mit Therapie) werden Patienten zugeordnet, wenn der systolische und/oder diastolische Blutdruckwert diese Schwellenwerte um mehr als 20 mmHg (systolisch) bzw. 10 mmHg (diastolisch) überschreitet.

Im Beitrittsjahr können die Kategorien 1 und 2 – definitionsgemäß keine Hypertoniker – nicht besetzt sein, da das Kollektiv der Hypertoniker ohne die Patienten gebildet wird, die laut Erstdokumentation in diese Kategorien fallen würden.

Ferner ist zu beachten, dass durch die 9. Risikostrukturausgleichs-Änderungsverordnung eine Änderung in den Dokumentationsmöglichkeiten erfolgte. Bis einschließlich 2004-1 war bei der AHT ein „ja“ oder „nein“ zu dokumentieren. Ab 2004-2 war nur noch das Ankreuzen eines „ja“-Feldes möglich. Dadurch lässt sich in den Daten nicht mehr zwischen „nein“ und „fehlende Angabe“ unterscheiden. Um durchgehend eine einheitliche Rechenregel zu verwenden, sind daher in der Auswertung - unabhängig von den Dokumentationsmöglichkeiten - alle Fälle, in denen bei der AHT kein „ja“ dokumentiert ist, als „nein“ zu werten. In der Tabelle wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den sechs Kategorien über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern angegeben.

In der Tabelle wird ausgewiesen, wie sich die Patientenzahlen in den sechs Kategorien über die Berichtshalbjahre entwickeln. Neben den Absolutzahlen wird dabei auch der jeweilige Anteil an den auswertbaren Kollektivmitgliedern angegeben.

In der Kohorte 2003-1 waren von den 4180 anfangs eingeschriebenen Teilnehmern laut Erstdokumentation 3601 Personen Hypertoniker. Im letzten Berichtshalbjahr umfasst dieses Kollektiv noch 747 Personen. Eine im Zeitverlauf abnehmende Anzahl an Hypertonikern kann zwei Ursachen haben: Zum einen kann es sein, dass Patienten aus dem Programm ausscheiden und damit auch keine Kollektivmitglieder mehr sind. Zum anderen kann es sein, dass sich die Blutdruckwerte der Patienten verbessern und sie daher in späteren Berichtshalbjahren den Kategorien 1 oder 2 zuzuordnen sind, also als Kollektivmitglieder ohne Hypertonus gelten. Daher ist neben der absoluten Anzahl der Hypertoniker auch der entsprechende

Anteilswert zu beachten. So lag im letzten Berichtshalbjahr der Hypertonikeranteil bei 45,66 Prozent der dann auswertbaren Kollektivmitglieder.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle C.3.1.4 Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten

* Die Patienten sind in die für sie jeweils höchste, für sie zutreffende Kategorie einzustufen. Die Kategorisierung hat somit mit der höchsten Kategorie zu beginnen, also Kategorie 5 oder 6 (deutlich erhöhter Blutdruck). Die dort eingestuft Patienten können nicht mehr in eine andere Kategorie eingestuft werden etc.

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3601	3293	2927	2612	2340	2139	1940	1597	1452	1315	1240	1138	1076	1007	949	895	845	790	747
	auswertbar	Anzahl	3601	2642	2766	2248	2011	1894	1653	1410	1285	1164	1069	1096	1049	979	924	868	823	777	725
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	1303	1053	1137	979	877	837	784	704	659	623	591	566	552	528	461	462	458	426	394
		Anteil in %	36,18	39,86	41,11	43,55	43,61	44,19	47,43	49,93	51,28	53,52	55,29	51,64	52,62	53,93	49,89	53,23	55,65	54,83	54,34
		CI Anteil in %	[34,61; 37,75]	[37,99; 41,72]	[39,27; 42,94]	[41,50; 45,60]	[41,44; 45,78]	[41,96; 46,43]	[45,02; 49,84]	[47,32; 52,54]	[48,55; 54,02]	[50,66; 56,39]	[52,30; 58,27]	[48,68; 54,60]	[49,60; 55,64]	[50,81; 57,06]	[46,67; 53,12]	[49,90; 56,55]	[52,25; 59,05]	[51,32; 58,33]	[50,72; 57,97]
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	50	127	132	16	18	14	11	8	11	5	5	24	20	22	20	14	20	18	17
		Anteil in %	1,39	4,81	4,77	0,71	0,90	0,74	0,67	0,57	0,86	0,43	0,47	2,19	1,91	2,25	2,16	1,61	2,43	2,32	2,34
		CI Anteil in %	[1,01; 1,77]	[3,99; 5,62]	[3,98; 5,57]	[0,36; 1,06]	[0,48; 1,31]	[0,35; 1,13]	[0,27; 1,06]	[0,18; 0,96]	[0,35; 1,36]	[0,05; 0,81]	[0,06; 0,88]	[1,32; 3,06]	[1,08; 2,73]	[1,32; 3,18]	[1,23; 3,10]	[0,77; 2,45]	[1,38; 3,48]	[1,26; 3,38]	[1,24; 3,45]
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	1253	926	1005	963	859	823	773	696	648	618	586	542	532	506	441	448	438	408	377
		Anteil in %	34,80	35,05	36,33	42,84	42,72	43,45	46,76	49,36	50,43	53,09	54,82	49,45	50,71	51,69	47,73	51,61	53,22	52,51	52,00
		CI Anteil in %	[33,24; 36,35]	[33,23; 36,87]	[34,54; 38,13]	[40,79; 44,88]	[40,55; 44,88]	[41,22; 45,69]	[44,36; 49,17]	[46,75; 51,97]	[47,69; 53,16]	[50,22; 55,96]	[51,83; 57,80]	[46,49; 52,41]	[47,69; 53,74]	[48,55; 54,82]	[44,50; 50,95]	[48,29; 54,94]	[49,81; 56,63]	[49,00; 56,02]	[48,36; 55,64]
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	2298	1589	1629	1269	1134	1057	869	706	626	541	478	530	497	451	463	406	365	351	331
		Anteil in %	63,82	60,14	58,89	56,45	56,39	55,81	52,57	50,07	48,72	46,48	44,71	48,36	47,38	46,07	50,11	46,77	44,35	45,17	45,66
		CI Anteil in %	[62,25; 65,39]	[58,28; 62,01]	[57,06; 60,73]	[54,40; 58,50]	[54,22; 58,56]	[53,57; 58,04]	[50,16; 54,98]	[47,46; 52,68]	[45,98; 51,45]	[43,61; 49,34]	[41,73; 47,70]	[45,40; 51,32]	[44,36; 50,40]	[42,94; 49,19]	[46,88; 53,33]	[43,45; 50,10]	[40,95; 47,75]	[41,67; 48,68]	[42,03; 49,28]
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	80	140	106	15	10	5	6	6	3	3	6	11	10	12	9	13	5	6	6
		Anteil in %	2,22	5,30	3,83	0,67	0,50	0,26	0,36	0,43	0,23	0,26	0,56	1,00	0,95	1,23	0,97	1,50	0,61	0,77	0,83
		CI Anteil in %	[1,74; 2,70]	[4,44; 6,15]	[3,12; 4,55]	[0,33; 1,00]	[0,19; 0,80]	[0,03; 0,50]	[0,07; 0,65]	[0,09; 0,77]	[0,00; 0,50]	[0,00; 0,55]	[0,11; 1,01]	[0,41; 1,59]	[0,36; 1,54]	[0,54; 1,92]	[0,34; 1,61]	[0,69; 2,31]	[0,08; 1,14]	[0,16; 1,39]	[0,17; 1,49]
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1870	1238	1324	1117	999	960	783	642	562	489	427	459	439	386	398	349	321	308	291
		Anteil in %	51,93	46,86	47,87	49,69	49,68	50,69	47,37	45,53	43,74	42,01	39,94	41,88	41,85	39,43	43,07	40,21	39,00	39,64	40,14
		CI Anteil in %	[50,30; 53,56]	[44,96; 48,76]	[46,00; 49,73]	[47,62; 51,76]	[47,49; 51,86]	[48,43; 52,94]	[44,96; 49,78]	[42,93; 48,13]	[41,02; 46,45]	[39,17; 44,85]	[37,01; 42,88]	[38,96; 44,80]	[38,86; 44,84]	[36,37; 42,49]	[39,88; 46,27]	[36,94; 43,47]	[35,67; 42,34]	[36,20; 43,08]	[36,57; 43,71]
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	12	17	18	3	3	1	0	0	0	1	0	2	1	0	1	1	2	1	0	
	Anteil in %	0,33	0,64	0,65	0,13	0,15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,18	0,10	0,00	0,11	0,12	0,24	0,13	0,00	
	CI Anteil in %	[0,14; 0,52]	[0,34; 0,95]	[0,35; 0,95]	[0,00; 0,28]	[0,00; 0,32]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,25]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,44]	[0,00; 0,28]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,32]	[0,00; 0,34]	[0,00; 0,58]	[0,00; 0,38]	[0,00; 0,00]	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	336	194	181	134	122	91	80	58	61	48	45	58	47	53	55	43	37	36	34	
	Anteil in %	9,33	7,34	6,54	5,96	6,07	4,80	4,84	4,11	4,75	4,12	4,21	5,29	4,48	5,41	5,95	4,95	4,50	4,63	4,69	
	CI Anteil in %	[8,38; 10,28]	[6,35; 8,34]	[5,62; 7,47]	[4,98; 6,94]	[5,02; 7,11]	[3,84; 5,77]	[3,80; 5,87]	[3,08; 5,15]	[3,58; 5,91]	[2,98; 5,27]	[3,01; 5,41]	[3,97; 6,62]	[3,23; 5,73]	[4,00; 6,83]	[4,43; 7,48]	[3,51; 6,40]	[3,08; 5,91]	[3,15; 6,11]	[3,15; 6,23]	
	Patienten insgesamt	Anzahl	4180	3803	3367	2999	2686	2457	2223	1847	1673	1510	1428	1306	1236	1155	1091	1032	978	912	862

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2003-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2615	2255	2007	1774	1604	1432	1276	1133	1015	952	883	839	788	731	683	639	596	562
	auswertbar	Anzahl	2615	2057	1624	1462	1371	1205	1088	969	880	818	849	798	761	710	663	625	582	543
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	994	802	658	630	607	523	507	474	427	396	418	400	392	340	365	343	323	312
		Anteil in %	38,01	38,99	40,52	43,09	44,27	43,40	46,60	48,92	48,52	48,41	49,23	50,13	51,51	47,89	55,05	54,88	55,50	57,46
		CI Anteil in %	[36,15; 39,87]	[36,88; 41,10]	[38,13; 42,91]	[40,55; 45,63]	[41,64; 46,90]	[40,60; 46,20]	[43,63; 49,56]	[45,77; 52,07]	[45,22; 51,83]	[44,98; 51,84]	[45,87; 52,60]	[46,65; 53,60]	[47,96; 55,06]	[44,21; 51,56]	[51,26; 58,84]	[50,98; 58,78]	[51,46; 59,54]	[53,30; 61,62]
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	56	95	18	11	10	9	6	7	3	4	13	6	6	8	7	7	6	5
		Anteil in %	2,14	4,62	1,11	0,75	0,73	0,75	0,55	0,72	0,34	0,49	1,53	0,75	0,79	1,13	1,06	1,12	1,03	0,92
		CI Anteil in %	[1,59; 2,70]	[3,71; 5,53]	[0,60; 1,62]	[0,31; 1,20]	[0,28; 1,18]	[0,26; 1,23]	[0,11; 0,99]	[0,19; 1,26]	[0,00; 0,73]	[0,01; 0,97]	[0,70; 2,36]	[0,15; 1,35]	[0,16; 1,42]	[0,35; 1,90]	[0,28; 1,83]	[0,29; 1,95]	[0,21; 1,85]	[0,12; 1,72]
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	938	707	640	619	597	514	501	467	424	392	405	394	386	332	358	336	317	307
		Anteil in %	35,87	34,37	39,41	42,34	43,54	42,66	46,05	48,19	48,18	47,92	47,70	49,37	50,72	46,76	54,00	53,76	54,47	56,54
		CI Anteil in %	[34,03; 37,71]	[32,32; 36,42]	[37,03; 41,79]	[39,81; 44,87]	[40,92; 46,17]	[39,86; 45,45]	[43,08; 49,01]	[45,05; 51,34]	[44,88; 51,49]	[44,50; 51,35]	[44,34; 51,06]	[45,90; 52,84]	[47,17; 54,28]	[43,09; 50,43]	[50,20; 57,79]	[49,85; 57,67]	[50,42; 58,52]	[52,36; 60,71]
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1621	1255	966	832	764	682	581	495	453	422	431	398	369	370	298	282	259	231
		Anteil in %	61,99	61,01	59,48	56,91	55,73	56,60	53,40	51,08	51,48	51,59	50,77	49,87	48,49	52,11	44,95	45,12	44,50	42,54
		CI Anteil in %	[60,13; 63,85]	[58,90; 63,12]	[57,09; 61,87]	[54,37; 59,45]	[53,10; 58,36]	[53,80; 59,40]	[50,44; 56,37]	[47,93; 54,23]	[48,17; 54,78]	[48,16; 55,02]	[47,40; 54,13]	[46,40; 53,35]	[44,94; 52,04]	[48,44; 55,79]	[41,16; 48,74]	[41,22; 49,02]	[40,46; 48,54]	[38,38; 46,70]
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	57	95	10	12	10	8	9	5	6	7	9	8	7	6	6	6	5	6
		Anteil in %	2,18	4,62	0,62	0,82	0,73	0,66	0,83	0,52	0,68	0,86	1,06	1,00	0,92	0,85	0,90	0,96	0,86	1,10
		CI Anteil in %	[1,62; 2,74]	[3,71; 5,53]	[0,24; 1,00]	[0,36; 1,28]	[0,28; 1,18]	[0,21; 1,12]	[0,29; 1,37]	[0,06; 0,97]	[0,14; 1,23]	[0,22; 1,49]	[0,37; 1,75]	[0,31; 1,69]	[0,24; 1,60]	[0,17; 1,52]	[0,18; 1,63]	[0,19; 1,73]	[0,11; 1,61]	[0,22; 1,99]
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1288	987	839	732	671	596	499	437	398	377	372	340	322	327	255	236	224	191
		Anteil in %	49,25	47,98	51,66	50,07	48,94	49,46	45,86	45,10	45,23	46,09	43,82	42,61	42,31	46,06	38,46	37,76	38,49	35,17
		CI Anteil in %	[47,34; 51,17]	[45,82; 50,14]	[49,23; 54,09]	[47,50; 52,63]	[46,30; 51,59]	[46,64; 52,28]	[42,90; 48,83]	[41,96; 48,23]	[41,94; 48,52]	[42,67; 49,51]	[40,48; 47,16]	[39,17; 46,04]	[38,80; 45,83]	[42,39; 49,73]	[34,76; 42,17]	[33,96; 41,56]	[34,53; 42,44]	[31,15; 39,20]
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	13	14	2	1	2	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anteil in %	0,50	0,68	0,12	0,07	0,15	0,00	0,18	0,10	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CI Anteil in %	[0,23; 0,77]	[0,33; 1,04]	[0,00; 0,29]	[0,00; 0,20]	[0,00; 0,35]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,44]	[0,00; 0,31]	[0,00; 0,54]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	263	159	115	87	81	78	71	52	47	38	50	50	40	37	37	40	30	34	
	Anteil in %	10,06	7,73	7,08	5,95	5,91	6,47	6,53	5,37	5,34	4,65	5,89	6,27	5,26	5,21	5,58	6,40	5,15	6,26	
	CI Anteil in %	[8,90; 11,21]	[6,58; 8,88]	[5,83; 8,33]	[4,74; 7,16]	[4,66; 7,16]	[5,08; 7,86]	[5,06; 7,99]	[3,95; 6,79]	[3,85; 6,83]	[3,20; 6,09]	[4,30; 7,47]	[4,58; 7,95]	[3,67; 6,84]	[3,58; 6,85]	[3,83; 7,33]	[4,48; 8,32]	[3,36; 6,95]	[4,22; 8,30]	
Patienten insgesamt	Anzahl	3146	2692	2391	2109	1897	1699	1524	1359	1213	1145	1060	1007	948	884	825	772	719	676	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	927	819	739	676	594	518	474	425	402	374	343	318	297	280	261	237	224	
	auswertbar	Anzahl	927	713	634	611	533	457	431	382	350	353	322	300	283	262	247	223	210	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	288	273	257	272	230	207	186	175	156	172	153	141	133	128	118	116	100	
		Anteil in %	31,07	38,29	40,54	44,52	43,15	45,30	43,16	45,81	44,57	48,73	47,52	47,00	47,00	48,85	47,77	52,02	47,62	
		CI Anteil in %	[28,09; 34,05]	[34,72; 41,86]	[36,71; 44,36]	[40,57; 48,46]	[38,94; 47,36]	[40,73; 49,86]	[38,47; 47,84]	[40,81; 50,81]	[39,36; 49,79]	[43,50; 53,95]	[42,05; 52,98]	[41,34; 52,66]	[41,17; 52,82]	[42,79; 54,92]	[41,53; 54,02]	[45,45; 58,59]	[40,85; 54,39]	
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	13	11	6	3	3	5	1	0	0	4	5	5	5	6	6	3	2	
		Anteil in %	1,40	1,54	0,95	0,49	0,56	1,09	0,23	0,00	0,00	1,13	1,55	1,67	1,77	2,29	2,43	1,35	0,95	
		CI Anteil in %	[0,64; 2,16]	[0,64; 2,45]	[0,19; 1,70]	[0,00; 1,05]	[0,00; 1,20]	[0,14; 2,05]	[0,00; 0,69]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,03; 2,24]	[0,20; 2,91]	[0,22; 3,12]	[0,23; 3,30]	[0,48; 4,10]	[0,51; 4,35]	[0,00; 2,86]	[0,00; 2,27]	
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	275	262	251	269	227	202	185	175	156	168	148	136	128	122	112	113	98	
		Anteil in %	29,67	36,75	39,59	44,03	42,59	44,20	42,92	45,81	44,57	47,59	45,96	45,33	45,23	46,56	45,34	50,67	46,67	
		CI Anteil in %	[26,72; 32,61]	[33,20; 40,29]	[35,78; 43,40]	[40,09; 47,97]	[38,39; 46,79]	[39,64; 48,76]	[38,25; 47,60]	[40,81; 50,81]	[39,36; 49,79]	[42,37; 52,81]	[40,51; 51,41]	[39,69; 50,98]	[39,42; 51,04]	[40,51; 52,62]	[39,12; 51,57]	[44,10; 57,25]	[39,90; 53,43]	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	639	440	377	339	303	250	245	207	194	181	169	159	150	134	129	107	110	
		Anteil in %	68,93	61,71	59,46	55,48	56,85	54,70	56,84	54,19	55,43	51,27	52,48	53,00	53,00	51,15	52,23	47,98	52,38	
		CI Anteil in %	[65,95; 71,91]	[58,14; 65,28]	[55,64; 63,29]	[51,54; 59,43]	[52,64; 61,06]	[50,14; 59,27]	[52,16; 61,53]	[49,19; 59,19]	[50,21; 60,64]	[46,05; 56,50]	[47,02; 57,95]	[47,34; 58,66]	[47,18; 58,83]	[45,08; 57,21]	[45,98; 58,47]	[41,41; 54,55]	[45,61; 59,15]	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	22	10	4	6	6	3	5	6	5	7	5	5	7	2	2	3	3	
		Anteil in %	2,37	1,40	0,63	0,98	1,13	0,66	1,16	1,57	1,43	1,98	1,55	1,67	2,47	0,76	0,81	1,35	1,43	
		CI Anteil in %	[1,39; 3,35]	[0,54; 2,27]	[0,01; 1,25]	[0,20; 1,76]	[0,23; 2,02]	[0,00; 1,40]	[0,15; 2,17]	[0,32; 2,82]	[0,18; 2,67]	[0,53; 3,44]	[0,20; 2,91]	[0,22; 3,12]	[0,66; 4,29]	[0,00; 1,82]	[0,00; 1,93]	[0,00; 2,86]	[0,00; 3,04]	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	501	373	329	291	262	213	211	176	161	149	144	132	126	109	106	85	88	
		Anteil in %	54,05	52,31	51,89	47,63	49,16	46,61	48,96	46,07	46,00	42,21	44,72	44,00	44,52	41,60	42,91	38,12	41,90	
		CI Anteil in %	[50,84; 57,26]	[48,65; 55,98]	[48,00; 55,79]	[43,66; 51,59]	[44,91; 53,40]	[42,03; 51,19]	[44,23; 53,68]	[41,07; 51,08]	[40,77; 51,23]	[37,05; 47,37]	[39,28; 50,16]	[38,37; 49,63]	[38,72; 50,32]	[35,62; 47,58]	[36,73; 49,10]	[31,73; 44,51]	[35,22; 48,59]	
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	2	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	
		Anteil in %	0,22	0,14	0,00	0,00	0,00	0,44	0,23	0,26	0,29	0,00	0,00	0,33	0,35	0,00	0,40	0,00	0,48	
		CI Anteil in %	[0,00; 0,51]	[0,00; 0,42]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,04]	[0,00; 0,69]	[0,00; 0,77]	[0,00; 0,85]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,99]	[0,00; 1,05]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,20]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,41]	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	114	56	44	42	35	32	28	24	27	25	20	21	16	23	20	19	18		
	Anteil in %	12,30	7,85	6,94	6,87	6,57	7,00	6,50	6,28	7,71	7,08	6,21	7,00	5,65	8,78	8,10	8,52	8,57		
	CI Anteil in %	[10,18; 14,41]	[5,88; 9,83]	[4,96; 8,92]	[4,87; 8,88]	[4,46; 8,67]	[4,66; 9,34]	[4,17; 8,83]	[3,85; 8,72]	[4,91; 10,51]	[4,40; 9,76]	[3,57; 8,85]	[4,11; 9,89]	[2,96; 8,35]	[5,35; 12,21]	[4,69; 11,51]	[4,85; 12,19]	[4,78; 12,37]		
	Patienten insgesamt	Anzahl	1120	985	883	798	695	610	557	500	466	428	391	360	337	316	293	268	255	

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	819	741	676	601	537	498	465	444	408	382	353	329	311	300	290	273		
	auswertbar	Anzahl	667	617	577	516	434	406	373	346	350	328	304	277	264	254	241	224		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	262	235	276	240	222	205	179	180	175	171	167	143	142	137	134	128		
		Anteil in %	39,28	38,09	47,83	46,51	51,15	50,49	47,99	52,02	50,00	52,13	54,93	51,62	53,79	53,94	55,60	57,14		
		CI Anteil in %	[35,57; 42,99]	[34,25; 41,92]	[43,75; 51,91]	[42,20; 50,82]	[46,44; 55,86]	[45,62; 55,36]	[42,91; 53,07]	[46,75; 57,29]	[44,75; 55,25]	[46,72; 57,55]	[49,33; 60,54]	[45,73; 57,52]	[47,76; 59,81]	[47,79; 60,08]	[49,32; 61,89]	[50,65; 63,64]		
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	9	11	5	7	7	4	4	6	13	6	8	10	8	8	8	8		
		Anteil in %	1,35	1,78	0,87	1,36	1,61	0,99	1,07	1,73	3,71	1,83	2,63	3,61	3,03	3,15	3,32	3,57		
		CI Anteil in %	[0,47; 2,23]	[0,74; 2,83]	[0,11; 1,62]	[0,36; 2,36]	[0,43; 2,80]	[0,02; 1,95]	[0,03; 2,12]	[0,36; 3,11]	[1,73; 5,70]	[0,38; 3,28]	[0,83; 4,43]	[1,41; 5,81]	[0,96; 5,10]	[1,00; 5,30]	[1,05; 5,59]	[1,14; 6,01]		
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	253	224	271	233	215	201	175	174	162	165	159	133	134	129	126	120		
		Anteil in %	37,93	36,30	46,97	45,16	49,54	49,51	46,92	50,29	46,29	50,30	52,30	48,01	50,76	50,79	52,28	53,57		
		CI Anteil in %	[34,25; 41,62]	[32,51; 40,10]	[42,89; 51,04]	[40,86; 49,45]	[44,83; 54,25]	[44,64; 54,38]	[41,85; 51,99]	[45,01; 55,57]	[41,05; 51,52]	[44,89; 55,72]	[46,68; 57,93]	[42,12; 53,91]	[44,72; 56,80]	[44,63; 56,95]	[45,96; 58,60]	[47,03; 60,12]		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	405	382	301	276	212	201	194	166	175	157	137	134	122	117	107	96		
		Anteil in %	60,72	61,91	52,17	53,49	48,85	49,51	52,01	47,98	50,00	47,87	45,07	48,38	46,21	46,06	44,40	42,86		
		CI Anteil in %	[57,01; 64,43]	[58,08; 65,75]	[48,09; 56,25]	[49,18; 57,80]	[44,14; 53,56]	[44,64; 54,38]	[46,93; 57,09]	[42,71; 53,25]	[44,75; 55,25]	[42,45; 53,28]	[39,46; 50,67]	[42,48; 54,27]	[40,19; 52,24]	[39,92; 52,21]	[38,11; 50,68]	[36,36; 49,35]		
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	9	8	8	4	1	1	2	2	7	8	8	3	4	4	3	3		
		Anteil in %	1,35	1,30	1,39	0,78	0,23	0,25	0,54	0,58	2,00	2,44	2,63	1,08	1,52	1,57	1,24	1,34		
		CI Anteil in %	[0,47; 2,23]	[0,40; 2,19]	[0,43; 2,34]	[0,02; 1,53]	[0,00; 0,68]	[0,00; 0,73]	[0,00; 1,28]	[0,00; 1,38]	[0,53; 3,47]	[0,77; 4,11]	[0,83; 4,43]	[0,00; 2,30]	[0,04; 2,99]	[0,04; 3,11]	[0,00; 2,65]	[0,00; 2,85]		
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	327	325	249	237	187	179	173	146	150	134	110	116	105	98	87	76		
		Anteil in %	49,03	52,67	43,15	45,93	43,09	44,09	46,38	42,20	42,86	40,85	36,18	41,88	39,77	38,58	36,10	33,93		
		CI Anteil in %	[45,23; 52,82]	[48,73; 56,62]	[39,11; 47,20]	[41,63; 50,23]	[38,42; 47,75]	[39,25; 48,92]	[41,31; 51,45]	[36,99; 47,41]	[37,67; 48,05]	[35,53; 46,18]	[30,77; 41,59]	[36,06; 47,70]	[33,86; 45,69]	[32,58; 44,58]	[30,02; 42,18]	[27,71; 40,14]		
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	2	1	4	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0		
		Anteil in %	0,30	0,16	0,69	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00		
		CI Anteil in %	[0,00; 0,72]	[0,00; 0,48]	[0,02; 1,37]	[0,00; 0,92]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,85]	[0,00; 0,90]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 1,23]	[0,00; 0,00]		
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	67	48	40	33	24	21	19	18	17	14	19	15	13	15	16	17			
	Anteil in %	10,04	7,78	6,93	6,40	5,53	5,17	5,09	5,20	4,86	4,27	6,25	5,42	4,92	5,91	6,64	7,59			
	CI Anteil in %	[7,76; 12,33]	[5,66; 9,89]	[4,86; 9,01]	[4,28; 8,51]	[3,38; 7,68]	[3,02; 7,33]	[2,86; 7,33]	[2,86; 7,55]	[2,60; 7,11]	[2,08; 6,46]	[3,52; 8,98]	[2,75; 8,09]	[2,31; 7,54]	[3,00; 8,81]	[3,49; 9,79]	[4,11; 11,07]			
	Patienten insgesamt	Anzahl	977	875	794	707	634	582	545	516	475	445	412	386	367	353	337	317		

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1161	1089	980	861	767	694	647	603	555	529	489	452	430	406	368			
	auswertbar	Anzahl	1007	912	827	752	676	606	575	575	534	512	473	443	410	386	359			
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	354	363	373	336	342	293	283	288	288	276	259	253	233	215	208			
		Anteil in %	35,15	39,80	45,10	44,68	50,59	48,35	49,22	50,09	53,93	53,91	54,76	57,11	56,83	55,70	57,94			
		CI Anteil in %	[32,20; 38,10]	[36,62; 42,98]	[41,71; 48,50]	[41,13; 48,24]	[46,82; 54,36]	[44,37; 52,33]	[45,13; 53,31]	[46,00; 54,18]	[49,70; 58,16]	[49,58; 58,23]	[50,27; 59,25]	[52,50; 61,72]	[52,03; 61,63]	[50,74; 60,66]	[52,82; 63,05]			
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	5	9	10	6	7	8	6	12	16	14	16	14	12	12	13			
		Anteil in %	0,50	0,99	1,21	0,80	1,04	1,32	1,04	2,09	3,00	2,73	3,38	3,16	2,93	3,11	3,62			
		CI Anteil in %	[0,06; 0,93]	[0,34; 1,63]	[0,46; 1,95]	[0,16; 1,43]	[0,27; 1,80]	[0,41; 2,23]	[0,21; 1,87]	[0,92; 3,26]	[1,55; 4,44]	[1,32; 4,15]	[1,75; 5,01]	[1,53; 4,79]	[1,29; 4,56]	[1,38; 4,84]	[1,69; 5,56]			
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	349	354	363	330	335	285	277	276	272	262	243	239	221	203	195			
		Anteil in %	34,66	38,82	43,89	43,88	49,56	47,03	48,17	48,00	50,94	51,17	51,37	53,95	53,90	52,59	54,32			
		CI Anteil in %	[31,72; 37,60]	[35,65; 41,98]	[40,51; 47,28]	[40,33; 47,43]	[45,78; 53,33]	[43,05; 51,01]	[44,09; 52,26]	[43,91; 52,09]	[46,69; 55,18]	[46,84; 55,51]	[46,87; 55,88]	[49,30; 58,60]	[49,07; 58,73]	[47,60; 57,58]	[49,16; 59,48]			
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	653	549	454	416	334	313	292	287	246	236	214	190	177	171	151			
		Anteil in %	64,85	60,20	54,90	55,32	49,41	51,65	50,78	49,91	46,07	46,09	45,24	42,89	43,17	44,30	42,06			
		CI Anteil in %	[61,90; 67,80]	[57,02; 63,38]	[51,50; 58,29]	[51,76; 58,87]	[45,64; 53,18]	[47,67; 55,63]	[46,69; 54,87]	[45,82; 54,00]	[41,84; 50,30]	[41,77; 50,42]	[40,75; 49,73]	[38,28; 47,50]	[38,37; 47,97]	[39,34; 49,26]	[36,95; 47,18]			
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	13	8	5	7	4	2	5	7	6	7	4	4	4	5	2			
		Anteil in %	1,29	0,88	0,60	0,93	0,59	0,33	0,87	1,22	1,12	1,37	0,85	0,90	0,98	1,30	0,56			
		CI Anteil in %	[0,59; 1,99]	[0,27; 1,48]	[0,08; 1,13]	[0,24; 1,62]	[0,01; 1,17]	[0,00; 0,79]	[0,11; 1,63]	[0,32; 2,11]	[0,23; 2,02]	[0,36; 2,37]	[0,02; 1,67]	[0,02; 1,78]	[0,02; 1,93]	[0,17; 2,42]	[0,00; 1,33]			
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	539	456	393	371	291	266	253	245	210	203	182	163	153	149	134			
		Anteil in %	53,53	50,00	47,52	49,34	43,05	43,89	44,00	42,61	39,33	39,65	38,48	36,79	37,32	38,60	37,33			
		CI Anteil in %	[50,44; 56,61]	[46,75; 53,25]	[44,12; 50,93]	[45,76; 52,91]	[39,31; 46,78]	[39,94; 47,85]	[39,94; 48,06]	[38,56; 46,65]	[35,18; 43,47]	[35,41; 43,89]	[34,09; 42,87]	[32,30; 41,29]	[32,63; 42,00]	[33,74; 43,46]	[32,32; 42,34]			
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	1	0	1	1				
	Anteil in %	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,56	0,00	0,21	0,23	0,00	0,26	0,28				
	CI Anteil in %	[0,01; 0,79]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,51]	[0,00; 0,51]	[0,00; 1,20]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,63]	[0,00; 0,67]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,77]	[0,00; 0,82]				
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	97	85	56	38	39	45	33	34	27	26	27	22	20	16	14				
	Anteil in %	9,63	9,32	6,77	5,05	5,77	7,43	5,74	5,91	5,06	5,08	5,71	4,97	4,88	4,15	3,90				
	CI Anteil in %	[7,81; 11,46]	[7,43; 11,21]	[5,06; 8,48]	[3,49; 6,62]	[4,01; 7,53]	[5,34; 9,52]	[3,84; 7,64]	[3,98; 7,84]	[3,20; 6,92]	[3,17; 6,98]	[3,62; 7,80]	[2,94; 6,99]	[2,79; 6,97]	[2,15; 6,14]	[1,89; 5,91]				
	Patienten insgesamt	Anzahl	1341	1246	1115	979	876	786	735	689	638	604	556	512	482	456	416			

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1631	1489	1351	1218	1107	1036	963	895	825	752	686	636	603	568						
	auswertbar	Anzahl	1433	1297	1183	1086	991	930	914	836	781	716	663	623	581	543						
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	553	500	517	485	459	439	458	405	383	349	353	322	296	296						
		Anteil in %	38,59	38,55	43,70	44,66	46,32	47,20	50,11	48,44	49,04	48,74	53,24	51,69	50,95	54,51						
		CI Anteil in %	[36,07; 41,11]	[35,90; 41,20]	[40,87; 46,53]	[41,70; 47,62]	[43,21; 49,42]	[43,99; 50,41]	[46,87; 53,35]	[45,06; 51,83]	[45,53; 52,55]	[45,08; 52,41]	[49,44; 57,04]	[47,76; 55,61]	[46,88; 55,02]	[50,32; 58,70]						
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	13	15	16	13	14	9	17	16	19	8	9	12	12	13						
		Anteil in %	0,91	1,16	1,35	1,20	1,41	0,97	1,86	1,91	2,43	1,12	1,36	1,93	2,07	2,39						
		CI Anteil in %	[0,42; 1,40]	[0,57; 1,74]	[0,69; 2,01]	[0,55; 1,84]	[0,68; 2,15]	[0,34; 1,60]	[0,98; 2,74]	[0,98; 2,84]	[1,35; 3,51]	[0,35; 1,89]	[0,48; 2,24]	[0,85; 3,01]	[0,91; 3,22]	[1,11; 3,68]						
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	540	485	501	472	445	430	441	389	364	341	344	310	284	283						
		Anteil in %	37,68	37,39	42,35	43,46	44,90	46,24	48,25	46,53	46,61	47,63	51,89	49,76	48,88	52,12						
		CI Anteil in %	[35,17; 40,19]	[34,76; 40,03]	[39,53; 45,17]	[40,51; 46,41]	[41,81; 48,00]	[43,03; 49,44]	[45,01; 51,49]	[43,15; 49,91]	[43,11; 50,11]	[43,96; 51,29]	[48,08; 55,69]	[45,83; 53,69]	[44,81; 52,95]	[47,91; 56,32]						
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	880	797	666	601	532	491	456	431	398	367	310	301	285	247						
		Anteil in %	61,41	61,45	56,30	55,34	53,68	52,80	49,89	51,56	50,96	51,26	46,76	48,31	49,05	45,49						
		CI Anteil in %	[58,89; 63,93]	[58,80; 64,10]	[53,47; 59,13]	[52,38; 58,30]	[50,58; 56,79]	[49,59; 56,01]	[46,65; 53,13]	[48,17; 54,94]	[47,45; 54,47]	[47,59; 54,92]	[42,96; 50,56]	[44,39; 52,24]	[44,98; 53,12]	[41,30; 49,68]						
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	17	12	15	8	5	7	24	16	18	17	15	8	9	8						
		Anteil in %	1,19	0,93	1,27	0,74	0,50	0,75	2,63	1,91	2,30	2,37	2,26	1,28	1,55	1,47						
		CI Anteil in %	[0,63; 1,75]	[0,40; 1,45]	[0,63; 1,91]	[0,23; 1,25]	[0,06; 0,95]	[0,20; 1,31]	[1,59; 3,66]	[0,98; 2,84]	[1,25; 3,36]	[1,26; 3,49]	[1,13; 3,40]	[0,40; 2,17]	[0,54; 2,55]	[0,46; 2,49]						
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	727	685	568	523	462	415	364	370	331	303	251	259	240	204						
		Anteil in %	50,73	52,81	48,01	48,16	46,62	44,62	39,82	44,26	42,38	42,32	37,86	41,57	41,31	37,57						
		CI Anteil in %	[48,14; 53,32]	[50,10; 55,53]	[45,17; 50,86]	[45,19; 51,13]	[43,51; 49,73]	[41,43; 47,82]	[36,65; 43,00]	[40,89; 47,63]	[38,91; 45,85]	[38,70; 45,94]	[34,16; 41,55]	[37,70; 45,45]	[37,30; 45,32]	[33,49; 41,65]						
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	0	0	2	0	1	2	3	1	1	2	2	0	0	0						
		Anteil in %	0,00	0,00	0,17	0,00	0,10	0,22	0,33	0,12	0,13	0,28	0,30	0,00	0,00	0,00						
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,40]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,30]	[0,00; 0,51]	[0,00; 0,70]	[0,00; 0,35]	[0,00; 0,38]	[0,00; 0,67]	[0,00; 0,72]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]						
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	136	100	81	70	64	67	65	44	48	45	42	34	36	35							
	Anteil in %	9,49	7,71	6,85	6,45	6,46	7,20	7,11	5,26	6,15	6,28	6,33	5,46	6,20	6,45							
	CI Anteil in %	[7,97; 11,01]	[6,26; 9,16]	[5,41; 8,29]	[4,98; 7,91]	[4,93; 7,99]	[5,54; 8,87]	[5,44; 8,78]	[3,75; 6,78]	[4,46; 7,83]	[4,51; 8,06]	[4,48; 8,19]	[3,67; 7,24]	[4,23; 8,16]	[4,38; 8,51]							
	Patienten insgesamt	Anzahl	1866	1706	1548	1396	1271	1185	1094	1014	933	852	778	722	685	641						

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1913	1802	1600	1441	1345	1248	1168	1069	990	904	838	767	713					
	auswertbar	Anzahl	1705	1593	1393	1280	1165	1188	1108	1021	942	871	800	739	693					
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	675	695	622	604	567	577	554	484	463	463	436	399	342					
		Anteil in %	39,59	43,63	44,65	47,19	48,67	48,57	50,00	47,40	49,15	50,06	50,06	49,88	51,56	49,35				
		CI Anteil in %	[37,27; 41,91]	[41,19; 46,06]	[42,04; 47,26]	[44,45; 49,92]	[45,80; 51,54]	[45,73; 51,41]	[47,05; 52,95]	[44,34; 50,47]	[45,96; 52,34]	[46,73; 53,38]	[46,41; 53,34]	[47,95; 55,16]	[45,63; 53,08]					
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	12	10	11	10	10	20	25	26	21	13	17	11	13					
		Anteil in %	0,70	0,63	0,79	0,78	0,86	1,68	2,26	2,55	2,23	1,49	2,13	1,49	1,88					
		CI Anteil in %	[0,31; 1,10]	[0,24; 1,02]	[0,32; 1,25]	[0,30; 1,26]	[0,33; 1,39]	[0,95; 2,42]	[1,38; 3,13]	[1,58; 3,51]	[1,29; 3,17]	[0,69; 2,30]	[1,13; 3,12]	[0,61; 2,36]	[0,87; 2,89]					
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	663	685	611	594	557	557	529	458	442	423	382	370	329					
		Anteil in %	38,89	43,00	43,86	46,41	47,81	46,89	47,74	44,86	46,92	48,56	47,75	50,07	47,47					
		CI Anteil in %	[36,57; 41,20]	[40,57; 45,43]	[41,26; 46,47]	[43,67; 49,14]	[44,94; 50,68]	[44,05; 49,72]	[44,80; 50,69]	[41,81; 47,91]	[43,73; 50,11]	[45,24; 51,89]	[44,29; 51,21]	[46,46; 53,68]	[43,75; 51,20]					
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1030	898	771	676	598	611	554	537	479	435	401	358	351					
		Anteil in %	60,41	56,37	55,35	52,81	51,33	51,43	50,00	52,60	50,85	49,94	50,13	48,44	50,65					
		CI Anteil in %	[58,09; 62,73]	[53,94; 58,81]	[52,74; 57,96]	[50,08; 55,55]	[48,46; 54,20]	[48,59; 54,27]	[47,05; 52,95]	[49,53; 55,66]	[47,66; 54,04]	[46,62; 53,27]	[46,66; 53,59]	[44,84; 52,05]	[46,92; 54,37]					
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	12	9	8	8	4	26	14	20	16	16	10	8						
		Anteil in %	0,70	0,56	0,57	0,63	0,34	2,19	1,26	1,96	1,70	1,84	1,25	1,15						
		CI Anteil in %	[0,31; 1,10]	[0,20; 0,93]	[0,18; 0,97]	[0,19; 1,06]	[0,01; 0,68]	[1,36; 3,02]	[0,61; 1,92]	[1,11; 2,81]	[0,87; 2,52]	[0,94; 2,73]	[0,48; 2,02]	[0,71; 2,54]	[0,36; 1,95]					
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	828	752	665	575	507	510	461	447	395	342	344	297	287					
		Anteil in %	48,56	47,21	47,74	44,92	43,52	42,93	41,61	43,78	41,93	39,27	43,00	40,19	41,41					
		CI Anteil in %	[46,19; 50,94]	[44,75; 49,66]	[45,11; 50,36]	[42,20; 47,65]	[40,67; 46,37]	[40,11; 45,75]	[38,70; 44,51]	[40,74; 46,83]	[38,78; 45,08]	[36,02; 42,51]	[39,57; 46,43]	[36,65; 43,73]	[37,74; 45,08]					
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	0	1	0	0	2	3	1	2	4	1	3	1						
	Anteil in %	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	0,17	0,27	0,10	0,21	0,46	0,13	0,41	0,14						
	CI Anteil in %	[0,00; 0,17]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,21]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,40]	[0,00; 0,58]	[0,00; 0,29]	[0,00; 0,51]	[0,01; 0,91]	[0,00; 0,37]	[0,00; 0,86]	[0,00; 0,43]						
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	189	137	97	93	87	73	76	69	66	73	46	46	55						
	Anteil in %	11,09	8,60	6,96	7,27	7,47	6,14	6,86	6,76	7,01	8,38	5,75	6,22	7,94						
	CI Anteil in %	[9,59; 12,58]	[7,22; 9,98]	[5,63; 8,30]	[5,84; 8,69]	[5,96; 8,98]	[4,78; 7,51]	[5,37; 8,35]	[5,22; 8,30]	[5,38; 8,64]	[6,54; 10,22]	[4,14; 7,36]	[4,48; 7,97]	[5,92; 9,95]						
	Patienten insgesamt	Anzahl	2166	2034	1807	1621	1514	1405	1318	1212	1127	1026	955	873	815					

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2344	2223	2020	1867	1654	1543	1411	1320	1220	1119	1029	960								
	auswertbar	Anzahl	2031	1861	1694	1568	1531	1425	1345	1234	1143	1049	987	923								
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	855	824	767	774	740	661	652	600	568	547	533	498								
		Anteil in %	42,10	44,28	45,28	49,36	48,33	46,39	48,48	48,62	49,69	52,14	54,00	53,95								
		CI Anteil in %	[39,95; 44,25]	[42,02; 46,53]	[42,91; 47,65]	[46,89; 51,84]	[45,83; 50,84]	[43,80; 48,98]	[45,80; 51,15]	[45,83; 51,41]	[46,79; 52,59]	[49,12; 55,17]	[50,89; 57,11]	[50,74; 57,17]								
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	17	15	17	15	42	32	34	37	29	31	33	22								
		Anteil in %	0,84	0,81	1,00	0,96	2,74	2,25	2,53	3,00	2,54	2,96	3,34	2,38								
		CI Anteil in %	[0,44; 1,23]	[0,40; 1,21]	[0,53; 1,48]	[0,47; 1,44]	[1,92; 3,56]	[1,48; 3,02]	[1,69; 3,37]	[2,05; 3,95]	[1,63; 3,45]	[1,93; 3,98]	[2,22; 4,47]	[1,40; 3,37]								
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	838	809	750	759	698	629	618	563	539	516	500	476								
		Anteil in %	41,26	43,47	44,27	48,41	45,59	44,14	45,95	45,62	47,16	49,19	50,66	51,57								
		CI Anteil in %	[39,12; 43,40]	[41,22; 45,72]	[41,91; 46,64]	[45,93; 50,88]	[43,10; 48,09]	[41,56; 46,72]	[43,28; 48,61]	[42,84; 48,40]	[44,26; 50,05]	[46,16; 52,22]	[47,54; 53,78]	[48,35; 54,80]								
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1176	1037	927	794	791	764	693	634	575	502	454	425								
		Anteil in %	57,90	55,72	54,72	50,64	51,67	53,61	51,52	51,38	50,31	47,86	46,00	46,05								
		CI Anteil in %	[55,75; 60,05]	[53,47; 57,98]	[52,35; 57,09]	[48,16; 53,11]	[49,16; 54,17]	[51,02; 56,20]	[48,85; 54,20]	[48,59; 54,17]	[47,41; 53,21]	[44,83; 50,88]	[42,89; 49,11]	[42,83; 49,26]								
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	18	14	14	9	34	31	27	25	23	22	12	20								
		Anteil in %	0,89	0,75	0,83	0,57	2,22	2,18	2,01	2,03	2,01	2,10	1,22	2,17								
		CI Anteil in %	[0,48; 1,29]	[0,36; 1,14]	[0,40; 1,26]	[0,20; 0,95]	[1,48; 2,96]	[1,42; 2,93]	[1,26; 2,76]	[1,24; 2,81]	[1,20; 2,83]	[1,23; 2,96]	[0,53; 1,90]	[1,23; 3,11]								
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	982	900	799	699	655	642	585	547	488	420	381	348								
		Anteil in %	48,35	48,36	47,17	44,58	42,78	45,05	43,49	44,33	42,69	40,04	38,60	37,70								
		CI Anteil in %	[46,18; 50,52]	[46,09; 50,63]	[44,79; 49,54]	[42,12; 47,04]	[40,30; 45,26]	[42,47; 47,64]	[40,84; 46,14]	[41,55; 47,10]	[39,83; 45,56]	[37,07; 43,00]	[35,56; 41,64]	[34,57; 40,83]								
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4	3	2	2	3	7	4	3	3	4	3	4								
		Anteil in %	0,20	0,16	0,12	0,13	0,20	0,49	0,30	0,24	0,26	0,38	0,30	0,43								
		CI Anteil in %	[0,00; 0,39]	[0,00; 0,34]	[0,00; 0,28]	[0,00; 0,30]	[0,00; 0,42]	[0,13; 0,85]	[0,01; 0,59]	[0,00; 0,52]	[0,00; 0,56]	[0,01; 0,75]	[0,00; 0,65]	[0,01; 0,86]								
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	172	120	112	84	99	84	77	59	61	56	58	53									
	Anteil in %	8,47	6,45	6,61	5,36	6,47	5,89	5,72	4,78	5,34	5,34	5,88	5,74									
	CI Anteil in %	[7,26; 9,68]	[5,33; 7,56]	[5,43; 7,80]	[4,24; 6,47]	[5,23; 7,70]	[4,67; 7,12]	[4,48; 6,97]	[3,59; 5,97]	[4,03; 6,64]	[3,98; 6,70]	[4,41; 7,34]	[4,24; 7,24]									
	Patienten insgesamt	Anzahl	2651	2513	2278	2097	1861	1731	1580	1480	1370	1258	1164	1081								

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2679	2528	2365	2109	1963	1820	1699	1573	1442	1341	1263									
	auswertbar	Anzahl	2348	2153	1968	1971	1835	1742	1634	1497	1390	1299	1211									
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	876	911	871	929	856	803	761	703	681	655	604									
		Anteil in %	37,31	42,31	44,26	47,13	46,65	46,10	46,57	46,96	48,99	50,42	49,88									
		CI Anteil in %	[35,35; 39,26]	[40,23; 44,40]	[42,06; 46,45]	[44,93; 49,34]	[44,37; 48,93]	[43,75; 48,44]	[44,15; 48,99]	[44,43; 49,49]	[46,36; 51,62]	[47,70; 53,14]	[47,06; 52,69]									
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	19	24	22	55	40	40	30	25	29	27	26									
		Anteil in %	0,81	1,11	1,12	2,79	2,18	2,30	1,84	1,67	2,09	2,08	2,15									
		CI Anteil in %	[0,45; 1,17]	[0,67; 1,56]	[0,65; 1,58]	[2,06; 3,52]	[1,51; 2,85]	[1,59; 3,00]	[1,18; 2,49]	[1,02; 2,32]	[1,33; 2,84]	[1,30; 2,85]	[1,33; 2,96]									
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	857	887	849	874	816	763	731	678	652	628	578									
		Anteil in %	36,50	41,20	43,14	44,34	44,47	43,80	44,74	45,29	46,91	48,34	47,73									
		CI Anteil in %	[34,55; 38,45]	[39,12; 43,28]	[40,95; 45,33]	[42,15; 46,54]	[42,19; 46,74]	[41,47; 46,13]	[42,33; 47,15]	[42,77; 47,81]	[44,28; 49,53]	[45,63; 51,06]	[44,91; 50,54]									
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	1472	1242	1097	1042	979	939	873	794	709	644	607									
		Anteil in %	62,69	57,69	55,74	52,87	53,35	53,90	53,43	53,04	51,01	49,58	50,12									
		CI Anteil in %	[60,74; 64,65]	[55,60; 59,77]	[53,55; 57,94]	[50,66; 55,07]	[51,07; 55,63]	[51,56; 56,25]	[51,01; 55,85]	[50,51; 55,57]	[48,38; 53,64]	[46,86; 52,30]	[47,31; 52,94]									
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	24	19	11	48	49	42	43	33	21	24	21									
		Anteil in %	1,02	0,88	0,56	2,44	2,67	2,41	2,63	2,20	1,51	1,85	1,73									
		CI Anteil in %	[0,62; 1,43]	[0,49; 1,28]	[0,23; 0,89]	[1,75; 3,12]	[1,93; 3,41]	[1,69; 3,13]	[1,86; 3,41]	[1,46; 2,95]	[0,87; 2,15]	[1,11; 2,58]	[1,00; 2,47]									
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	1225	1046	955	865	816	798	738	666	606	553	500									
		Anteil in %	52,17	48,58	48,53	43,89	44,47	45,81	45,17	44,49	43,60	42,57	41,29									
		CI Anteil in %	[50,15; 54,19]	[46,47; 50,70]	[46,32; 50,74]	[41,69; 46,08]	[42,19; 46,74]	[43,47; 48,15]	[42,75; 47,58]	[41,97; 47,01]	[40,99; 46,20]	[39,88; 45,26]	[38,51; 44,06]									
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	6	1	1	4	1	2	1	2	1	0	0									
		Anteil in %	0,26	0,05	0,05	0,20	0,05	0,11	0,06	0,13	0,07	0,08	0,00									
		CI Anteil in %	[0,05; 0,46]	[0,00; 0,14]	[0,00; 0,15]	[0,00; 0,40]	[0,00; 0,16]	[0,00; 0,27]	[0,00; 0,18]	[0,00; 0,32]	[0,00; 0,21]	[0,00; 0,23]	[0,00; 0,00]									
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	217	176	130	125	113	97	91	93	81	66	86										
	Anteil in %	9,24	8,17	6,61	6,34	6,16	5,57	5,57	6,21	5,83	5,08	7,10										
	CI Anteil in %	[8,07; 10,41]	[7,02; 9,33]	[5,51; 7,70]	[5,27; 7,42]	[5,06; 7,26]	[4,49; 6,65]	[4,46; 6,68]	[4,99; 7,44]	[4,60; 7,06]	[3,89; 6,28]	[5,65; 8,55]										
	Patienten insgesamt	Anzahl	3003	2836	2647	2355	2190	2031	1894	1746	1599	1490	1402									

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1404	1347	1222	1109	999	906	826	758	705	653												
	auswertbar	Anzahl	1233	1132	1106	1023	942	858	783	715	678	623												
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	534	532	521	499	455	444	392	393	376	337												
		Anteil in %	43,31	47,00	47,11	48,78	48,30	51,75	50,06	54,97	54,97	55,46	54,09											
		CI Anteil in %	[40,54; 46,08]	[44,09; 49,91]	[44,16; 50,05]	[45,71; 51,84]	[45,11; 51,49]	[48,40; 55,09]	[46,56; 53,57]	[51,32; 58,61]	[51,71; 59,20]	[50,18; 58,01]												
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	14	13	34	18	26	26	26	25	23	19												
		Anteil in %	1,14	1,15	3,07	1,76	2,76	3,03	3,32	3,50	3,39	3,05												
		CI Anteil in %	[0,54; 1,73]	[0,53; 1,77]	[2,06; 4,09]	[0,95; 2,57]	[1,71; 3,81]	[1,88; 4,18]	[2,06; 4,58]	[2,15; 4,84]	[2,03; 4,76]	[1,70; 4,40]												
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	520	519	487	481	429	418	366	368	353	318												
		Anteil in %	42,17	45,85	44,03	47,02	45,54	48,72	46,74	51,47	52,06	51,04												
		CI Anteil in %	[39,42; 44,93]	[42,94; 48,75]	[41,11; 46,96]	[43,96; 50,08]	[42,36; 48,72]	[45,37; 52,06]	[43,25; 50,24]	[47,80; 55,13]	[48,30; 55,83]	[47,11; 54,97]												
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	699	600	585	524	487	414	391	322	302	286												
		Anteil in %	56,69	53,00	52,89	51,22	51,70	48,25	49,94	45,03	44,54	45,91												
		CI Anteil in %	[53,92; 59,46]	[50,09; 55,91]	[49,95; 55,84]	[48,16; 54,29]	[48,51; 54,89]	[44,91; 51,60]	[46,43; 53,44]	[41,39; 48,68]	[40,80; 48,29]	[41,99; 49,82]												
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	7	12	28	28	25	21	16	10	12	18												
		Anteil in %	0,57	1,06	2,53	2,74	2,65	2,45	2,04	1,40	1,77	2,89												
		CI Anteil in %	[0,15; 0,99]	[0,46; 1,66]	[1,61; 3,46]	[1,74; 3,74]	[1,63; 3,68]	[1,41; 3,48]	[1,05; 3,04]	[0,54; 2,26]	[0,78; 2,76]	[1,57; 4,21]												
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	578	512	472	420	391	342	321	269	244	235												
		Anteil in %	46,88	45,23	42,68	41,06	41,51	39,86	41,00	37,62	35,99	37,72												
		CI Anteil in %	[44,09; 49,66]	[42,33; 48,13]	[39,76; 45,59]	[38,04; 44,07]	[38,36; 44,66]	[36,58; 43,14]	[37,55; 44,44]	[34,07; 41,18]	[32,37; 39,60]	[33,91; 41,53]												
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	0	1	2	3	1	2	1	2	3	2												
		Anteil in %	0,00	0,09	0,18	0,29	0,11	0,23	0,13	0,28	0,44	0,32												
		CI Anteil in %	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,26]	[0,00; 0,43]	[0,00; 0,62]	[0,00; 0,31]	[0,00; 0,56]	[0,00; 0,38]	[0,00; 0,67]	[0,00; 0,94]	[0,00; 0,77]												
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	114	75	83	73	70	49	53	41	43	31													
	Anteil in %	9,25	6,63	7,50	7,14	7,43	5,71	6,77	5,73	6,34	4,98													
	CI Anteil in %	[7,63; 10,86]	[5,18; 8,08]	[5,95; 9,06]	[5,56; 8,71]	[5,76; 9,11]	[4,16; 7,26]	[5,01; 8,53]	[4,03; 7,44]	[4,51; 8,18]	[3,27; 6,68]													
	Patienten insgesamt	Anzahl	1608	1538	1387	1257	1135	1033	940	866	805	744												

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1246	1195	1090	971	880	814	769	700	644													
	auswertbar	Anzahl	1074	1099	999	913	838	783	737	672	608													
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	481	542	483	437	430	405	387	373	332													
		Anteil in %	44,79	49,32	48,35	47,86	51,31	51,72	52,51	55,51	54,61													
		CI Anteil in %	[41,81; 47,76]	[46,36; 52,27]	[45,25; 51,45]	[44,62; 51,11]	[47,93; 54,70]	[48,22; 55,23]	[48,90; 56,12]	[51,75; 59,27]	[50,64; 58,57]													
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	18	32	36	33	28	24	25	24	19													
		Anteil in %	1,68	2,91	3,60	3,61	3,34	3,07	3,39	3,57	3,13													
		CI Anteil in %	[0,91; 2,44]	[1,92; 3,91]	[2,45; 4,76]	[2,40; 4,83]	[2,12; 4,56]	[1,86; 4,27]	[2,08; 4,70]	[2,17; 4,98]	[1,74; 4,51]													
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	463	510	447	404	402	381	362	349	313													
		Anteil in %	43,11	46,41	44,74	44,25	47,97	48,66	49,12	51,93	51,48													
		CI Anteil in %	[40,15; 46,07]	[43,46; 49,36]	[41,66; 47,83]	[41,03; 47,47]	[44,59; 51,36]	[45,16; 52,16]	[48,90; 56,12]	[51,75; 59,27]	[50,64; 58,57]													
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	593	557	516	476	408	378	350	299	276													
		Anteil in %	55,21	50,68	51,65	52,14	48,69	48,28	47,49	44,49	45,39													
		CI Anteil in %	[52,24; 58,19]	[47,73; 53,64]	[48,55; 54,75]	[48,89; 55,38]	[45,30; 52,07]	[44,77; 51,78]	[43,88; 51,10]	[40,73; 48,25]	[41,43; 49,36]													
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	14	32	19	23	16	19	11	8	12													
		Anteil in %	1,30	2,91	1,90	2,52	1,91	2,43	1,49	1,19	1,97													
		CI Anteil in %	[0,62; 1,98]	[1,92; 3,91]	[1,05; 2,75]	[1,50; 3,54]	[0,98; 2,84]	[1,35; 3,51]	[0,62; 2,37]	[0,37; 2,01]	[0,87; 3,08]													
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	479	443	426	384	338	306	298	243	222													
		Anteil in %	44,60	40,31	42,64	42,06	40,33	39,08	40,43	36,16	36,51													
		CI Anteil in %	[41,63; 47,57]	[37,41; 43,21]	[39,57; 45,71]	[38,86; 45,26]	[37,01; 43,66]	[35,66; 42,50]	[36,89; 43,98]	[32,53; 39,80]	[32,68; 40,34]													
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	4	4	3	2	1	3	2	1													
		Anteil in %	0,09	0,36	0,40	0,33	0,24	0,13	0,41	0,30	0,16													
		CI Anteil in %	[0,00; 0,28]	[0,01; 0,72]	[0,01; 0,79]	[0,00; 0,70]	[0,00; 0,57]	[0,00; 0,38]	[0,00; 0,87]	[0,00; 0,71]	[0,00; 0,49]													
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	99	78	67	66	52	52	38	46	41														
	Anteil in %	9,22	7,10	6,71	7,23	6,21	6,64	5,16	6,85	6,74														
	CI Anteil in %	[7,49; 10,95]	[5,58; 8,62]	[5,15; 8,26]	[5,55; 8,91]	[4,57; 7,84]	[4,90; 8,39]	[3,56; 6,75]	[4,93; 8,76]	[4,75; 8,74]														
	Patienten insgesamt	Anzahl	1413	1356	1237	1102	998	925	869	796	733													

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	769	730	672	608	556	514	476	444												
	auswertbar	Anzahl	769	697	625	575	530	487	455	417												
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	377	344	317	287	259	266	241	228												
		Anteil in %	49,02	49,35	50,72	49,91	48,87	54,62	52,97	54,68												
		CI Anteil in %	[45,49; 52,56]	[45,64; 53,07]	[46,80; 54,64]	[45,82; 54,00]	[44,61; 53,13]	[50,19; 59,05]	[48,38; 57,56]	[49,89; 59,46]												
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	25	13	11	12	9	13	11	8												
		Anteil in %	3,25	1,87	1,76	2,09	1,70	2,67	2,42	1,92												
		CI Anteil in %	[2,00; 4,51]	[0,86; 2,87]	[0,73; 2,79]	[0,92; 3,26]	[0,60; 2,80]	[1,24; 4,10]	[1,00; 3,83]	[0,60; 3,24]												
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	352	331	306	275	250	253	230	220												
		Anteil in %	45,77	47,49	48,96	47,83	47,17	51,95	50,55	52,76												
		CI Anteil in %	[42,25; 49,30]	[43,78; 51,20]	[45,04; 52,88]	[43,74; 51,91]	[42,92; 51,42]	[47,51; 56,39]	[45,95; 55,15]	[47,96; 57,56]												
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	392	353	308	288	271	221	214	189												
		Anteil in %	50,98	50,65	49,28	50,09	51,13	45,38	47,03	45,32												
		CI Anteil in %	[47,44; 54,51]	[46,93; 54,36]	[45,36; 53,20]	[46,00; 54,18]	[46,87; 55,39]	[40,95; 49,81]	[42,44; 51,62]	[40,54; 50,11]												
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	18	15	17	12	12	6	5	6												
		Anteil in %	2,34	2,15	2,72	2,09	2,26	1,23	1,10	1,44												
		CI Anteil in %	[1,27; 3,41]	[1,07; 3,23]	[1,44; 4,00]	[0,92; 3,26]	[1,00; 3,53]	[0,25; 2,21]	[0,14; 2,06]	[0,29; 2,58]												
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	312	280	239	236	221	180	181	161												
		Anteil in %	40,57	40,17	38,24	41,04	41,70	36,96	39,78	38,61												
		CI Anteil in %	[37,10; 44,05]	[36,53; 43,81]	[34,43; 42,05]	[37,02; 45,07]	[37,50; 45,90]	[32,67; 41,25]	[35,28; 44,28]	[33,93; 43,29]												
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	3	2	0	0	1	0	0													
	Anteil in %	0,13	0,43	0,32	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00													
	CI Anteil in %	[0,00; 0,38]	[0,00; 0,92]	[0,00; 0,76]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,61]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]													
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	61	55	50	40	38	34	28	22													
	Anteil in %	7,93	7,89	8,00	6,96	7,17	6,98	6,15	5,28													
	CI Anteil in %	[6,02; 9,84]	[5,89; 9,89]	[5,87; 10,13]	[4,88; 9,04]	[4,97; 9,37]	[4,72; 9,25]	[3,94; 8,36]	[3,13; 7,42]													
	Patienten insgesamt	Anzahl	879	835	760	685	627	579	537	502												

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	658	616	557	497	452	419	391													
	auswertbar	Anzahl	657	579	521	470	426	402	373													
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	295	277	246	230	231	208	198													
		Anteil in %	44,90	47,84	47,22	48,94	54,23	51,74	53,08													
		CI Anteil in %	[41,09; 48,71]	[43,77; 51,91]	[42,93; 51,51]	[44,41; 53,46]	[49,49; 58,96]	[46,85; 56,63]	[48,01; 58,15]													
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	20	28	16	17	10	7	8													
		Anteil in %	3,04	4,84	3,07	3,62	2,35	1,74	2,14													
		CI Anteil in %	[1,73; 4,36]	[3,09; 6,58]	[1,59; 4,55]	[1,93; 5,31]	[0,91; 3,79]	[0,46; 3,02]	[0,67; 3,62]													
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	275	249	230	213	221	201	190													
		Anteil in %	41,86	43,01	44,15	45,32	51,88	50,00	50,94													
		CI Anteil in %	[38,08; 45,63]	[38,97; 47,04]	[39,88; 48,41]	[40,81; 49,82]	[47,13; 56,63]	[45,11; 54,89]	[45,86; 56,02]													
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	362	302	275	240	195	194	175													
		Anteil in %	55,10	52,16	52,78	51,06	45,77	48,26	46,92													
		CI Anteil in %	[51,29; 58,91]	[48,09; 56,23]	[48,49; 57,07]	[46,54; 55,59]	[41,04; 50,51]	[43,37; 53,15]	[41,85; 51,99]													
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	18	8	12	8	7	6	4													
		Anteil in %	2,74	1,38	2,30	1,70	1,64	1,49	1,07													
		CI Anteil in %	[1,49; 3,99]	[0,43; 2,33]	[1,01; 3,59]	[0,53; 2,87]	[0,43; 2,85]	[0,31; 2,68]	[0,03; 2,12]													
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	290	251	224	201	164	159	147													
		Anteil in %	44,14	43,35	42,99	42,77	38,50	39,55	39,41													
		CI Anteil in %	[40,34; 47,94]	[39,31; 47,39]	[38,74; 47,25]	[38,29; 47,24]	[33,87; 43,12]	[34,77; 44,34]	[34,44; 44,38]													
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	1	1	1	0	0	0	1														
	Anteil in %	0,15	0,17	0,19	0,00	0,00	0,00	0,27														
	CI Anteil in %	[0,00; 0,45]	[0,00; 0,51]	[0,00; 0,57]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,79]														
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	53	42	38	31	24	29	23														
	Anteil in %	8,07	7,25	7,29	6,60	5,63	7,21	6,17														
	CI Anteil in %	[5,98; 10,15]	[5,14; 9,37]	[5,06; 9,53]	[4,35; 8,84]	[3,44; 7,83]	[4,68; 9,75]	[3,72; 8,61]														
	Patienten insgesamt	Anzahl	759	709	644	573	519	481	447													

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	652	623	555	508	447	411														
	auswertbar	Anzahl	651	596	515	470	423	391														
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	349	304	255	268	232	214														
		Anteil in %	53,61	51,01	49,51	57,02	54,85	54,73														
		CI Anteil in %	[49,78; 57,44]	[46,99; 55,02]	[45,19; 53,84]	[52,54; 61,50]	[50,10; 59,59]	[49,79; 59,67]														
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	15	14	14	6	2	5														
		Anteil in %	2,30	2,35	2,72	1,28	0,47	1,28														
		CI Anteil in %	[1,15; 3,46]	[1,13; 3,57]	[1,31; 4,12]	[0,26; 2,29]	[0,00; 1,13]	[0,16; 2,39]														
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	334	290	241	262	230	209														
		Anteil in %	51,31	48,66	46,80	55,74	54,37	53,45														
		CI Anteil in %	[47,46; 55,15]	[44,64; 52,67]	[42,48; 51,11]	[51,25; 60,24]	[49,62; 59,13]	[48,50; 58,40]														
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	302	292	260	202	191	177														
		Anteil in %	46,39	48,99	50,49	42,98	45,15	45,27														
		CI Anteil in %	[42,56; 50,22]	[44,98; 53,01]	[46,16; 54,81]	[38,50; 47,46]	[40,41; 49,90]	[40,33; 50,21]														
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	16	15	7	8	9	5														
		Anteil in %	2,46	2,52	1,36	1,70	2,13	1,28														
		CI Anteil in %	[1,27; 3,65]	[1,26; 3,78]	[0,36; 2,36]	[0,53; 2,87]	[0,75; 3,50]	[0,16; 2,39]														
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	234	230	224	162	159	150														
		Anteil in %	35,94	38,59	43,50	34,47	37,59	38,36														
		CI Anteil in %	[32,26; 39,63]	[34,68; 42,50]	[39,21; 47,78]	[30,17; 38,77]	[32,97; 42,21]	[33,54; 43,19]														
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	2	2	1	2	0	0															
	Anteil in %	0,31	0,34	0,19	0,43	0,00	0,00															
	CI Anteil in %	[0,00; 0,73]	[0,00; 0,80]	[0,00; 0,57]	[0,00; 1,01]	[0,00; 0,00]	[0,00; 0,00]															
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	50	45	28	30	23	22															
	Anteil in %	7,68	7,55	5,44	6,38	5,44	5,63															
	CI Anteil in %	[5,63; 9,73]	[5,43; 9,67]	[3,48; 7,40]	[4,17; 8,60]	[3,27; 7,60]	[3,34; 7,91]															
	Patienten insgesamt	Anzahl	765	727	649	584	516	473														

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	754	714	640	585	545															
	auswertbar	Anzahl	754	685	608	561	512															
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	331	341	316	294	277															
		Anteil in %	43,90	49,78	51,97	52,41	54,10															
		CI Anteil in %	[40,35; 47,44]	[46,03; 53,53]	[48,00; 55,95]	[48,27; 56,54]	[49,78; 58,42]															
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	6	9	9	9	12															
		Anteil in %	0,80	1,31	1,48	1,60	2,34															
		CI Anteil in %	[0,16; 1,43]	[0,46; 2,17]	[0,52; 2,44]	[0,56; 2,64]	[1,03; 3,66]															
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	325	332	307	285	265															
		Anteil in %	43,10	48,47	50,49	50,80	51,76															
		CI Anteil in %	[39,57; 46,64]	[44,72; 52,21]	[46,52; 54,47]	[46,66; 54,94]	[47,43; 56,09]															
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	423	344	292	267	235															
		Anteil in %	56,10	50,22	48,03	47,59	45,90															
		CI Anteil in %	[52,56; 59,65]	[46,47; 53,97]	[44,05; 52,00]	[43,46; 51,73]	[41,58; 50,22]															
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	16	12	12	11	7															
		Anteil in %	2,12	1,75	1,97	1,96	1,37															
		CI Anteil in %	[1,09; 3,15]	[0,77; 2,74]	[0,87; 3,08]	[0,81; 3,11]	[0,36; 2,37]															
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	332	288	239	230	202															
		Anteil in %	44,03	42,04	39,31	41,00	39,45															
		CI Anteil in %	[40,49; 47,58]	[38,34; 45,74]	[35,42; 43,19]	[36,92; 45,07]	[35,22; 43,69]															
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4	2	1	1	1																
	Anteil in %	0,53	0,29	0,16	0,18	0,20																
	CI Anteil in %	[0,01; 1,05]	[0,00; 0,70]	[0,00; 0,49]	[0,00; 0,53]	[0,00; 0,58]																
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	71	42	40	25	25																
	Anteil in %	9,42	6,13	6,58	4,46	4,88																
	CI Anteil in %	[7,33; 11,50]	[4,33; 7,93]	[4,61; 8,55]	[2,75; 6,17]	[3,01; 6,75]																
	Patienten insgesamt	Anzahl	844	795	710	649	600															

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	805	774	707	636																
	auswertbar	Anzahl	805	743	656	614																
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	392	387	340	317																
		Anteil in %	48,70	52,09	51,83	51,63																
		CI Anteil in %	[45,24; 52,15]	[48,49; 55,68]	[48,00; 55,66]	[47,67; 55,58]																
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	18	17	12	15																
		Anteil in %	2,24	2,29	1,83	2,44																
		CI Anteil in %	[1,21; 3,26]	[1,21; 3,36]	[0,80; 2,86]	[1,22; 3,67]																
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	374	370	328	302																
		Anteil in %	46,46	49,80	50,00	49,19																
		CI Anteil in %	[43,01; 49,91]	[46,20; 53,40]	[46,17; 53,83]	[45,23; 53,14]																
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	413	356	316	297																
		Anteil in %	51,30	47,91	48,17	48,37																
		CI Anteil in %	[47,85; 54,76]	[44,32; 51,51]	[44,34; 52,00]	[44,42; 52,33]																
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	18	17	12	12																
		Anteil in %	2,24	2,29	1,83	1,95																
		CI Anteil in %	[1,21; 3,26]	[1,21; 3,36]	[0,80; 2,86]	[0,86; 3,05]																
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	316	284	249	238																
		Anteil in %	39,25	38,22	37,96	38,76																
		CI Anteil in %	[35,88; 42,63]	[34,73; 41,72]	[34,24; 41,67]	[34,91; 42,62]																
Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	3	1	2	2																	
	Anteil in %	0,37	0,13	0,30	0,33																	
	CI Anteil in %	[0,00; 0,79]	[0,00; 0,40]	[0,00; 0,73]	[0,00; 0,78]																	
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	76	54	53	45																	
	Anteil in %	9,44	7,27	8,08	7,33																	
	CI Anteil in %	[7,42; 11,46]	[5,40; 9,14]	[5,99; 10,17]	[5,27; 9,39]																	
	Patienten insgesamt	Anzahl	914	879	799	716																

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	817	793	722																			
	auswertbar	Anzahl	817	762	690																			
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	367	378	348																			
		Anteil in %	44,92	49,61	50,43																			
		CI Anteil in %	[41,51; 48,33]	[46,05; 53,16]	[46,70; 54,17]																			
	Kategorie 1 "normal ohne Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	12	15	11																			
		Anteil in %	1,47	1,97	1,59																			
		CI Anteil in %	[0,64; 2,29]	[0,98; 2,96]	[0,66; 2,53]																			
	Kategorie 2 "normal mit Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	355	363	337																			
		Anteil in %	43,45	47,64	48,84																			
		CI Anteil in %	[40,05; 46,85]	[44,09; 51,19]	[45,11; 52,57]																			
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	450	384	342																			
		Anteil in %	55,08	50,39	49,57																			
		CI Anteil in %	[51,67; 58,49]	[46,84; 53,95]	[45,83; 53,30]																			
	Kategorie 3 "mäßig erhöht ohne Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	20	15	11																			
		Anteil in %	2,45	1,97	1,59																			
		CI Anteil in %	[1,39; 3,51]	[0,98; 2,96]	[0,66; 2,53]																			
	Kategorie 4 "mäßig erhöht mit Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	330	304	265																			
		Anteil in %	40,39	39,90	38,41																			
		CI Anteil in %	[37,02; 43,76]	[36,42; 43,37]	[34,77; 42,04]																			
	Kategorie 5 "deutlich erhöht ohne Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	7	2	4																			
		Anteil in %	0,86	0,26	0,58																			
		CI Anteil in %	[0,22; 1,49]	[0,00; 0,63]	[0,01; 1,15]																			
Kategorie 6 "deutlich erhöht mit Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	93	63	62																				
	Anteil in %	11,38	8,27	8,99																				
	CI Anteil in %	[9,20; 13,56]	[6,31; 10,22]	[6,85; 11,12]																				
	Patienten insgesamt	Anzahl	952	920	836																			

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2011-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	723	693																		
	auswertbar	Anzahl	723	673																		
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	329	352																		
		Anteil in %	45,50	52,30																		
		CI Anteil in %	[41,87; 49,14]	[48,53; 56,08]																		
	Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	16	8																		
		Anteil in %	2,21	1,19																		
		CI Anteil in %	[1,14; 3,29]	[0,37; 2,01]																		
	Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	313	344																		
		Anteil in %	43,29	51,11																		
		CI Anteil in %	[39,68; 46,91]	[47,33; 54,89]																		
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	394	321																		
		Anteil in %	54,50	47,70																		
		CI Anteil in %	[50,86; 58,13]	[43,92; 51,47]																		
	Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	17	15																		
		Anteil in %	2,35	2,23																		
		CI Anteil in %	[1,25; 3,46]	[1,11; 3,34]																		
	Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	309	250																		
		Anteil in %	42,74	37,15																		
		CI Anteil in %	[39,13; 46,35]	[33,49; 40,80]																		
Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	6	2																			
	Anteil in %	0,83	0,30																			
	CI Anteil in %	[0,17; 1,49]	[0,00; 0,71]																			
Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	62	54																			
	Anteil in %	8,58	8,02																			
	CI Anteil in %	[6,53; 10,62]	[5,97; 10,08]																			
	Patienten insgesamt	<i>Anzahl</i>	<i>823</i>	<i>787</i>																		

EZ	Hypertonieverlauf bei Patienten mit Hypertonie laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr
2012-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	765																	
	auswertbar	Anzahl	765																	
	Normotoniker* (Kategorien 1 und 2)	Anzahl	346																	
		Anteil in %	45,23																	
		CI Anteil in %	[41,70; 48,76]																	
	Kategorie 1 "normal <u>ohne</u> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	14																	
		Anteil in %	1,83																	
		CI Anteil in %	[0,88; 2,78]																	
	Kategorie 2 "normal <u>mit</u> Therapie": sys<140 und dia<90	Anzahl	332																	
		Anteil in %	43,40																	
		CI Anteil in %	[39,88; 46,91]																	
	Hypertoniker* (Kategorien 3 bis 6)	Anzahl	419																	
		Anteil in %	54,77																	
		CI Anteil in %	[51,24; 58,30]																	
	Kategorie 3 "mäßig erhöht <u>ohne</u> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	16																	
		Anteil in %	2,09																	
		CI Anteil in %	[1,08; 3,11]																	
	Kategorie 4 "mäßig erhöht <u>mit</u> Therapie": sys≥140 und ≤160 oder dia≥90 und ≤100	Anzahl	306																	
		Anteil in %	40,00																	
		CI Anteil in %	[36,53; 43,47]																	
Kategorie 5 "deutlich erhöht <u>ohne</u> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	4																		
	Anteil in %	0,52																		
	CI Anteil in %	[0,01; 1,03]																		
Kategorie 6 "deutlich erhöht <u>mit</u> Therapie": sys>160 oder dia>100	Anzahl	93																		
	Anteil in %	12,16																		
	CI Anteil in %	[9,84; 14,47]																		
	Patienten insgesamt	Anzahl	875																	

In Tabelle C.3.1.5 wird die Entwicklung des **mittleren systolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutrifft:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

In der Kohorte 2003-1 lagen im Beitrittsjahr für 3601 Patienten im Hypertoniker-Kollektiv auswertbare Angaben zum systolischen Blutdruck vor. Der arithmetische Mittelwert lag bei 141,69 mmHg, der Median bei 140,00 mmHg der dafür auswertbaren Patienten. Im letzten Berichtsjahr lagen für 725 der dann noch eingeschriebenen Patienten auswertbare Angaben vor. Der Mittelwert lag bei 135,18 und der Median bei 135,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle C.3.1.5 Mittlerer systolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2003-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3601	3293	2927	2612	2340	2139	1940	1597	1452	1315	1240	1138	1076	1007	949	895	845	790	747
	auswertbar	Anzahl	3601	2642	2766	2562	2276	2100	1822	1561	1414	1279	1182	1096	1049	979	924	868	823	777	725
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	141,69	140,19	139,49	138,86	138,51	137,75	137,17	135,75	135,84	135,47	134,80	136,37	135,82	135,37	136,43	136,18	135,05	135,33	135,18
		CI Mean	[141,16; 142,22]	[139,58; 140,80]	[138,92; 140,07]	[138,26; 139,46]	[137,89; 139,14]	[137,11; 138,39]	[136,48; 137,86]	[135,02; 136,49]	[135,06; 136,63]	[134,65; 136,29]	[133,94; 135,66]	[135,47; 137,26]	[134,91; 136,73]	[134,40; 136,34]	[135,43; 137,42]	[135,21; 137,16]	[133,97; 136,14]	[134,27; 136,39]	[134,15; 136,21]
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	139,50	135,00	135,00	135,00	134,00	135,00	135,00	135,00	136,00	135,00	135,00	135,00	135,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4180</i>	<i>3803</i>	<i>3367</i>	<i>2999</i>	<i>2686</i>	<i>2457</i>	<i>2223</i>	<i>1847</i>	<i>1673</i>	<i>1510</i>	<i>1428</i>	<i>1306</i>	<i>1236</i>	<i>1155</i>	<i>1091</i>	<i>1032</i>	<i>978</i>	<i>912</i>	<i>862</i>	
2003-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2615	2255	2007	1774	1604	1432	1276	1133	1015	952	883	839	788	731	683	639	596	562	
	auswertbar	Anzahl	2615	2057	1946	1726	1553	1367	1226	1088	984	913	849	798	761	711	664	626	582	543	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	142,00	140,59	139,54	139,28	138,74	138,37	137,65	137,35	137,50	136,78	137,52	137,13	136,73	137,53	135,76	136,01	135,18	135,43	
		CI Mean	[141,34; 142,65]	[139,90; 141,29]	[138,82; 140,25]	[138,54; 140,02]	[137,94; 139,54]	[137,57; 139,17]	[136,77; 138,52]	[136,43; 138,27]	[136,56; 138,43]	[135,77; 137,80]	[136,40; 138,64]	[136,05; 138,21]	[135,59; 137,87]	[136,38; 138,67]	[134,53; 136,99]	[134,67; 137,35]	[133,86; 136,50]	[134,07; 136,80]	
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	139,50	138,50	138,00	138,00	136,00	135,00	140,00	133,00	133,00	133,00	135,00	130,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3146</i>	<i>2692</i>	<i>2391</i>	<i>2109</i>	<i>1897</i>	<i>1699</i>	<i>1524</i>	<i>1359</i>	<i>1213</i>	<i>1145</i>	<i>1060</i>	<i>1007</i>	<i>948</i>	<i>884</i>	<i>825</i>	<i>772</i>	<i>719</i>	<i>676</i>		
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	927	819	739	676	594	518	474	425	402	374	343	318	297	280	261	237	224		
	auswertbar	Anzahl	927	788	712	655	570	491	459	403	368	353	322	300	283	262	247	223	210		
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	144,08	140,47	140,61	139,31	139,18	139,11	139,15	138,87	138,41	138,19	137,04	139,03	138,02	139,15	139,62	138,09	138,33		
		CI Mean	[142,94; 145,22]	[139,37; 141,58]	[139,45; 141,77]	[138,06; 140,57]	[137,90; 140,45]	[137,72; 140,50]	[137,68; 140,63]	[137,35; 140,39]	[136,81; 139,96]	[136,43; 138,86]	[135,22; 138,86]	[137,16; 140,89]	[135,92; 140,12]	[137,06; 141,23]	[137,66; 141,57]	[136,02; 140,17]	[136,19; 140,48]		
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	140,00	140,00	140,00	140,00	137,00	140,00	136,00	140,00	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1120</i>	<i>985</i>	<i>883</i>	<i>798</i>	<i>695</i>	<i>610</i>	<i>557</i>	<i>500</i>	<i>466</i>	<i>428</i>	<i>391</i>	<i>360</i>	<i>337</i>	<i>316</i>	<i>293</i>	<i>268</i>	<i>255</i>			
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	819	741	676	601	537	498	465	444	408	382	353	329	311	300	290	273			
	auswertbar	Anzahl	819	702	652	579	484	449	415	386	350	328	304	277	264	254	241	224			
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,89	140,43	138,10	138,18	136,28	136,55	137,00	135,94	135,82	135,54	135,80	136,10	135,31	136,10	135,80	135,16			
		CI Mean	[139,71; 142,07]	[139,29; 141,58]	[136,84; 139,36]	[136,88; 139,48]	[134,97; 137,58]	[135,09; 138,01]	[135,48; 138,52]	[134,32; 137,55]	[134,19; 137,45]	[133,93; 137,15]	[134,02; 137,58]	[134,24; 137,97]	[133,43; 137,19]	[134,13; 138,07]	[133,64; 137,96]	[132,85; 137,46]			
		Median	140,00	140,00	138,50	140,00	135,00	138,00	138,00	135,00	136,00	135,00	135,00	136,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>977</i>	<i>875</i>	<i>794</i>	<i>707</i>	<i>634</i>	<i>582</i>	<i>545</i>	<i>516</i>	<i>475</i>	<i>445</i>	<i>412</i>	<i>386</i>	<i>367</i>	<i>353</i>	<i>337</i>	<i>317</i>				
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1161	1089	980	861	767	694	647	603	555	529	489	452	430	406	368				
	auswertbar	Anzahl	1161	1026	926	832	736	661	619	575	534	512	473	443	410	386	359				
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	141,66	139,97	138,35	137,44	136,76	137,61	136,59	137,39	136,58	135,86	136,31	135,25	135,67	135,62	133,70				
		CI Mean	[140,67; 142,65]	[138,91; 141,03]	[137,33; 139,37]	[136,42; 138,47]	[135,64; 137,88]	[136,35; 138,87]	[135,42; 137,77]	[136,20; 138,59]	[136,20; 138,59]	[135,27; 137,89]	[134,54; 137,18]	[134,89; 137,73]	[133,86; 136,63]	[134,33; 137,01]	[134,16; 137,09]	[132,13; 135,27]			
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	130,00	135,00	135,00	133,00			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1341</i>	<i>1246</i>	<i>1115</i>	<i>979</i>	<i>876</i>	<i>786</i>	<i>735</i>	<i>689</i>	<i>638</i>	<i>604</i>	<i>556</i>	<i>512</i>	<i>482</i>	<i>456</i>	<i>416</i>					
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1631	1489	1351	1218	1107	1036	963	895	825	752	686	636	603	568					
	auswertbar	Anzahl	1631	1412	1283	1165	1064	985	914	836	781	716	663	623	581	543					
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,86	139,91	138,69	138,21	138,02	137,73	137,22	137,46	137,46	137,83	137,08	136,34	137,32	136,73					
		CI Mean	[140,03; 141,70]	[139,05; 140,77]	[137,79; 139,58]	[137,30; 139,11]	[137,07; 138,96]	[136,75; 138,71]	[136,13; 138,30]	[136,42; 138,50]	[136,34; 138,57]	[136,65; 139,01]	[135,81; 138,35]	[135,17; 137,51]	[136,03; 138,60]	[135,42; 138,03]					
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	137,00	137,50	138,00	139,00	135,00	135,00	136,00	135,00					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1866</i>	<i>1706</i>	<i>1548</i>	<i>1396</i>	<i>1271</i>	<i>1185</i>	<i>1094</i>	<i>1014</i>	<i>933</i>	<i>852</i>	<i>778</i>	<i>722</i>	<i>685</i>	<i>641</i>						
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1913	1802	1600	1441	1345	1248	1168	1069	990	904	838	767	713						
	auswertbar	Anzahl	1913	1738	1516	1393	1261	1188	1108	1021	942	871	800	739	693						
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	141,54	139,23	138,50	138,09	137,43	137,40	137,33	137,97	138,07	137,96	137,24	137,02	137,65						
		CI Mean	[140,76; 142,33]	[138,45; 140,01]	[137,70; 139,30]	[137,25; 138,92]	[136,53; 138,33]	[136,47; 138,33]	[136,33; 138,32]	[137,00; 138,94]	[137,01; 139,12]	[136,84; 139,09]	[136,16; 138,32]	[135,88; 138,16]	[136,34; 138,97]						
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	138,00	136,00	140,00	138,00	136,00	138,00	136,00	138,00						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2166</i>	<i>2034</i>	<i>1807</i>	<i>1621</i>	<i>1514</i>	<i>1405</i>	<i>1318</i>	<i>1212</i>	<i>1127</i>	<i>1026</i>	<i>955</i>	<i>873</i>	<i>815</i>							

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr	
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2344	2223	2020	1867	1654	1543	1411	1320	1220	1119	1029	960							
	auswertbar	Anzahl	2344	2090	1892	1717	1532	1426	1346	1235	1144	1050	987	923							
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,94	138,12	138,17	137,02	137,79	137,82	137,35	137,40	137,18	136,21	135,83	136,05							
		CI Mean	[139,28; 140,61]	[137,46; 138,78]	[137,47; 138,88]	[136,28; 137,76]	[136,98; 138,60]	[137,00; 138,65]	[136,49; 138,21]	[136,53; 138,26]	[136,29; 138,08]	[135,27; 137,16]	[134,84; 136,83]	[135,02; 137,08]							
		Median	140,00	140,00	140,00	137,00	140,00	140,00	138,00	138,00	135,00	135,00	135,00	135,00							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2651</i>	<i>2513</i>	<i>2278</i>	<i>2097</i>	<i>1861</i>	<i>1731</i>	<i>1580</i>	<i>1480</i>	<i>1370</i>	<i>1258</i>	<i>1164</i>	<i>1081</i>								
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2679	2528	2365	2109	1963	1820	1699	1573	1442	1341	1263								
	auswertbar	Anzahl	2679	2399	2181	1971	1835	1742	1634	1497	1391	1300	1213								
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	141,00	139,04	138,35	138,08	137,70	137,79	137,70	137,82	137,28	136,66	137,15								
		CI Mean	[140,36; 141,63]	[138,38; 139,71]	[137,67; 139,02]	[137,38; 138,79]	[136,97; 138,43]	[137,05; 138,53]	[136,92; 138,48]	[137,01; 138,63]	[136,44; 138,12]	[135,83; 137,50]	[136,22; 138,08]								
		Median	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	138,00	135,00	136,00								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3003</i>	<i>2836</i>	<i>2647</i>	<i>2355</i>	<i>2190</i>	<i>2031</i>	<i>1894</i>	<i>1746</i>	<i>1599</i>	<i>1490</i>	<i>1402</i>									
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1404	1347	1222	1109	999	906	826	758	705	653									
	auswertbar	Anzahl	1404	1266	1106	1023	942	858	783	715	678	623									
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,33	138,02	138,16	137,61	137,42	136,46	137,25	136,34	136,32	136,19									
		CI Mean	[138,44; 140,22]	[137,10; 138,94]	[137,18; 139,15]	[136,61; 138,61]	[136,28; 138,56]	[135,38; 137,53]	[136,07; 138,42]	[135,17; 137,51]	[135,07; 137,57]	[134,94; 137,44]									
		Median	140,00	140,00	140,00	138,00	137,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1608</i>	<i>1538</i>	<i>1387</i>	<i>1257</i>	<i>1135</i>	<i>1033</i>	<i>940</i>	<i>866</i>	<i>805</i>	<i>744</i>										
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1246	1195	1090	971	880	814	769	700	644										
	auswertbar	Anzahl	1246	1104	999	913	838	783	737	672	608										
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,47	137,47	137,39	137,60	136,05	136,50	135,78	135,34	134,78										
		CI Mean	[138,51; 140,43]	[136,46; 138,48]	[136,34; 138,44]	[136,49; 138,71]	[134,94; 137,16]	[135,36; 137,64]	[134,61; 136,94]	[134,10; 136,58]	[133,45; 136,12]										
		Median	140,00	136,50	138,00	140,00	135,00	135,00	135,00	133,50	134,50										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1413</i>	<i>1356</i>	<i>1237</i>	<i>1102</i>	<i>998</i>	<i>925</i>	<i>869</i>	<i>796</i>	<i>733</i>											
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	769	730	672	608	556	514	476	444											
	auswertbar	Anzahl	769	697	625	575	530	487	455	417											
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,32	137,57	136,61	136,52	137,11	135,61	135,38	134,70											
		CI Mean	[137,10; 139,54]	[136,30; 138,83]	[135,26; 137,96]	[135,16; 137,88]	[135,71; 138,51]	[134,08; 137,14]	[133,78; 136,97]	[133,13; 136,26]											
		Median	138,00	137,00	135,00	136,00	138,00	135,00	135,00	132,00											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>879</i>	<i>835</i>	<i>760</i>	<i>685</i>	<i>627</i>	<i>579</i>	<i>537</i>	<i>502</i>												
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	658	616	557	497	452	419	391												
	auswertbar	Anzahl	658	580	521	470	426	402	373												
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,35	138,15	137,07	136,92	135,44	135,99	135,45												
		CI Mean	[137,08; 139,63]	[136,77; 139,54]	[135,69; 138,45]	[135,42; 138,42]	[133,92; 136,97]	[134,39; 137,59]	[133,68; 137,22]												
		Median	140,00	137,00	138,00	135,50	134,00	135,00	133,00												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>759</i>	<i>709</i>	<i>644</i>	<i>573</i>	<i>519</i>	<i>481</i>	<i>447</i>													
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	652	623	555	508	447	411													
	auswertbar	Anzahl	652	596	516	471	424	391													
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	136,76	136,49	136,93	135,82	135,08	135,61													
		CI Mean	[135,40; 138,12]	[135,14; 137,84]	[135,62; 138,25]	[134,32; 137,32]	[133,54; 136,62]	[134,07; 137,15]													
		Median	135,00	135,00	138,00	134,00	135,00	135,00													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>765</i>	<i>727</i>	<i>649</i>	<i>584</i>	<i>516</i>	<i>473</i>														
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	754	714	640	585	545														
	auswertbar	Anzahl	754	685	608	562	512														
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,39	136,95	136,66	135,89	135,89														
		CI Mean	[138,15; 140,63]	[135,69; 138,22]	[135,34; 137,97]	[134,56; 137,21]	[134,55; 137,24]														
		Median	140,00	135,00	135,00	135,00	135,00														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>844</i>	<i>795</i>	<i>710</i>	<i>649</i>	<i>600</i>															

EZ	Mittlerer systolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	805	774	707	636														
	auswertbar	Anzahl	805	743	656	614														
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,53	136,47	136,57	136,46														
		CI Mean	[137,35; 139,71]	[135,25; 137,68]	[135,24; 137,89]	[135,12; 137,80]														
		Median	135,00	135,00	135,00	135,00														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>914</i>	<i>879</i>	<i>799</i>	<i>716</i>															
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	817	793	722															
	auswertbar	Anzahl	817	762	690															
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	139,97	138,10	137,43															
		CI Mean	[138,69; 141,25]	[136,88; 139,33]	[136,07; 138,78]															
		Median	140,00	138,00	135,00															
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>952</i>	<i>920</i>	<i>836</i>																
2011-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	723	693																
	auswertbar	Anzahl	723	673																
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	138,85	137,05																
		CI Mean	[137,55; 140,16]	[135,70; 138,40]																
		Median	140,00	136,00																
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>823</i>	<i>787</i>																	
2012-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	765																	
	auswertbar	Anzahl	765																	
	Auswertungsergebnisse zum systolischen Blutdruck	Mean	140,08																	
		CI Mean	[138,75; 141,41]																	
		Median	140,00																	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>875</i>																		

In Tabelle C.3.1.6 wird die Entwicklung des **mittleren diastolischen Blutdruckwertes** für das Kollektiv der Hypertoniker dokumentiert. Dazu zählen im vorliegenden Bericht diejenigen Patienten, für die laut Erstdokumentation die folgende Bedingung zutraf:

- Hypertoniker laut Anamnesebefund in der Erstdokumentation

Zu beachten ist dabei, dass systolischer und diastolischer Blutdruck nicht als unabhängige Parameter gewertet werden. Wenn nur einer der beiden Werte vorliegt, findet dieser Wert keinen Eingang in die jeweilige Mittelwertberechnung.

In der Kohorte 2003-1 lagen im Beitrittsjahr für 3601 Patienten im Hypertoniker-Kollektiv auswertbare Angaben zum diastolischen Blutdruck vor. Der arithmetische Mittelwert lag bei 80,04 mmHg, der Median bei 80,00 mmHg der dafür auswertbaren Patienten. Im letzten Berichtshalbjahr lagen für 725 der dann noch eingeschriebenen Patienten auswertbare Angaben vor. Der Mittelwert lag für diese Patienten bei 76,60 und der Median bei 80,00.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle C.3.1.6 Mittlerer diastolischer Blutdruck in mmHg im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese in der Erstdokumentation, Subkohorte mit sekundären Endpunkten

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	3601	3293	2927	2612	2340	2139	1940	1597	1452	1315	1240	1138	1076	1007	949	895	845	790	747
	auswertbar	Anzahl	3601	2642	2766	2562	2276	2100	1822	1561	1414	1279	1182	1096	1049	979	924	868	823	777	725
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,04	79,40	78,78	78,66	78,37	78,01	77,63	77,35	77,25	76,89	76,45	76,82	76,50	76,83	76,91	76,97	76,22	76,51	76,60
		CI Mean	[79,73; 80,35]	[79,04; 79,76]	[78,45; 79,11]	[78,32; 78,99]	[78,01; 78,73]	[77,63; 78,39]	[77,23; 78,03]	[76,89; 77,80]	[76,79; 77,72]	[76,38; 77,41]	[75,92; 76,97]	[76,28; 77,37]	[75,95; 77,06]	[76,25; 77,40]	[76,33; 77,49]	[76,35; 77,59]	[75,57; 76,86]	[75,87; 77,15]	[75,94; 77,26]
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>4180</i>	<i>3803</i>	<i>3367</i>	<i>2999</i>	<i>2686</i>	<i>2457</i>	<i>2223</i>	<i>1847</i>	<i>1673</i>	<i>1510</i>	<i>1428</i>	<i>1306</i>	<i>1236</i>	<i>1155</i>	<i>1091</i>	<i>1032</i>	<i>978</i>	<i>912</i>	<i>862</i>	
2003-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2615	2255	2007	1774	1604	1432	1276	1133	1015	952	883	839	788	731	683	639	596	562	
	auswertbar	Anzahl	2615	2057	1946	1726	1553	1367	1226	1088	984	913	849	798	761	711	664	626	582	543	
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,54	79,87	78,77	78,59	78,36	78,21	77,90	77,85	78,35	77,81	77,71	77,88	77,23	77,61	76,78	76,45	76,46	76,75	
		CI Mean	[80,19; 80,89]	[79,48; 80,34]	[78,41; 79,14]	[78,17; 79,01]	[77,93; 78,80]	[77,77; 78,65]	[77,42; 78,39]	[77,34; 78,36]	[77,79; 78,90]	[77,24; 78,38]	[77,10; 78,31]	[77,24; 78,52]	[76,60; 77,85]	[76,99; 78,23]	[76,12; 77,43]	[75,72; 77,17]	[75,72; 77,19]	[75,99; 77,51]	
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3146</i>	<i>2692</i>	<i>2391</i>	<i>2109</i>	<i>1897</i>	<i>1699</i>	<i>1524</i>	<i>1359</i>	<i>1213</i>	<i>1145</i>	<i>1060</i>	<i>1007</i>	<i>948</i>	<i>884</i>	<i>825</i>	<i>772</i>	<i>719</i>	<i>676</i>		
2004-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	927	819	739	676	594	518	474	425	402	374	343	318	297	280	261	237	224		
	auswertbar	Anzahl	927	788	712	655	570	491	459	403	368	353	322	300	283	262	247	223	210		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	81,00	79,73	78,94	78,64	78,60	79,21	78,84	78,79	78,59	78,75	78,31	78,57	78,05	78,04	77,26	77,93	76,99		
		CI Mean	[80,38; 81,62]	[79,11; 80,34]	[78,27; 79,61]	[77,99; 79,29]	[77,91; 79,29]	[78,44; 79,97]	[78,05; 79,64]	[78,00; 79,58]	[77,63; 79,55]	[77,75; 79,76]	[77,36; 79,25]	[77,54; 79,60]	[76,96; 79,13]	[76,91; 79,17]	[76,08; 78,45]	[76,69; 79,18]	[75,68; 78,29]		
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1120</i>	<i>985</i>	<i>883</i>	<i>798</i>	<i>695</i>	<i>610</i>	<i>557</i>	<i>500</i>	<i>466</i>	<i>428</i>	<i>391</i>	<i>360</i>	<i>337</i>	<i>316</i>	<i>293</i>	<i>268</i>	<i>255</i>			
2004-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	819	741	676	601	537	498	465	444	408	382	353	329	311	300	290	273			
	auswertbar	Anzahl	819	702	652	579	484	449	415	386	350	328	304	277	264	254	241	224			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,57	79,52	79,06	78,77	78,07	78,24	78,95	78,17	77,57	78,12	77,88	77,39	77,16	76,96	76,87	77,36			
		CI Mean	[79,94; 81,21]	[78,88; 80,16]	[78,41; 79,71]	[78,07; 79,46]	[77,31; 78,82]	[77,49; 78,99]	[78,16; 79,75]	[77,33; 79,01]	[76,68; 78,45]	[77,19; 79,04]	[76,93; 78,83]	[76,34; 78,43]	[75,96; 78,35]	[75,86; 78,06]	[75,70; 78,04]	[76,08; 78,63]			
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>977</i>	<i>875</i>	<i>794</i>	<i>707</i>	<i>634</i>	<i>582</i>	<i>545</i>	<i>516</i>	<i>475</i>	<i>445</i>	<i>412</i>	<i>386</i>	<i>367</i>	<i>353</i>	<i>337</i>	<i>317</i>				
2005-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1161	1089	980	861	767	694	647	603	555	529	489	452	430	406	368				
	auswertbar	Anzahl	1161	1026	926	832	736	661	619	575	534	512	473	443	410	386	359				
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,14	79,30	78,61	78,52	77,99	78,76	78,25	78,67	78,21	78,15	77,94	77,61	77,49	77,11	76,37				
		CI Mean	[79,63; 80,65]	[78,76; 79,85]	[78,06; 79,17]	[77,94; 79,11]	[77,35; 78,63]	[78,11; 79,42]	[77,55; 78,95]	[77,97; 79,37]	[77,47; 78,95]	[77,41; 78,89]	[77,15; 78,73]	[76,81; 78,41]	[76,64; 78,33]	[76,31; 77,91]	[75,48; 77,25]				
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1341</i>	<i>1246</i>	<i>1115</i>	<i>979</i>	<i>876</i>	<i>786</i>	<i>735</i>	<i>689</i>	<i>638</i>	<i>604</i>	<i>556</i>	<i>512</i>	<i>482</i>	<i>456</i>	<i>416</i>					
2005-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1631	1489	1351	1218	1107	1036	963	895	825	752	686	636	603	568					
	auswertbar	Anzahl	1631	1412	1283	1165	1064	985	914	836	781	716	663	623	581	543					
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,50	79,00	78,68	78,98	78,43	78,48	77,97	78,51	78,09	78,07	78,20	77,34	77,62	77,08					
		CI Mean	[79,07; 79,93]	[78,53; 79,47]	[78,19; 79,16]	[78,45; 79,51]	[77,90; 78,95]	[77,93; 79,03]	[77,38; 78,56]	[77,91; 79,12]	[77,45; 78,74]	[77,42; 78,72]	[77,47; 78,92]	[76,60; 78,07]	[76,87; 78,37]	[76,29; 77,86]					
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1866</i>	<i>1706</i>	<i>1548</i>	<i>1396</i>	<i>1271</i>	<i>1185</i>	<i>1094</i>	<i>1014</i>	<i>933</i>	<i>852</i>	<i>778</i>	<i>722</i>	<i>685</i>	<i>641</i>						
2006-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1913	1802	1600	1441	1345	1248	1168	1069	990	904	838	767	713						
	auswertbar	Anzahl	1913	1738	1516	1393	1261	1188	1108	1021	942	871	800	739	693						
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,71	78,38	78,50	78,38	77,84	78,10	77,74	77,87	77,96	77,90	77,44	76,95	76,81						
		CI Mean	[79,28; 80,14]	[77,96; 78,79]	[78,04; 78,96]	[77,93; 78,84]	[77,34; 78,34]	[77,58; 78,63]	[77,21; 78,27]	[77,32; 78,42]	[77,37; 78,56]	[77,30; 78,50]	[76,80; 78,08]	[76,32; 77,58]	[76,11; 77,52]						
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2166</i>	<i>2034</i>	<i>1807</i>	<i>1621</i>	<i>1514</i>	<i>1405</i>	<i>1318</i>	<i>1212</i>	<i>1127</i>	<i>1026</i>	<i>955</i>	<i>873</i>	<i>815</i>							

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2006-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2344	2223	2020	1867	1654	1543	1411	1320	1220	1119	1029	960							
	auswertbar	Anzahl	2344	2090	1892	1717	1532	1426	1346	1235	1144	1050	987	923							
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,76	79,01	78,88	78,45	78,30	78,35	78,17	77,79	77,92	77,34	77,34	77,07							
		CI Mean	[79,41; 80,11]	[78,65; 79,37]	[78,50; 79,27]	[78,05; 78,85]	[77,85; 78,74]	[77,89; 78,80]	[77,69; 78,65]	[77,30; 78,29]	[77,40; 78,44]	[76,80; 77,89]	[76,81; 77,86]	[76,50; 77,65]							
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>2651</i>	<i>2513</i>	<i>2278</i>	<i>2097</i>	<i>1861</i>	<i>1731</i>	<i>1580</i>	<i>1480</i>	<i>1370</i>	<i>1258</i>	<i>1164</i>	<i>1081</i>								
2007-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	2679	2528	2365	2109	1963	1820	1699	1573	1442	1341	1263								
	auswertbar	Anzahl	2679	2399	2181	1971	1835	1742	1634	1497	1391	1300	1213								
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,13	79,17	78,81	78,75	78,90	78,69	78,36	78,29	77,69	77,86	78,10								
		CI Mean	[79,79; 80,48]	[78,82; 79,53]	[78,43; 79,18]	[78,36; 79,15]	[78,49; 79,31]	[78,26; 79,12]	[77,90; 78,81]	[77,81; 78,77]	[77,20; 78,19]	[77,36; 78,35]	[77,60; 78,59]								
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00								
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>3003</i>	<i>2836</i>	<i>2647</i>	<i>2355</i>	<i>2190</i>	<i>2031</i>	<i>1894</i>	<i>1746</i>	<i>1599</i>	<i>1490</i>	<i>1402</i>									
2007-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1404	1347	1222	1109	999	906	826	758	705	653									
	auswertbar	Anzahl	1404	1266	1106	1023	942	858	783	715	678	623									
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,24	78,47	78,42	78,25	78,15	77,75	77,77	77,16	77,49	77,40									
		CI Mean	[78,74; 79,74]	[77,95; 78,99]	[77,87; 78,97]	[77,69; 78,82]	[77,54; 78,76]	[77,13; 78,37]	[77,12; 78,41]	[76,47; 78,19]	[76,80; 78,19]	[76,68; 78,13]									
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00									
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1608</i>	<i>1538</i>	<i>1387</i>	<i>1257</i>	<i>1135</i>	<i>1033</i>	<i>940</i>	<i>866</i>	<i>805</i>	<i>744</i>										
2008-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	1246	1195	1090	971	880	814	769	700	644										
	auswertbar	Anzahl	1246	1104	999	913	838	783	737	672	608										
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,66	78,66	78,60	78,43	78,13	77,99	77,42	77,55	77,05										
		CI Mean	[79,13; 80,19]	[78,12; 79,21]	[77,99; 79,21]	[77,83; 79,03]	[77,52; 78,75]	[77,30; 78,69]	[76,74; 78,11]	[76,81; 78,28]	[76,26; 77,84]										
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00										
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1413</i>	<i>1356</i>	<i>1237</i>	<i>1102</i>	<i>998</i>	<i>925</i>	<i>869</i>	<i>796</i>	<i>733</i>											
2008-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	769	730	672	608	556	514	476	444											
	auswertbar	Anzahl	769	697	625	575	530	487	455	417											
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,33	78,71	78,72	78,93	78,42	76,97	77,38	76,45											
		CI Mean	[78,67; 79,99]	[78,02; 79,40]	[78,01; 79,43]	[78,11; 79,75]	[77,61; 79,24]	[76,11; 77,83]	[76,51; 78,25]	[75,49; 77,41]											
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00											
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>879</i>	<i>835</i>	<i>760</i>	<i>685</i>	<i>627</i>	<i>579</i>	<i>537</i>	<i>502</i>												
2009-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	658	616	557	497	452	419	391												
	auswertbar	Anzahl	658	580	521	470	426	402	373												
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,80	79,31	78,63	78,73	77,60	78,62	78,21												
		CI Mean	[79,04; 80,56]	[78,52; 80,10]	[77,76; 79,49]	[77,83; 79,63]	[76,66; 78,54]	[77,62; 79,63]	[77,28; 79,13]												
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00												
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>759</i>	<i>709</i>	<i>644</i>	<i>573</i>	<i>519</i>	<i>481</i>	<i>447</i>													
2009-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	652	623	555	508	447	411													
	auswertbar	Anzahl	652	596	516	471	424	391													
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	78,86	78,63	78,55	77,87	77,58	78,01													
		CI Mean	[78,11; 79,61]	[77,85; 79,41]	[77,75; 79,35]	[77,02; 78,72]	[76,73; 78,43]	[77,11; 78,91]													
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00													
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>765</i>	<i>727</i>	<i>649</i>	<i>584</i>	<i>516</i>	<i>473</i>														
2010-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	754	714	640	585	545														
	auswertbar	Anzahl	754	685	608	562	512														
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,60	78,37	78,26	78,31	78,28														
		CI Mean	[78,87; 80,33]	[77,66; 79,08]	[77,54; 78,97]	[77,53; 79,09]	[77,46; 79,10]														
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00														
<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>844</i>	<i>795</i>	<i>710</i>	<i>649</i>	<i>600</i>															

EZ	Mittlerer diastolischer Blutdruck in [mmHg] im Kollektiv der Hypertoniker laut Anamnese (ED), Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr				
2010-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	805	774	707	636																		
	auswertbar	Anzahl	805	743	656	614																		
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,00	78,27	78,55	78,40																		
		CI Mean	[78,32; 79,68]	[77,58; 78,95]	[77,80; 79,30]	[77,64; 79,16]																		
		Median	80,00	80,00	80,00	80,00																		
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>914</i>	<i>879</i>	<i>799</i>	<i>716</i>																		
2011-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	817	793	722																			
	auswertbar	Anzahl	817	762	690																			
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,69	78,68	78,82																			
		CI Mean	[78,97; 80,41]	[77,97; 79,39]	[78,07; 79,58]																			
		Median	80,00	80,00	80,00																			
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>952</i>	<i>920</i>	<i>836</i>																			
2011-2	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	723	693																				
	auswertbar	Anzahl	723	673																				
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	79,63	78,79																				
		CI Mean	[78,88; 80,37]	[78,01; 79,56]																				
		Median	80,00	80,00																				
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>823</i>	<i>787</i>																				
2012-1	Kollektivmitglieder insgesamt	Anzahl	765																					
	auswertbar	Anzahl	765																					
	Auswertungsergebnisse zum diastolischen Blutdruck	Mean	80,49																					
		CI Mean	[79,76; 81,22]																					
		Median	80,00																					
	<i>Patienten insgesamt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>875</i>																					

C.3.2 Laborwerte

Neben der Einstellung des erhöhten Blutdrucks in den Normbereich ist bei Diabetikern die Einstellung bei erhöhten Blutzucker-/Glukosekonzentrationen entscheidend für den Therapieerfolg bzw. für das Verhindern von Folgeerkrankungen. Während die Messung des Blutzuckerwertes nur eine Momentaufnahme der aktuellen Stoffwechsellage liefert, kann durch Bestimmung des Anteils von glykolisiertem Hämoglobin (hier gemessen als: HbA1c) als Parameter der diabetischen Stoffwechselkontrolle im Sinne eines „Blutzuckergedächtnisses“ der mittlere Blutzuckerspiegel der vergangenen (4-12) Wochen beurteilt werden. So sind beispielsweise Diabetiker, deren Blutzuckerwerte durch eine intensivierete Insulintherapie dauerhaft gut eingestellt sind und die in der Folge HbA1c-Werte von unter 6,5% aufweisen, deutlich besser vor den Komplikationen und Folgeerkrankungen eines Diabetes mellitus geschützt als solche mit höheren HbA1c-Werten.

In Tabelle C.3.2.1 ist die Entwicklung der **HbA1c**-Konzentration ausgewiesen. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer waren. Die „auswertbaren“ Patienten bilden die Fallbasis für die Mittelwertberechnungen, die anschließend ausgewiesen werden. Für die Berechnung der durchschnittlichen Differenz zwischen HbA1c-Konzentration im Berichtshalbjahr und Beitrittsjahr – es handelt sich dabei *nicht* um die Differenz der Mittelwerte der beiden Halbjahre – müssen plausible Werte aus zwei Berichtshalbjahren vorliegen. Daher kann die Fallbasis hier geringer ausfallen als die Anzahl der auswertbaren Patienten im Berichtshalbjahr. Deswegen wird für diesen Durchschnittswert die entsprechende Fallbasis gesondert aufgeführt.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts-halbjahr 4180 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 4179 Patienten lagen auswertbare Daten vor. Bei ihnen betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich 7,37 %; der Median lag bei 7,20 %. Im letzten Berichtshalbjahr betrug die HbA1c-Konzentration durchschnittlich 7,39 %; der Median lag bei 7,20 %, der dafür auswertbaren Patienten.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle C.3.2.1 Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit sekundären Endpunkten

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4180	3803	3367	2999	2686	2457	2223	1847	1673	1510	1428	1306	1236	1155	1091	1032	978	912	862	
	auswertbar	Anzahl	4179	3039	3176	2937	2613	2415	2095	1800	1625	1470	1352	1252	1202	1122	1062	1003	949	895	838	
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,37	7,16	7,29	7,13	7,28	7,19	7,28	7,18	7,24	7,20	7,28	7,21	7,33	7,33	7,41	7,36	7,39	7,26	7,39	
		CI Mean	[7,33; 7,41]	[7,11; 7,20]	[7,24; 7,33]	[7,09; 7,17]	[7,23; 7,32]	[7,14; 7,24]	[7,23; 7,33]	[7,13; 7,24]	[7,18; 7,30]	[7,14; 7,26]	[7,21; 7,34]	[7,15; 7,28]	[7,26; 7,40]	[7,26; 7,40]	[7,34; 7,49]	[7,29; 7,44]	[7,31; 7,47]	[7,19; 7,34]	[7,30; 7,47]	
		Median	7,20	7,00	7,10	7,00	7,10	7,00	7,10	7,00	7,00	7,00	7,10	7,00	7,10	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,10	7,20
		Fallbasis mittlere Differenz		3038	3176	2936	2612	2414	2094	1799	1624	1469	1351	1251	1201	1121	1061	1002	948	894	837	
		Mittlere Differenz zur ED		-0,19	-0,05	-0,18	-0,03	-0,09	-0,01	-0,09	-0,01	-0,06	0,02	-0,02	0,10	0,11	0,20	0,15	0,19	0,19	0,07	0,19
		CI mittlere Differenz		[-0,22; -0,15]	[-0,09; -0,01]	[-0,22; -0,14]	[-0,07; -0,02]	[-0,14; -0,04]	[-0,06; -0,05]	[-0,15; -0,03]	[-0,07; -0,05]	[-0,12; -0,01]	[-0,05; -0,09]	[-0,09; -0,05]	[0,02; 0,17]	[0,03; 0,18]	[0,12; 0,28]	[0,07; 0,23]	[0,11; 0,27]	[-0,02; 0,15]	[0,10; 0,28]	
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,20	0,10	0,20	0,10		
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	3146	2692	2391	2109	1897	1699	1524	1359	1213	1145	1060	1007	948	884	825	772	719	676		
	auswertbar	Anzahl	3141	2451	2313	2045	1841	1625	1464	1300	1180	1100	1013	956	918	859	802	754	699	653		
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,34	7,24	7,14	7,26	7,22	7,28	7,18	7,26	7,19	7,26	7,21	7,33	7,30	7,39	7,30	7,34	7,23	7,40		
		CI Mean	[7,29; 7,38]	[7,19; 7,29]	[7,09; 7,19]	[7,21; 7,31]	[7,16; 7,27]	[7,22; 7,34]	[7,11; 7,24]	[7,20; 7,33]	[7,12; 7,26]	[7,19; 7,33]	[7,13; 7,28]	[7,25; 7,41]	[7,22; 7,37]	[7,31; 7,47]	[7,22; 7,38]	[7,26; 7,42]	[7,15; 7,32]	[7,30; 7,49]		
		Median	7,10	7,10	7,00	7,10	7,00	7,10	7,00	7,10	7,00	7,10	7,00	7,10	7,10	7,20	7,20	7,10	7,10	7,20		
		Fallbasis mittlere Differenz		2447	2309	2044	1841	1625	1464	1300	1180	1100	1013	956	918	859	802	754	699	653		
		Mittlere Differenz zur ED		-0,07	-0,16	-0,03	-0,07	0,02	-0,07	-0,01	-0,04	0,03	0,02	0,14	0,12	0,21	0,10	0,14	0,04	0,23		
		CI mittlere Differenz		[-0,12; -0,02]	[-0,21; -0,11]	[-0,09; -0,02]	[-0,13; -0,01]	[-0,04; -0,08]	[-0,14; -0,01]	[-0,08; -0,06]	[-0,11; -0,04]	[-0,05; -0,11]	[-0,07; -0,10]	[0,05; 0,23]	[0,03; 0,21]	[0,12; 0,30]	[0,01; 0,20]	[0,04; 0,24]	[-0,06; 0,14]	[0,13; 0,34]		
Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20	0,20	0,10	0,30				
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1120	985	883	798	695	610	557	500	466	428	391	360	337	316	293	268	255			
	auswertbar	Anzahl	1118	936	850	770	669	578	537	470	421	398	362	339	320	295	278	253	240			
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,61	7,17	7,30	7,30	7,39	7,30	7,35	7,36	7,43	7,31	7,49	7,53	7,58	7,48	7,63	7,59	7,62			
		CI Mean	[7,53; 7,69]	[7,09; 7,24]	[7,22; 7,38]	[7,21; 7,39]	[7,29; 7,48]	[7,20; 7,40]	[7,25; 7,46]	[7,24; 7,48]	[7,31; 7,55]	[7,20; 7,42]	[7,36; 7,62]	[7,39; 7,66]	[7,44; 7,72]	[7,34; 7,62]	[7,49; 7,78]	[7,42; 7,75]	[7,47; 7,77]			
		Median	7,40	7,05	7,10	7,10	7,20	7,10	7,20	7,10	7,30	7,10	7,30	7,30	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40			
		Fallbasis mittlere Differenz		934	848	768	668	577	536	469	420	397	361	338	319	294	277	252	239			
		Mittlere Differenz zur ED		-0,43	-0,29	-0,28	-0,18	-0,30	-0,24	-0,25	-0,16	-0,29	-0,13	-0,11	-0,05	-0,12	0,02	-0,01	0,03			
		CI mittlere Differenz		[-0,51; -0,35]	[-0,37; -0,20]	[-0,38; -0,19]	[-0,28; -0,08]	[-0,40; -0,19]	[-0,35; -0,14]	[-0,38; -0,12]	[-0,29; -0,02]	[-0,43; -0,16]	[-0,29; -0,03]	[-0,28; -0,05]	[-0,21; -0,11]	[-0,29; -0,04]	[-0,16; -0,21]	[-0,22; -0,19]	[-0,16; -0,23]			
Median mittlere Differenz		-0,30	-0,10	-0,20	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,20	-0,10	-0,20	0,00	0,10	0,00	0,20	0,10	0,10					
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	977	875	794	707	634	582	545	516	475	445	412	386	367	353	337	317				
	auswertbar	Anzahl	973	827	765	683	572	523	487	451	409	383	355	328	314	299	281	262				
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,45	7,13	7,10	7,19	7,10	7,11	7,12	7,22	7,17	7,17	7,23	7,26	7,23	7,27	7,25	7,33				
		CI Mean	[7,36; 7,54]	[7,04; 7,21]	[7,02; 7,18]	[7,09; 7,28]	[7,00; 7,19]	[7,02; 7,21]	[7,02; 7,23]	[7,10; 7,33]	[7,05; 7,29]	[7,05; 7,28]	[7,11; 7,36]	[7,13; 7,39]	[7,08; 7,37]	[7,12; 7,41]	[7,09; 7,40]	[7,16; 7,49]				
		Median	7,20	7,00	6,90	7,00	6,90	6,90	6,90	7,00	7,00	6,90	7,00	7,00	7,00	7,10	6,90	7,10				
		Fallbasis mittlere Differenz		823	761	681	570	521	485	449	407	381	353	326	312	297	279	260				
		Mittlere Differenz zur ED		-0,31	-0,32	-0,21	-0,30	-0,26	-0,24	-0,11	-0,16	-0,13	-0,02	0,01	-0,04	0,03	0,02	0,07				
		CI mittlere Differenz		[-0,40; -0,23]	[-0,41; -0,23]	[-0,31; -0,11]	[-0,42; -0,19]	[-0,38; -0,15]	[-0,36; -0,11]	[-0,25; -0,03]	[-0,31; -0,01]	[-0,28; -0,03]	[-0,17; -0,13]	[-0,15; -0,17]	[-0,21; -0,14]	[-0,14; -0,20]	[-0,17; -0,20]	[-0,12; -0,25]				
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15						
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1341	1246	1115	979	876	786	735	689	638	604	556	512	482	456	416					
	auswertbar	Anzahl	1336	1173	1053	942	833	750	706	660	609	582	538	499	460	427	406					
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,51	7,17	7,19	7,14	7,17	7,12	7,18	7,16	7,25	7,22	7,30	7,18	7,31	7,31	7,34					
		CI Mean	[7,43; 7,59]	[7,10; 7,23]	[7,12; 7,27]	[7,06; 7,21]	[7,09; 7,25]	[7,03; 7,22]	[7,09; 7,27]	[7,06; 7,25]	[7,15; 7,35]	[7,13; 7,31]	[7,20; 7,41]	[7,08; 7,29]	[7,20; 7,42]	[7,20; 7,42]	[7,21; 7,46]					
		Median	7,20	7,00	7,00	6,90	6,90	6,90	7,00	6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,10	7,00	7,00					
		Fallbasis mittlere Differenz		1168	1049	941	831	749	705	659	608	581	537	498	459	426	405					
		Mittlere Differenz zur ED		-0,32	-0,25	-0,30	-0,24	-0,29	-0,24	-0,26	-0,19	-0,20	-0,12	-0,20	-0,09	-0,10	-0,07					
		CI mittlere Differenz		[-0,39; -0,25]	[-0,33; -0,18]	[-0,39; -0,22]	[-0,33; -0,15]	[-0,39; -0,19]	[-0,34; -0,14]	[-0,37; -0,15]	[-0,31; -0,08]	[-0,31; -0,08]	[-0,25; -0,00]	[-0,33; -0,08]	[-0,22; -0,04]	[-0,23; -0,03]	[-0,22; -0,08]					
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,20	-0,10	-0,20	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10							

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1866	1706	1548	1396	1271	1185	1094	1014	933	852	778	722	685	641					
	auswertbar	Anzahl	1864	1625	1470	1334	1220	1126	1043	946	886	811	753	708	660	613					
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,44	7,27	7,19	7,24	7,21	7,25	7,22	7,30	7,31	7,41	7,31	7,38	7,26	7,30					
		CI Mean	[7,37; 7,51]	[7,21; 7,33]	[7,13; 7,25]	[7,17; 7,31]	[7,14; 7,28]	[7,18; 7,32]	[7,15; 7,29]	[7,21; 7,38]	[7,23; 7,39]	[7,32; 7,49]	[7,22; 7,40]	[7,29; 7,48]	[7,16; 7,35]	[7,21; 7,40]					
		Median	7,10	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,20	7,10	7,10	7,00	7,10				
		Fallbasis mittlere Differenz		1624	1470	1333	1219	1126	1043	946	886	811	753	708	660	613					
		Mittlere Differenz zur ED		-0,17	-0,21	-0,16	-0,19	-0,13	-0,18	-0,09	-0,07	0,01	-0,05	0,03	-0,08	-0,02					
		CI mittlere Differenz		[-0,22; -0,11]	[-0,27; -0,15]	[-0,23; -0,09]	[-0,26; -0,12]	[-0,21; -0,06]	[-0,27; -0,10]	[-0,18; -0,00]	[-0,16; -0,02]	[-0,08; -0,11]	[-0,15; -0,05]	[-0,08; -0,14]	[-0,18; -0,03]	[-0,13; -0,10]					
Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10							
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2166	2034	1807	1621	1514	1405	1318	1212	1127	1026	955	873	815						
	auswertbar	Anzahl	2164	1960	1702	1561	1417	1341	1253	1160	1065	992	910	843	792						
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,53	7,25	7,27	7,22	7,31	7,28	7,31	7,28	7,39	7,45	7,32	7,35	7,24	7,32					
		CI Mean	[7,47; 7,59]	[7,19; 7,31]	[7,21; 7,33]	[7,16; 7,28]	[7,25; 7,38]	[7,21; 7,35]	[7,36; 7,51]	[7,32; 7,46]	[7,37; 7,52]	[7,24; 7,39]	[7,27; 7,43]	[7,15; 7,32]	[7,23; 7,41]						
		Median	7,30	7,00	7,10	7,00	7,10	7,10	7,20	7,20	7,20	7,10	7,10	7,10	7,00	7,10					
		Fallbasis mittlere Differenz		1959	1700	1559	1415	1339	1251	1158	1064	991	909	842	791						
		Mittlere Differenz zur ED		-0,28	-0,25	-0,30	-0,20	-0,22	-0,03	-0,08	0,01	-0,11	-0,04	-0,15	-0,05						
		CI mittlere Differenz		[-0,33; -0,23]	[-0,31; -0,19]	[-0,37; -0,24]	[-0,27; -0,13]	[-0,29; -0,14]	[-0,11; -0,04]	[-0,16; -0,00]	[-0,07; -0,09]	[-0,19; -0,02]	[-0,13; -0,05]	[-0,25; -0,06]	[-0,15; -0,05]						
Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,20	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00								
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	2651	2513	2278	2097	1861	1731	1580	1480	1370	1258	1164	1081							
	auswertbar	Anzahl	2648	2367	2128	1919	1721	1598	1509	1392	1284	1184	1112	1038							
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,35	7,23	7,14	7,19	7,12	7,24	7,23	7,31	7,22	7,28	7,20	7,29							
		CI Mean	[7,30; 7,40]	[7,18; 7,28]	[7,09; 7,20]	[7,13; 7,25]	[7,06; 7,17]	[7,18; 7,31]	[7,17; 7,29]	[7,24; 7,37]	[7,15; 7,28]	[7,21; 7,35]	[7,13; 7,27]	[7,22; 7,36]							
		Median	7,10	7,00	6,90	7,00	6,90	7,00	7,00	7,10	7,00	7,10	7,00	7,10							
		Fallbasis mittlere Differenz		2364	2125	1917	1720	1597	1508	1391	1283	1184	1112	1038							
		Mittlere Differenz zur ED		-0,08	-0,15	-0,09	-0,14	0,00	-0,02	0,06	-0,04	0,03	-0,06	0,04							
		CI mittlere Differenz		[-0,12; -0,04]	[-0,19; -0,10]	[-0,15; -0,04]	[-0,19; -0,08]	[-0,06; -0,06]	[-0,08; -0,04]	[-0,01; -0,12]	[-0,11; -0,02]	[-0,05; -0,10]	[-0,13; -0,02]	[-0,04; -0,12]							
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	-0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10									
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	3003	2836	2647	2355	2190	2031	1894	1746	1599	1490	1402								
	auswertbar	Anzahl	3001	2686	2436	2200	2032	1939	1818	1662	1537	1443	1350								
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,37	7,15	7,20	7,16	7,25	7,24	7,30	7,24	7,31	7,26	7,32								
		CI Mean	[7,32; 7,42]	[7,11; 7,20]	[7,15; 7,25]	[7,11; 7,21]	[7,19; 7,30]	[7,19; 7,30]	[7,24; 7,35]	[7,18; 7,30]	[7,25; 7,38]	[7,20; 7,33]	[7,26; 7,39]								
		Median	7,10	6,90	7,00	6,90	7,00	7,00	7,10	7,00	7,10	7,00	7,10								
		Fallbasis mittlere Differenz		2685	2435	2199	2031	1938	1817	1661	1536	1442	1349								
		Mittlere Differenz zur ED		-0,17	-0,11	-0,17	-0,08	-0,09	-0,02	-0,07	0,02	-0,03	0,02								
		CI mittlere Differenz		[-0,21; -0,13]	[-0,16; -0,07]	[-0,22; -0,11]	[-0,14; -0,03]	[-0,15; -0,03]	[-0,08; -0,04]	[-0,14; -0,11]	[-0,05; -0,09]	[-0,11; -0,04]	[-0,05; -0,09]								
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10										
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1608	1538	1387	1257	1135	1033	940	866	805	744									
	auswertbar	Anzahl	1607	1436	1249	1154	1069	976	890	818	773	710									
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,39	7,25	7,19	7,27	7,28	7,36	7,27	7,28	7,20	7,27									
		CI Mean	[7,31; 7,46]	[7,18; 7,32]	[7,12; 7,26]	[7,19; 7,35]	[7,20; 7,35]	[7,28; 7,45]	[7,19; 7,35]	[7,19; 7,36]	[7,11; 7,28]	[7,18; 7,37]									
		Median	7,00	7,00	6,90	7,00	7,00	7,10	7,00	7,00	6,90	7,10									
		Fallbasis mittlere Differenz		1436	1249	1154	1069	975	889	817	772	709									
		Mittlere Differenz zur ED		-0,12	-0,18	-0,11	-0,07	0,01	-0,10	-0,09	-0,14	-0,04									
		CI mittlere Differenz		[-0,19; -0,06]	[-0,25; -0,11]	[-0,19; -0,02]	[-0,16; -0,01]	[-0,08; -0,11]	[-0,20; -0,00]	[-0,20; -0,02]	[-0,25; -0,02]	[-0,16; -0,07]									
Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10											
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1413	1356	1237	1102	998	925	869	796	733										
	auswertbar	Anzahl	1412	1251	1135	1040	952	889	834	763	694										
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,36	7,09	7,10	7,13	7,10	7,08	7,14	7,07	7,13										
		CI Mean	[7,28; 7,44]	[7,02; 7,16]	[7,03; 7,17]	[7,05; 7,20]	[7,02; 7,17]	[7,00; 7,17]	[7,06; 7,23]	[6,98; 7,15]	[7,04; 7,22]										
		Median	7,00	6,80	6,90	6,90	6,80	6,80	6,90	6,80	6,90										
		Fallbasis mittlere Differenz		1250	1135	1040	952	889	834	763	694										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,23	-0,18	-0,12	-0,14	-0,16	-0,10	-0,19	-0,10										
		CI mittlere Differenz		[-0,29; -0,16]	[-0,25; -0,11]	[-0,20; -0,04]	[-0,22; -0,06]	[-0,25; -0,07]	[-0,19; -0,01]	[-0,29; -0,09]	[-0,20; -0,00]										
Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	879	835	760	685	627	579	537	502										
	auswertbar	Anzahl	879	794	708	647	594	549	510	473										
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,41	7,21	7,26	7,32	7,23	7,26	7,16	7,26										
		CI Mean	[7,31; 7,51]	[7,12; 7,30]	[7,16; 7,36]	[7,22; 7,43]	[7,13; 7,34]	[7,15; 7,36]	[7,04; 7,27]	[7,16; 7,37]										
		Median	7,00	7,00	6,95	7,10	7,00	7,00	6,90	7,00										
		Fallbasis mittlere Differenz		794	708	647	594	549	510	473										
		Mittlere Differenz zur ED		-0,17	-0,11	-0,01	-0,10	-0,09	-0,20	-0,09										
		CI mittlere Differenz		[-0,26; -0,08]	[-0,21; 0,00]	[-0,12; 0,11]	[-0,22; 0,03]	[-0,21; 0,02]	[-0,33; 0,07]	[-0,23; 0,05]										
		Median mittlere Differenz		0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10										
	2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	759	709	644	573	519	481	447										
auswertbar		Anzahl	759	670	602	543	490	460	428											
Auswertungsergebnisse zum HbA1c		Mean	7,48	7,12	7,23	7,05	7,08	7,01	7,14											
		CI Mean	[7,36; 7,59]	[7,02; 7,21]	[7,13; 7,34]	[6,95; 7,15]	[6,97; 7,19]	[6,90; 7,12]	[7,02; 7,26]											
		Median	7,10	6,85	6,95	6,80	6,80	6,70	6,90											
		Fallbasis mittlere Differenz		670	602	543	490	460	428											
		Mittlere Differenz zur ED		-0,33	-0,19	-0,36	-0,35	-0,40	-0,24											
		CI mittlere Differenz		[-0,44; -0,23]	[-0,32; -0,07]	[-0,49; -0,23]	[-0,49; -0,20]	[-0,55; -0,25]	[-0,38; -0,11]											
		Median mittlere Differenz		-0,10	0,00	-0,20	-0,10	-0,10	0,00											
2009-2		Patienten insgesamt	Anzahl	765	727	649	584	516	473											
	auswertbar	Anzahl	763	693	593	542	491	449												
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,43	7,22	7,12	7,19	7,04	7,19												
		CI Mean	[7,33; 7,54]	[7,12; 7,31]	[7,02; 7,22]	[7,08; 7,29]	[6,93; 7,14]	[7,07; 7,30]												
		Median	7,10	6,90	6,90	6,90	6,90	7,00												
		Fallbasis mittlere Differenz		691	591	540	490	448												
		Mittlere Differenz zur ED		-0,19	-0,29	-0,21	-0,36	-0,22												
		CI mittlere Differenz		[-0,29; -0,10]	[-0,40; -0,18]	[-0,33; -0,09]	[-0,48; -0,23]	[-0,36; -0,09]												
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	0,00	-0,20	-0,10												
	2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	844	795	710	649	600												
auswertbar		Anzahl	843	763	674	621	564													
Auswertungsergebnisse zum HbA1c		Mean	7,46	7,13	7,19	7,10	7,17													
		CI Mean	[7,36; 7,56]	[7,05; 7,22]	[7,10; 7,29]	[7,01; 7,19]	[7,07; 7,27]													
		Median	7,20	7,00	7,00	6,90	6,90													
		Fallbasis mittlere Differenz		762	673	620	563													
		Mittlere Differenz zur ED		-0,33	-0,23	-0,29	-0,24													
		CI mittlere Differenz		[-0,42; -0,24]	[-0,33; -0,14]	[-0,39; -0,19]	[-0,35; -0,13]													
		Median mittlere Differenz		-0,10	-0,10	-0,10	-0,10													
2010-2		Patienten insgesamt	Anzahl	914	879	799	716													
	auswertbar	Anzahl	914	842	738	690														
	Auswertungsergebnisse zum HbA1c	Mean	7,39	7,16	7,06	7,17														
		CI Mean	[7,29; 7,49]	[7,08; 7,24]	[6,97; 7,14]	[7,07; 7,26]														
		Median	7,00	6,90	6,75	6,80														
		Fallbasis mittlere Differenz		842	738	690														
		Mittlere Differenz zur ED		-0,21	-0,28	-0,16														
		CI mittlere Differenz		[-0,29; -0,13]	[-0,38; -0,19]	[-0,26; -0,05]														
		Median mittlere Differenz		0,00	-0,10	-0,05														
	2011-1	Patienten insgesamt	Anzahl	952	920	836														
auswertbar		Anzahl	952	882	794															
Auswertungsergebnisse zum HbA1c		Mean	7,46	7,06	7,18															
		CI Mean	[7,36; 7,55]	[6,98; 7,14]	[7,09; 7,27]															
		Median	7,10	6,80	6,90															
		Fallbasis mittlere Differenz		882	794															
		Mittlere Differenz zur ED		-0,37	-0,23															
		CI mittlere Differenz		[-0,45; -0,28]	[-0,32; -0,14]															
		Median mittlere Differenz		-0,20	-0,10															

EZ	Patienten und ihre HbA1c-Konzentration, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	823	787																			
	auswertbar	Anzahl	823	763																			
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,44	7,21																			
		CI Mean	[7,33; 7,54]	[7,11; 7,30]																			
		Median	7,00	6,90																			
		Fallbasis mittlere Differenz		763																			
		Mittlere Differenz zur ED			-0,21																		
		CI mittlere Differenz			[-0,30; -0,12]																		
		Median mittlere Differenz			0,00																		
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	875																				
	auswertbar	Anzahl	874																				
	Auswertungs- ergebnisse zum HbA1c	Mean	7,50																				
		CI Mean	[7,39; 7,61]																				
		Median	7,10																				
		Fallbasis mittlere Differenz																					
		Mittlere Differenz zur ED																					
		CI mittlere Differenz																					
		Median mittlere Differenz																					

In Tabelle C.3.2.2 wird die Verteilung der Patienten auf die HbA1c-Kategorien dargestellt. Für jede Kohorte wird dazu unter „Patienten insgesamt“ zunächst die Patientenzahl der Restkohorte angegeben, d.h. derjenigen Patienten, die im Berichtshalb-jahr noch Programmteilnehmer waren. In der Zeile „auswertbar“ werden diejenigen Patienten ausgewiesen, für die im jeweiligen Berichtshalb-jahr plausible Angaben zum HbA1c-Wert vorliegen. Anschließend wird für jedes Berichtshalb-jahr dargestellt, wie sich diese auswertbaren Patienten auf die HbA1c-Kategorien verteilen.

In der Kohorte 2003-1 waren im Beitritts-halb-jahr 4180 Patienten in das Programm eingeschrieben. Für 4179 Patienten lagen auswertbare Daten vor. 49,32 Prozent dieser Patienten lagen mit ihrem gemessenen HbA1c-Wert im „oberen Zielbereich“. Im letzten Berichtshalb-jahr wurden dieser Kategorie 50,24 Prozent, der dann noch eingeschriebenen und auswertbaren Patienten zugeordnet.

Alle Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die Subkohorte derjenigen Patienten, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation ausschließlich sekundäre Endpunkte dokumentiert waren.

Tabelle C.3.2.2 Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halb-jahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr	
2003-1	Patienten insgesamt	Anzahl	4180	3803	3367	2999	2686	2457	2223	1847	1673	1510	1428	1306	1236	1155	1091	1032	978	912	862
	auswertbar	Anzahl	4179	3039	3176	2937	2613	2415	2095	1800	1625	1470	1352	1252	1202	1122	1062	1003	949	895	838
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	543	510	447	464	377	350	281	244	205	196	178	161	120	129	112	120	92	108	96
		Anteil in %	12,99	16,78	14,07	15,80	14,43	14,49	13,41	13,56	12,62	13,33	13,17	12,86	9,98	11,50	10,55	11,96	9,69	12,07	11,46
		CI Anteil in %	[11,97; 14,01]	[15,45; 18,11]	[12,86; 15,28]	[14,48; 17,12]	[13,08; 15,78]	[13,09; 15,90]	[11,95; 14,87]	[11,97; 15,14]	[11,00; 14,23]	[11,59; 15,07]	[11,36; 14,97]	[11,00; 14,71]	[8,29; 11,68]	[9,63; 13,36]	[8,70; 12,39]	[9,95; 13,97]	[7,81; 11,58]	[9,93; 14,20]	[9,30; 13,61]
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	2061	1573	1601	1594	1304	1308	1094	997	888	800	705	704	668	579	534	510	486	477	421
		Anteil in %	49,32	51,76	50,41	54,27	49,90	54,16	52,22	55,39	54,65	54,42	52,14	56,23	55,57	51,60	50,28	50,85	51,21	53,30	50,24
		CI Anteil in %	[47,80; 50,83]	[49,98; 53,54]	[48,67; 52,15]	[52,47; 56,08]	[47,99; 51,82]	[52,17; 56,15]	[50,08; 54,36]	[53,09; 57,69]	[52,22; 57,07]	[51,87; 56,97]	[49,48; 54,81]	[53,48; 58,98]	[52,76; 58,38]	[48,68; 54,53]	[47,27; 53,29]	[47,75; 53,94]	[48,03; 54,39]	[50,03; 56,57]	[46,85; 53,63]
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	915	592	700	556	593	470	427	347	319	305	280	247	254	250	251	231	235	195	180
		Anteil in %	21,90	19,48	22,04	18,93	22,69	19,46	20,38	19,28	19,63	20,75	20,71	19,73	21,13	22,28	23,63	23,03	24,76	21,79	21,48
		CI Anteil in %	[20,64; 23,15]	[18,07; 20,89]	[20,60; 23,48]	[17,51; 20,35]	[21,09; 24,30]	[17,88; 21,04]	[18,66; 22,11]	[17,45; 21,10]	[17,70; 21,56]	[18,67; 22,82]	[18,55; 22,87]	[17,52; 21,93]	[18,82; 23,44]	[19,85; 24,72]	[21,08; 26,19]	[20,42; 25,64]	[22,02; 27,51]	[19,08; 24,49]	[18,70; 24,26]
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	489	289	330	260	261	228	233	166	168	136	141	107	125	136	125	107	105	94	109
		Anteil in %	11,70	9,51	10,39	8,85	9,99	9,44	11,12	9,22	10,34	9,25	10,43	8,55	10,40	12,12	11,77	10,67	11,06	10,50	13,01
		CI Anteil in %	[10,73; 12,68]	[8,47; 10,55]	[9,33; 11,45]	[7,83; 9,88]	[8,84; 11,14]	[8,27; 10,61]	[9,78; 12,47]	[7,89; 10,56]	[8,86; 11,82]	[7,77; 10,73]	[8,80; 12,06]	[7,00; 10,10]	[8,67; 12,13]	[10,21; 14,03]	[9,83; 13,71]	[8,76; 12,58]	[9,07; 13,06]	[8,49; 12,51]	[10,73; 15,29]
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	171	75	98	63	78	59	60	46	45	33	48	33	35	28	40	35	31	21	32	
	Anteil in %	4,09	2,47	3,09	2,15	2,99	2,44	2,86	2,56	2,77	2,24	3,55	2,64	2,91	2,50	3,77	3,49	3,27	2,35	3,82	
	CI Anteil in %	[3,49; 4,69]	[1,92; 3,02]	[2,48; 3,69]	[1,62; 2,67]	[2,33; 3,64]	[1,83; 3,06]	[2,15; 3,58]	[1,83; 3,28]	[1,97; 3,57]	[1,49; 3,00]	[2,56; 4,54]	[1,75; 3,52]	[1,96; 3,86]	[1,58; 3,41]	[2,62; 4,91]	[2,35; 4,63]	[2,14; 4,40]	[1,35; 3,34]	[2,52; 5,12]	
2003-2	Patienten insgesamt	Anzahl	3146	2692	2391	2109	1897	1699	1524	1359	1213	1145	1060	1007	948	884	825	772	719	676	
	auswertbar	Anzahl	3141	2451	2313	2045	1841	1625	1464	1300	1180	1100	1013	956	918	859	802	754	699	653	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	464	371	377	295	262	211	210	174	166	143	130	105	99	85	85	77	80	62	
		Anteil in %	14,77	15,14	16,30	14,43	14,23	12,98	14,34	13,38	14,07	13,00	12,83	10,98	10,78	9,90	10,60	10,21	11,44	9,49	
		CI Anteil in %	[13,53; 16,01]	[13,72; 16,56]	[14,79; 17,80]	[12,90; 15,95]	[12,64; 15,83]	[11,35; 14,62]	[12,55; 16,14]	[11,53; 15,24]	[12,08; 16,05]	[11,01; 14,99]	[10,77; 14,89]	[9,00; 12,97]	[8,78; 12,79]	[7,90; 11,89]	[8,47; 12,73]	[8,05; 12,38]	[9,08; 13,81]	[7,24; 11,74]	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	1526	1234	1220	1047	1000	858	794	688	649	598	568	514	501	455	439	408	393	340	
		Anteil in %	48,58	50,35	52,75	51,20	54,32	52,80	54,23	52,92	55,00	54,36	56,07	53,77	54,58	52,97	54,74	54,11	56,22	52,07	
		CI Anteil in %	[46,84; 50,33]	[48,37; 52,33]	[50,71; 54,78]	[49,03; 53,37]	[52,04; 56,59]	[50,37; 55,23]	[51,68; 56,79]	[50,21; 55,64]	[52,16; 57,84]	[51,42; 57,31]	[53,01; 59,13]	[50,60; 56,93]	[51,35; 57,80]	[49,63; 56,31]	[51,29; 58,19]	[50,55; 57,67]	[52,54; 59,90]	[48,23; 55,90]	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	654	527	453	417	340	326	298	275	228	220	200	197	199	197	178	166	139	151	
		Anteil in %	20,82	21,50	19,58	20,39	18,47	20,06	20,36	21,15	19,32	20,00	19,74	20,61	21,68	22,93	22,19	22,02	19,89	23,12	
		CI Anteil in %	[19,40; 22,24]	[19,87; 23,13]	[17,97; 21,20]	[18,64; 22,14]	[16,70; 20,24]	[18,11; 22,01]	[18,29; 22,42]	[18,93; 23,37]	[17,07; 21,58]	[17,64; 22,36]	[17,29; 22,20]	[18,04; 23,17]	[19,01; 24,34]	[20,12; 25,75]	[19,32; 25,07]	[19,06; 24,98]	[16,92; 22,85]	[19,89; 26,36]	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	375	262	216	227	190	185	123	123	105	109	85	107	94	90	80	81	73	77	
		Anteil in %	11,94	10,69	9,34	11,10	10,32	11,38	8,40	9,46	8,90	9,91	8,39	11,19	10,24	10,48	9,98	10,74	10,44	11,79	
		CI Anteil in %	[10,80; 13,07]	[9,47; 11,91]	[8,15; 10,52]	[9,74; 12,46]	[8,93; 11,71]	[9,84; 12,93]	[6,98; 9,82]	[7,87; 11,05]	[7,27; 10,52]	[8,14; 11,68]	[6,68; 10,10]	[9,19; 13,19]	[8,28; 12,20]	[8,43; 12,53]	[7,90; 12,05]	[8,53; 12,95]	[8,17; 12,71]	[9,32; 14,27]	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	122	57	47	59	49	45	39	40	32	30	30	33	25	32	20	22	14	23		
	Anteil in %	3,88	2,33	2,03	2,89	2,66	2,77	2,66	3,08	2,71	2,73	2,96	3,45	2,72	3,73	2,49	2,92	2,00	3,52		
	CI Anteil in %	[3,21; 4,56]	[1,73; 2,92]	[1,46; 2,61]	[2,16; 3,61]	[1,93; 3,40]	[1,97; 3,57]	[1,84; 3,49]	[2,14; 4,02]	[1,78; 3,64]	[1,76; 3,69]	[1,92; 4,01]	[2,29; 4,61]	[1,67; 3,78]	[2,46; 4,99]	[1,41; 3,57]	[1,72; 4,12]	[0,96; 3,04]	[2,11; 4,94]		

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr
2004-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1120	985	883	798	695	610	557	500	466	428	391	360	337	316	293	268	255	
	auswertbar	Anzahl	1118	936	850	770	669	578	537	470	421	398	362	339	320	295	278	253	240	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	120	147	104	78	65	69	59	55	36	37	30	28	28	18	10	11	8	
		Anteil in %	10,73	15,71	12,24	10,13	9,72	11,94	10,99	11,70	8,55	9,30	8,29	8,26	8,75	6,10	3,60	4,35	3,33	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[8,92; 12,55]	[13,37; 18,04]	[10,03; 14,44]	[8,00; 12,26]	[7,47; 11,96]	[9,29; 14,58]	[8,34; 13,63]	[8,79; 14,61]	[5,88; 11,23]	[6,44; 12,15]	[5,44; 11,13]	[5,32; 11,19]	[5,65; 11,85]	[3,37; 8,84]	[1,40; 5,79]	[1,83; 6,87]	[1,06; 5,61]	
		Anzahl	487	481	443	429	363	294	277	252	224	220	189	168	155	162	147	132	122	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	43,56	51,39	52,12	55,71	54,26	50,87	51,58	53,62	53,21	55,28	52,21	49,56	48,44	54,92	52,88	52,17	50,83	
		CI Anteil in %	[40,65; 46,47]	[48,19; 54,59]	[48,76; 55,48]	[52,20; 59,23]	[50,48; 58,04]	[46,79; 54,94]	[47,35; 55,81]	[49,10; 58,13]	[48,43; 57,98]	[50,39; 60,17]	[47,06; 57,36]	[44,23; 54,89]	[42,95; 53,92]	[49,23; 60,60]	[47,00; 58,76]	[46,01; 58,34]	[44,50; 57,17]	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	267	206	187	162	136	137	124	91	95	92	82	78	76	69	70	68	64	
		Anteil in %	23,88	22,01	22,00	21,04	20,33	23,70	23,09	19,36	22,57	23,12	22,65	23,01	23,75	23,39	25,18	26,88	26,67	
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[21,38; 26,38]	[19,35; 24,66]	[19,21; 24,79]	[18,16; 23,92]	[17,28; 23,38]	[20,23; 27,17]	[19,52; 26,66]	[15,79; 22,94]	[18,57; 26,56]	[18,97; 27,26]	[18,33; 26,97]	[18,52; 27,50]	[19,08; 28,42]	[18,55; 28,23]	[20,07; 30,29]	[21,40; 32,35]	[21,06; 32,27]	
		Anzahl	179	79	92	75	83	65	59	52	50	40	45	51	46	31	34	26	40	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	16,01	8,44	10,82	9,74	12,41	11,25	10,99	11,06	11,88	10,05	12,43	15,04	14,38	10,51	12,23	10,28	16,67	
		CI Anteil in %	[13,86; 18,16]	[6,66; 10,22]	[8,73; 12,91]	[7,64; 11,84]	[9,91; 14,91]	[8,67; 13,82]	[8,34; 13,63]	[8,22; 13,90]	[8,78; 14,97]	[7,09; 13,01]	[9,03; 15,83]	[11,23; 18,86]	[10,52; 18,23]	[7,00; 14,01]	[8,37; 16,09]	[6,53; 14,03]	[11,94; 21,39]	
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	65	23	24	26	22	13	18	20	16	9	16	14	15	15	17	16	6		
	Anteil in %	5,81	2,46	2,82	3,38	3,29	2,25	3,35	4,26	3,80	2,26	4,42	4,13	4,69	5,08	6,12	6,32	2,50		
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[4,44; 7,19]	[1,46; 3,45]	[1,71; 3,94]	[2,10; 4,65]	[1,94; 4,64]	[1,04; 3,46]	[1,83; 4,88]	[2,43; 6,08]	[1,97; 5,63]	[0,80; 3,72]	[2,30; 6,54]	[2,01; 6,25]	[2,37; 7,01]	[2,57; 7,60]	[3,29; 8,94]	[3,32; 9,33]	[0,52; 4,48]		
	Anzahl	977	875	794	707	634	582	545	516	475	445	412	386	367	353	337	317			
2004-2	Patienten insgesamt	Anzahl	977	875	794	707	634	582	545	516	475	445	412	386	367	353	337	317		
	auswertbar	Anzahl	973	827	765	683	572	523	487	451	409	383	355	328	314	299	281	262		
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	150	151	131	105	109	72	85	68	72	57	50	39	43	39	41	30		
		Anteil in %	15,42	18,26	17,12	15,37	19,06	13,77	17,45	15,08	17,60	14,88	14,08	11,89	13,69	13,04	14,59	11,45		
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[13,15; 17,69]	[15,62; 20,89]	[14,45; 19,80]	[12,67; 18,08]	[15,83; 22,28]	[10,81; 16,72]	[14,08; 20,83]	[11,77; 18,38]	[13,91; 21,30]	[11,31; 18,45]	[10,46; 17,71]	[8,38; 15,40]	[9,89; 17,50]	[9,22; 16,87]	[10,46; 18,73]	[7,59; 15,31]		
		Anzahl	430	435	415	368	303	305	260	238	214	204	186	178	170	161	147	143		
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	44,19	52,60	54,25	53,88	52,97	58,32	53,39	52,77	52,32	53,26	52,39	54,27	54,14	53,85	52,31	54,58		
		CI Anteil in %	[41,07; 47,32]	[49,19; 56,01]	[50,72; 57,78]	[50,14; 57,62]	[48,88; 57,07]	[54,09; 62,55]	[48,95; 57,82]	[48,16; 57,38]	[47,48; 57,17]	[48,26; 58,27]	[47,19; 57,60]	[48,87; 59,67]	[48,62; 59,66]	[48,19; 59,51]	[46,46; 58,16]	[48,54; 60,62]		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	201	145	139	114	94	87	86	89	70	73	68	66	60	58	51	41		
		Anteil in %	20,66	17,53	18,17	16,69	16,43	16,63	17,66	19,73	17,11	19,06	19,15	20,12	19,11	19,40	18,15	15,65		
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[18,11; 23,20]	[14,94; 20,13]	[15,44; 20,90]	[13,89; 19,49]	[13,39; 19,47]	[13,44; 19,83]	[14,27; 21,05]	[16,06; 23,41]	[13,46; 20,77]	[15,12; 23,00]	[15,06; 23,25]	[15,78; 24,47]	[14,75; 23,46]	[14,91; 23,89]	[13,63; 22,66]	[11,24; 20,06]		
		Anzahl	138	73	60	71	53	44	41	44	42	42	45	39	31	29	31	40		
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	14,18	8,83	7,84	10,40	9,27	8,41	8,42	9,76	10,27	10,97	12,68	11,89	9,87	9,70	11,03	15,27		
		CI Anteil in %	[11,99; 16,38]	[6,89; 10,76]	[5,94; 9,75]	[8,10; 12,69]	[6,89; 11,64]	[6,03; 10,79]	[5,95; 10,89]	[7,01; 12,50]	[7,32; 13,21]	[7,83; 14,10]	[9,21; 16,14]	[8,38; 15,40]	[6,57; 13,18]	[6,34; 13,06]	[7,36; 14,70]	[10,90; 19,63]		
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	54	23	20	25	13	15	15	12	11	7	6	6	10	12	11	8			
	Anteil in %	5,55	2,78	2,61	3,66	2,27	2,87	3,08	2,66	2,69	1,83	1,69	1,83	3,18	4,01	3,91	3,05			
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[4,11; 6,99]	[1,66; 3,90]	[1,48; 3,75]	[2,25; 5,07]	[1,05; 3,50]	[1,44; 4,30]	[1,54; 4,62]	[1,17; 4,15]	[1,12; 4,26]	[0,48; 3,17]	[0,35; 3,03]	[0,38; 3,28]	[1,24; 5,13]	[1,78; 6,24]	[1,64; 6,19]	[0,97; 5,14]			
	Anzahl	1341	1246	1115	979	876	786	735	689	638	604	556	512	482	456	416				
2005-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1341	1246	1115	979	876	786	735	689	638	604	556	512	482	456	416			
	auswertbar	Anzahl	1336	1173	1053	942	833	750	706	660	609	582	538	499	460	427	406			
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	157	182	152	142	114	116	96	95	81	70	63	69	45	46	46			
		Anteil in %	11,75	15,52	14,43	15,07	13,69	15,47	13,60	14,39	13,30	12,03	11,71	13,83	9,78	10,77	11,33			
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[10,02; 13,48]	[13,44; 17,59]	[12,31; 16,56]	[12,79; 17,36]	[11,35; 16,02]	[12,88; 18,06]	[11,07; 16,13]	[11,71; 17,07]	[10,60; 16,00]	[9,38; 14,67]	[8,99; 14,43]	[10,80; 16,86]	[7,06; 12,50]	[7,83; 13,72]	[8,24; 14,42]			
		Anzahl	638	634	582	525	476	429	407	378	329	336	300	282	255	225	215			
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	47,75	54,05	55,27	55,73	57,14	57,20	57,65	57,27	54,02	57,73	55,76	56,51	55,43	52,69	52,96			
		CI Anteil in %	[45,08; 50,43]	[51,20; 56,90]	[52,27; 58,28]	[52,56; 58,91]	[53,78; 60,51]	[53,66; 60,74]	[54,00; 61,30]	[53,50; 61,05]	[50,06; 57,98]	[53,72; 61,75]	[51,56; 59,96]	[52,16; 60,87]	[50,89; 59,98]	[47,95; 57,43]	[48,09; 57,82]			
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	274	216	195	167	136	116	117	105	122	97	95	89	96	95	78			
		Anteil in %	20,51	18,41	18,52	17,73	16,33	15,47	16,57	15,91	20,03	16,67	17,66	17,84	20,87	22,25	19,21			
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[18,34; 22,67]	[16,20; 20,63]	[16,17; 20,87]	[15,29; 20,17]	[13,82; 18,84]	[12,88; 18,06]	[13,83; 19,32]	[13,12; 18,70]	[16,85; 23,21]	[13,64; 19,70]	[14,43; 20,88]	[14,47; 21,20]	[17,15; 24,59]	[18,30; 26,20]	[15,37; 23,05]			
		Anzahl	187	112	88	74	83	62	66	62	62	68	63	47	49	51	52			
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	14,00	9,55	8,36	7,86	9,96	8,27	9,35	9,39	10,18	11,68	11,71	9,42	10,65	11,94	12,81			
		CI Anteil in %	[12,14; 15,86]	[7,87; 11,23]	[6,68; 10,03]	[6,14; 9,57]	[7,93; 12,00]	[6,29; 10,24]	[7,20; 11,50]	[7,17; 11,62]	[7,78; 12,58]	[9,07; 14,30]	[8,99; 14,43]	[6,85; 11,98]	[7,83; 13,47]	[8,86; 15,02]	[9,55; 16,06]			
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	80	29	36	34	24	27	20	20	15	11	17	12	15	15					
	Anteil in %	5,99	2,47	3,42	3,61	2,88	3,60	2,83	3,03	2,46	1,89	3,16	2,40	3,26	2,34	3,69				
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[4,72; 7,26]	[1,58; 3,36]	[2,32; 4,52]	[2,42; 4,80]	[1,74; 4,02]	[2,27; 4,93]	[1,61; 4,06]	[1,72; 4,34]	[1,23; 3,70]	[0,78; 3,00]	[1,68; 4,64]	[1,06; 3,75]	[1,64; 4,89]	[0,91; 3,78]	[1,86; 5,53]				

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2005-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1866	1706	1548	1396	1271	1185	1094	1014	933	852	778	722	685	641						
	auswertbar	Anzahl	1864	1625	1470	1334	1220	1126	1043	946	886	811	753	708	660	613						
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	236	211	232	195	194	162	141	117	102	81	89	79	77	64						
		Anteil in %	12,66	12,98	15,78	14,62	15,90	14,39	13,52	12,37	11,51	9,99	11,82	11,16	11,67	10,44						
	CI Anteil in %	[11,15; 14,17]	[11,35; 14,62]	[13,92; 17,65]	[12,72; 16,51]	[13,85; 17,95]	[12,34; 16,44]	[11,44; 15,59]	[10,27; 14,47]	[9,41; 13,62]	[7,92; 12,05]	[9,51; 14,13]	[8,84; 13,48]	[9,22; 14,12]	[8,02; 12,86]							
		CI Anteil in %	[11,15; 14,17]	[11,35; 14,62]	[13,92; 17,65]	[12,72; 16,51]	[13,85; 17,95]	[12,34; 16,44]	[11,44; 15,59]	[10,27; 14,47]	[9,41; 13,62]	[7,92; 12,05]	[9,51; 14,13]	[8,84; 13,48]	[9,22; 14,12]	[8,02; 12,86]						
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	919	868	777	716	658	602	574	498	477	419	410	370	365	332						
		Anteil in %	49,30	53,42	52,86	53,67	53,93	53,46	55,03	52,64	53,84	51,66	54,45	52,26	55,30	54,16						
	CI Anteil in %	[47,03; 51,57]	[50,99; 55,84]	[50,30; 55,41]	[51,00; 56,35]	[51,14; 56,73]	[50,55; 56,38]	[52,01; 58,05]	[49,46; 55,83]	[50,55; 57,12]	[48,22; 55,11]	[50,89; 58,01]	[48,58; 55,94]	[51,51; 59,10]	[50,21; 58,11]							
		CI Anteil in %	[47,03; 51,57]	[50,99; 55,84]	[50,30; 55,41]	[51,00; 56,35]	[51,14; 56,73]	[50,55; 56,38]	[52,01; 58,05]	[49,46; 55,83]	[50,55; 57,12]	[48,22; 55,11]	[50,89; 58,01]	[48,58; 55,94]	[51,51; 59,10]	[50,21; 58,11]						
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	362	313	284	250	215	198	184	194	179	193	149	149	133	129						
		Anteil in %	19,42	19,26	19,32	18,74	17,62	17,58	17,64	20,51	20,20	23,80	19,79	21,05	20,15	21,04						
	CI Anteil in %	[17,62; 21,22]	[17,34; 21,18]	[17,30; 21,34]	[16,65; 20,84]	[15,48; 19,76]	[15,36; 19,81]	[15,33; 19,96]	[17,93; 23,08]	[17,56; 22,85]	[20,87; 26,73]	[16,94; 22,64]	[18,04; 24,05]	[17,09; 23,21]	[17,81; 24,27]							
		CI Anteil in %	[17,62; 21,22]	[17,34; 21,18]	[17,30; 21,34]	[16,65; 20,84]	[15,48; 19,76]	[15,36; 19,81]	[15,33; 19,96]	[17,93; 23,08]	[17,56; 22,85]	[20,87; 26,73]	[16,94; 22,64]	[18,04; 24,05]	[17,09; 23,21]	[17,81; 24,27]						
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	242	172	130	121	103	124	116	103	97	79	79	79	63	74							
	Anteil in %	12,98	10,58	8,84	9,07	8,44	11,01	11,12	10,89	10,95	9,74	10,49	11,16	9,55	12,07							
CI Anteil in %	[11,46; 14,51]	[9,09; 12,08]	[7,39; 10,30]	[7,53; 10,61]	[6,88; 10,00]	[9,18; 12,84]	[9,21; 13,03]	[8,90; 12,87]	[8,89; 13,01]	[7,70; 11,78]	[8,30; 12,68]	[8,84; 13,48]	[7,30; 11,79]	[9,49; 14,65]								
	CI Anteil in %	[11,46; 14,51]	[9,09; 12,08]	[7,39; 10,30]	[7,53; 10,61]	[6,88; 10,00]	[9,18; 12,84]	[9,21; 13,03]	[8,90; 12,87]	[8,89; 13,01]	[7,70; 11,78]	[8,30; 12,68]	[8,84; 13,48]	[7,30; 11,79]	[9,49; 14,65]							
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	105	61	47	52	50	40	28	34	31	39	26	31	22	14							
	Anteil in %	5,63	3,75	3,20	3,90	4,10	3,55	2,68	3,59	3,50	4,81	3,45	4,38	3,33	2,28							
CI Anteil in %	[4,59; 6,68]	[2,83; 4,68]	[2,30; 4,10]	[2,86; 4,94]	[2,99; 5,21]	[2,47; 4,63]	[1,70; 3,67]	[2,41; 4,78]	[2,29; 4,71]	[3,34; 6,28]	[2,15; 4,76]	[2,87; 5,89]	[1,96; 4,70]	[1,10; 3,47]								
	CI Anteil in %	[4,59; 6,68]	[2,83; 4,68]	[2,30; 4,10]	[2,86; 4,94]	[2,99; 5,21]	[2,47; 4,63]	[1,70; 3,67]	[2,41; 4,78]	[2,29; 4,71]	[3,34; 6,28]	[2,15; 4,76]	[2,87; 5,89]	[1,96; 4,70]	[1,10; 3,47]							
2006-1	Patienten insgesamt	Anzahl	2166	2034	1807	1621	1514	1405	1318	1212	1127	1026	955	873	815							
	auswertbar	Anzahl	2164	1960	1702	1561	1417	1341	1253	1160	1065	992	910	843	792							
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	233	278	216	211	176	174	137	115	100	107	98	103	84							
		Anteil in %	10,77	14,18	12,69	13,52	12,42	12,98	10,93	9,91	9,39	10,79	10,77	12,22	10,61							
	CI Anteil in %	[9,46; 12,07]	[12,64; 15,73]	[11,11; 14,27]	[11,82; 15,21]	[10,70; 14,14]	[11,18; 14,77]	[9,21; 12,66]	[8,19; 11,63]	[7,64; 11,14]	[8,85; 12,78]	[8,75; 12,78]	[10,01; 14,43]	[8,46; 12,75]								
		CI Anteil in %	[9,46; 12,07]	[12,64; 15,73]	[11,11; 14,27]	[11,82; 15,21]	[10,70; 14,14]	[11,18; 14,77]	[9,21; 12,66]	[8,19; 11,63]	[7,64; 11,14]	[8,85; 12,78]	[8,75; 12,78]	[10,01; 14,43]	[8,46; 12,75]							
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	1037	1011	884	834	736	724	642	621	550	533	490	468	448							
		Anteil in %	47,92	51,58	51,94	53,43	51,94	53,99	51,24	53,53	51,64	53,73	53,85	55,52	56,57							
	CI Anteil in %	[45,82; 50,03]	[49,37; 53,79]	[49,56; 54,31]	[50,95; 55,90]	[49,34; 54,54]	[51,32; 56,66]	[48,47; 54,01]	[50,66; 56,41]	[48,64; 54,65]	[50,63; 56,83]	[50,61; 57,09]	[52,16; 58,87]	[53,11; 60,02]								
		CI Anteil in %	[45,82; 50,03]	[49,37; 53,79]	[49,56; 54,31]	[50,95; 55,90]	[49,34; 54,54]	[51,32; 56,66]	[48,47; 54,01]	[50,66; 56,41]	[48,64; 54,65]	[50,63; 56,83]	[50,61; 57,09]	[52,16; 58,87]	[53,11; 60,02]							
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	473	413	369	318	300	256	246	257	235	210	177	164	147							
		Anteil in %	21,86	21,07	21,68	20,37	21,17	19,09	19,63	22,16	22,07	21,17	19,45	19,45	18,56							
	CI Anteil in %	[20,12; 23,60]	[19,27; 22,88]	[19,72; 23,64]	[18,37; 22,37]	[19,04; 23,30]	[16,99; 21,19]	[17,43; 21,83]	[19,76; 24,55]	[19,57; 24,56]	[18,63; 23,71]	[16,88; 22,02]	[16,78; 22,13]	[15,85; 21,27]								
		CI Anteil in %	[20,12; 23,60]	[19,27; 22,88]	[19,72; 23,64]	[18,37; 22,37]	[19,04; 23,30]	[16,99; 21,19]	[17,43; 21,83]	[19,76; 24,55]	[19,57; 24,56]	[18,63; 23,71]	[16,88; 22,02]	[16,78; 22,13]	[15,85; 21,27]							
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	294	190	188	155	157	142	167	115	138	108	110	85	89								
	Anteil in %	13,59	9,69	11,05	9,93	11,08	10,59	13,33	9,91	12,96	10,89	12,09	10,08	11,24								
CI Anteil in %	[12,14; 15,03]	[8,38; 11,00]	[9,56; 12,54]	[8,45; 11,41]	[9,44; 12,71]	[8,94; 12,24]	[11,45; 15,21]	[8,19; 11,63]	[10,94; 14,98]	[8,95; 12,83]	[9,97; 14,21]	[8,05; 12,12]	[9,04; 13,44]									
	CI Anteil in %	[12,14; 15,03]	[8,38; 11,00]	[9,56; 12,54]	[8,45; 11,41]	[9,44; 12,71]	[8,94; 12,24]	[11,45; 15,21]	[8,19; 11,63]	[10,94; 14,98]	[8,95; 12,83]	[9,97; 14,21]	[8,05; 12,12]	[9,04; 13,44]								
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	127	68	45	43	48	45	61	52	42	34	35	23	24								
	Anteil in %	5,87	3,47	2,64	2,75	3,39	3,36	4,87	4,48	3,94	3,43	3,85	2,73	3,03								
CI Anteil in %	[4,88; 6,86]	[2,66; 4,28]	[1,88; 3,41]	[1,94; 3,57]	[2,45; 4,33]	[2,39; 4,32]	[3,68; 6,06]	[3,29; 5,67]	[2,77; 5,11]	[2,29; 4,56]	[2,60; 5,10]	[1,63; 3,83]	[1,84; 4,22]									
	CI Anteil in %	[4,88; 6,86]	[2,66; 4,28]	[1,88; 3,41]	[1,94; 3,57]	[2,45; 4,33]	[2,39; 4,32]	[3,68; 6,06]	[3,29; 5,67]	[2,77; 5,11]	[2,29; 4,56]	[2,60; 5,10]	[1,63; 3,83]	[1,84; 4,22]								
2006-2	Patienten insgesamt	Anzahl	2651	2513	2278	2097	1861	1731	1580	1480	1370	1258	1164	1081								
	auswertbar	Anzahl	2648	2367	2128	1919	1721	1598	1509	1392	1284	1184	1112	1038								
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	347	352	340	288	259	215	187	167	182	147	144	107								
		Anteil in %	13,10	14,87	15,98	15,01	15,05	13,45	12,39	12,00	14,17	12,42	12,95	10,31								
	CI Anteil in %	[11,82; 14,39]	[13,44; 16,30]	[14,42; 17,53]	[13,41; 16,61]	[13,36; 16,74]	[11,78; 15,13]	[10,73; 14,06]	[10,29; 13,70]	[12,27; 16,08]	[10,54; 14,29]	[10,98; 14,92]	[8,46; 12,16]									
		CI Anteil in %	[11,82; 14,39]	[13,44; 16,30]	[14,42; 17,53]	[13,41; 16,61]	[13,36; 16,74]	[11,78; 15,13]	[10,73; 14,06]	[10,29; 13,70]	[12,27; 16,08]	[10,54; 14,29]	[10,98; 14,92]	[8,46; 12,16]								
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	1371	1258	1151	1015	960	854	821	735	699	642	630	574								
		Anteil in %	51,77	53,15	54,09	5																

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts-halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halbjahr	11. Halbjahr	12. Halbjahr	13. Halbjahr	14. Halbjahr	15. Halbjahr	16. Halbjahr	17. Halbjahr	18. Halbjahr	19. Halbjahr		
2007-1	Patienten insgesamt	Anzahl	3003	2836	2647	2355	2190	2031	1894	1746	1599	1490	1402									
	auswertbar	Anzahl	3001	2686	2436	2200	2032	1939	1818	1662	1537	1443	1350									
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	411	449	365	335	275	258	215	216	181	175	156									
		Anteil in %	13,70	16,72	14,98	15,23	13,53	13,31	11,83	13,00	11,78	12,13	11,56									
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[12,47; 14,93]	[15,30; 18,13]	[13,57; 16,40]	[13,73; 16,73]	[12,05; 15,02]	[11,79; 14,82]	[10,34; 13,31]	[11,38; 14,61]	[10,16; 13,39]	[10,44; 13,81]	[9,85; 13,26]									
		Anzahl	1525	1446	1302	1222	1091	1079	993	915	827	795	739									
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	50,82	53,83	53,45	55,55	53,69	55,65	54,62	55,05	53,81	55,09	54,74									
		CI Anteil in %	[49,03; 52,61]	[51,95; 55,72]	[51,47; 55,43]	[53,47; 57,62]	[51,52; 55,86]	[53,44; 57,86]	[52,33; 56,91]	[52,66; 57,45]	[51,31; 56,30]	[52,53; 57,66]	[52,08; 57,40]									
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	555	452	441	359	376	338	351	307	312	293	271									
		Anteil in %	18,49	16,83	18,10	16,32	18,50	17,43	19,31	18,47	20,30	20,30	20,07									
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[17,10; 19,88]	[15,41; 18,24]	[16,57; 19,63]	[14,77; 17,86]	[16,82; 20,19]	[15,74; 19,12]	[17,49; 21,12]	[16,61; 20,34]	[18,29; 22,31]	[18,23; 22,38]	[17,94; 22,21]									
		Anzahl	349	255	247	211	219	185	198	169	155	126	130									
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anteil in %	11,63	9,49	10,14	9,59	10,78	9,54	10,89	10,17	10,08	8,73	9,63									
		CI Anteil in %	[10,48; 12,78]	[8,38; 10,60]	[8,94; 11,34]	[8,36; 10,82]	[9,43; 12,13]	[8,23; 10,85]	[9,46; 12,32]	[8,71; 11,62]	[8,58; 11,59]	[7,27; 10,19]	[8,06; 11,20]									
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	161	84	81	73	71	79	61	55	62	54	54										
	Anteil in %	5,36	3,13	3,33	3,32	3,49	4,07	3,36	3,31	4,03	3,74	4,00										
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[4,56; 6,17]	[2,47; 3,79]	[2,61; 4,04]	[2,57; 4,07]	[2,70; 4,29]	[3,19; 4,95]	[2,53; 4,18]	[2,45; 4,17]	[3,05; 5,02]	[2,76; 4,72]	[2,95; 5,05]										
	Anzahl	1608	1538	1387	1257	1135	1033	940	866	805	744											
2007-2	Patienten insgesamt	Anzahl	1608	1538	1387	1257	1135	1033	940	866	805	744										
	auswertbar	Anzahl	1607	1436	1249	1154	1069	976	890	818	773	710										
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	226	196	192	154	134	105	122	81	104	96										
		Anteil in %	14,06	13,65	15,37	13,34	12,54	10,76	13,71	9,90	13,45	13,52										
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[12,36; 15,76]	[11,87; 15,43]	[13,37; 17,37]	[11,38; 15,31]	[10,55; 14,52]	[8,81; 12,70]	[11,45; 15,97]	[7,85; 11,95]	[11,05; 15,86]	[11,00; 16,04]										
		Anzahl	814	754	672	620	590	533	495	481	433	385										
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	50,65	52,51	53,80	53,73	55,19	54,61	55,62	58,80	56,02	54,23										
		CI Anteil in %	[48,21; 53,10]	[49,92; 55,09]	[51,04; 56,57]	[50,85; 56,60]	[52,21; 58,17]	[51,49; 57,74]	[52,35; 58,88]	[55,43; 62,18]	[52,51; 59,52]	[50,56; 57,89]										
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	291	288	230	223	199	177	138	141	133	124										
		Anteil in %	18,11	20,06	18,41	19,32	18,62	18,14	15,51	17,24	17,21	17,46										
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[16,22; 19,99]	[17,98; 22,13]	[16,26; 20,57]	[17,04; 21,60]	[16,28; 20,95]	[15,72; 20,55]	[13,13; 17,88]	[14,65; 19,83]	[14,54; 19,87]	[14,67; 20,26]										
		Anzahl	166	138	114	110	105	116	99	80	77	80										
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anteil in %	10,33	9,61	9,13	9,53	9,82	11,89	11,12	9,78	9,96	11,27										
		CI Anteil in %	[8,84; 11,82]	[8,09; 11,13]	[7,53; 10,73]	[7,84; 11,23]	[8,04; 11,61]	[9,85; 13,92]	[9,06; 13,19]	[7,74; 11,82]	[7,85; 12,07]	[8,94; 13,60]										
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	110	60	41	47	41	45	36	35	26	25											
	Anteil in %	6,85	4,18	3,28	4,07	3,84	4,61	4,04	4,28	3,36	3,52											
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[5,61; 8,08]	[3,14; 5,21]	[2,29; 4,27]	[2,93; 5,21]	[2,68; 4,99]	[3,29; 5,93]	[2,75; 5,34]	[2,89; 5,67]	[2,09; 4,64]	[2,16; 4,88]											
	Anzahl	1413	1356	1237	1102	998	925	869	796	733												
2008-1	Patienten insgesamt	Anzahl	1413	1356	1237	1102	998	925	869	796	733											
	auswertbar	Anzahl	1412	1251	1135	1040	952	889	834	763	694											
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	209	215	189	173	158	150	130	141	97											
		Anteil in %	14,80	17,19	16,65	16,63	16,60	16,87	15,59	18,48	13,98											
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[12,95; 16,65]	[15,09; 19,28]	[14,48; 18,82]	[14,37; 18,90]	[14,23; 18,96]	[14,41; 19,34]	[13,12; 18,05]	[15,72; 21,24]	[11,40; 16,56]											
		Anzahl	712	694	639	570	535	497	451	405	383											
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	50,42	55,48	56,30	54,81	56,20	55,91	54,08	53,08	55,19											
		CI Anteil in %	[47,82; 53,03]	[52,72; 58,23]	[53,41; 59,19]	[51,78; 57,83]	[53,04; 59,35]	[52,64; 59,17]	[50,69; 57,46]	[49,54; 56,62]	[51,48; 58,89]											
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	248	194	179	166	142	130	143	131	127											
		Anteil in %	17,56	15,51	15,77	15,96	14,92	14,62	17,15	17,17	18,30											
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[15,58; 19,55]	[13,50; 17,51]	[13,65; 17,89]	[13,73; 18,19]	[12,65; 17,18]	[12,30; 16,95]	[14,59; 19,71]	[14,49; 19,85]	[15,42; 21,18]											
		Anzahl	158	111	99	99	90	85	82	69	71											
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anteil in %	11,19	8,87	8,72	9,52	9,45	9,56	9,83	9,04	10,23											
		CI Anteil in %	[9,54; 12,83]	[7,30; 10,45]	[7,08; 10,36]	[7,73; 11,30]	[7,59; 11,31]	[7,63; 11,50]	[7,81; 11,85]	[7,01; 11,08]	[7,97; 12,49]											
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	85	37	29	32	27	27	28	17	16												
	Anteil in %	6,02	2,96	2,56	3,08	2,84	3,04	3,36	2,23	2,31												
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[4,78; 7,26]	[2,02; 3,90]	[1,64; 3,47]	[2,03; 4,13]	[1,78; 3,89]	[1,91; 4,17]	[2,13; 4,58]	[1,18; 3,28]	[1,19; 3,42]												

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2008-2	Patienten insgesamt	Anzahl	879	835	760	685	627	579	537	502												
	auswertbar	Anzahl	879	794	708	647	594	549	510	473												
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	114	116	99	74	96	58	81	57												
		Anteil in %	12,97	14,61	13,98	11,44	16,16	10,56	15,88	12,05												
	CI Anteil in %	[10,75; 15,19]	[12,15; 17,07]	[11,43; 16,54]	[8,98; 13,89]	[13,20; 19,12]	[7,99; 13,14]	[12,71; 19,06]	[9,11; 14,99]													
		CI Anteil in %																				
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	464	427	391	355	312	315	278	265												
		Anteil in %	52,79	53,78	55,23	54,87	52,53	57,38	54,51	56,03												
	CI Anteil in %	[49,49; 56,09]	[50,31; 57,25]	[51,56; 58,89]	[51,03; 58,71]	[48,51; 56,54]	[53,24; 61,52]	[50,18; 58,84]	[51,55; 60,50]													
		CI Anteil in %																				
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	153	155	120	128	108	108	84	91												
		Anteil in %	17,41	19,52	16,95	19,78	18,18	19,67	16,47	19,24												
	CI Anteil in %	[14,90; 19,91]	[16,76; 22,28]	[14,18; 19,71]	[16,71; 22,86]	[15,08; 21,29]	[16,34; 23,00]	[13,25; 19,69]	[15,68; 22,80]													
		CI Anteil in %																				
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	90	71	72	66	57	50	55	45													
	Anteil in %	10,24	8,94	10,17	10,20	9,60	9,11	10,78	9,51													
CI Anteil in %	[8,23; 12,24]	[6,96; 10,93]	[7,94; 12,40]	[7,87; 12,53]	[7,23; 11,97]	[6,70; 11,52]	[8,09; 13,48]	[6,87; 12,16]														
	CI Anteil in %																					
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	58	25	26	24	21	18	12	15													
	Anteil in %	6,60	3,15	3,67	3,71	3,54	3,28	2,35	3,17													
CI Anteil in %	[4,96; 8,24]	[1,93; 4,36]	[2,29; 5,06]	[2,25; 5,17]	[2,05; 5,02]	[1,79; 4,77]	[1,04; 3,67]	[1,59; 4,75]														
	CI Anteil in %																					
2009-1	Patienten insgesamt	Anzahl	759	709	644	573	519	481	447													
	auswertbar	Anzahl	759	670	602	543	490	460	428													
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	111	125	88	103	86	90	70													
		Anteil in %	14,62	18,66	14,62	18,97	17,55	19,57	16,36													
	CI Anteil in %	[12,11; 17,14]	[15,70; 21,61]	[11,79; 17,44]	[15,67; 22,27]	[14,18; 20,92]	[15,94; 23,19]	[12,85; 19,86]														
		CI Anteil in %																				
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	367	337	327	304	267	247	231													
		Anteil in %	48,35	50,30	54,32	55,99	54,49	53,70	53,97													
	CI Anteil in %	[44,80; 51,91]	[46,51; 54,09]	[50,34; 58,30]	[51,81; 60,16]	[50,08; 58,90]	[49,13; 58,26]	[49,24; 58,70]														
		CI Anteil in %																				
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	137	125	97	74	79	67	76													
		Anteil in %	18,05	18,66	16,11	13,63	16,12	14,57	17,76													
	CI Anteil in %	[15,31; 20,79]	[15,70; 21,61]	[13,17; 19,05]	[10,74; 16,52]	[12,86; 19,38]	[11,34; 17,79]	[14,13; 21,38]														
		CI Anteil in %																				
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	91	61	64	46	43	45	38														
	Anteil in %	11,99	9,10	10,63	8,47	8,78	9,78	8,88														
CI Anteil in %	[9,68; 14,30]	[6,92; 11,28]	[8,17; 13,10]	[6,13; 10,82]	[6,27; 11,28]	[7,06; 12,50]	[6,18; 11,58]															
	CI Anteil in %																					
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	53	22	26	16	15	11	13														
	Anteil in %	6,98	3,28	4,32	2,95	3,06	2,39	3,04														
CI Anteil in %	[5,17; 8,80]	[1,93; 4,63]	[2,69; 5,94]	[1,52; 4,37]	[1,53; 4,59]	[0,99; 3,79]	[1,41; 4,67]															
	CI Anteil in %																					
2009-2	Patienten insgesamt	Anzahl	765	727	649	584	516	473														
	auswertbar	Anzahl	763	693	593	542	491	449														
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	80	103	102	89	94	82														
		Anteil in %	10,48	14,86	17,20	16,42	19,14	18,26														
	CI Anteil in %	[8,31; 12,66]	[12,21; 17,51]	[14,16; 20,24]	[13,30; 19,54]	[15,66; 22,63]	[14,69; 21,84]															
		CI Anteil in %																				
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anzahl	402	361	312	284	266	218														
		Anteil in %	52,69	52,09	52,61	52,40	54,18	48,55														
	CI Anteil in %	[49,14; 56,23]	[48,37; 55,81]	[48,59; 56,64]	[48,19; 56,61]	[49,76; 58,59]	[43,92; 53,18]															
		CI Anteil in %																				
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	150	133	107	96	75	87														
		Anteil in %	19,66	19,19	18,04	17,71	15,27	19,38														
	CI Anteil in %	[16,84; 22,48]	[16,26; 22,13]	[14,95; 21,14]	[14,50; 20,93]	[12,09; 18,46]	[15,72; 23,04]															
		CI Anteil in %																				
Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	92	76	57	57	44	50															
	Anteil in %	12,06	10,97	9,61	10,52	8,96	11,14															
CI Anteil in %	[9,75; 14,37]	[8,64; 13,30]	[7,24; 11,99]	[7,93; 13,10]	[6,43; 11,49]	[8,22; 14,05]																
	CI Anteil in %																					
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	39	20	15	16	12	12															
	Anteil in %	5,11	2,89	2,53	2,95	2,44	2,67															
CI Anteil in %	[3,55; 6,68]	[1,64; 4,13]	[1,26; 3,79]	[1,53; 4,38]	[1,08; 3,81]	[1,18; 4,17]																
	CI Anteil in %																					

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr		
2010-1	Patienten insgesamt	Anzahl	844	795	710	649	600															
	auswertbar	Anzahl	843	763	674	621	564															
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	100	130	94	96	84															
		Anteil in %	11,86	17,04	13,95	15,46	14,89															
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[9,68; 14,05]	[14,37; 19,71]	[11,33; 16,56]	[12,61; 18,30]	[11,95; 17,83]															
		Anzahl	423	408	368	353	299															
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	50,18	53,47	54,60	56,84	53,01															
		CI Anteil in %	[46,80; 53,56]	[49,93; 57,01]	[50,84; 58,36]	[52,95; 60,74]	[48,89; 57,14]															
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	187	137	130	110	114															
		Anteil in %	22,18	17,96	19,29	17,71	20,21															
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[19,38; 24,99]	[15,23; 20,68]	[16,31; 22,27]	[14,71; 20,72]	[16,90; 23,53]															
		Anzahl	78	66	60	50	50															
		Anteil in %	9,25	8,65	8,90	8,05	8,87															
		CI Anteil in %	[7,30; 11,21]	[6,65; 10,65]	[6,75; 11,05]	[5,91; 10,19]	[6,52; 11,21]															
	Anzahl	55	22	22	12	17																
	Anteil in %	6,52	2,88	3,26	1,93	3,01																
	CI Anteil in %	[4,86; 8,19]	[1,70; 4,07]	[1,92; 4,61]	[0,85; 3,02]	[1,60; 4,43]																
	Patienten insgesamt	Anzahl	914	879	799	716																
2010-2	auswertbar	Anzahl	914	842	738	690																
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	114	116	117	94																
		Anteil in %	12,47	13,78	15,85	13,62																
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[10,33; 14,62]	[11,45; 16,11]	[13,22; 18,49]	[11,06; 16,18]																
		Anzahl	492	482	422	386																
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	53,83	57,24	57,18	55,94																
		CI Anteil in %	[50,60; 57,06]	[53,90; 60,59]	[53,61; 60,75]	[52,23; 59,65]																
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	138	133	111	124																
		Anteil in %	15,10	15,80	15,04	17,97																
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[12,78; 17,42]	[13,33; 18,26]	[12,46; 17,62]	[15,10; 20,84]																
		Anzahl	107	92	71	70																
		Anteil in %	11,71	10,93	9,62	10,14																
		CI Anteil in %	[9,62; 13,79]	[8,82; 13,03]	[7,49; 11,75]	[7,89; 12,40]																
		Anzahl	63	19	17	16																
Anteil in %		6,89	2,26	2,30	2,32																	
	CI Anteil in %	[5,25; 8,54]	[1,25; 3,26]	[1,22; 3,39]	[1,20; 3,44]																	
	Patienten insgesamt	Anzahl	952	920	836																	
2011-1	auswertbar	Anzahl	952	882	794																	
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	99	163	117																	
		Anteil in %	10,40	18,48	14,74																	
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	CI Anteil in %	[8,46; 12,34]	[15,92; 21,04]	[12,27; 17,20]																	
		Anzahl	514	480	440																	
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anteil in %	53,99	54,42	55,42																	
		CI Anteil in %	[50,82; 57,16]	[51,13; 57,71]	[51,96; 58,88]																	
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anzahl	169	142	124																	
		Anteil in %	17,75	16,10	15,62																	
	Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	CI Anteil in %	[15,32; 20,18]	[13,67; 18,53]	[13,09; 18,14]																	
		Anzahl	112	68	90																	
		Anteil in %	11,76	7,71	11,34																	
		CI Anteil in %	[9,72; 13,81]	[5,95; 9,47]	[9,13; 13,54]																	
		Anzahl	58	29	23																	
Anteil in %		6,09	3,29	2,90																		
	CI Anteil in %	[4,57; 7,61]	[2,11; 4,47]	[1,73; 4,06]																		

EZ	Patienten und ihre Zuordnung zu HbA1c-Klassen, Subkohorte mit sekundären Endpunkten	Beitritts- halbjahr	2. Halbjahr	3. Halbjahr	4. Halbjahr	5. Halbjahr	6. Halbjahr	7. Halbjahr	8. Halbjahr	9. Halbjahr	10. Halb- jahr	11. Halb- jahr	12. Halb- jahr	13. Halb- jahr	14. Halb- jahr	15. Halb- jahr	16. Halb- jahr	17. Halb- jahr	18. Halb- jahr	19. Halb- jahr			
2011-2	Patienten insgesamt	Anzahl	823	787																			
	auswertbar	Anzahl	823	763																			
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	94	100																			
		Anteil in %	11,42	13,11																			
		CI Anteil in %	[9,25; 13,60]	[10,71; 15,50]																			
		Anzahl	447	424																			
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %	54,31	55,57																			
		CI Anteil in %	[50,91; 57,72]	[52,04; 59,10]																			
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	131	136																			
		Anteil in %	15,92	17,82																			
		CI Anteil in %	[13,42; 18,42]	[15,11; 20,54]																			
		Anzahl	92	73																			
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	11,18	9,57																			
		CI Anteil in %	[9,02; 13,33]	[7,48; 11,66]																			
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	59	30																				
	Anteil in %	7,17	3,93																				
	CI Anteil in %	[5,41; 8,93]	[2,55; 5,31]																				
2012-1	Patienten insgesamt	Anzahl	875																				
	auswertbar	Anzahl	874																				
	normal: HbA1c ≤ 6,0	Anzahl	103																				
		Anteil in %	11,78																				
		CI Anteil in %	[9,65; 13,92]																				
		Anzahl	471																				
	oberer Zielbereich: 6,0 < HbA1c ≤ 7,5	Anteil in %	53,89																				
		CI Anteil in %	[50,58; 57,20]																				
	erhöhtes Risiko: 7,5 < HbA1c ≤ 8,5	Anzahl	137																				
		Anteil in %	15,68																				
		CI Anteil in %	[13,26; 18,09]																				
		Anzahl	90																				
	Hochrisiko 1: 8,5 < HbA1c ≤ 10,0	Anteil in %	10,30																				
		CI Anteil in %	[8,28; 12,31]																				
Hochrisiko 2: HbA1c > 10,0	Anzahl	73																					
	Anteil in %	8,35																					
	CI Anteil in %	[6,52; 10,19]																					

Anhang D: Risikoadjustierter Berichtsteil

In den folgenden Kapiteln werden risikoadjustierte Werte zu einigen bislang ausgewiesenen Werten berechnet, z.T. sind für die Risikoadjustierung aber auch gänzlich neue Auswertungen vorzunehmen. Im Gegensatz zu den vorigen Berichtsteilen, in denen die Auswertungsergebnisse nach Beitrittskohorten und Teilnahmehalbjahren am Programm getrennt ausgewiesen wurden, wird bei den Berechnungen für die Risikoadjustierung nicht nach Kohorten und Halbjahren differenziert. Für jede Auswertung wird jeweils ein einziger (risikoadjustierter) Mittelwert ausgewiesen. Eine Entwicklung über die Zeit – sei es über die Teilnahmehalbjahre oder über das Halbjahr des Beitritts in ein DMP – lässt sich daher aus den risikoadjustierten Werten nicht ablesen. Dagegen geben die risikoadjustierten Werte darüber Aufschluss, ob für das betrachtete Programm insgesamt die medizinischen und ökonomischen Werte über- oder unterdurchschnittlich ausfallen, wenn diejenigen statistischen Einflüsse herausgerechnet werden, die sich aus der unterschiedlichen Risikostruktur der Teilnehmer der unterschiedlichen Kassen in den DMPs ergeben. Bei der Interpretation der Daten ist allerdings zu beachten, dass in die Risikoadjustierung nur diejenigen Variablen eingehen können, die in den Datensätzen zu den Patientenmerkmalen, den medizinischen Werten und den Leistungsausgaben vorliegen. Sozioökonomische Variablen wie Bildungsstand, Erwerbsstatus oder (Haushalts-) Einkommen sind in den genannten Datensätzen nicht enthalten; die Erkrankungsdauer vor Einschreibung ist seit eDMP nicht mehr enthalten. Welche Variablen bzw. Risikofaktoren in den jeweiligen Modellen für die Risikoadjustierung zu berücksichtigen waren, wurde vom Bundesversicherungsamt definiert und ist in Anhang E.4 ausführlich dargestellt.

1. Mittel der beobachteten Werte (O):

Hierzu wird das arithmetische Mittel (Mean) über *alle* für das Programm beobachteten Werte gebildet, unabhängig davon, in welcher Kohorte und in welchem Halbjahr diese Werte beobachtet wurden. Die Berechnung erfolgt dabei in zwei Schritten: Zunächst werden unabhängig von der Kohortenzugehörigkeit pro Patient die Durchschnitts- oder Anteilswerte über alle Halbjahre gebildet, bzw. pro Patient erfolgt anhand der Werte aller Halbjahre die Zuordnung zu einer interessierenden Kategorie (z.B. Patient mit mindestens einer neuen Inzidenz während seiner Programmteilnahme). Anschließend wird ein Gesamtdurchschnitts- bzw. Gesamt-Anteilswert über alle Patienten gebildet. Die neben dem Mittelwert ausgewiesene Fallbasis gibt demnach die Anzahl Patienten (bzw. streng genommen: die Anzahl der Fälle) ein, die in die Mittelwertberechnung einfließen, und *nicht* die Anzahl der beobachteten Werte.

2. Mittel der erwarteten Werte (E):

Die beobachteten medizinischen Werte bzw. Leistungsausgaben werden durch die Risikofaktoren der Patienten (z.B. Alter, Geschlecht, Begleiterkrankungen) determiniert. Bei unterschiedlicher Risikostruktur der Teilnehmer der unterschiedlichen Kassen in den DMPs ist daher das Mittel der beobachteten Werte nicht vergleichbar.

Deshalb ist es notwendig, für alle Patienten ergänzend zu ihren beobachteten Werten zunächst einen erwarteten Wert pro Halbjahr zu berechnen. Dieser Werte gibt an, welcher Wert bei gegebenem Risikoprofil des jeweiligen Patienten statistisch zu erwarten gewesen wäre.

Das arithmetische Mittel wurde wiederum in dem geschilderten zweistufigen Verfahren über alle erwarteten Werte gebildet, unabhängig davon, für welche Kohorte und in welchem Halbjahr diese Werte berechnet wurden. Zusätzlich wird die Fallbasis ausgewiesen. Die Berechnung der erwarteten Werte erfolgte dabei folgendermaßen:

- Seien $x_1 \dots x_m$ die unabhängigen Variablen (Risikofaktoren) der Modelle und $b_1 \dots b_m$ jeweils die zugehörigen Koeffizientenvektoren, dann werden die erwarteten Werte E für jeden Patienten und jedes Halbjahr in Abhängigkeit von der Art des Zielwertes berechnet über:

Lineare Zielwerte:

$$E = b_0 + b_1x_1 + \dots + b_mx_m$$

Binäre Zielwerte:

$$E = \frac{\exp(b_0 + b_1x_1 + \dots + b_mx_m)}{1 + \exp(b_0 + b_1x_1 + \dots + b_mx_m)}$$

Ereigniszeiten:

Für alle Kalenderhalbjahre nach dem Beitrittsjahr $t = 1, 2, 3, \dots$ in denen ein Ereignis stattfinden kann, wird für jeden einzelnen Patienten berechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Ereignis eintritt:

$$E(t) = 1 - (S_0(t))^{\exp(b_1x_1 + \dots + b_mx_m)}$$

wobei die Baseline-Survivalfunktion $S_0(t)$ der im Modell geschätzten Baseline-Survivalfunktion gegeben alle Kovariaten = 0 entspricht.

Im Modell geschätzte Baseline-Rate (1-S ₀ (t)) für die drei Zielgrößen: ,Primärer Endpunkt', ,Sekundärer Endpunkt' und ,Tod' (inkl. Beitrittsjahr, t=0)			
Zeitpunkt	Primärer Endpunkt	Sekundärer Endpunkt	Tod
t ₀	---	---	0,00061
t ₁	0,00339	0,01160	0,00120
t ₂	0,00273	0,00828	0,00109
t ₃	0,00270	0,00847	0,00111
t ₄	0,00267	0,00862	0,00119
t ₅	0,00293	0,00906	0,00127
t ₆	0,00282	0,01003	0,00131
t ₇	0,00307	0,01110	0,00143
t ₈	0,00331	0,01339	0,00145
t ₉	0,00312	0,01019	0,00169
t ₁₀	0,00325	0,00987	0,00188
t ₁₁	0,00323	0,01037	0,00202
t ₁₂	0,00323	0,01134	0,00206
t ₁₃	0,00403	0,01010	0,00248
t ₁₄	0,00341	0,00942	0,00248
t ₁₅	0,00420	0,01068	0,00252
Mittlere Baseline-Rate	<i>0,00309</i>	<i>0,01004</i>	<i>0,00133</i>

3. Risikoadjustierter Mittelwert (RA):

Der risikoadjustierte Wert wird bei binären Zielwerten berechnet als das Verhältnis von beobachtetem und erwartetem Durchschnittswert, multipliziert mit dem Gesamtmittelwert aller DMPs, der mit dem gepoolten Datensatz geschätzt wurde: (O/E)*G. Bei den linearen Zielwerten wird der risikoadjustierte Wert berechnet als Differenz von beobachtetem und erwartetem Durchschnittswert und anschließender Addition des Gesamtmittelwertes aller DMPs, der mit dem gepoolten Datensatz geschätzt wurde: (O-E)+G. Der risikoadjustierte Wert ist trotz der unterschiedlichen Risikostruktur der Teilnehmer der unterschiedlichen Kassen über alle DMPs (bedingt) vergleichbar. Es gelten die Einschränkungen, die sich aus der Nicht-Berücksichtigung sozioökonomischer Variablen ergeben, siehe oben.

Um ein Gegenüberstellen der risikoadjustierten Werte mit den beobachteten Werten zu erleichtern, die in den regulären Evaluationsberichten – nach Kohorten und Auswertungshalbjahren differenziert – ausgewiesen werden, wurde in den folgenden Kapiteln für inhaltlich vergleichbare Auswertungen eine analoge Nummerierung verwendet. Da Risikoadjustierungen nur zu den Auswertungskapiteln 3 und 5 der regulären Berichte vorzunehmen waren, sind dazu keine Kapitel D.1, D.2, D.4 und D.6 enthalten.

Eine Übersicht über die Zielvariablen, die Kollektivabgrenzung und die Gesamtmittelwerte (G) findet sich in Tabelle D.1 (s.u.). Eine ausführliche Beschreibung der Modellbildung erfolgt im Anhang zur Methodik und Datengrundlage in Kapitel E.4.

Tabelle D.1 Übersicht über die Zielwerte, Kollektivabgrenzung und die zugehörigen Gesamtmittelwerte¹⁵

* Auswertungen ohne Beitrittsjahr

Tab.-Nr.	Zielwert	Gesamt- mittelwert
D.3.1.1	Body-Mass-Index 1: Durchschnittlicher BMI während der Programmteilnahme pro Erwachsenen über alle Erwachsene	30,5464
	Body-Mass-Index 2: Anteil der Halbjahre mit BMI-Kategorie „stark adipös“ pro Erwachsenen über alle Erwachsene	0,4797
	Raucheranteil 1: Anteil der Raucherhalbjahre pro Patient über alle Patienten	0,1321
	Raucheranteil 2: Anteil der Raucherhalbjahre pro Patient über ursprüngliche Raucher *	0,8071
	Hypertonieverlauf (Hypertoniker zur Erstdokumentation): Anteil der Halbjahre mit erhöhtem Blutdruckwert pro Patient bei ursprünglichen Hypertonikern laut Anamnese	0,5028
D.3.2.1	HbA1c-Wert 1: Durchschnittlicher HbA1c-Wert während der Programmteilnahme pro Patient über alle Patienten	7,0216
	HbA1c-Wert 2: Anteil der Halbjahre mit einem HbA1c-Wert > 7,5 % pro Patient über alle Patienten	0,2359
	Serum-Kreatinin-Wert: Anteil der Halbjahre mit einem Serum-Kreatinin-Wert > 1,4 mg/dl pro Patient über alle Patienten	0,0899
D.3.4.1	Diabetesschulung 1: Patientenanteil mit Empfehlung(en) zur Schulungsteilnahme, der mindestens einmal unbegründet nicht teilgenommen hat *	0,3062
	Diabetesschulung 2: Patientenanteil mit mindestens einer durchgeführten Schulung über alle Patienten *	0,2593
	Hypertonieschulung 1: Hypertonikeranteil laut Erstdokumentation (Anamnese) mit Empfehlung(en) zur Schulungsteilnahme, der mindestens einmal unbegründet nicht teilgenommen hat *	0,5564
	Hypertonieschulung 2: Hypertonikeranteil laut Erstdokumentation (Anamnese) mit mindestens einer durchgeführten Schulung über alle Patienten *	0,0811
	Ophthalmologische Netzhautuntersuchung: Anteil der Jahre mit Netzhautuntersuchung pro Patient über alle Patienten (Teilnehmer und mit Doku im gesamten Jahr) *	0,6437
D.3.5.1	Herzinfarkt: Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über Patienten ohne Inzidenz zur ED*	0,0114
	Schlaganfall: Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über Patienten ohne Inzidenz zur ED*	0,0260
	erheblich auffälliger Fußstatus (Wagner 2-5 oder Armstrong C-D): Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über Patienten ohne beschriebene Inzidenz zur ED*	0,0114
	diabetische Nephropathie: Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über Patienten ohne Inzidenz zur ED*	0,0761
	diabetische Retinopathie: Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über Patienten ohne Inzidenz zur ED*	0,0374
D.3.6.1	Nierenersatztherapie: Patientenanteil mit mindestens einer Therapie über Patienten ohne Therapie zur ED*	0,0040
D.3.7.1- D.3.7.7	Endpunktfreiheit: Wahrscheinlichkeit, dass Patienten im jew. Folgehalbjahr noch ohne primären Endpunkt sind, bezogen auf Patienten, bei denen Endpunkte noch auftreten könnten*	0,9802
D.5.1	Ausgaben f. ärztliche Behandlung und häusliche Krankenpflege: Durchschnittliche Halbjahresausgaben in Euro pro Patient über die Stichprobenmitglieder	494,20
	Ausgaben für Krankenhausbehandlung und Anschlussrehabilitation: Durchschnittliche Halbjahresausgaben in Euro pro Patient über die Stichprobenmitglieder	718,83
	Ausgaben für Arzneimittel: Durchschnittliche Halbjahresausgaben in Euro pro Patient über die Stichprobenmitglieder	566,97
	Ausgaben für Heil- und Hilfsmittel sowie Dialyse-Sachkosten: Durchschnittliche Halbjahresausgaben in Euro pro Patient über die Stichprobenmitglieder	144,89
	Ausgaben für Krankengeld: Durchschnittliche Halbjahresausgaben in Euro pro Patient über die Stichprobenmitglieder	82,54
	Leistungsausgaben insgesamt: Durchschnittliche Halbjahresausgaben in Euro pro Patient über die Stichprobenmitglieder	2.000,05

¹⁵ Die mit dem gepoolten Datensatz berechneten Mittelwerte als Schätzer für die Gesamtmittelwerte für das jeweilige Kollektiv wurden als Mittelwerte der Mittelwerte auf Versicherten-Ebene und nicht als Mittelwerte über alle Berichtshalbjahre berechnet.

D.3 Krankheitsverlauf nach Einschreibung

Die Auswertungskapitel 1 und 2 des Hauptteils im vorliegenden Evaluationsbericht sind für die Risikoadjustierung nicht relevant. Um den Vergleich mit den vorausgegangenen Berichtsteilen über eine analoge Nummerierung zu erleichtern, wird der Anhang zur Risikoadjustierung daher direkt mit dem Kapitel D.3 fortgesetzt.

Ein wesentliches Ziel der Evaluation besteht in der Überprüfung der medizinischen Versorgungsqualität der DMP-Patienten. Hierzu werden die patientenbezogenen Angaben zum Krankheitsverlauf nach der Einschreibung in das DMP aus den Dokumentationen der Leistungserbringer ausgewertet. Die risikoadjustierten Tabellen weisen die Ergebnisse für die folgenden Bereiche und Variablen aus:

Risikofaktoren

- Body-Mass-Index (BMI)
- Raucherstatus
- Hypertonus

Laborwerte

- HbA1c-Werte
- Serum-Kreatinin-Werte

Prozessparameter

- Diabetes-Schulungen
- Hypertonieschulungen
- Ophthalmologische Netzhautuntersuchung

Neu auftretende Begleit- und Folgeerkrankungen

- Herzinfarkt
- Schlaganfall
- Erheblich auffälliger Fußstatus
- diabetische Nephropathie
- diabetische Retinopathie

Therapien

- Nierenersatztherapie

Kumulierte Überlebensraten nach Kaplan-Meier

- primäre Endpunkte (einschließlich Tod)
- sekundäre Endpunkte
- Tod

Endpunktfreiheit

- Endpunktfreiheit während DMP-Teilnahme

Anteilswerte werden in den folgenden Tabellen in Prozent ausgewiesen.

D.3.1 Risikofaktoren

In der folgenden Tabelle werden Auswertungen zu drei Variablen dargestellt. Zunächst wird der Body-Mass-Index (BMI) dargestellt. Der BMI wird durch den Quotienten aus Körpergewicht in kg und Körpergröße in m im Quadrat errechnet (kg:m^2). BMI-Werte unter 25 kg/m^2 sind als normalgewichtig, BMI-Werte zwischen 25 und 30 kg/m^2 als leicht übergewichtig und BMI-Werte über 30 kg/m^2 als übergewichtig (stark adipös) zu werten.

Anschließend werden Auswertungen zum Raucherstatus vorgenommen. Rauchen stellt einen der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen dar. Eine Reduktion des Raucheranteils der DMP-Patienten ist demnach eine wichtige Zielsetzung der Behandlung.

Schließlich werden Angaben zum Bluthochdruck bzw. Hypertonus gemacht, da dieser eine bedeutende Begleiterkrankung des Diabetes mit potenzierenden negativen Effekten auf die Herz-Kreislaufmorbidity und -mortality ist. Eine Senkung des Blutdrucks in den Normbereich bei den DMP-Patienten mit erhöhten Blutdruckwerten ist demnach eine weitere wichtige Zielsetzung der Behandlung.

Tabelle D.3.1.1 Risikofaktoren: Body-Mass-Index 1 - Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr

Risikofaktoren: Body-Mass-Index 1 Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Body-Mass-Index 1				
Durchschnittlicher BMI während der Programmteilnahme pro Erwachsenen über alle Erwachsene	Wert	31,16	30,89	30,27
	Fallbasis	134145	134145	134145

Tabelle D.3.1.2 Risikofaktoren: Body-Mass-Index 2 - Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr

Risikofaktoren: Body-Mass-Index 2 Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Body-Mass-Index 2				
Anteil der Halbjahre mit stark adipöser BMI-Kategorie pro Erwachsenen über alle Erwachsene	Anteil in %	52,97	50,93	46,12
	Fallbasis	134147	134147	134147

Tabelle D.3.1.3 Risikofaktoren: Rauchen 1 - Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr

Risikofaktoren: Rauchen 1 Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr; nur ursprüngliche Raucher ohne ED		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Raucheranteil 1				
Anteil der Raucherhalbjahre pro Patient über alle Patienten	Anteil in %	15,64	11,19	9,45
	Fallbasis	134069	134069	134069

Tabelle D.3.1.4 Risikofaktoren: Rauchen 2 - Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr

Risikofaktoren: Rauchen 2 Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr; nur ursprüngliche Raucher ohne ED		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Raucheranteil 2				
Anteil der Raucherhalbjahre pro Patient über ursprüngliche Raucher	Anteil in %	82,61	81,33	79,45
	Fallbasis	13260	13260	13260

Tabelle D.3.1.5 Risikofaktoren: Hypertonie - Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr

Risikofaktoren: Hypertonie Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Hypertoniker laut Blutdruckwert				
Anteil der Halbjahre mit bestehender Hypertonie pro Patient bei ursprünglichen Hypertonikern (lt. Anamnese)	Anteil in %	51,95	52,07	50,40
	Fallbasis	110233	110233	110233

D.3.2 Laborwerte

Neben der Einstellung des erhöhten Blutdrucks in den Normbereich ist bei Diabetikern die Einstellung von erhöhten Blutzucker- / Glukosekonzentrationen entscheidend für den Therapieerfolg bzw. für das Verhindern von Folgeerkrankungen. Während die Messung des Blutzuckerwertes nur eine Momentaufnahme der aktuellen Stoffwechsellage liefert, kann durch Bestimmung des Anteils von glykosiliertem Hämoglobin (hier gemessen als: HbA1c) als Parameter der diabetischen Stoffwechselkontrolle im Sinne eines „Blutzuckergedächtnisses“ der mittlere Blutzuckerspiegel der vergangenen (4-12) Wochen beurteilt werden. Gut eingestellte Diabetiker, die HbA1c-Werte unter 6,5% aufweisen, haben gute Chancen, Folgeschäden an

z.B. Augen, Nieren oder Herz zu verzögern oder zu verhindern. Umgekehrt gilt, dass Patienten mit deutlich erhöhten HbA1c-Werten (> 7,5%) ein größeres Risiko haben, Komplikationen oder Folgeerkrankungen zu erleiden. Eine etwaige Beeinträchtigung der Filter- bzw. Klärfunktion der Nieren kann durch die so genannte Kreatinin-Clearance beurteilt werden. Für deren Berechnung wird der Kreatininwert im Blut (Serum) des Patienten ermittelt. Ein erhöhter Kreatininwert kann eine Funktionsverschlechterung der Nieren anzeigen.

Tabelle D.3.2.1 Laborwerte: HbA1c 1 - Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr

Laborwerte: HbA1c 1 Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
HbA1c-Wert 1				
Durchschnittlicher HbA1c-Wert während der Programmteilnahme pro Patient über alle Patienten	Wert	7,17	7,08	6,94
	Fallbasis	134181	134181	134181

Tabelle D.3.2.2 Laborwerte: HbA1c 2 - Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr

Laborwerte: HbA1c 2 Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
HbA1c-Wert 2				
Anteil der Halbjahre mit einem HbA1c-Wert > 7,5 % pro Patient über alle Patienten	Anteil in %	29,71	26,33	20,91
	Fallbasis	134181	134181	134181

Tabelle D.3.2.3 Laborwerte: Serum-Kreatinin - Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr

Laborwerte: Serum-Kreatinin Auswertungen einschließlich Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Serum-Kreatinin-Wert				
Anteil der Halbjahre mit einem Serum-Kreatinin-Wert >1,4 mg/dl pro Patient über alle Patienten	Anteil in %	9,21	10,25	10,01
	Fallbasis	126445	126445	126445

D.3.4 Prozessparameter: Durchgeführte Schulungen und Untersuchungen

Zur Erhöhung der Lebensqualität der Patienten sowie zur Erhaltung ihrer Autonomie ist eine Schulung über die Ursachen, Auswirkungen und Therapiemodalitäten eines Diabetes mellitus empfehlenswert. Zum einen, weil hierdurch oftmals bei den Diabetikern dauerhafte Verhaltens- und Verhältnisänderungen in den Bereichen Ernährung und Bewegung eingeleitet werden können, die positive Effekte auf den Krankheitsverlauf ausüben. Zum anderen aber auch, weil vor allem bei der Insulintherapie eine kontinuierliche Kontrolle der verzehrten Lebensmittel (Broteinheiten) sowie der zu injizierenden Insulinmenge durch wiederholte Blutzuckerselbstmessungen erfolgen muss. Hierzu ist ein hohes Maß an Selbstorganisationsfähigkeit der Betroffenen erforderlich, welches u.a. in den Schulungen intensiv erlernt wird. Gefürchtete Langzeitkomplikationen des Diabetes bestehen in der Schädigung von kleinen Gefäßen (sog. Mikroangiopathien). Betroffen sind grundsätzlich alle Gefäße, besonders gravierend sind jedoch Schädigungen der Gefäße der Netzhaut (Retina) des Auges mit der Gefahr der Erblindung, der Nieren mit der Gefahr des Nierenversagens sowie des Herzens mit der Gefahr des Herzinfarktes.

In der folgenden Tabelle wird zunächst ausgewiesen, welcher Anteil der Patienten, denen ein- oder mehrmals eine **Diabetes- bzw. Hypertonieschulung** empfohlen worden war, trotz dieser Empfehlung(en) mindestens einmal unbegründet nicht an dieser Schulung teilgenommen hat. Davon wird ausgegangen, wenn bezüglich der Teilnahme an einer empfohlenen Schulung ein „nein“ dokumentiert ist. Weitere Dokumentationsmöglichkeiten waren „ja“ und „Wahrnehmung aktuell nicht möglich“. Ferner wird ausgewiesen, welcher Anteil der Patienten im Programmverlauf mindestens einmal an einer (empfohlenen) Schulung teilgenommen hat. Anschließend wird dargestellt, in welchem Anteil der Berichtsjahre pro Patient im Durchschnitt eine durchgeführte **ophthalmologische Netzhautuntersuchung** dokumentiert wurde. Veranlasste Netzhautuntersuchungen fließen nicht in diese Betrachtung ein.

Tabelle D.3.4.1 Prozessparameter: Diabetesschulung 1 - Auswertungen ohne Beitrittsjahr

Prozessparameter: Diabetesschulung 1 - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Diabetesschulung 1				
Anteil der Patienten die mindestens einmal unbegründet nicht an einer Diabetesschulung teilgenommen haben, bezogen auf die Patienten, denen eine Schulung empfohlen wurde	Anteil in %	14,29	31,18	66,81
	Fallbasis	53954	53954	53954

Tabelle D.3.4.2 Prozessparameter: Diabetesschulung 2 - Auswertungen ohne Beitrittsjahr

Prozessparameter: Diabetesschulung 2 - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Diabetesschulung 2				
Patientenanteil mit mindestens einer durchgeführten Schulung über alle Patienten	Anteil in %	14,02	27,05	50,02
	Fallbasis	117845	117845	117845

Tabelle D.3.4.3 Prozessparameter: Hypertonieschulung 1 - Auswertungen ohne Beitrittsjahr

Prozessparameter: Hypertonieschulung 1 - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Hypertonieschulung 1				
Hypertoniker laut ED (Anamnese, Blutdruck) die mindestens einmal unbegründet nicht an einer Hypertonieschulung teilgenommen haben, bezogen auf Hypertoniker laut ED, denen eine Schulung empfohlen wurde	Anteil in %	33,30	59,85	100,00
	Fallbasis	29562	29562	29562

Tabelle D.3.4.4 Prozessparameter: Hypertonieschulung 2 - Auswertungen ohne Beitrittsjahr

Prozessparameter: Hypertonieschulung 2 - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Hypertonieschulung 2				
Hypertonikeranteil laut ED (Anamnese) mit mindestens einer durchgeführten Schulung, bezogen auf Hypertoniker laut ED, denen eine Schulung empfohlen wurde	Anteil in %	3,62	6,55	14,69
	Fallbasis	97391	97391	97391

Tabelle D.3.4.5 Prozessparameter: Ophtalmologische Netzhautuntersuchung - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr

Prozessparameter: Ophtalmologische Netzhautuntersuchung - Auswertungen ohne Beitrittshalbjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Ophtalmologische Netzhautuntersuchung				
Anteil der Jahre mit Netzhautuntersuchung pro Patient über alle Patienten mit DMP-Teilnahme und Dokumentation im gesamten Jahr	Anteil in %	62,20	65,64	67,94
	Fallbasis	101242	101242	101242

D.3.5 Begleit- und Folgeerkrankungen

Die durch langjährige diabetische Stoffwechsellage verursachten Begleit- oder Folgeerkrankungen des Diabetes sind durch Makro- und Mikroangiopathie sowie Neuropathie, allesamt schwerwiegende Erkrankungen an Gefäßen und Nerven, bedingt und können zu schweren Organschädigungen bzw. Organversagen führen. Eine frühzeitige Erkennung und Therapie kann die Progredienz deutlich verlangsamen. Eine gefürchtete Folge des Diabetes mellitus besteht in der Schädigung der Nieren durch Veränderung der Nierengefäße in Form der diabetischen Nephropathie, die zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion bis hin zur Dialysepflichtigkeit führen kann. Eine weitere Schädigung besteht in Form des diabetischen Fußes, der sich durch Auffälligkeiten (Wunden, Infektionen, Ischämien, Nekrosen) manifestiert und bei dessen fortgeschrittenen Stadien Amputationen von Zehen, des Vorfußes oder gar des Unterschenkels notwendig werden können. Ein weiteres von Gefäßveränderungen betroffenes Organ ist das Herz, bei dem es in ausgeprägten Stadien zu so genannten (durch die gleichzeitige Schädigung der

Nerven) „stummen Infarkten“, bei denen die Patienten keine oder kaum Schmerzen verspüren, kommen kann. Durch ausgeprägte Schädigung der Gefäße des Zentralnervensystems können weiterhin Schlaganfälle verursacht werden. Fortschreitende Schädigungen der Gefäße der Netzhaut (Retinopathie) können bis zur Erblindung des betroffenen Auges führen.

In der folgenden Tabelle wird für ausgewählte Begleit- und Folgeerkrankungen dargestellt, bei welchem Anteil derjenigen Patienten, die bei Programmeintritt von diesen Erkrankungen noch nicht betroffen waren, im weiteren Programmverlauf mindestens eine Inzidenz auftritt. Aufgrund der geringen Prävalenzen bei den Zielwerten „Amputationen“ und „Erblindung“ war keine Modellbildung möglich; entsprechend können dazu keine Ergebnisse ausgewiesen werden.

Tabelle D.3.5.1 Begleit- und Folgeerkrankungen: Herzinfarkt - Auswertungen ohne Beitrittsjahr

Begleit- und Folgeerkrankungen: Herzinfarkt - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Herzinfarkt				
Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über	Anteil in %	0,92	1,30	1,61
Patienten ohne Inzidenz zur ED	Fallbasis	113015	113015	113015

Tabelle D.3.5.2 Begleit- und Folgeerkrankungen: Schlaganfall - Auswertungen ohne Beitrittsjahr

Begleit- und Folgeerkrankungen: Schlaganfall - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Schlaganfall				
Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über	Anteil in %	0,89	3,20	9,35
Patienten ohne Inzidenz zur ED	Fallbasis	111475	111475	111475

Tabelle D.3.5.3 Begleit- und Folgeerkrankungen: Erheblich auffälliger Fußstatus- Auswertungen ohne Beitrittsjahr

Begleit- und Folgeerkrankungen: Erheblich auffälliger Fußstatus - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
erheblich auffälliger Fußstatus (Wagner 2-5 oder Armstrong C-D)				
Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über	Anteil in %	0,72	1,32	2,07
Patienten ohne beschriebene Inzidenz zur ED	Fallbasis	117055	117055	117055

Tabelle D.3.5.4 Begleit- und Folgeerkrankungen: Diabetische Nephropathie - Auswertungen ohne Beitrittsjahr

Begleit- und Folgeerkrankungen: Diabetische Nephropathie - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
diabetische Nephropathie				
Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über	Anteil in %	8,06	9,67	9,13
Patienten ohne Inzidenz zur ED	Fallbasis	110343	110343	110343

Tabelle D.3.5.5 Begleit- und Folgeerkrankungen: Diabetische Retinopathie - Auswertungen ohne Beitrittsjahr

Begleit- und Folgeerkrankungen: Diabetische Retinopathie - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
diabetische Retinopathie				
Patientenanteil mit mindestens einer Inzidenz über	Anteil in %	3,79	4,60	4,54
Patienten ohne Inzidenz zur ED	Fallbasis	113000	113000	113000

D.3.6 Therapien

Die Beeinträchtigung der Nierenfunktion oder sogar die Schädigung der Nieren ist - wie oben beschrieben wurde - ebenfalls eine gefürchtete Begleiterkrankung der Diabetes-Erkrankung.

In der folgenden Tabelle wird dokumentiert, welcher Anteil der Patienten im Durchschnitt aller Kohorten und Auswertungshalbjahre eine **Nierenersatztherapie** erhielt.

Tabelle D.3.6.1 Therapien: Nierenersatztherapie - Auswertungen ohne Beitrittsjahr

Therapien: Nierenersatztherapie - Auswertungen ohne Beitrittsjahr		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Nierenersatztherapie				
Patientenanteil mit mindestens einer Therapie über Patienten ohne Therapie zur ED	Anteil in %	0,38	0,60	0,64
	Fallbasis	117352	117352	117352

D.3.7 Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier

In den folgenden Tabellen sind **kumulierte „Raten der ereignisfreien Zeit“ nach Kaplan-Meier** ausgewiesen. Diese geben die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass für die Patienten zum jeweiligen Halbjahr (noch) keines der aufgeführten Ereignisse dokumentiert war, bezogen auf die Patientengruppe, bei denen diese Ereignisse noch auftreten könnten. Hierbei wird jeweils nur das erste Auftreten eines Endpunktes betrachtet.¹⁶

¹⁶Für die Analyse der vorliegenden Ergebnisse ist zu beachten, dass der Zähler „t“ über die Folgehalbjahre läuft. Da in den medizinischen Erstdokumentationen das Erstauftreten der dokumentierten Endpunkte zeitlich nicht zugeordnet werden kann, können die Ereigniszeitanalysen erst ab dem 1. Folgehalbjahr beginnen, d.h. t=1, 2, ..., x. Für die in den PM-Daten enthaltenen Angaben über Todesfälle gilt diese Einschränkung nicht. Die Ereigniszeitanalysen bezüglich Tod können daher bereits im Beitrittsjahr beginnen, d.h. t=0, 1, 2, ..., x.

Die ermittelten Raten der ereignisfreien Zeit werden in Prozent ausgewiesen. Bei der Interpretation der Werte ist zudem zu beachten, dass es aufgrund der – in den ersten Jahren der Evaluationsphase zwangsläufig – geringen Anzahl von Messzeitpunkten zu verzerrten Parameterschätzungen kommen kann.¹⁷

¹⁷Auf diese Problematik hatte infas frühzeitig hingewiesen. Nach den Vorgaben des Bundesversicherungsamtes war dennoch von Beginn an das Auftreten von Endpunkten mit Ereigniszeitanalysen zu modellieren, da mit zunehmender Follow-up-Zeit in dieser Hinsicht keine gravierenden methodischen Probleme mehr zu erwarten seien.

Tabelle D.3.7.1 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=4, Tod t=5): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
primäre Endpunkte, t=4				
	Rate in %	92,83	92,73	94,65
	Fallbasis	69446	69446	69446
sekundäre Endpunkte, t=4				
	Rate in %	84,17	84,01	85,93
	Fallbasis	62230	62230	62230
Tod, t=5				
	Rate in %	94,41	94,56	96,75
	Fallbasis	76938	76938	76938

Tabelle D.3.7.2 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=5, Tod t=6): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
primäre Endpunkte, t=5				
	Rate in %	91,01	90,93	93,41
	Fallbasis	61153	61153	61153
sekundäre Endpunkte, t=5				
	Rate in %	80,58	80,43	83,03
	Fallbasis	54792	54792	54792
Tod, t=6				
	Rate in %	93,13	93,37	96,08
	Fallbasis	67750	67750	67750

Tabelle D.3.7.3 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=6, Tod t=7): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
primäre Endpunkte, t=6				
	Rate in %	89,17	89,11	92,25
	Fallbasis	54210	54210	54210
sekundäre Endpunkte, t=6				
	Rate in %	77,02	76,90	80,03
	Fallbasis	48485	48485	48485
Tod, t=7				
	Rate in %	91,74	92,10	95,43
	Fallbasis	60006	60006	60006

Tabelle D.3.7.4 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=7, Tod t=8): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
primäre Endpunkte, t=7				
	Rate in %	87,30	87,34	91,10
	Fallbasis	47926	47926	47926
sekundäre Endpunkte, t=7				
	Rate in %	73,56	73,46	76,88
	Fallbasis	42912	42912	42912
Tod, t=8				
	Rate in %	90,28	90,78	94,79
	Fallbasis	53038	53038	53038

Tabelle D.3.7.5 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte (t=8, Tod t=9): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
primäre Endpunkte, t=8				
	Rate in %	85,66	85,79	89,88
	Fallbasis	41917	41917	41917
sekundäre Endpunkte, t=8				
	Rate in %	70,06	69,99	73,32
	Fallbasis	37589	37589	37589
Tod, t=9				
	Rate in %	88,87	89,53	94,16
	Fallbasis	46365	46365	46365

Tabelle D.3.7.6 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=9, Tod t=10): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
primäre Endpunkte, t=9				
	Rate in %	83,89	84,20	88,87
	Fallbasis	34978	34978	34978
sekundäre Endpunkte, t=9				
	Rate in %	66,63	67,05	71,33
	Fallbasis	31342	31342	31342
Tod, t=10				
	Rate in %	87,31	88,16	93,49
	Fallbasis	38697	38697	38697

Tabelle D.3.7.7 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=10, Tod t=11): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
primäre Endpunkte, t=10				
	Rate in %	82,03	82,59	87,92
	Fallbasis	28552	28552	28552
sekundäre Endpunkte, t=10				
	Rate in %	63,37	64,19	69,51
	Fallbasis	25532	25532	25532
Tod, t=11				
	Rate in %	85,64	86,77	92,84
	Fallbasis	31559	31559	31559

Tabelle D.3.7.8 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=11, Tod t=12): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
primäre Endpunkte, t=11				
	Rate in %	79,97	80,94	87,20
	Fallbasis	19118	19118	19118
sekundäre Endpunkte, t=11				
	Rate in %	59,77	61,28	68,07
	Fallbasis	17061	17061	17061
Tod, t=12				
	Rate in %	83,92	85,39	92,25
	Fallbasis	21146	21146	21146

Tabelle D.3.7.9 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=12, Tod t=13): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
primäre Endpunkte, t=12				
	Rate in %	78,21	79,61	86,55
	Fallbasis	12541	12541	12541
sekundäre Endpunkte, t=12				
	Rate in %	56,09	55,69	65,53
	Fallbasis	11180	11180	11180
Tod, t=13				
	Rate in %	82,32	82,83	85,93
	Fallbasis	13820	13820	13820

Tabelle D.3.7.10 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=13, Tod t=14): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
primäre Endpunkte, t=13				
	Rate in %	65,05	78,09	85,87
	Fallbasis	7677	7677	7677
sekundäre Endpunkte, t=13				
	Rate in %	52,87	55,69	65,53
	Fallbasis	6836	6836	6836
Tod, t=14				
	Rate in %	80,38	82,83	91,32
	Fallbasis	8422	8422	8422

Tabelle D.3.7.11 Ereigniszeitanalysen (primäre und sekundäre Endpunkte t=14, Tod t=15): Kumulierte Raten der ereignisfreien Zeit nach Kaplan-Meier

Ereigniszeitanalysen nach Kaplan-Meier		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
primäre Endpunkte, t=14				
	Rate in %	63,42	76,65	85,26
	Fallbasis	4077	4077	4077
sekundäre Endpunkte, t=14				
	Rate in %	49,69	53,17	64,78
	Fallbasis	3666	3666	3666
Tod, t=15				
	Rate in %	78,54	81,60	90,97
	Fallbasis	4479	4479	4479

D.3.8 Endpunktfreiheit

In der folgenden Tabelle wird der Anteil derjenigen Patienten ausgewiesen, für die zu Beginn der DMP-Teilnahme noch kein primärer Endpunkt, aber mindestens ein sekundärer Endpunkt dokumentiert war und die im Verlauf der DMP-Teilnahme ihren Status „ohne primäre Endpunkte“ behalten haben.

Tabelle D.3.8.1 Endpunktfreiheit

Endpunktfreiheit		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Endpunktfreiheit	Anteil in %	100,00	81,51	76,56
	Fallbasis	18990	18990	18990

D.5 Leistungsausgaben

Das Auswertungskapitel 4 der regulären Evaluationsberichte ist für die Risikoadjustierung nicht relevant. Um den Vergleich beider Berichte über eine analoge Nummerierung zu erleichtern, wird der vorliegende Bericht mit dem Kapitel 5 fortgesetzt.

Ein Grundziel der Evaluation ist laut Kriterien des BVA die Überprüfung der Kosten der Versorgung der DMP-Patienten. Entsprechende Auswertungen werden in diesem zweiten Teil des Evaluationsberichtes vorgenommen. Hierzu werden anhand von Zufallsstichproben die durchschnittlichen Leistungsausgaben pro Patient berechnet. Diese werden in Euro ausgewiesen. In diese Betrachtung fließen alle Ausgaben für die betrachteten Leistungsbereiche ein, nicht nur die diabetesspezifischen Ausgaben. Differenziert wird nach folgenden Bereichen:

- ambulante ärztliche Behandlung und häusliche Krankenpflege,
- Krankenhausbehandlung und Anschlussrehabilitation,

- Arzneimittel,
- Heil- und Hilfsmittel sowie Dialyse-Sachkosten,
- Krankengeld (im Gegensatz zur Auswertung im Berichtsteil II ist die Auswertungen hier nicht auf Patienten mit Krankengeldanspruch bezogen, sondern ist für alle Patienten vorzunehmen).

Für Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege liegen die Leistungsausgaben erst ab dem 1. Halbjahr 2006 vor.

Die Angaben zu den Leistungsausgaben liegen für eine Stichprobe aller evaluierten Patienten vor.

Tabelle D.5.1 Leistungsausgaben: Ambulante ärztliche Behandlung und häusliche Krankenpflege - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre

Leistungsausgaben: Ambulante ärztliche Behandlung und häusliche Krankenpflege - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Ausgaben f. ambulante ärztliche Behandlung und häusliche Krankenpflege				
Durchschnittliche Halbjahresausgaben pro Patient über die Stichprobenmitglieder	Mean in Euro	540,38	597,85	551,67
	Fallbasis	7480	7480	7480

Tabelle D.5.2 Leistungsausgaben: Krankenhausbehandlung und Anschlussrehabilitation - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre

Leistungsausgaben: Krankenhausbehandlung und Anschlussrehabilitation - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Ausgaben für Krankenhausbehandlung und Anschlussrehabilitation				
Durchschnittliche Halbjahresausgaben pro Patient über die Stichprobenmitglieder	Mean in Euro	1123,59	1250,96	846,20
	Fallbasis	7784	7784	7784

Tabelle D.5.3 Leistungsausgaben: Arzneimittel - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre

Leistungsausgaben: Arzneimittel - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Ausgaben für Arzneimittel				
Durchschnittliche Halbjahresausgaben pro Patient über die Stichprobenmitglieder	Mean in Euro	674,42	776,21	668,76
	Fallbasis	7784	7784	7784

Tabelle D.5.4 Leistungsausgaben: Heil- und Hilfsmittel, sowie Dialyse-Sachkosten - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre

Leistungsausgaben: Heil- und Hilfsmittel, sowie Dialyse-Sachkosten - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Ausgaben für Heil- und Hilfsmittel, sowie Dialyse-Sachkosten				
Durchschnittliche Halbjahresausgaben pro Patient über die Stichprobenmitglieder	Mean in Euro	159,79	200,34	185,44
	Fallbasis	7480	7480	7480

Tabelle D.5.5 Leistungsausgaben: Krankengeld bei anspruchsberechtigten Patienten - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre

Leistungsausgaben: Krankengeld bei anspruchsberechtigten Patienten - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Ausgaben für Krankengeld bei anspruchsberechtigten Patienten				
Durchschnittliche Halbjahresausgaben pro Patient über die Stichprobenmitglieder	Mean in Euro	82,25	35,41	35,70
	Fallbasis	7784	7784	7784

Tabelle D.5.6 Leistungsausgaben: Insgesamt - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre

Leistungsausgaben: Insgesamt - durchschnittliche Halbjahresausgaben über alle Kohorten und Auswertungshalbjahre		Risikoadjustierter Mittelwert	Mittel der beobachteten Werte	Mittel der erwarteten Werte
Leistungsausgaben insgesamt				
Durchschnittliche Halbjahresausgaben pro Patient über die Stichprobenmitglieder	Mean in Euro	2560,98	2841,80	2280,87
	Fallbasis	7784	7784	7784

Anhang E: Methodik und Datengrundlage

In diesem Teil des Anhangs werden Herkunft, Inhalt und Handling derjenigen Datensätze beschrieben, die für den Evaluationsbericht zur Evaluation der Disease-Management-Programme (DMP) zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 herangezogen wurden. Dabei handelt es sich um drei Arten von Datensätzen, die jeweils für einen Patienten erhoben wurden:


- Patientenmerkmale
- Medizinische Daten
- Ökonomische Daten

Die folgenden Erläuterungen gliedern sich in drei Abschnitte: Zunächst wird der Datenfluss im Rahmen der DMP beschrieben (siehe Abbildung E.1.1). Anschließend wird erläutert, welche Qualitätssicherungsmaßnahmen seitens des Evaluators implementiert wurden. Abschließend wird darauf eingegangen, wie bei Sonderfällen hinsichtlich der medizinischen Datensätze verfahren wurde. Diese Erläuterungen beziehen sich auf alle Berichte zur Evaluation der DMP Diabetes mellitus Typ 2 von AOK, Seekrankenkasse und Knappschaft.

E.1 Datengrundlage

Datengrundlage bildet zunächst die Dokumentation, die der Arzt mit der Einschreibung eines Patienten in das Programm anlegt. Der erste Befund wird in der „**Erstdokumentation**“ (ED) dokumentiert, alle weiteren Befunde werden – in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen – in den „**Folgedokumentationen**“ (FD) festgehalten. Zu beachten ist, dass es durch die 9. RSA-ÄndV zu einer Änderung in der Dokumentation kam.

Abb. E.1.1 Datenfluss im Rahmen des DMP DM2 unter vertraglicher Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) (Regelfall) - ab eDMP



Voraussetzung für die Evaluation ist die unbedingte Einhaltung des Datenschutzes. Um eine adressatenorientierte Datentrennung, Pseudonymisierung und Übermittlung zu realisieren, wurden unabhängige Datenstellen zwischengeschaltet, an die alle von den Ärzten dokumentierten Informationen fließen. Die Datenstellen erfassen die Daten und überprüfen die Datensätze auf Vollständigkeit und Plausibilität. Bei Beanstandungen erfolgt eine Rückmeldung an den behandelnden Arzt, damit entsprechende Korrekturen an den Dokumentationen vorgenommen werden können. Nach Einführung der elektronischen Datenübermittlung (eDMP) ab Juli 2008 gibt es nur noch einen einheitlichen Datensatz, der alle erhobenen **medizinischen Behandlungsdaten** sowie die **personenbezogenen Merkmale** enthält.¹⁸ Dieser Datensatz wird allen an der DMP-Evaluation beteiligten Institutionen, also den Ärzten, den Datenstellen und den Krankenkassen zur Verfügung gestellt.

Die Datenstellen erstellen die **medizinischen Datensätze** gemäß den in den Evaluationskriterien festgelegten Satzartbeschreibungen, die sie dem Evaluator übermitteln. Für das DMP Diabetes mellitus Typ 2 finden die Satzartbeschreibungen SA100EA/FA und SA100ED/FD¹⁹ Anwendung.

Da ab Einführung der elektronischen Datenübermittlungen auch die neuen Satzartbeschreibungen SA100ED/SA100FD Gültigkeit erlangten, wurden dem Evaluator wie oben beschrieben für den vorliegenden Evaluationsbericht die „a-Datensätze“ bis zum Berichtshalbjahr 2008-1 gemäß der Satzartbeschreibungen SA 100EA/FA übermittelt. Für alle Berichtshalbjahre ab 2008-2 werden dem Evaluator gemäß den Evaluationskriterien die medizinischen Daten des einheitlichen Datensatzes auf Basis der Satzartbeschreibungen SA100ED/FD übermittelt.

Die personenbezogenen Merkmale aus dem einheitlichen Datensatz werden von den Krankenkassen dazu genutzt, die bei Ihnen zu jedem Patienten vorhandenen **Patientenmerkmale** zu aktualisieren bzw. zu vervollständigen. Diese dienen dann versichertenbezogenen Qualitätssicherungsaufgaben wie z.B. Informations- und Erinnerungsfunktionen.

Die Kassen sorgen unter anderem anhand der Patientenmerkmale für die formal korrekte Einschreibung ihrer Versicherten in das Programm. Sie legen die Kohortenzugehörigkeit der Patienten fest und entscheiden unter anderem auf Basis fehlender Dokumentationen über deren Austrittsdatum aus dem Programm. Anschließend erstellen Kassen aus den solchermaßen ergänzten Patientenmerkmalen einen Datensatz gemäß der Satzartbeschreibung SA 100 PM (nachfolgend als „PM-Datensatz“ bezeichnet) und übermitteln ihn dem Evaluator. Voraussetzung dafür, dass ein Patient in diesen Datensatz aufgenommen wird, ist, dass für ihn eine gültige „Erstdokumentation“ vorliegt. Sobald dem Evaluator die Patientenmerkmale vorliegen, zieht er eine Zufallsstichprobe aus der Gesamtheit der Programmteilnehmer für die **Evaluation** der ökonomischen Daten. Der Stichprobenumfang beträgt dabei jeweils 10 Prozent der Ist-Größe einer Kohorte, jedoch mindestens 100 und höchstens 500 Patienten. Falls an einem Programm zwischen 10 und 100 Patienten teilnahmen, wird eine Vollerhebung durchgeführt. Davon wird jedoch abgesehen, wenn die Kohorte weniger als 10 Teilnehmer umfasst, da in diesem Fall aus Gründen der Wahrung der Anonymität auf eine Auswertung verzichtet wird. Der Evaluator übermittelt der Krankenkasse eine Liste mit den Pseudonymen der Stichprobe. Die Kasse spielt diesen Pseudonymen die mit der medizinischen Behandlung verbundenen Leistungsausgaben zu und erstellt daraus einen Datensatz gemäß der Satzartbeschreibung SA 100 OD. Ferner liefert sie Angaben zu den Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung im Disease-Management-Programm. („**ökonomische Daten**“).

Der damit beschriebene Datenfluss ist schematisch in Abbildung E.1.1 dargestellt und gilt für alle Kohorten.

Ab der Kohorte 2008-2 wurden die Auswertungen darüber hinaus um die Ergebnisse einer schriftlichen Befragung zur Veränderung der subjektiven Lebensqualität ergänzt. Die Lebensqualität wird mittels des SF-36-Fragebogens erhoben. Der SF-36 zählt zu den bekanntesten und international am häufigsten eingesetzten generischen Instrumenten, um den Gesundheitszustand zu messen.

Befragt wird grundsätzlich die bereits oben beschriebene Stichprobe von Patienten. Die Kasse ermittelt dazu, für die vom Evaluator übermittelte Pseudonymliste, die zugehörigen Adressdaten und versendet an diese Patienten den Fragebogen. Die Patienten senden die ausgefüllten Fragebögen direkt an den Evaluator zurück, wo sie ausgewertet werden.

Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wurde in den bisherigen Erläuterungen wie auch in den tabellarischen Auswertungen von „Teilnehmern“ und „Patienten“ gesprochen und nicht von „Fällen“.

Bei der Interpretation der Auswertungen ist jedoch zu berücksichtigen, dass entsprechend der Kriterien des BVA eine **fallbezogene Auswertung** vorgenommen wurde und keine patientenbezogene. So wurde bei wiederholter Einschreibung ein neuer Fall gebildet und damit der Versicherte einer neuen Kohorte zugeordnet. Das könnte z.B. bei Unterbrechung der Teilnahme an einem Programm der Fall sein. Bei einer patientenbezogenen Auswertung würde hingegen der Patient weiterhin in der bisherigen Kohorte geführt und die formale Wiedereinschreibung ignoriert. Beispiel: Der Versicherte hat schon einmal am betrachteten DMP teilgenommen, ist dann aber ausgeschieden und meldet sich nun im selben DMP erneut an, allerdings in einer „jüngeren“ Kohorte. Dies war insbesondere in der Einführungsphase der DMP relevant, als Anlaufschwierigkeiten dazu führten, dass Versicherte aus formalen Gründen von ihrer Krankenkasse aus dem DMP ausgeschrieben werden mussten und sich

in der Folge erneut einschrieben. Der frühere, bereits dokumentierte Gesundheitszustand und die ggf. durch das DMP beeinflussten Ausprägungen (z.B. Verhaltensänderungen) vor Wiedereintritt ins DMP können somit nicht in der Auswertung berücksichtigt werden.

Bei der patientenbezogenen Betrachtungsweise hat die Unterbrechung der Teilnahme keinen Einfluss auf die Auswertung, während bei der fallbezogenen Betrachtungsweise die entsprechenden Versicherten als neue Fälle gelten und damit neu ausgewertet werden. Dies hat folgenden Nachteil: Wird in einem bestimmten DMP ein Teilnehmer der Kohorte 2006-2 im 2. Halbjahr betrachtet, kann daraus nur mit Sicherheit geschlossen werden, dass er sich in diesem konkreten Programm und in dieser konkreten Kohorte genau im zweiten Teilnahmehalbjahr befindet – denn möglicherweise hat der betreffende Patient „Vorzeiten“ in einer anderen Kohorte und nimmt damit schon länger als die Tabelle vermuten ließe an einem DMP teil. Der Evaluator und die ihn beauftragenden Krankenkassen haben sich daher beim BVA dafür eingesetzt, dass die Versicherten nicht als neue Fälle ausgewertet werden; das BVA hat sich jedoch für das Fallkonzept entschieden.

Bei der Interpretation der tabellarischen Auswertungen nach vollendeten Lebensjahren ist zu berücksichtigen, dass nur Angaben zum Geburtsjahr, nicht aber zum Geburtsmonat oder gar Geburtstag vorlagen. Um für die Patienten dennoch zutreffende Angaben über die vollendeten Lebensjahre treffen zu können, musste auf die Altersangabe „vollendete Lebensjahre zum 1.1. des Auswertungsjahres“ zurückgegriffen werden, die sich nach den Berechnungsvorschriften des BVA ergeben als „Auswertungsjahr minus Geburtsjahr minus 1“. Dadurch ergibt sich eine Besonderheit. Die Patienten werden verglichen mit der für Durchschnittswerte häufig verwendeten Altersermittlung „Auswertungsjahr minus Geburtsjahr“ um ein Jahr jünger ausgewiesen.

¹⁸ Bis zum 30.06.2008 wurden die von den Datenstellen nicht beanstandeten bzw. korrigierten Daten durch die Datenstellen gesplittet, um die personenbezogenen Merkmale von bestimmten medizinischen Daten, für die stattdessen Pseudonyme für die Versicherten vergeben werden, zu trennen. Zum einen wurde dabei ein sog. „a-Datensatz“ in versichertenpseudonymisierter Form erstellt, der u.a. alle medizinischen Daten enthielt. Zum anderen wurde ein „b-Datensatz“ für die Krankenkassen erstellt. Dieser Kurzdatsatz enthielt bestimmte medizinische Daten sowie die personenbezogenen Merkmale wie Geschlecht, Geburtsdatum usw. Durch den Wegfall der Splittung in „a“- und „b“-Datensatz werden Verwaltungsaufwand und Kosten eingespart. Der Datenschutz für die am DMP teilnehmenden Patienten bleibt jedoch nach wie vor gewahrt.

¹⁹ Das „E“ steht dabei für „Erstdokumentation“, das „F“ für „Folgedokumentation“. Mit den Buchstaben „A“ (alt) und „D“ wird unterschieden, ob sich die Dokumentation auf die Zeit vor oder nach Einführung der elektronischen Datenerfassung (eDMP) in den Arztpraxen bezieht.

E.2 Qualitätssicherung

In der praktischen Umsetzung der Datenverarbeitung kam es zu Abweichungen bei der erwarteten Datenqualität. Diese Abweichungen traten insbesondere zu Beginn der Programmlaufzeit, z.B. aufgrund der allgemeinen Anlaufschwierigkeiten, auf. Zur Sicherstellung der Datenqualität wurden daher seitens des Evaluators auf mehreren Ebenen aufwändige Kontroll- und Bereinigungsverfahren implementiert:

- Eingangskontrolle auf Datenformat- und Plausibilitätskriterien
- Dublettenbereinigung
- Matching-Kontrolle (PM- und medizinische Datensätze)
- Rücklaufkontrolle (OD-Datensätze)
- Kontrolle auf Fortschreibung im Zeitverlauf (PM-Datensätze)

Die Anforderungen an die Datensätze sind in den „Datensatzbeschreibungen zur Evaluation“ des BVA geregelt. Alle Daten, die dem Evaluator von den Krankenkassen, Datenstellen und gemeinsamen Einrichtungen geliefert wurden, wurden beim Import auf Verstöße gegen diese Datenanforderungen geprüft und mussten gegebenenfalls neu geliefert werden. Dabei wurden zwei Fehlerquellen festgestellt. Zum einen kam es vor, dass die Daten gegen das festgelegte **Datenformat** verstießen (unzulässige Spaltenlänge, unzulässige Anzahl der Zeichen pro Feld, unzulässige Trennzeichen der Datensätze). Zum anderen kam es vor, dass die medizinischen Daten gegen die festgelegten **Plausibilitätskriterien** verstießen (nicht ausgefüllte Pflichtfelder, unzulässige Einträge, unzulässige Kombinationen). Die Dateien mussten neu geliefert werden, sofern für mindestens ein Merkmal der Anteil der Datensätze mit einem Verstoß gegen die geprüften Plausibilitätskriterien bei 5 Prozent oder mehr lag.²⁰ Der Evaluator hat es allerdings nicht zu verantworten, wenn Teile der Datensätze weiterhin nicht auswertbar waren. Für die Richtigkeit der Rohdaten, die dem Evaluator geliefert wurden, kann er ebenfalls keine Gewähr übernehmen.

Alle anderen Dateien wurden in die tabellarische Auswertung mit einbezogen, also einschließlich der Datensätze mit einem oder mehreren Verstößen gegen die Plausibilitätsregeln. In diesen Fällen wurde im Zusammenspiel mit den Rechenregeln und den medizinischen Plausibilitätskriterien des BVA (siehe Tabelle 0.1.2) folgendermaßen verfahren: Sofern sich die Auswertung auf Merkmale bezog, bei denen kein Regelverstoß vorlag und die gemäß Rechenregeln auswertbar waren, gingen alle Datensätze ganz normal in die Auswertung ein. Sofern sich die Auswertung auf Merkmale bezog, bei denen Regelverstöße vorlagen oder die gemäß Rechenregeln nicht auswertbar waren, wurden Datensätze mit Regelverstoß als „nicht auswertbar“ ausgewiesen.

Zudem kam es vor, dass die gelieferten Dateien **Dubletten** enthielten, die aussortiert werden mussten. Diese Bereinigung erfolgte bei zwei Arten von Dubletten. Zum einen wurden **„Komplett-Dubletten“** aussortiert, also Datensätze, die in allen gelieferten Feldern exakt dieselben Inhalte aufwiesen wie ein bereits vorliegender Datensatz. Diese Dubletten traten in den PM-Datensätzen auf. Zum anderen wurden **„Auswertungsdubletten“** aussortiert. Dabei handelt es sich um Datensätze, die hinsichtlich der Kriterien „Antragsregion“, „Kassenart“ und „Kohortenzugehörigkeit“, also mit identischem Auswertungsschlüssel für einen Versicherten bzw. ein Pseudonym mehrfach vorliegen. Hierbei kann pro Variable nur ein einziger dieser Datensätze ausgewertet werden. Die übrigen Datensätze fallen als Auswertungsdubletten durch das Raster. Mit der Eingangskontrolle und der Dublettenbereinigung wurden Datenqualität und Auswertbarkeit für die einzelnen Datensatztypen (PM-Datensätze, Medizinische Datensätze, Ökonomische Datensätze) verbessert. In diesem Bericht steht jedoch nicht die getrennte Auswertung der einzelnen Datensatztypen im Vordergrund, sondern die Verknüpfung (**„Matching“**) von Personenmerkmalen, medizinischen Daten und ökonomischen Daten anhand der Pseudonymnummern. Daher wurden alle nach Eingangskontrolle und Dublettenbereinigung verbliebenen PM- und medizinischen Datensätze – differenziert nach Kassen und Antragsregion – zunächst auf ihre Verknüpfbarkeit hin ausgewertet, um nicht zuordenbare Datensätze zu identifizieren. Hier ist zwischen folgenden Fällen von Verknüpfungsfehlern zu unterscheiden:

- Medizinische Datensätze (Erst- oder Folgedokumentationen) ohne zugehörigen PM-Datensatz
- PM-Datensätze ohne zugehörige Erstdokumentation

Bei der Analyse dieser Auswertung war zu berücksichtigen, dass ein 100-prozentiges Matching zwischen medizinischen Datensätzen und PM-Datensätzen nicht plausibel wäre. Denn neben einer fehlerhaften Pseudonymvergabe führen verschiedene Konstellationen dazu, dass sich Erstdokumentationen keinem PM-Datensatz zuordnen lassen.

Auch die Zuordnung von PM-Datensätzen zu Erstdokumentationen war aus plausiblen Gründen - wie z.B. falscher Datumsangabe oder Wechsel des Institutionskennzeichens - häufig nicht in 100 Prozent der Fälle möglich.

In die tabellarischen Auswertungen der Patientenmerkmale und der medizinischen Daten flossen nur die Werte derjenigen Patienten ein, für die neben dem PM-Datensatz auch eine zugehörige Erstdokumentation vorlag.

Bei den ökonomischen Datensätzen war eine Überprüfung auf Verknüpfbarkeit entbehrlich. Da sie durch das Zuspielen der Leistungsausgaben zu denjenigen Pseudonymnummern generiert wurden, die in einer Stichprobe aus den PM-Datensätzen gezogen worden waren, war für die zugespielten Leistungsausgaben eine Verknüpfbarkeit mit den PM-Datensätzen in jedem Fall gegeben. Dennoch konnten auch hier drei Arten von Problemfällen auftreten:

- In der Stichprobe gezogene Pseudonymnummern, denen keine Leistungsausgaben zugespielt worden waren
- In der Stichprobe gezogene Pseudonymnummern, denen die Leistungsausgaben doppelt und mit teils unterschiedlichen Werten zugespielt worden waren
- In der Stichprobe nicht gezogene Pseudonymnummern, die dennoch um Leistungsausgaben ergänzt geliefert wurden

Im Rahmen einer **Rücklaufkontrolle** wurde daher ein Abgleich vorgenommen zwischen denjenigen Pseudonymnummern, die der Evaluator in der Stichprobe gezogen hatte, und denjenigen Pseudonymnummern, für welche die Krankenkasse die zugehörigen Leistungsausgaben zugespielt hatte. Damit wurden – differenziert nach Kassen, Eintrittskohorte und Antragsregion – die Problemfälle identifiziert. Da es sich bei der letztgenannten Art von Problemfällen um nicht auswertungsrelevante Informationen handelt, wurden die entsprechenden Datensätze bei der Auswertung ignoriert. Analog wurde vorgegangen, wenn den Pseudonymnummern Leistungsausgaben für Halbjahre zugespielt wurden, in denen die entsprechenden Patienten nicht mehr Programmteilnehmer waren.

Dass die Krankenkassen nicht allen gezogenen Pseudonymnummern die Leistungsausgaben für die erwarteten Berichtshalbjahre zuspielten, lag zum Teil daran, dass die entsprechenden Patienten rückwirkend aus dem Programm ausgeschrieben worden waren, diese Information zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung aber noch nicht vorlag. Lagen andere Gründe dafür vor, wurden die Daten ggf. von Kassen ergänzt und eine Neulieferung der überarbeiteten ökonomischen Datensätze an den Evaluator vorgenommen. Lagen in einer Datenlieferung für eine Pseudonymnummer zwei oder mehr ökonomische Datensätze mit unterschiedlichen Leistungsausgaben vor, floss der ökonomisch ungünstigste Wert in die Evaluation ein.

Bei der Evaluation war zudem bei den PM-Daten eine Kontrolle auf Fortschreibung im Zeitverlauf vorzunehmen. Denn nach der erstmaligen Lieferung der PM-Daten stellen die Kassen dem Evaluator halbjährlich den jeweils neuesten Stand der PM-Datensätze zur Verfügung. Um Auswertungen im Zeitverlauf zu ermöglichen, müssen die neuen PM-Datenlieferungen sowohl die PM-Daten aller bisherigen Programmteilnehmer – egal ob mittlerweile ausgeschieden oder nach wie vor Mitglied der Restkohorte – als auch die PM-Daten aller seitdem neu in das Programm eingetretenen Versicherten enthalten. Die neuen PM-Datensätze, die dem Evaluator zur Verfügung gestellt wurden, erfüllten diese Anforderung jedoch nicht in allen Fällen. Die Datenbasis der Auswertungen wurde daher durch einen Abgleich der bisherigen mit den neuen PM-Daten gewonnen:

- Grundlage der Datenbasis waren die PM-Datensätze der Erstlieferung, die in die veröffentlichten Berichte eingegangen sind (bis zum Berichtshalbjahr 2012-1)
- Sie wurden ergänzt durch die in der aktuellen Datenlieferung enthaltenen PM-Datensätze für alle bisher noch nicht ausgewerteten Eintrittskohorten.
- Änderungen in den PM-Datensätzen der neuen Lieferung werden auch dann berücksichtigt, wenn sie sich auf bereits veröffentlichte Kohorten bzw. Halbjahre beziehen.

Der letzte Punkt stellt eine Änderung gegenüber den bisherigen Berichten dar, die gemäß der Abstimmung mit dem BVA zum 30.09.2013 sowohl für die medizinischen als auch für die stichprobenbasierten Auswertungen umzusetzen war. Im Kern wird dabei zugunsten einer aktuelleren Datenbasis die Reproduzierbarkeit der Berichte aufgehoben. Durch die rückwirkende Bereinigung der Datenbasis kann es im Vergleich zu den bisherigen Berichten insbesondere zu folgenden Änderungen kommen: Die Restkohorte kann durch die rückwirkende Bereinigung im Zeitverlauf stärker absinken als in bisherigen Berichten. Da diese Bereinigung im Wesentlichen Patienten ohne medizinische Dokumentation betrifft, ist in der Regel jedoch mit keinen oder nur geringen Auswirkungen auf die **Anzahl der auswertbaren Patienten und ihre Auswertungsergebnisse** (Durchschnittswerte, Patientenanteile) zu rechnen. Dagegen ist davon auszugehen, dass der **Anteil** der auswertbaren Patienten an allen Patienten steigt, wenn die Restkohorte als Bezugsgröße kleiner ausfällt als in bisherigen Berichten. Analog ist in diesem Fall auch ein Anstieg der Anteilswerte aus anderen Auswertungen zu erwarten, deren Bezugsgröße die Restkohorte darstellt.

²⁰ Der Fehleranteil wurde auf die „Netto“-Datei bezogen ermittelt: Für jede Satzart wurde von den Datenstellen eine „Brutto“-Datei geliefert, wobei je nach Datenstelle die Versichertendaten mehrerer Kassen und/oder Kassenarten in einer Datei enthalten sein konnten. Aus dieser Datei wurden die Komplettdubletten aussortiert (siehe nächster Absatz). Die sich daraus ergebende Netto-Datei war die Basis für die Plausibilitätsprüfungen und die Berechnung der Fehleranteile.

E.3 Sonderfälle bei den medizinischen Datensätzen

Im Standardfall, der bei den bisherigen Erläuterungen implizit unterstellt wurde, liegt für einen DMP-Teilnehmer für das Beitrittsjahr genau eine Erstdokumentation und ab dem 2. Halbjahr genau eine Folgedokumentation vor. Tatsächlich kam es in den vorliegenden medizinischen Datensätzen teilweise zu Abweichungen von diesem Schema. Im Folgenden wird beschrieben, wie bei diesen Sonderfällen in der Auswertung vorgegangen wurde:

- **1. Folgedokumentationen bereits im Beitrittsjahr**
Liegen für das Beitrittsjahr eines Patienten eine oder mehrere Folgedokumentationen vor, wurden diese dem darauf folgenden Halbjahr zugeordnet. Führt dies dazu, dass dem 2. Halbjahr zwei oder mehr Folgedokumentationen zugerechnet wurden, galten die Regeln aus Tabelle E.3.1.
- **2. Folgedokumentationen außerhalb des Teilnahmezeitraums**
Liegen Folgedokumentationen für ein Berichtshalbjahr vor, das vor dem Beitrittsjahr oder nach dem Austrittsjahr liegt, werden die entsprechenden Datensätze in der Auswertung nicht berücksichtigt.
- **3. Mehrere Folgedokumentationen in einem Halbjahr**
Lagen für ein Halbjahr mehrere Folgedokumentationen vor, fanden die Regeln aus Tabelle E.3.1 Anwendung.
- **4. Mehrere Erstdokumentationen im Beitrittsjahr**
Lagen für das Beitrittsjahr zwei oder mehr Erstdokumentationen vor, wurde grundsätzlich diejenige mit dem frühesten Unterschriftsdatum des Arztes herangezogen. Sofern zwei oder mehr Erstdokumentationen mit diesem Datum vorliegen, werden die auszuwertenden medizinischen Werte gemäß Tabelle E.3.1 festgelegt.
- **5. Erstdokumentationen im 2. Halbjahr oder später**
Lagen Erstdokumentationen für Halbjahre nach dem Beitrittsjahr vor, werden die entsprechenden Datensätze in der Auswertung nicht berücksichtigt.

Die beiden letztgenannten Punkte wurden im Herbst 2010 neu in die Berechnungsvorschriften aufgenommen.²¹ In den Fällen, in denen die Datenlage widersprüchlich ist, kann es dadurch zu Abweichungen gegenüber bisherigen Berichtsergebnissen kommen. Da in einer chronologisch ersten Erstdokumentation nicht zwangsläufig alle Parameter gleich dokumentiert sind, wie in etwaigen weiteren Erstdokumentationen im Beitrittsjahr, kann es aufgrund der Neuregelung in Punkt 4 zu einer Änderung medizinischer Parameter im *Beitrittsjahr* und infolgedessen auch zu Änderungen der Basis von kollektivbasierten Auswertungen kommen. Die Neuregelung unter Punkt 5 kann zu einer Änderung medizinischer Parameter in den *Folgehalbjahren* führen.²² Darüber hinaus wurden die Berechnungsvorschriften bezüglich Tabelle E.3.1 dahingehend geändert, dass bei den Laborparametern/Messwerten nicht mehr der letzte chronologisch verfügbare, sondern der letzte *plausible* Wert zu verwenden ist. Dadurch kann es ebenfalls zu Abweichungen gegenüber bisherigen Berichtsergebnissen kommen.

²¹ Zuvor war in den Berechnungsvorschriften des BVA nur definiert, wie bei Sonderfällen bezüglich der Folgedokumentationen zu verfahren ist (mehrerer Folgedokumentationen in einem Halbjahr, Folgedokumentationen im „falschen“ Halbjahr). Die Handhabung von Sonderfällen bei den Erstdokumentationen war nicht geregelt. Sie wurden bislang weitestgehend analog zu den Sonderfällen bei den Folgedokumentationen in die Auswertung einbezogen.

²² Da medizinische Informationen aus Erstdokumentationen in den Folgehalbjahren explizit zu ignorieren sind, entfällt nun in den betroffenen Fällen und Halbjahren ein medizinischer Wert. Sofern im betroffenen Halbjahr aus einer oder mehreren Folgedokumentationen abweichende Werte vorliegen, kann es – je nach Auswahl gemäß Tabelle E.3.1 – zu veränderten medizinischen Parametern führen. Sofern im betroffenen Halbjahr keine Folgedokumentationen vorliegen, kommt es durch die Neuregelung zu fehlenden Angaben.

Tabelle E.3.1 Medizinische Daten: Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr

Parameter	Umgang bei mehreren Dokumentationen in einem Berichtshalbjahr
BMI	Jeweils letzter vorliegender plausibler Wert des Auswertungshalbjahres
Definition „Raucher“	Für das betreffende Halbjahr als „Raucher“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde
Hypertonus	Jeweils letztes vorliegendes plausibles Blutdruck-Wert-Paar des Auswertungshalbjahres*
HbA1c	Jeweils letzter vorliegender plausibler HbA1c-Wert des Auswertungshalbjahres*
Serum-Kreatinin	Jeweils letzter vorliegender plausibler Kreatinin-Wert des Auswertungshalbjahres*
Medikation	Jeweils letzter vorliegender Wert des Auswertungshalbjahres**
Empfohlene Diabetes-Schulung	Ist in einem Halbjahr eine Schulungskategorie mindestens einmal als wahrgenommen dokumentiert worden, ist diese Schulung unabhängig von ggf. weiteren dokumentierten Ausprägungen als wahrgenommen zu berücksichtigen („best case“).
Empfohlene Hypertonie-Schulung	Ist in einem Halbjahr eine Schulungskategorie mindestens einmal als wahrgenommen dokumentiert worden, ist diese Schulung unabhängig von ggf. weiteren dokumentierten Ausprägungen als wahrgenommen zu berücksichtigen („best case“).
Herzinfarkt	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Schlaganfall	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Amputation	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Erblindung	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Nierenersatztherapie (ab 2004-2)	als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde
Nephropathie	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Diabetische Retinopathie	als „neu aufgetreten“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Folgedokumentation angegeben wurde
Diabetischer Fuß (Wagner/Armstrong)	Jeweils die höchste (pathologischste) dokumentierte Kategorie für Wagner und Armstrong ist zu werten (s.u.)***
Ophthalmologische Netzhautuntersuchung	als „durchgeführt“ zu werten, wenn dies in mindestens einer Dokumentation angegeben wurde****

* Sollten zu einem **letzten** Arztdatum in einem Halbjahr 2 oder mehr Dokumentationen mit plausiblen Angaben vorliegen, wird der ungünstigste (höchste) Wert verwendet.

** Sollten zu einem **letzten** Arztdatum in einem Halbjahr 2 oder mehr Dokumentationen mit Angaben zur Medikation vorliegen, sind alle Informationen zu verwenden. Bei Widersprüchen (z.B. Medikament X ja und nein) ist von der Anwendung des Medikamentes auszugehen.

*** DFS (Wagner/Armstrong): Beim Vorliegen mehrerer FD ist aus allen vorliegenden FD das Maximum für das Wagner-Stadium UND das Maximum für das Armstrong-Stadium zu werten, unabhängig davon, aus welcher FD die beiden höchsten Angaben entstammen. Dadurch wird sichergestellt, dass für beide Angaben (Wagner und Armstrong) in einem Halbjahr die jeweils höchste dokumentierte Kategorie in die Auswertung einfließt. Laut Ausfüllanleitungen zu SA100EA/FA und SA100ED/FD sind KEINE Angaben zum DFS für Kinder unter 18 Jahren zu machen. Sofern dennoch in den Daten der Datenstellen Angaben bei Kindern enthalten sein sollten, werden diese Angaben für die Evaluation nicht berücksichtigt (auf „missing“ gesetzt).

**** Diese Parameter können halbjährlich pro Folgedokumentation dokumentiert werden, sie werden aber nicht halbjährlich sondern jährlich ausgewertet, so dass immer zwei aufeinanderfolgende Halbjahre ein Berichtsjahr ergeben. Berichtsjahre sind dabei nicht gleichzusetzen mit Kalenderjahren.

E.4 Modellbildung für die Risikoadjustierung

In den folgenden Ausführungen werden die Modellschätzungen für die Risikoadjustierung zentraler Werte im Rahmen der Evaluation der Disease Management Programme für das Krankheitsbild Diabetes Mellitus Typ 2 erläutert.

Allen Modellen liegt ein im Wesentlichen einheitlicher Kovariatensatz zu Grunde, der im Rahmen hierarchischer Modelle mit jeweils zwei Ebenen („Patient“ und „DMP einer Krankenkasse in einer Region“) verwendet wurde. Die Modelle wurden mit einem Datensatz geschätzt, der sich aus jeweils einer Stichprobe aus dem Gesamtdatenbestand der beiden Evaluationsinstitute zusammensetzt. In beiden Instituten wurde dazu jeweils eine Stichprobe von 150.000 Patienten gezogen, die zwischen dem 2. Halbjahr 2004 und dem 1. Halbjahr 2012 in die Programme eingetreten sind. Die beiden Stichproben wurden zusammengeführt und anonymisiert (Vergabe zufällig generierter Werte für die DMP-Kennung und die Patientenkennung). Für jeden Patienten können in halbjährlichem Abstand mehrere Messzeitpunkte vorliegen, wobei der Beobachtungszeitraum bis maximal zum 1. Halbjahr 2012 reicht. Eintritte in die Programme erfolgten ab dem 2. Halbjahr 2004. Die maximale Anzahl an Beobachtungszeitpunkten und damit die maximale Anzahl an Records pro Patient in dem Datensatz beträgt demnach 16 (Eintritt in das DMP im 2. Halbjahr 2004 und das letzte Beobachtungshalbjahr ist das 1. Halbjahr 2012).

Insgesamt setzte sich der anonymisierte gepoolte Datensatz aus 300.000 Patienten und 1.859.583 Records zusammen. Enthalten waren 283 DMP, die allerdings zum Teil nur sehr gering besetzt waren. Deshalb wurden sieben DMP mit weniger als drei Patienten für die Modellschätzung aus dem Datensatz entfernt. Zusätzlich wurden Halbjahre ohne Erst- bzw. Folgedokumentation aus dem Datensatz entfernt. Der letztlich für die Modellschätzung der medizinischen Zielgrößen verwendete Datensatz setzte sich aus 276 DMP mit 299.927 Patienten und 1.770.063 auswertbaren Records zusammen.

Da die ökonomischen Werte nur für eine Stichprobe aller Patienten vorliegen, basieren auch die Modelle zur Schätzung der ökonomischen Zielgrößen auf einer kleineren Fallzahl. Insgesamt lagen in dem gepoolten Gesamtdatensatz für 112.899 Patienten mit 241.469 Records ökonomische Werte vor. Die Zahl der DMP lag bei 276. Von den 276 DMP mit Patienten mit ökonomischen Werten wurden drei DMP mit weniger als drei Patienten für die Modellschätzung aus dem Datensatz entfernt. Insgesamt verblieben also 273 DMP mit 121.894 Patienten und 241.464 Records für die Schätzung der ökonomischen Modelle.

In allen Modellen mit Ausnahme der Übergangsratenmodelle ist die Eintrittskohorte (kodiert von 1 bis 16) und das Kalenderhalbjahr (kodiert von 0 bis 15) enthalten. In den Übergangsratenmodellen ist nur die Eintrittskohorte als unabhängige Variable enthalten, da das Kalenderhalbjahr zum Zeitpunkt des Ereigniszeitpunkts die abhängige Variable definiert. Die letzte Eintrittskohorte ist bei den beiden Zielereignissen „primäre Endpunkte“ und „sekundäre Endpunkte“ dabei nicht enthalten, da für diese noch kein Ereignis beobachtet werden konnte, da noch keine Folgedokumentation vorhanden sein kann. Bei dem Zielereignis „Tod“ können für alle Halbjahre einschließlich des Beitrittsjahres Ereignisse auftreten, d.h. hier kann sich der Beobachtungszeitraum über 16 Halbjahre erstrecken.

Bei der Ausreißerbehandlung wurde auf die bereits vorhandenen medizinischen Wertebereiche zurückgegriffen. Falls die Werte außerhalb der gültigen Wertebereiche lagen, waren die Werte bereits im gepoolten Datensatz mit dem Code für fehlende Angaben (-1) abgelegt. Für alle anderen Variablen wurden keine gültigen Wertebereiche definiert.

Fehlende Angaben wurden grundsätzlich nicht ersetzt (imputiert), d.h. Records mit fehlenden Angaben sind in der Modellierung nicht enthalten. Auf Grund der sehr geringen Anzahl fehlender Werte bei DM2 wurden auch bei den beiden unabhängigen Variablen „BMI-Kategorie“ und „HbA1c-Kategorie“ fehlende Angaben nicht als gesonderte Kategorie in die Modelle aufgenommen (Anteil der fehlenden Werte < 0,5%).

Bei der unabhängigen Variable „auffälliger Fußstatus“ ergaben sich bei einer nennenswerten Anzahl der Fälle (rd. 20 Prozent) fehlende Werte. Da davon auszugehen ist, dass das Vorliegen eines erheblich auffälligen Fußstatus in der Erstdokumentation auch dokumentiert wäre, wurden die fehlenden Angaben auf den Wert für einen unauffälligen Fußstatus gesetzt.

Kollektivabgrenzung

Da im risikoadjustierten Berichtsteil die Werte aus den Rohberichten zu adjustieren sind, wurden grundsätzlich dieselben Abgrenzungen gewählt wie im Rohberichtsteil. Dies betrifft insbesondere die Abgrenzung der Kollektive. Deshalb wurden bei der Modellbildung für DM2 die Modelle über eine Selektion auch ausschließlich für die jeweiligen Kollektive geschätzt, für die auch die risikoadjustierten Werte berechnet werden sollen. Die anzuwendenden Koeffizienten wurden demnach nur an der jeweiligen Gruppe, die das Kollektiv bilden, bestimmt. Sie gelten insofern nicht für alle Programmteilnehmer.

Entsprechend wurden auch die mit dem gepoolten Datensatz berechneten Mittelwerte, als Schätzer für die Gesamtmittelwerte, nur für das jeweilige Kollektiv berechnet.

Mit der Kollektivabgrenzung einher geht in vielen Fällen eine Selektion der Eintrittskohorten und der Kalenderhalbjahre. Wenn beispielsweise nur die neu aufgetretenen Herzinfarkte bei den Patienten ohne Herzinfarkt zur ED betrachtet werden, müssen

folgerichtig alle Eintrittshalbjahre (Zähler des Kalenderhalbjahres = 0) und die letzte Eintrittskohorte (derzeit das 1. Halbjahr 2012) ausselektiert werden.

Modelle

Für die Schätzung wurden Random-Intercept-Two-Level-Modelle (hierarchische Modelle, Mehrebenen-Modelle, gemischte Modelle) berechnet. Level 1 bilden die Patienten, Level 2 bilden die DMP einer Krankenkasse in einer Region (DMP).

Bei diesen Modellen wird stochastische Variation (Heterogenität), d.h. Zufallseffekte auf der Ebene 2 (den DMP) angenommen. Die Modellierung eines Random-Intercept Modells erlaubt diese Zufallseffekte auf der Ebene der DMP in der Modellierung und damit der Schätzung der fixen Effekte, d.h. der Koeffizienten der unabhängigen Variablen auf der Ebene 1 (der Patienten) mit zu berücksichtigen .

Für die intervallskalierten Zielwerte wurden lineare Random-Intercept-Two-Level-Modelle geschätzt. Für die binären bzw. binomialen Zielwerte wurden Logit-Random-Intercept-Two-Level-Modelle geschätzt. Für die Übergangsratenmodelle wurden unter anderem auch aus Gründen der Rechenzeit Proportional-Hazardratenmodelle (Cox-Regressionsmodelle) with shared frailty (gemeinsamer unbeobachteter Heterogenität) geschätzt. Modelliert wird eine gammaverteilte gemeinsame unbeobachtete Heterogenität (der Zufallseffekt auf dem zweiten Level), die multiplikativ auf die Hazardfunktion wirkt.

Während die intervallskalierten Werte direkt modelliert werden (mit dem Modell wird der Wert der abhängigen Variablen geschätzt), gilt für die binären Werte, dass die Wahrscheinlichkeiten des Auftretens des jeweiligen Ereignisses im Beobachtungszeitraum modelliert wird (mit dem Modell wird die Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1 für das Ereignis vorhergesagt). Bei den Übergangsratenmodellen wird die Rate, d.h. die Wahrscheinlichkeit des Auftretens zu einem bestimmten Zeitpunkt unter Berücksichtigung der Zensierungen geschätzt.

Für die Schätzungen der linearen und binären medizinischen Zielwerte wurde das Statistikprogramm „Stata“ (die Module xtmixed und xtlogit) verwendet.

„xtmixed“ verwendet für die linearen Modelle als Schätzmethode REML (Maximum Restricted Likelihood). Als Schätzmethode für die Logit-Modelle wird adaptive quadrature mit sieben Integrationspunkten verwendet.

Zielwerte und Kollektive

Für die folgenden Zielwerte wurden jeweils für die genannten Patientengruppen Modelle geschätzt:

Tabelle E.4.1 Medizinische Zielwerte

Zielwert	Betrachtete Patienten / Kollektivabgrenzung
Tod (Übergangsratenmodell)	alle Patienten
erster primärer Endpunkt (Übergangsratenmodell)	alle Patienten ohne primäre Endpunkte zur ED
erster sekundärer Endpunkt (Übergangsratenmodell)	alle Patienten ohne sekundäre Endpunkte zu ED
BMI 1: Mittelwert	erwachsene Patienten (18 Jahre und älter)
BMI 2: stark adipös	erwachsene Patienten (18 Jahre und älter)
Raucheranteil 1: Anteil Halbjahre Raucher	alle Patienten
Raucheranteil 2: Anteil Halbjahre Raucher	Raucher bei Einschreibung
Hypertonie	Hypertoniker zur ED laut Anamnese
HbA1c 1: Mittelwert	alle Patienten
HbA1c 2: Wert über 7,5%	alle Patienten
Serum-Kreatinin-Wert: über 1,4 mg/dl	alle Patienten
Diabetesschulung 1: Non-Compliance	Patienten mit empfohlener Schulung laut Dokumentation
Diabetesschulung 2: durchgeführte Schulungen	alle Patienten
Hypertonieschulung 1: Non-Compliance	Hypertoniker zur ED laut Anamnese mit empfohlener Schulung laut Dokumentation
Hypertonieschulung 2: durchgeführte Schulungen	Hypertoniker zur ED laut Anamnese
ophthalmologische Netzhautuntersuchung (Jahresauswertung)	Patienten, die in jeweils beiden betrachteten Halbjahren Teilnehmer waren und für die in beiden Halbjahren medizinische Dokumentationen mit Angaben zur Netzhautuntersuchung vorlagen
Herzinfarkt: neu aufgetreten	Patienten ohne Herzinfarkt zur ED
Schlaganfall: neu aufgetreten	Patienten ohne Schlaganfall zur ED
erheblich auffälliger Fußstatus: neu aufgetreten	Patienten ohne erheblichen auffälligen Fußstatus zur ED
Nephropathie: neu aufgetreten	Patienten ohne Nephropathie zur ED
Diabetische Retinopathie: neu aufgetreten	Patienten ohne diabetische Retinopathie zur ED
Nierenersatztherapie: neu aufgetreten	Patienten ohne Nierenersatztherapie zur ED
Endpunktfreiheit: ohne primären Endpunkt	Patienten ohne primären, aber mit mindestens einem sekundären Endpunkt zur ED

Tabelle E.4.2 Ökonomische Zielwerte

Zielwert	Betrachtete Patienten / Kollektivabgrenzung
Kosten für ärztliche Behandlung u. häusliche Krankenpflege (ambulant) (Euro)	alle Patienten aus der OD-Stichprobe
Kosten für Krankenhausbehandlung und Anschlussrehabilitation (stationär) (Euro)	alle Patienten aus der OD-Stichprobe
Kosten für Arzneimittel (Euro)	alle Patienten aus der OD-Stichprobe
Kosten für Heil-, Hilfsmittel und Dialyse (Euro)	alle Patienten aus der OD-Stichprobe
Kosten für Krankengeld (Euro)	alle Patienten aus der OD-Stichprobe
Leistungsausgaben insgesamt (Euro)	alle Patienten aus der OD-Stichprobe

Bei einigen der medizinischen Zielwerte handelt es sich um Ereignisse, die korrekterweise unter Berücksichtigung der Rechtszensierungen (d.h. Berücksichtigung der zeitlichen Begrenzung des Beobachtungszeitpunkts) berechnet werden sollten. Da allerdings die Ereignishäufigkeit (Inzidenz) im Beobachtungszeitraum z. T. sehr gering ist und zudem in den Evaluationsberichten ebenfalls auf die Berücksichtigung von Zensierungen verzichtet wurde, wurde für die genannten Zielwerte die Auftretenswahrscheinlichkeit im Beobachtungszeitraum modelliert.

In allen drei Übergangsratenmodellen, auch bei den primären und den sekundären Endpunkten, wurde nur das erste Auftreten eines Zielergebnisses analysiert. Zweit- und Mehrfachereignisse wurden auch bei den primären und sekundären Endpunkten nicht berücksichtigt.

Da die nur halbjahresgenaue Messung der Verweildauern bzw. Ereigniszeiten für die Übergangsratenmodelle vergleichsweise unpräzise ist, treten in den Daten viele Endpunkte mit gleicher Zeit, d.h. gleiche Messwerte (Ties, Bindungen) auf, was zu verzerrten Parameterschätzungen führen kann. Allerdings wird mit zunehmender Follow-up-Zeit die Zahl der Bindungen sinken. Auf der anderen Seite können aber nur im Rahmen von Übergangsratenmodellen Rechtszensierungen überhaupt adäquat berücksichtigt werden, so dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt Übergangsratenmodelle geschätzt wurden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zahl der Bindungen bei den drei Zielwerten zum gegebenen Beobachtungszeitraum.

Tabelle E.4.3 Gemessene Ereigniszeiten und Zahl der Bindungen bei primären Endpunkten, sekundären Endpunkten und Tod

Zeitpunkt (Zähler Kalenderhalbjahr)	Zensierungen	Ereignisse	Gesamt
Primäre Endpunkte			
Beitrittsjahr	43.566	0	43.566
1. Folgehalbjahr = 1	33.056	3.664	36.720
2. Folgehalbjahr = 2	26.418	2.443	28.861
3. Folgehalbjahr = 3	20.570	2.029	22.599
4. Folgehalbjahr = 4	18.027	1.708	19.735
5. Folgehalbjahr = 5	14.446	1.591	16.037
6. Folgehalbjahr = 6	13.775	1.314	15.089
7. Folgehalbjahr = 7	11.880	1.209	13.089
8. Folgehalbjahr = 8	13.873	1.094	14.967
9. Folgehalbjahr = 9	11.812	819	12.631
10. Folgehalbjahr = 10	11.107	658	11.765
11. Folgehalbjahr = 11	8.276	491	8.767
12. Folgehalbjahr = 12	7.993	363	8.356
13. Folgehalbjahr = 13	6.325	307	6.632
14. Folgehalbjahr = 14	6.812	175	6.987
15. Folgehalbjahr = 15	5.631	96	5.727
<i>Gesamt</i>	<i>253.567</i>	<i>17.961</i>	<i>271.528</i>
Sekundäre Endpunkte			
Beitrittsjahr	40.065	0	40.065
1. Folgehalbjahr = 1	29.634	9.880	39.514
2. Folgehalbjahr = 2	23.144	5.574	28.718
3. Folgehalbjahr = 3	17.667	4.598	22.265
4. Folgehalbjahr = 4	15.125	3.849	18.974
5. Folgehalbjahr = 5	11.793	3.311	15.104
6. Folgehalbjahr = 6	11.056	3.025	14.081
7. Folgehalbjahr = 7	9.275	2.720	11.995
8. Folgehalbjahr = 8	10.285	2.650	12.935
9. Folgehalbjahr = 9	8.464	1.499	9.963
10. Folgehalbjahr = 10	7.846	1.080	8.926
11. Folgehalbjahr = 11	5.697	808	6.505
12. Folgehalbjahr = 12	5.295	631	5.926
13. Folgehalbjahr = 13	4.052	371	4.423
14. Folgehalbjahr = 14	4.339	218	4.557
15. Folgehalbjahr = 15	3.417	108	3.525
<i>Gesamt</i>	<i>207.154</i>	<i>40.322</i>	<i>247.476</i>

Zeitpunkt (Zähler Kalenderhalbjahr)	Zensierungen	Ereignisse	Gesamt
Tod			
Beitrittsjahr	47.443	1.262	48.705
1. Folgehalbjahr = 1	36.437	2.072	38.509
2. Folgehalbjahr = 2	29.278	1.557	30.835
3. Folgehalbjahr = 3	22.926	1.314	24.240
4. Folgehalbjahr = 4	20.119	1.190	21.309
5. Folgehalbjahr = 5	16.267	1.077	17.344
6. Folgehalbjahr = 6	15.614	949	16.563
7. Folgehalbjahr = 7	13.571	868	14.439
8. Folgehalbjahr = 8	16.147	734	16.881
9. Folgehalbjahr = 9	13.844	682	14.526
10. Folgehalbjahr = 10	13.114	574	13.688
11. Folgehalbjahr = 11	9.842	459	10.301
12. Folgehalbjahr = 12	9.405	343	9.748
13. Folgehalbjahr = 13	7.469	278	7.747
14. Folgehalbjahr = 14	8.064	179	8.243
15. Folgehalbjahr = 15	6.768	81	6.849
<i>Gesamt</i>	<i>286.308</i>	<i>13.619</i>	<i>299.927</i>

Unabhängige Variablen

Der gemeinsame Kovariatensatz für die Modelle enthält die folgenden unabhängigen Variablen:

- Altersgruppe
- Geschlecht
- Kohortenzugehörigkeit
- Kalenderhalbjahr
- Interaktion: Kohortenzugehörigkeit x Kalenderhalbjahr
- Auswertungsjahr (nur für Jahresauswertung)
- Interaktion: Kohortenzugehörigkeit x Jahr (nur für Jahresauswertung)
- Raucherstatus bei Einschreibung
- BMI-Klassen bei Einschreibung
- Fußstatus bei Einschreibung
- HbA1c-Intervalle bei Einschreibung
- Schlaganfall bei Einschreibung
- Blindheit bei Einschreibung
- Hypertonus bei Einschreibung (anamnestisch)
- pAVK bei Einschreibung
- Diabetische Neuropathie bei Einschreibung
- Fettstoffwechselstörung bei Einschreibung
- Nephropathie bei Einschreibung
- Amputation bei Einschreibung
- KHK bei Einschreibung
- Nierenersatztherapie bei Einschreibung
- Herzinfarkt bei Einschreibung
- Diabetische Retinopathie bei Einschreibung
- Krankengeldanspruch (nur bei Zielwert „Krankengeld“)

In den Modellen enthalten sind also jeweils die in der folgenden Tabelle dargestellten Variablen, wobei keine zu den Zielvariablen sowie der Kollektivabgrenzung redundanten Variablen als unabhängige Variablen in das Modell aufgenommen wurden (z.B. wurde bei Zielwert „Herzinfarkt“ die unabhängige Variable „Herzinfarkt bei Einschreibung“ nicht in das Modell aufgenommen). Bei den Übergangsratenmodellen ist selbstverständlich auch das Kalenderhalbjahr nicht im Modell enthalten, da darüber die Verweildauer bestimmt wird.

Die kategorialen abhängigen Variablen wurden dummy-kodiert mit jeweils der niedrigsten Kategorie als Referenz in das Modell aufgenommen.

Der Interaktionseffekt von Beitrittskohorte und Kalenderhalbjahr wurde als linearer Interaktionseffekt modelliert, d.h. er wurde als Produkt aus der rekodierten Beitrittskohorte (1 - 12) und dem Zähler des Kalenderhalbjahres (0 – 11) gebildet.

Tabelle E.4.4 Übersicht über den gemeinsamen Kovariatensatz für die Modellierung

Unabhängige Variable	Kodierung	Variablenname im Modell
Altersgruppe: - bis 51 Jahre - 51 - 60 Jahre - 61 - 70 Jahre - 71 - 80 Jahre - 81 Jahre und älter	Indikator: 1 2 3 4 5	radm_042 Referenz 2 3 4 5
Geschlecht: - Männer - Frauen	Dummy: 1 0	radm043r Referenz
Kohortenzugehörigkeit: - 2004-2 - 2005-1 - 2005-2 - 2006-1 - 2006-2 - 2007-1 - 2007-2 - 2008-1 - 2008-2 - 2009-1 - 2009-2 - 2010-1 - 2010-2 - 2011-1 - 2011-2 - 2012-1	Indikator: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	radm044r Referenz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kalenderhalbjahr:^{A)} - Beitrittsjahr - 1. Folgehalbjahr - 2. Folgehalbjahr - 3. Folgehalbjahr - 4. Folgehalbjahr - 5. Folgehalbjahr - 6. Folgehalbjahr - 7. Folgehalbjahr - 8. Folgehalbjahr - 9. Folgehalbjahr - 10. Folgehalbjahr - 11. Folgehalbjahr - 12. Folgehalbjahr - 13. Folgehalbjahr - 14. Folgehalbjahr - 15. Folgehalbjahr	Indikator: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	radm046 Referenz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Auswertungsjahr (nur für Jahresauswertung): - Jahr 1 - Jahr 2 - Jahr 3 - Jahr 4 - Jahr 5 - Jahr 6 - Jahr 7	Indikator: 1 2 3 4 5 6 7	jahr Referenz 2 3 4 5 6 7
Interaktionsterm: - Kohortenzugehörigkeit x Kalenderhalbjahr	Metrisch: 0 64	intkohj

Unabhängige Variable	Kodierung	Variablenname im Modell
Interaktionsterm (nur für Jahresauswertung): - Kohortenzugehörigkeit x Kalenderjahr	Metrisch: 1 36	intkoj
Raucherstatus bei Einschreibung: - Nichtraucher - Raucher	Dummy: 0 1	Referenz radm_047
BMI-Klassen bei Einschreibung: - Normal - mäßig adipös - stark adipös	Indikator: 1 2 3	radm_048 Referenz 2 3
HbA1c (Intervalle) bei Einschreibung: - $x \leq 6$ - $6 < x \leq 7,5$ - $7,5 < x \leq 8$ - $8 < x \leq 8,5$ - $8,5 < x \leq 10$ - $x > 10$	Indikator: 1 2 3 4 5 6	radm_051 Referenz 2 3 4 5 6
Schlaganfall bei Einschreibung: - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz radm_060
Blindheit bei Einschreibung: - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz radm_063
Hypertonus bei Einschreibung: - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz radm_075
pAVK bei Einschreibung: - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz radm_067
Diabetische Neuropathie bei Einschreibung: - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz radm_065
Fettstoffwechselstörung bei Einschreibung: - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz radm_069
Fußstatus bei Einschreibung^{B)}: - unauffällig - leicht auffällig - erheblich auffällig	Indikator: 1 2 3	radm_fav Referenz 2 3

Unabhängige Variable	Kodierung	Variablenname im Modell
Nephropathie bei Einschreibung: - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz radm_064
Amputation bei Einschreibung: - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz radm_062
KHK bei Einschreibung: - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz radm_068
Nierenersatztherapie bei Einschreibung: - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz radm_061
Herzinfarkt bei Einschreibung: - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz radm_059
Diabetische Retinopathie bei Einschreibung: - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz radm_066
Krankengeldanspruch: - Nein - Ja	Dummy: 0 1	Referenz radm_025

A) Bei den Zielwerten, bei denen auf Grund der Kollektivabgrenzung das Beitrittsjahr nicht in den Modellen enthalten ist, wurde das 1. Folgehalbjahr als Referenzkategorie verwendet.

B) Im Falle einer fehlenden Angabe beim Fußstatus wurde die Kategorie „unauffällig“ gesetzt.

Besonderheiten

Für die Definition der Zielvariablen ist wesentlich, dass bei den Schulungen (Diabetes- und Hypertonieschulungen) eine unsystematische Dokumentation festzustellen ist, die dazu führt, dass für die Erwartungswerte zum Teil erheblich zu hohe Schätzwerte ermittelt werden. Die Ergebnisse sind hier nur sehr eingeschränkt verwendbar.

Dies liegt daran, dass die Dokumentationen häufig, aber offenbar nicht immer fortgeschrieben werden. In den Daten ist sichtbar, dass bei vielen Patienten in aufeinander folgenden Halbjahren bei den Schulungsvariablen eine 0, eine 1 oder eine 2 eingetragen ist. Vermutlich gab es hier also einmal die Empfehlung zur Schulung und in allen Folgehalbjahren wurde dann bei Nichtteilnahme eine 0 bzw. bei Teilnahme eine 2 eingetragen. Bei der 0 (nicht teilgenommen) kommt dies häufiger vor als bei der 2, weshalb bei der Non-Compliance (Zielwert = 0) die Schätzung der E-Werte im Verhältnis zu den O-Werten bzw. G-Werten noch stärker nach oben abweicht als bei der Teilnahme.

Diese Fortschreibung ist allerdings unsystematisch, d.h. es gibt auch viele Patienten, bei denen die Schulungswerte erwartungsgemäß aussehen (d.h. in einem Halbjahr ist ein Wert gesetzt, im Folgehalbjahr dann nicht mehr). Da die Aggregierungsfunktion bei den Schulungszielvariablen (Aggregation von Halbjahren auf Patienten) eine Summenbildung über die Halbjahre ist, wird das Problem mit zunehmender Zahl der Halbjahre größer.

Das Problem lässt sich auf Grund der vermutlich unsystematischen Dokumentation nur über eine Änderung der Zielvariablen lösen. Würde in der Zielvariablen nur das "Erstauftreten" bei der Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an empfohlenen Schulungen und nicht alle empfohlenen Schulungen betrachtet, würde also pro Patient nur das erste Halbjahr, in dem ein Wert bei den Schulungen eingetragen ist, modelliert, hätten fortgeschriebene Werte bei den Schulungen keinen Einfluss auf die Schätzung der Erwartungswerte.

Eine detaillierte Darstellung der Modellergebnisse findet sich in infas (2013): DMP-Evaluation DM2: Bericht zur Modellbildung für die Risikoadjustierung. September 2013.

Anhang F: Glossar

ACE-Hemmer sind Hemmstoffe (Inhibitoren) des Angiotensin-konvertierenden Enzyms (Angiotensin Converting Enzyme = ACE)

Anschlussrehabilitation (-heilbehandlung) – Eine solche schließt sich unmittelbar an eine stationäre Behandlung im Krankenhaus an und dient der raschen und sozialen Wiedereingliederung des Versicherten in Beruf und Gesellschaft.

Antragsregion – Region, für die ein DMP beantragt werden konnte; zumeist deckungsgleich mit den Bundesländern. Es gibt 17 Antragsregionen: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und Westfalen-Lippe.

arithmetisches Mittel – Das arithmetische Mittel (auch Durchschnitt) ist der am häufigsten benutzte Mittelwert und wird deshalb auch als Standardmittelwert bezeichnet.

Armstrong-Klassen – Die Armstrong-Klassen werden in der Beschreibung des diabetischen Fußsyndroms ergänzend zu den Wagner-Stadien verwendet. Armstrong-Stadium A: Keine zusätzliche Komplikation; Stadium B: Mit Infektion (Besiedlung mit Krankheitserregern); Stadium C: Mit Ischämie (Minderdurchblutung); Stadium D: mit Ischämie und Infektion.

auswertbare Patienten – Patienten, die im Berichtshalbjahr noch Programmteilnehmer sind, d.h. die der Restkohorte angehören, und für die auswertbare medizinische Daten vorliegen.

Auswertungs(halb)jahr – Jeweiliges Kalender(halb)jahr, für das Auswertungen zu den Patientenmerkmalen, den medizinischen Parametern oder den ökonomischen Daten der DMP-Teilnehmer erfolgen.

Beitritts(halb)jahr – Kalenderhalbjahr, in dem ein Versicherter in ein DMP eingeschrieben wurde.

Bluthochdruck – Ein Bluthochdruck liegt vor, wenn bei mindestens zwei Gelegenheitsblutdruckmessungen an zwei unterschiedlichen Tagen Blutdruckwerte von größer gleich 140 mmHg systolisch und/oder größer gleich 90 mmHg diastolisch vorliegen.

BMI (Body-Mass-Index) – Verhältniszahl zur Beurteilung des Körpergewichts, berechnet durch Körpergewicht in kg dividiert durch Körpergröße in m zum Quadrat.

Body-Mass-Index – siehe BMI

CI (confidence interval) – Das Konfidenzintervall (Vertrauensbereich) sagt etwas über die Präzision der Lageschätzung eines Populationsparameters aus, zum Beispiel eines Mittel- oder eines Anteilswertes. Das Vertrauensintervall schließt einen Bereich um den auf Basis einer Stichprobe geschätzten Parameter ein, der mit einer zuvor festgelegten Wahrscheinlichkeit die wahre Lage des Parameters in der Population trifft. Würden aus der Grundgesamtheit sehr viele Stichproben gezogen und für jede dieser Stichproben ein Schätzwert für das arithmetische Mittel (oder einen Anteilswert) samt zugehörigem 95%-Konfidenzintervall berechnet, würden 95 Prozent dieser Intervalle den „wahren“ Wert für das arithmetische Mittel (oder den Anteilswert) in der Grundgesamtheit enthalten. Die Breite des CI wird maßgeblich von der Stichprobengröße (der Fallzahl) bestimmt.

diastolischer Blutdruck – Der sich während der Erschlaffung der Herzkammer (Diastole) ergebende niedrigste Punkt der Blutdruckkurve (auch als unterer Blutdruckwert bezeichnet). Da dieser Druck während des größten Teils des Herzzyklus auf den Gefäßwänden lastet, ist er für die Langzeitprognose bedeutend.

Diabetes mellitus – Diabetes mellitus - Zuckerkrankheit, die häufigste endokrine Störung. Es wird vor allem zwischen den beiden wichtigsten Gruppen, dem Typ 1 und dem Typ 2 unterschieden. Allen Typen ist ein absoluter oder relativer Mangel an Insulin gemeinsam. Gefürchtet sind vor allem die Spätfolgen des Diabetes, die Makro- und Mikroangiopathie sowie die Neuropathie, allesamt schwerwiegende Erkrankungen an Gefäßen und Nerven.

DMP (Disease-Management-Programm[e]) – Es handelt sich um systematische Behandlungsprogramme für chronisch kranke Menschen, die auf die Erkenntnisse der evidenzbasierten Medizin gestützt sind. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden diese Programme auch als strukturierte Behandlungsprogramme oder Chronikerprogramme bezeichnet.

ED – siehe Erstdokumentation

Erstdokumentation – Mit der Einschreibung des Patienten in das Programm erhebt der behandelnde Arzt standardisierte Dokumentationsdaten. Der erste Befund wird in der Erstdokumentation dokumentiert, alle weiteren Befunde werden – in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen – in den so genannten Folgedokumentationen festgehalten.

Erstmanifestation – Erstmaliges Erkennbarwerden z.B. einer Erkrankung oder einer Erbanlage.

EZ – Eintrittszeitpunkt bzw. Halbjahr, in das der Programmeintritt fiel.

FD – siehe Folgedokumentation

Folgedokumentation – Nach der Erhebung der ersten Befunde in der sog. Erstdokumentation werden alle weiteren Befunde in der Regel in viertel- bzw. halbjährlichen Abständen in den sog. Folgedokumentationen festgehalten.

Fußstatus, auffälliger – Unter einem „auffälligen Fußstatus“ werden gefäß- (angiologische), nerven- (neurologische) und/oder knochen- bzw. gelenkbedingte (osteoarthropathische) Auffälligkeiten verstanden. Die Spätkomplikation diabetischer Fuß kann sich in Form schmerzloser Geschwüre (Ulzera) oder sogar Gewebstod (Nekrose, diabetische Gangrän) manifestieren. Liegt eine Polyneuropathie vor, so sind die Füße durch unbemerkte Verletzungen besonders gefährdet. Bereits kleine Verletzungen, bei der Fußpflege oder durch Druck der Schuhe zugezogen, können sich entzünden und damit den Fuß gefährden. Veränderungen können mittels der Klassifikation nach Wagner/Armstrong klassifiziert werden.

Fußsyndrom – Das diabetische Fußsyndrom oder umgangssprachlich auch der "diabetische Fuß" steht für einen Komplex von nervlich (neuropathischen) und/oder gefäßbedingten (angio-pathischen) Symptomen wie Infektionen, Geschwürbildungen (Ulzerationen) und/oder Destruktionen tiefen Gewebes (Knochen, Knorpel, Sehnen) der unteren Extremitäten als Folge eines Diabetes mellitus. Die Schädigungen werden u.a. anhand der Klassifikation nach Wagner klassifiziert.

Glomeruläre Filtrationsrate - Die über eine Million Nierenkörperchen oder Glomeruli sind die kleinsten Funktionseinheiten der Niere mit einer wichtigen Filterfunktion. Die Glomeruläre Filtrationsrate (GFR) gibt das Gesamtvolumen des Primärharns an, das von allen Glomeruli beider Nieren gefiltert wird. Dies sind bei einem Menschen etwa 120 Milliliter pro Minute bzw. etwa 180 Liter pro Tag.

Glibenclamid – Arzneimittel zur medikamentösen Therapie des Diabetes mellitus, das zur Gruppe der Sulfonylharnstoffe gehört. Glibenclamid fördert die Freisetzung von Insulin durch Stimulation der sog. B-Zellen der Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse (Pankreas).

Glukosidase – Die Kohlenhydratspaltung erfolgt durch eine Reihe von Enzymen (Glucosidasen) im Magen-Darm-Trakt. Diese Enzyme werden durch eine Gruppe von oralen Antidiabetika, sog. Glukosidase-Hemmer gehemmt, wodurch sich die Resorption von Kohlenhydraten verlangsamt und dadurch der Blutzuckeranstieg nach Nahrungsaufnahme (postprandial) geglättet wird.

Häusliche Krankenpflege – In der Wohnung der Patienten erfolgende Krankenpflege, die als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) unter bestimmten Voraussetzungen neben der ärztlichen Behandlung dann erbracht wird, wenn Krankenhauspflege geboten, aber nicht ausführbar ist oder wenn diese dadurch vermieden oder verkürzt wird (sog. Krankenhausersatzpflege), ferner dann, wenn sie zur Sicherung des Ziels ambulanter ärztlicher Behandlung erforderlich ist (sog. Behandlungssicherungspflege). Nicht zu verwechseln mit der häuslichen Pflege, bei der es sich um eine Leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung handelt.

Hemmer – siehe Inhibitoren

HbA1c – Ein Derivat aus der Gruppe des sog. Glykohämoglobins. In roten Blutkörperchen binden sich Zuckermoleküle (Glukose) an die Moleküle des Blutfarbstoffs (Hämoglobin). Der Anteil des HbA1c am Gesamthämoglobin bei Gesunden beträgt 4-6. Mit steigendem Blutzuckerspiegel steigt sein Anteil und bleibt bis zu acht Wochen lang erhöht, auch wenn der Blutzucker zeitweise wieder auf normale Werte absinkt. Die Bestimmung von HbA1c dient als Qualitätskontrolle der Blutzuckereinstellung (sog. Blutzuckergedächtnis).

Heilmittel – Mittel zur Behandlung von Krankheiten, die (im Gegensatz zu Arzneimitteln) v.a. äußerlich angewendet werden (Definition der GKV). Ferner alle ärztlich verordneten Dienstleistungen, die einem Heilzweck dienen oder einen Heilerfolg sichern und nur von einem entsprechend ausgebildeten Personenkreis erbracht werden dürfen. Z.B. physikalisch-medizinische Leistungen und medizinische Bäder, wenn sie von Krankengymnasten (Physiotherapeuten), Sprach- (Logopäden) und Beschäftigungstherapeuten (Ergotherapeuten), Masseuren oder medizinischen Bademeistern ausgeführt werden.

Herzinfarkt – Der Herzinfarkt oder Myokardinfarkt ist eine akute und lebensbedrohliche Erkrankung des Herzens. Es handelt sich dabei um Absterben oder Gewebsuntergang von Teilen des Herzmuskels auf Grund einer Minderversorgung des Gewebes mit Sauerstoff bedingt durch den Verschluss eines oder mehrerer Herzkranzgefäße. Im Laufe der diabetesbedingten Gefäßschädigungen und gleichzeitiger Nervenschädigungen kann es zu sog. „stummen Infarkten“ ohne jegliche Schmerzsymptome kommen.

Hilfsmittel – Laut Definition der GKV Hilfen, die im Einzelfall zum Ausgleich eines körperlichen Funktionsdefizits (Behinderung), zur Vorbeugung einer drohenden Behinderung, zur Sicherung des Erfolgs einer Heilbehandlung oder zum Ausgleich einer Behinderung erforderlich sind. Versicherte haben in diesen Fällen Anspruch auf Versorgung mit Seh- und Hörhilfen (Brillen, Hörgeräte), Körperersatzstücken (Arm- und Beinprothesen), orthopädischen (Einlagen, Geh- und Stützapparate, Bruchbänder, Leibbinden, Gummistrümpfe) und andere Hilfsmittel (Treppen- oder Badewannenlift, WC-Sitzerhöhung).

Hypertoniker – Patienten mit dauerhaft erhöhten Blutdruckwerten.

Hypertonus (Hypertonie) – Bluthochdruck, Hochdruckkrankheit. Ein Bluthochdruck liegt vor, wenn bei mindestens zwei Gelegenheitsblutdruckmessungen an zwei unterschiedlichen Tagen Blutdruckwerte von größer gleich 140 mmHg systolisch und/oder größer gleich 90 mmHg diastolisch vorliegen.

Inhibitoren – Es handelt sich um Substanzen, die chemische Reaktionen beeinflussen. Inhibitoren sind Zusatzstoffe, die Reaktionen verschiedenster Art zu verlangsamen oder zu verhindern suchen. Die gegenteilige Eigenschaft zeichnet einen Katalysator aus - dieser beschleunigt chemische Reaktionen.

Insulin – Blutzuckersenkendes Hormon, das in den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) gebildet wird. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Regulierung des Blutzuckers und der Therapie des Diabetes mellitus. Bei der Therapie des insulinpflichtigen Diabetes mellitus kommt v.a. dem Humaninsulin, das gentechnisch hergestellt wird, eine herausragende Bedeutung zu. Insuline werden zumeist in Abhängigkeit von der Nahrungsaufnahme oder den Blutzuckermesswerten mittels (Selbst-)Injektion ins Unterhautfettgewebe (subkutan) oder halbautomatisch mittels Insulinpumpe verabreicht. Es stehen verschiedene Darreichungsformen mit langer und kurzer Wirkdauer zur Verfügung. Insulinanaloga sind Insuline mit veränderter Wirkungsweise (insbes. Aufnahme, Verteilung und Ausscheidung im Organismus und damit auch der Wirkdauer aufgrund einer gentechnisch gegenüber dem Humaninsulin veränderten Aminosäurezusammensetzung).

Kohorte bzw. Halbjahreskohorte – Gesamtheit der Teilnehmer eines DMP, die im selben Kalenderhalbjahr in das Programm eingeschrieben wurden. So bilden alle Patienten, die zwischen dem 1.7.2004 und dem 31.12.2004 eingeschrieben wurden, die „Kohorte 2004-2“.

Kollektiv – Einem „Kollektiv“ wird diejenige Teilgruppe der Patienten einer Kohorte zugeordnet, bei denen zum Zeitpunkt der Erstdokumentation eine bestimmte Indikation oder eine bestimmte Verhaltensweise vorlag. Diese Einteilung bleibt unabhängig von der weiteren Entwicklung des interessierenden Parameters über den ganzen Berichtszeitraum bestehen.

Konfidenzintervall – siehe CI

Koronare Herzkrankheit (KHK) – Die KHK ist die Manifestation einer Arteriosklerose an den Herzkranzgefäßen. Bei höhergradigen Einengungen resultiert ein Missverhältnis zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffangebot in der Herzmuskulatur. Die Koronare Herzkrankheit ist in den Industrieländern die häufigste Todesursache

Krankengeld – Beim Krankengeld handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung bei Arbeitsunfähigkeit, die als Geldleistung zur wirtschaftlichen Sicherung bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ausbezahlt wird. Das Krankengeld soll dabei dem Krankenversicherten den Verdienstaufschlag ersetzen. Es beträgt bei Arbeitnehmern 70% des erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt (Regelentgelt), höchstens jedoch 90% des Nettoarbeitsentgelts und wird bei Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit für längstens 78 Wochen gezahlt.

Lasertherapie – Bei der Laser-Therapie - auch Laser-Koagulation oder Photo-Koagulation genannt - werden gezielte Lichtstrahlen auf die geschädigte Netzhaut gerichtet, die diabetesbedingte Blutgefäß-Wucherungen zerstören. Dadurch wird auch die Bildung weiterer Gefäßveränderungen unterdrückt.

Makroangiopathie – Bei dieser Spätfolge des Diabetes werden die großen Gefäße (Arterien) durch Arteriosklerose geschädigt, wobei Folgeerkrankungen wie koronare Herzkrankheit (KHK), Herzinfarkt, Schlaganfall und arterielle Verschlusskrankheit (AVK) auftreten können.

Mean – siehe arithmetisches Mittel

Median – Der Median oder Zentralwert bezeichnet eine Grenze zwischen zwei Hälften. In der Statistik ist er definiert als jener Beobachtungswert, bei dem die Werte jeweils mindestens der Hälfte der Beobachtungen kleiner oder gleich und die Werte mindestens der Hälfte größer oder gleich diesem Wert sind.

Medizinische Datensätze – Datensätze, welche die Befundwerte aus den Erst- und Folgedokumentationen der behandelnden Ärzte enthalten. Dazu liegen vier Satzarten (SA) vor: Für die Werte der Erstdokumentation die SA 100 EA und (ab der 9. RSA-ÄndV) SA 100 EN sowie für die Folgedokumentationen die SA 100 FA und (ab der 9. RSA-ÄndV) SA 100 FN.

Metformin – Der einzige heute noch in Deutschland zugelassene Wirkstoff aus der Gruppe der Biguanide ist das Metformin. Diese Substanzklasse der oralen Antidiabetika, entsteht aus zwei Molekülen Guanidin unter Abspaltung von Ammoniak. Der blutzuckersenkende Effekt ist auf mehrere, zum Teil noch unklare, Mechanismen zurückzuführen. Es wird die körpereigene Glucoseproduktion (Gluconeogenese), die Glucosefreisetzung (Glykogenolyse) aus der Leber und auch die Aufnahme (Resorption) der Kohlenhydrate aus dem Darm gehemmt. Durch den letztgenannten Wirkmechanismus ist Metformin auch besonders gut für die Therapie übergewichtiger Diabetiker geeignet. Eine verbesserte Glucoseaufnahme in den Muskel führt zu einer Zunahme der Glykogenkonzentration und trägt dadurch ebenfalls zur Senkung des Blutzuckerspiegels bei.

Mikroangiopathie – Bei dieser Spätfolge des Diabetes werden die die kleinen und kleinsten Gefäße (Kapillaren) geschädigt, wobei Folgeerkrankungen wie Netzhautschädigung (Retinopathie) oder Nierenschädigung (Nephropathie) mit den Endstadien Erblindung und Nierenversagen auftreten können.

Monotherapie – Unter einer Monotherapie versteht man die Behandlung mit einem Medikament, das nur eine Wirksubstanz enthält. Eine Kombinationstherapie arbeitet dagegen mit Medikamenten mit zwei oder mehr Wirksubstanzen.

Nephropathie, diabetische – Eine durch Diabetes mellitus verursachte Veränderung der Nierengefäße, die zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion führt. Erstes Anzeichen für eine diabetische Nephropathie ist die Ausscheidung von kleinsten Eiweißmengen mit dem Urin (Mikroalbuminurie). Nimmt die Nierenfunktion weiter ab, können bestimmte Stoffwechselprodukte nicht mehr in ausreichendem Maße über die Niere ausgeschieden werden. Man spricht dann von einer Niereninsuffizienz, die in ihrem Endstadium eine Blutwäsche (Dialyse) notwendig macht.

Neuropathie (Polyneuropathie) – Nervenerkrankung, die zu den diabetischen Folgeerkrankungen zählt. Man unterscheidet zwischen der häufigeren peripheren Neuropathie und der selteneren autonomen Neuropathie. Die periphere Neuropathie (z.B. nervenbedingte Störungen des Temperatur- und Schmerzempfindens an den Extremitäten) tritt meist als Empfindungsstörung an beiden Füßen auf. Der Gefühlsverlust wird von einem Fehlen der Sehnenreflexe begleitet. Häufig ist auch eine motorische Störung festzustellen, die sich in einer Schwäche und Rückbildung der kleinen Fußmuskulatur zeigt. Dadurch kommt es zu Veränderungen des Fußes mit Fehlstellungen. Unangenehm ist die schmerzhaft Polyneuropathie, die sich vornehmlich in der Nacht mit einem Gefühl von Pelzigkeit, Spannung, Fußsohlenbrennen oder starkem Kribbeln äußert. Die autonome Polyneuropathie gehört ebenso zu den Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus und äußert sich in Funktionsstörungen der inneren Organe. Von den häufig unspezifischen Symptomen können alle Organsysteme betroffen sein, wie z.B. Magen-Darm-Trakt (Magenentleerungsstörungen, Übelkeit), Herz (Verringerung der Herzfrequenzvariabilität), Sexualorgane (erektile Dysfunktion), Blase (Entleerungsstörungen). An den Füßen kann es als Folge einer verminderten Schweißbildung zu erhöhter Austrocknungsgefahr der Fußhaut, starker Hornhautbildung und Rissen kommen. Außerdem gibt es vermehrt Veränderungen in der Haut (Pergamenthaut) und den Nägeln (eingerissene, brüchige Nägel).

Nierenersatztherapie – Verlieren als Folge des Diabetes die Nieren ihre Ausscheidungs- und Filterfunktion, muss mittels Blutwäsche (Dialyse) oder gar Nierentransplantation eine Nierenersatztherapie durchgeführt werden.

Niereninsuffizienz – Sind die Nieren durch eine Erkrankung derart geschädigt, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die bei normaler Ernährung anfallenden Stoffwechselprodukte vollständig auszuscheiden bzw. ihre Filterfunktion auszuüben, so spricht man von Nierenversagen oder Niereninsuffizienz. Im Endstadium der terminalen Niereninsuffizienz muss eine Nierenersatztherapie durchgeführt werden.

OAD – Unter dem Begriff orale Antidiabetika werden Tabletten aus verschiedenen Substanzklassen zusammengefasst. Dazu zählen Glucosidase-Hemmer, Biguanide, Sulfonylharnstoffe bzw. deren Derivate und Repaglinide. In der Therapie des Diabetes mellitus Typ 2 sind sowohl Kombinationen zwischen oralen Antidiabetika untereinander als auch zwischen dem nicht oral applizierbaren Insulin und oralen Antidiabetika möglich. Die Therapie ist in jedem Fall an die individuellen Bedürfnisse des Patienten anzupassen.

OD-Daten – Ökonomische Daten. In die Evaluation fließen zwei Arten von ökonomischen Daten ein. Erstens: Die mit der medizinischen Behandlung der DMP-Teilnehmer verbundenen Leistungsausgaben; sie sind patientenbezogen und liegen für eine Stichprobe der DMP-Teilnehmer vor. Diese Daten werden als Satzart 100 OD bezeichnet. Zweitens: Die Kosten für Verwaltung und Qualitätssicherung im Disease-Management-Programm. Diese Daten liegen als jährliche Durchschnittswerte pro Patient und Jahr vor.

ophthalmologische Netzhautuntersuchung – Vom Augenarzt zur frühzeitigen Erkennung und Therapie von Mikroangiopathien (Erweiterungen, Neubildungen, Blutungen etc.) der Netzhaut (Retina) durchgeführte Untersuchung des Augenhintergrunds.

orale Antidiabetika – siehe OAD

Osteoarthropathie – Das Absterben von Knochengewebe (Knochennekrosen) kann bei Diabetes-Patienten z.B. im Vor- und Rückfuß zu schmerzlosen Destruktionen, Statikverlust und Geschwürbildungen (Ulzerationen) mit nachfolgenden schwerwiegenden Infektverläufen und Schädigung der Gewölbefunktion des Fußes führen.

periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) – Durch verengende (stenosierende) bzw. verschließende (obliterierende) Veränderungen an Arterien verursachte Erkrankung, die zu Störungen der arteriellen Durchblutung an den Extremitäten durch Einengung der Gefäßlichtung führt. Verschlüsse peripherer Arterien sind oft multipel und langstreckig und betreffen zumeist Arterien der unteren Extremität (Beine). Beschwerden an den Beinen, die zum Stehenbleiben zwingen, werden als Schaufensterkrankheit bezeichnet.

PM-Daten – Patientenmerkmalsdaten. Kurzdatensätze, welche Patientenmerkmale wie Geschlecht und Geburtsjahr enthalten, jedoch keinerlei medizinischen Befunde. Zudem enthalten sie die für die Zuordnung bei der Auswertung benötigten Angaben über Kohortenzugehörigkeit, Einschreibedatum und ggf. Beendigungsdatum.

Programtteilnehmer – Versicherte, die in ein DMP eingeschrieben sind.

Restkohorte – Gesamtheit der Patienten einer Kohorte, die zu Beginn des Berichtshalbjahres noch Programtteilnehmer sind. Formal wird dies daran festgemacht, dass im PM-Datensatz kein „Austrittsdatum“ vermerkt ist.

Retinopathie – Die diabetische Retinopathie ist eine durch Diabetes mellitus hervorgerufene Erkrankung der Netzhaut des Auges. Die Schädigung kleiner Blutgefäße (Mikroangiopathie) verursacht eine Minderung der Sehschärfe sowie Einschränkung des Gesichtsfelds und kann im Verlauf zur Erblindung führen. Eine schlechte Diätführung bzw. Blutzuckereinstellung begünstigt die Entstehung des Krankheitsbilds. 30% aller Erblindungen in Europa sind auf die diabetische Retinopathie zurückzuführen

Risikostrukturausgleichsänderungsverordnung (RSA-ÄndV) – Zwischen den Krankenkassen wird jährlich ein Risikostrukturausgleich durchgeführt. Damit werden die finanziellen Auswirkungen von Unterschieden in der Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder, der Zahl der Familienversicherten und der Verteilung der Versicherten auf nach Alter und Geschlecht getrennte Versichertengruppen zwischen den Krankenkassen ausgeglichen. Der RSA soll künftig auch Unterschiede bei der Krankheitslast (Morbidität) zwischen den Krankenkassen berücksichtigen. Die Ergänzung des RSA um einen DMP-RSA für im DMP eingeschriebene Versicherte stellt eine erste Stufe zum morbiditätsorientierten RSA dar.

Schlaganfall – Als Schlaganfall (medizinisch auch Apoplex oder Insult), wird eine plötzlich oder innerhalb kurzer Zeit auftretende Erkrankung des Gehirns bezeichnet, die zu einem anhaltenden Ausfall von Funktionen des Zentralen Nervensystems führt und durch kritische Störungen der Blutversorgung des Gehirns (Gefäßverschluss oder Einblutung) verursacht wird.

Serum-Kreatinin – Kreatinin ist ein Produkt des Muskelstoffwechsels. Ein Anstieg seiner Konzentration im Blut (Serum-Kreatinin) kann ein Hinweis auf eine Nierenschädigung (Nephropathie) sein.

Subkohorte – Untergruppe der Patienten einer Kohorte. Alle Patienten werden zum Zeitpunkt der Erstdokumentation nach dem Schweregrad ihrer Begleit- oder Folgeerkrankungen in drei Subkohorten unterteilt. Diese Einteilung bleibt über den gesamten Berichtszeitraum bestehen, auch wenn sich der Schweregrad der Begleit- oder Folgeerkrankungen im Zeitverlauf ändert.

subkutan – bedeutet "unter der Haut" oder "unter die Haut verabreicht". Die subkutane Verabreichung von Medikamenten ist einfach zu handhaben. Dadurch eignet sich dieses Verfahren gut, um vom Patienten selbst angewandt zu werden.

Sulfonylharnstoffe – Arzneimittelgruppe zur medikamentösen Therapie des Diabetes mellitus (z.B. Glibenclamid) Sie fördern die Freisetzung von Insulin durch Stimulation der sog. Beta-Zellen der Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse (Pankreas).

systolischer Blutdruck – Der sich während des Zusammenziehens bzw. der Kontraktion der Herzkammer (Systole) ergebende höchste Punkt der Blutdruckkurve (auch als oberer Blutdruckwert bezeichnet).

Statin ist im allgemeinen medizinischen Sprachgebrauch ein Arzneistoff, der der pharmakologischen Substanzklasse der 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzym-A-Reduktase-(HMG-CoA-Reduktase-)Inhibitoren angehört. Da HMG-CoA ein Zwischenprodukt der menschlichen Cholesterinsynthese ist, werden Statine bislang hauptsächlich bei Fettstoffwechselstörungen als Cholesterinsenker eingesetzt

Thrombozyten-Aggregationshemmer – Diese Arzneimittel, wie z.B. Acetylsalicylsäure, verhindern das Zusammenkleben von Blutplättchen (Thrombozyten) und senken dadurch die Blutgerinnungsneigung, wodurch in den Blutgefäßen seltener Blutgerinnsel (Thrombosen) entstehen.

Urin-Albumin – Albumin ist das häufigste Eiweiß im Blutplasma. Während die Filterfunktion gesunder Nieren nur geringe Albuminmengen im Primärharn zulässt, die außerdem fast vollständig rückgewonnen (resorbiert) werden, erhöht sich bei zunehmender Nierenfunktionsstörung die Menge von Albumin im Primärharn. Dieses Albumin wird bei Überschreitung der Rückresorptionskapazität zunächst in geringen Mengen (Mikroalbuminurie), dann auch in größeren Mengen (Makroalbuminurie, Eiweißverlustniere) mit dem Urin/Harn ausgeschieden.

Wagner-Stadien – Zur klinischen Einteilung des Schweregrads des diabetischen Fußsyndroms hat sich die Einteilung nach Wagner in 5 Stadien bewährt (Stadium 0: Risikofuß ohne Läsion [ggf. Fußdeformation], 1: oberflächliches Geschwür (Ulcus) [mit potentieller Infektion oder mit Infektion nur im Wundbereich], 2: tiefes, gelenknah infiziertes Ulcus, 3: penetrierende Infektion mit Knochenbeteiligung, Knochenmarksentzündung (Osteomyelitis) oder Abszess, 4: Begrenzte Vorfuß- oder Fersennekrose, 5: Nekrose (Zelltod) des Fußes.