Interleukin-modulierende Biologika und JAK-Inhibitoren mit der Indikation atopische Dermatitis

Wirkstoff	Form	Stärke[4]	Anbieter	Packungsgröße	Erhaltungsdosis	Jahrestherapiekosten[1, 4]	Rabattvertrag
Tralokinumab							
Adtralza®	Fertigpen	300 mg	Leo Pharma	6 St.	alle 2-4 Wochen[6]	8.398,52 € – 16.797,04 €	✓
Dupilumab							
Dupixent®	Fertigpen, Fertigspritzen	300 mg	Sanofi-Aventis	6 St.	alle 2 Wochen	15.992,27 €	✓
Abrocitinib							
Cibinqo®	Filmtabletten	50 mg, 100 mg oder 200 mg	Pfizer	91 St.	1 x tgl.	15.715,94 € (50 mg/100 mg) 18.141,42 € (200 mg)	✗
Baricitinib							
Olumiant®	Filmtabletten	4 mg[2]	Lilly	98 St.	1 x tgl.	13.227,04 €	✓
Upadacitinib							
Rinvoq®	Retard-Tabletten	15 mg oder 30 mg	AbbVie	90 St.	1 x tgl.	14.318,54 € (15 mg) 18.000,99 € (30 mg)	✓
Lebrikizumab							
Ebglyss®	Fertigpen	250 mg	Almirall	3 St.	alle 4 Wochen	13.275,90 €[5]	✗
Nemolizumab							
Nemluvio®	Fertigpen	30 mg	Galderma	1 St.	alle 8 Wochen	14.342,25 €[5]	✗
Ruxolitinib							
Opzelura®	Creme	15 mg/g	Incyte Biosc.	1 St.	bis zu 4 St./Monat	bis zu 43.490,88 €	✓

Mit ✓ markierte Präparate sind rabattiert. Mit ✗ markierte Präparate sind nicht rabattiert. Tatsächliche Kosten sind durch Rabattverträge deutlich günstiger. Die individuelle Verordnung ist im Einzelfall nach medizinischen Gesichtspunkten zu entscheiden.
[1] Listen-Verkaufspreis abzüglich Herstellerrabatt und Apothekenpflichtrabatt. Therapiekosten im ersten Jahr teils deutlich höher.
[2] Kosten für die optionalen 2 mg täglich weichen nur minimal ab. [3] I. d. R. kürzerer Behandlungszeitraum, siehe Hinweise. [4] Bezogen auf die Standarddosierung für Erwachsene. Es sind teils abweichende Wirkstärken mit gegebenenfalls anderen Jahrestherapiekosten im Handel. [5] Kosten sind im ersten Behandlungsjahr deutlich höher. [6] Adtralza® kann entsprechend der Zulassung bei Patientinnen/Patienten mit einem gutem Therapieansprechen von einer Dosierung alle 2 Wochen auf eine Dosierung alle 4 Wochen umgestellt werden. Einige Patientinnen/Patienten mit einem anfänglich partiellen Ansprechen können von einer über 16 Wochen hinaus fortgeführten Behandlung alle zwei Wochen weiter profitieren.
Stand Lauer-Taxe: 15.08.2026.

Wichtige Hinweise zum Ansprechen der Therapie:
Adtralza® und **Dupixent®**: Bei Patientinnen/Patienten, die nach 16 Wochen Behandlung kein Ansprechen zeigen, soll ein Absetzen der Behandlung erwogen werden.
Cibinqo®: Bei Patientinnen/Patienten, bei denen nach 24 Behandlungswochen kein therapeutischer Nutzen nachgewiesen werden kann, ist eine Beendigung der Behandlung in Betracht zu ziehen.
Olumiant®: Bei Patientinnen/Patienten, bei denen nach 8 Behandlungswochen kein therapeutischer Nutzen nachgewiesen werden kann, ist eine Beendigung der Behandlung in Betracht zu ziehen.

Rinvoq®: Bei Patientinnen/Patienten, die nach 12 Behandlungswochen keine Anzeichen für einen therapeutischen Nutzen zeigen, ist ein Absetzen von Upadacitinib in Erwägung zu ziehen.
Ebglyss®: Bei Patientinnen/Patienten, die nach 16 Wochen Behandlung kein klinisches Ansprechen gezeigt haben, sollte ein Abbruch der Behandlung in Betracht gezogen werden. Bei Patienten mit einem anfänglich partiellen Ansprechen kann sich der Zustand durch eine fortgesetzte Behandlung alle zwei Wochen bis zu Woche 24 weiter verbessern.
Nemluvio®: Bei Patienten, die nach 16 Wochen Behandlung der atopischen Dermatitis kein Ansprechen gezeigt haben, sollte ein Abbruch der Behandlung in Betracht gezogen werden. Bei Patienten mit einem anfänglichen partiellen Ansprechen kann sich der Zustand durch eine fortgesetzte Behandlung über 16 Wochen hinaus weiter verbessern.