# Wirtschaftliche Behandlung der Hämophilie A oder Hämophilie B

**Hinweise der AOK Niedersachsen**

Die nachfolgenden Therapiekostenübersichten unterstützen Sie bei einer wirtschaftlichen Versorgung im Therapiegebiet und berücksichtigen ausschließlich Präparate für die Heimselbstbehandlung (Blutungsprophylaxe oder Bedarfsmedikation), die eine Zulassung zur ambulanten Behandlung der Hämophilie A und Hämophilie B besitzen.[1] Dabei werden die Arzneimittel zur Behandlung von Hämophilie A oder Hämophilie B getrennt dargestellt und aufgrund abweichender Dosierungen und Dosierungsintervallen in drei Altersgruppen gegliedert:

- Kinder (unter 12 Jahren)
- Jugendliche (zwischen 12 und 18 Jahren)
- Erwachsene (über 18 Jahren)

Die Kosten werden auf Basis des Apothekenverkaufspreises unter Berücksichtigung bestehender gesetzlicher und vertraglicher Rabatte gegenüber der AOK Niedersachsen ermittelt.

Aufgrund patientenindividueller Parameter wie z. B. Körpergewicht, Dosierungen und Dosierungsintervallen kann es zu unterschiedlichen wirtschaftlichen Rangfolgen der Therapieoptionen kommen.

Die ärztliche Therapiehoheit wird durch die Wirtschaftlichkeitshinweise nicht eingeschränkt. Die individuelle Verordnung ist im Einzelfall nach medizinischen Gesichtspunkten zu entscheiden.

Die Therapiekostenübersichten enthalten keine Informationen für die Hämophilie-Behandlung mit Hemmkörpern gegen Faktor VIII bzw. gegen Faktor IX. Näheres zu Dosierungen und Dosierungsintervallen außerhalb der Blutungsprophylaxe oder Bedarfsmedikation der Hämophilie A oder Hämophilie B entnehmen Sie bitte den jeweils aktuellen Fachinformationen.

**Bitte nutzen Sie ausschließlich die aktuellste Version dieses Hinweises – abrufbar über den QR-Code oder auf aok.de/gp/nds > Arztpraxen > Wirtschaftliche Verordnung > Arzneimittelinformationen der AOK Niedersachsen > Hämophilie.**

**Für Fragen steht Ihnen die Pharmazeutische Beratung der AOK Niedersachsen unter 0511 285-0 oder per Mail unter Arzneimittelantraege@nds.aok.de zur Verfügung.**

[1] Information nach § 73 Abs. 8 SGB V.

## Kinder (unter 12 Jahre) mit Hämophilie A

Stand (Lauer-Taxe): 01.11.2026

Version: 12

| Medikament | Rabatt-vereinbarung | Standarddosierung<br><br>genauere Informationen siehe jeweilige aktuelle Fachinformation | Rang der Wirtschaftlichkeit für Versicherte der AOK Niedersachsen anhand der **Minimaldosierung** | | Rang der Wirtschaftlichkeit für Versicherte der AOK Niedersachsen anhand der **Maximaldosierung** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Die Therapieoptionen werden nach Rang gelistet und grafisch dargestellt. **Die wirtschaftlichste Therapieoption hat dabei den Rang 1.** | | | |
| **plasmatische Blutgerinnungsfaktor-VIII-Präparate** (inklusive Kombipräparate mit pharmazeutisch aktiven Mengen des von-Willebrand-Faktors) | | | | | | |
| Fanhdi | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d (für Kinder unter 7 Jahren nicht zugelassen) | 1 | ■ | 1 | ■ |
| Octanate | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 2 | ■■ | 2 | ■■ |
| Faktor VIII SDH Intersero | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 3 | ■■■ | 3 | ■■■ |
| Haemoctin SDH | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 4 | ■■■■ | 4 | ■■■■ |
| Beriate | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 5 | ■■■■■ | 5 | ■■■■■ |
| Immunate | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 6 | ■■■■■■ | 6 | ■■■■■■ |
| Wilate | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 7 | ■■■■■■■ | 7 | ■■■■■■■ |
| Voncento | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 8 | ■■■■■■■■ | 8 | ■■■■■■■■ |
| Haemate P | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d (für Kinder unter 7 Jahren nicht zugelassen) | 9 | ■■■■■■■■■ | 9 | ■■■■■■■■■ |
| **rekombinante Blutgerinnungsfaktor-VIII-Präparate mit normaler Wirkdauer** | | | | | | |
| Kovaltry | ✓ | 20 bis 50 I.E./ kg KG alle 2 d oder 2-3x/ Woche | 1 | ■ | 6 | ■■■■■■ |
| ReFacto AF | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 2 | ■■ | 1 | ■ |
| Nuwiq | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 3 | ■■■ | 2 | ■■ |
| Advate | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d (20 bis 50 I.E./ kg KG 3-4x/ Woche für Kinder unter 6 Jahre) | 4 | ■■■■ | 5 | ■■■■■ |
| Afstyla | ✓ | 30 bis 50 I.E./kg KG 2-3x/ Woche | 5 | ■■■■■ | 4 | ■■■■ |
| Novoeight | ✓ | 25 bis 50 I.E./ kg KG alle 2 d oder 25 bis 60 I.E./ kg KG 3x/ Woche | 6 | ■■■■■■ | 3 | ■■■ |
| **rekombinante Blutgerinnungsfaktor-VIII-Präparate mit verlängerter Wirkdauer und monoklonale Antikörper** | | | | | | |
| Elocta | ✓ | 25 bis 65 I.E./kg KG alle 3-5 d | 1 | ■ | 5 | ■■■■■ |
| Altuvoct | ✓ | 50 I.E./ kg KG 1x/ Woche | 2 | ■■ | 1 | ■ |
| Jivi | ✓ | 40 bis 60 I.E./kg KG 2x/ Woche (ab 7 Jahre, für Kinder unter 7 Jahre nicht zugelassen) | 3 | ■■■ | 3 | ■■■ |
| Esperoct | ✓ | 65 I.E. (50-75 I.E.)/kg KG 2x/ Woche | 4 | ■■■■ | 4 | ■■■■ |
| Hemlibra | ✓ | 1,5 mg pro kg KG 1x/ Woche oder 3 mg pro kg KG alle 2 Wochen oder 6 mg pro kg KG alle 4 Wochen | 5 | ■■■■■ | 2 | ■■ |

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird ein nach dem Verordnungsvolumen gewichteter Durchschnittspreis aus den verfügbaren Stärken des jeweiligen Fertigarzneimittels eines Herstellers für das Ranking der Therapieoptionen genutzt. Für den Fall, dass für ein Fertigarzneimittel keine Verordnungen vorliegen, erfolgt eine Gleichgewichtung der jeweiligen Stärken. Aufgrund patientenindividueller Parameter wie z.B. Körpergewicht, Dosierungen und Dosierungsintervalle kann es zu unterschiedlichen wirtschaftlichen Reihenfolgen der Therapieoptionen kommen. Bitte nutzen Sie ausschließlich die aktuellste Version.

## Jugendliche (zwischen 12 und 18 Jahre) mit Hämophilie A

Stand (Lauer-Taxe): 01.11.2026

Version: 12

| Medikament | Rabatt-vereinbarung | Standarddosierung<br><br>genauere Informationen siehe jeweilige aktuelle Fachinformation | Rang der Wirtschaftlichkeit für Versicherte der AOK Niedersachsen anhand der **Minimaldosierung** | | Rang der Wirtschaftlichkeit für Versicherte der AOK Niedersachsen anhand der **Maximaldosierung** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Die Therapieoptionen werden nach Rang gelistet und grafisch dargestellt. **Die wirtschaftlichste Therapieoption hat dabei den Rang 1.** | | | |
| **plasmatische Blutgerinnungsfaktor-VIII-Präparate** (inklusive Kombipräparate mit pharmazeutisch aktiven Mengen des von-Willebrand-Faktors) | | | | | | |
| Fanhdi | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 1 | ■ | 1 | ■ |
| Octanate | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 2 | ■■ | 2 | ■■ |
| Faktor VIII SDH Intersero | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 3 | ■■■ | 3 | ■■■ |
| Haemoctin SDH | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 4 | ■■■■ | 4 | ■■■■ |
| Beriate | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 5 | ■■■■■ | 5 | ■■■■■ |
| Immunate | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 6 | ■■■■■■ | 6 | ■■■■■■ |
| Wilate | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 7 | ■■■■■■■ | 7 | ■■■■■■■ |
| Voncento | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 8 | ■■■■■■■■ | 8 | ■■■■■■■■ |
| Haemate P | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 9 | ■■■■■■■■■ | 9 | ■■■■■■■■■ |
| **rekombinante Blutgerinnungsfaktor-VIII-Präparate mit normaler Wirkdauer** | | | | | | |
| Afstyla | ✓ | 20 bis 50 I.E./kg KG 2-3x/ Woche | 1 | ■ | 5 | ■■■■■ |
| Kovaltry | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG 2-3x/ Woche | 2 | ■■ | 2 | ■■ |
| ReFacto AF | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 3 | ■■■ | 3 | ■■■ |
| Nuwiq | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 4 | ■■■■ | 4 | ■■■■ |
| Novoeight | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2 d oder 20 bis 50 I.E./ kg KG 3x/ Woche oder 40 bis 60 I.E./ kg KG alle 3 d oder 2x/ Wo. | 5 | ■■■■■ | 1 | ■ |
| Advate | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 6 | ■■■■■■ | 6 | ■■■■■■ |
| **rekombinante Blutgerinnungsfaktor-VIII-Präparate mit verlängerter Wirkdauer und monoklonale Antikörper** | | | | | | |
| Elocta | ✓ | 25 bis 65 I.E./kg KG alle 3-5 d | 1 | ■ | 6 | ■■■■■■ |
| Adynovi | ✓ | 40 bis 50 I.E./ kg KG alle 3-4 d | 2 | ■■ | 5 | ■■■■■ |
| Jivi | ✓ | 45 bis 60 I.E/kg KG alle 5 d oder 60 I.E./kg KG alle 7 d oder 30 bis 40 I.E./kg KG 2x/ Woche | 3 | ■■■ | 3 | ■■■ |
| Altuvoct | ✓ | 50 I.E./ kg KG 1x/ Woche | 4 | ■■■■ | 1 | ■ |
| Esperoct | ✓ | 50 I.E./ kg KG alle 4 d | 5 | ■■■■■ | 2 | ■■ |
| Hemlibra | ✓ | 1,5 mg pro kg KG 1x/ Woche oder 3 mg pro kg KG alle 2 Wochen oder 6 mg pro kg KG alle 4 Wochen | 6 | ■■■■■■ | 4 | ■■■■ |
| Alhemo | ✓ | individuell, je nach Concizumab-Plasmakonzentration 0,15-0,25 mg/kg 1x täglich (siehe Fachinformation) | 7 | ■■■■■■■ | 7 | ■■■■■■■ |
| Hympavzi* | | 150 mg 1x/ Woche (bei KG ≥ 35 kg) oder 300 mg 1x/ Woche (bei KG ≥ 50 kg möglich, siehe Fachinformation) | 8 | ■■■■■■■■ | 8 | ■■■■■■■■ |

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird ein nach dem Verordnungsvolumen gewichteter Durchschnittspreis aus den verfügbaren Stärken des jeweiligen Fertigarzneimittels eines Herstellers für das Ranking der Therapieoptionen genutzt. Für den Fall, dass für ein Fertigarzneimittel keine Verordnungen vorliegen, erfolgt eine Gleichgewichtung der jeweiligen Stärken. Aufgrund patientenindividueller Parameter wie z.B. Körpergewicht, Dosierungen und Dosierungsintervalle kann es zu unterschiedlichen wirtschaftlichen Reihenfolgen der Therapieoptionen kommen. Bitte nutzen Sie ausschließlich die aktuellste Version.

*es gilt ein vertraulicher Erstattungsbetrag nach § 130b Absatz 1c Satz 1 SGB V.

## Erwachsene (über 18 Jahre) mit Hämophilie A

Stand (Lauer-Taxe): 01.11.2026

Version: 12

| Medikament | Rabatt-vereinbarung | Standarddosierung<br><br>genauere Informationen siehe jeweilige aktuelle Fachinformation | Rang der Wirtschaftlichkeit für Versicherte der AOK Niedersachsen anhand der **Minimaldosierung** | | Rang der Wirtschaftlichkeit für Versicherte der AOK Niedersachsen anhand der **Maximaldosierung** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Die Therapieoptionen werden nach Rang gelistet und grafisch dargestellt. **Die wirtschaftlichste Therapieoption hat dabei den Rang 1.** | | | |
| **plasmatische Blutgerinnungsfaktor-VIII-Präparate** (inklusive Kombipräparate mit pharmazeutisch aktiven Mengen des von-Willebrand-Faktors) | | | | | | |
| Fanhdi | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 1 | ■ | 1 | ■ |
| Octanate | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 2 | ■■ | 2 | ■■ |
| Faktor VIII SDH Intersero | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 3 | ■■■ | 3 | ■■■ |
| Haemoctin SDH | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 4 | ■■■■ | 4 | ■■■■ |
| Beriate | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 5 | ■■■■■ | 5 | ■■■■■ |
| Immunate | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 6 | ■■■■■■ | 6 | ■■■■■■ |
| Wilate | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 7 | ■■■■■■■ | 7 | ■■■■■■■ |
| Voncento | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 8 | ■■■■■■■■ | 8 | ■■■■■■■■ |
| Haemate P | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 9 | ■■■■■■■■■ | 9 | ■■■■■■■■■ |
| **rekombinante Blutgerinnungsfaktor-VIII-Präparate mit normaler Wirkdauer** | | | | | | |
| Afstyla | ✓ | 20 bis 50 I.E./kg KG 2-3x/ Woche | 1 | ■ | 5 | ■■■■■ |
| Kovaltry | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG 2-3x/ Woche | 2 | ■■ | 2 | ■■ |
| ReFacto AF | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 3 | ■■■ | 3 | ■■■ |
| Nuwiq | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 4 | ■■■■ | 4 | ■■■■ |
| Novoeight | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2 d oder 20 bis 50 I.E./ kg KG 3x/ Woche oder 40 bis 60 I.E./ kg KG alle 3 d oder 2x/ Wo. | 5 | ■■■■■ | 1 | ■ |
| Advate | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 2-3 d | 6 | ■■■■■■ | 6 | ■■■■■■ |
| **rekombinante Blutgerinnungsfaktor-VIII-Präparate mit verlängerter Wirkdauer und monoklonale Antikörper** | | | | | | |
| Elocta | ✓ | 25 bis 65 I.E./kg KG alle 3-5 d | 1 | ■ | 6 | ■■■■■■ |
| Adynovi | ✓ | 40 bis 50 I.E./ kg KG alle 3-4 d | 2 | ■■ | 5 | ■■■■■ |
| Jivi | ✓ | 45 bis 60 I.E/kg KG alle 5 d oder 60 I.E./kg KG alle 7 d oder 30 bis 40 I.E./kg KG 2x/ Woche | 3 | ■■■ | 3 | ■■■ |
| Altuvoct | ✓ | 50 I.E./ kg KG 1x/ Woche | 4 | ■■■■ | 1 | ■ |
| Esperoct | ✓ | 50 I.E./ kg KG alle 4 d | 5 | ■■■■■ | 2 | ■■ |
| Hemlibra | ✓ | 1,5 mg pro kg KG 1x/ Woche oder 3 mg pro kg KG alle 2 Wochen oder 6 mg pro kg KG alle 4 Wochen | 6 | ■■■■■■ | 4 | ■■■■ |
| Alhemo | ✓ | individuell, je nach Concizumab-Plasmakonzentration 0,15-0,25 mg/kg 1x täglich (siehe Fachinformation) | 7 | ■■■■■■■ | 7 | ■■■■■■■ |
| Hympavzi* | | 150 mg 1x/ Woche (bei KG ≥ 35 kg) oder 300 mg 1x/ Woche (bei KG ≥ 50 kg möglich, siehe Fachinformation) | 8 | ■■■■■■■■ | 8 | ■■■■■■■■ |

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird ein nach dem Verordnungsvolumen gewichteter Durchschnittspreis aus den verfügbaren Stärken des jeweiligen Fertigarzneimittels eines Herstellers für das Ranking der Therapieoptionen genutzt. Für den Fall, dass für ein Fertigarzneimittel keine Verordnungen vorliegen, erfolgt eine Gleichgewichtung der jeweiligen Stärken. Aufgrund patientenindividueller Parameter wie z.B. Körpergewicht, Dosierungen und Dosierungsintervalle kann es zu unterschiedlichen wirtschaftlichen Reihenfolgen der Therapieoptionen kommen. Bitte nutzen Sie ausschließlich die aktuellste Version.

*es gilt ein vertraulicher Erstattungsbetrag nach § 130b Absatz 1c Satz 1 SGB V.

## Kinder (unter 12 Jahre) mit Hämophilie B

Stand (Lauer-Taxe): 01.11.2026

Version: 12

| Medikament | Rabatt-vereinbarung | Standarddosierung<br><br>genauere Informationen siehe jeweilige aktuelle Fachinformation | Rang der Wirtschaftlichkeit für Versicherte der AOK Niedersachsen anhand der **Minimaldosierung** | Rang der Wirtschaftlichkeit für Versicherte der AOK Niedersachsen anhand der **Maximaldosierung** |
|---|---|---|---|---|
| | | | Die Therapieoptionen werden nach Rang gelistet und grafisch dargestellt. **Die wirtschaftlichste Therapieoption hat dabei den Rang 1.** | |
| **plasmatische Blutgerinnungsfaktor-IX-Präparate** | | | | |
| Immunine | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 3-4 d (für Kinder unter 6 Jahren nicht zugelassen) | 1 ■ | 1 ■ |
| Octanine F | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 3-4 d (für Kinder unter 6 Jahren alternativ auch 35 bis 40 I.E./ kg KG jeden d) | 2 ■■ | 2 ■■ |
| Alphanine | | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 3-4 d (für Kinder unter 6 Jahren nicht zugelassen) | 3 ■■■ | 3 ■■■ |
| Haemonine | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 3-4 d (für Kinder unter 6 Jahren nicht zugelassen) | 4 ■■■■ | 4 ■■■■ |
| **rekombinante Blutgerinnungsfaktor-IX-Präparate mit normaler Wirkdauer** | | | | |
| Rixubis | ✓ | 40 bis 80 I.E./ kg KG alle 3-4 d | 1 ■ | 2 ■■ |
| BeneFIX | ✓ | 63,7 (± 19,1) I.E./ kg KG alle 3-7 d | 2 ■■ | 1 ■ |
| **rekombinante Blutgerinnungsfaktor-IX-Präparate mit verlängerter Wirkdauer** | | | | |
| Idelvion | ✓ | 35 bis 50 I.E./ kg KG alle 7 d | 1 ■ | 2 ■■ |
| Alprolix | ✓ | 50 bis 60 I.E./ kg KG alle 7 d | 2 ■■ | 1 ■ |
| Refixia | | 40 I.E./ kg KG alle 7 d | 3 ■■■ | 3 ■■■ |

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird ein nach dem Verordnungsvolumen gewichteter Durchschnittspreis aus den verfügbaren Stärken des jeweiligen Fertigarzneimittels eines Herstellers für das Ranking der Therapieoptionen genutzt. Für den Fall, dass für ein Fertigarzneimittel keine Verordnungen vorliegen, erfolgt eine Gleichgewichtung der jeweiligen Stärken. Aufgrund patientenindividueller Parameter wie z.B. Körpergewicht, Dosierungen und Dosierungsintervalle kann es zu unterschiedlichen wirtschaftlichen Reihenfolgen der Therapieoptionen kommen. Bitte nutzen Sie ausschließlich die aktuellste Version.

## Jugendliche (zwischen 12 und 18 Jahre) mit Hämophilie B

Stand (Lauer-Taxe): 01.11.2026

Version: 12

| Medikament | Rabatt-vereinbarung | Standarddosierung<br><br>genauere Informationen siehe jeweilige aktuelle Fachinformation | Rang der Wirtschaftlichkeit für Versicherte der AOK Niedersachsen anhand der **Minimaldosierung** | Rang der Wirtschaftlichkeit für Versicherte der AOK Niedersachsen anhand der **Maximaldosierung** |
|---|---|---|---|---|
| | | | Die Therapieoptionen werden nach Rang gelistet und grafisch dargestellt. **Die wirtschaftlichste Therapieoption hat dabei den Rang 1.** | |
| **plasmatische Blutgerinnungsfaktor-IX-Präparate** | | | | |
| Immunine | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 3-4 d | 1 ■ | 1 ■ |
| Octanine F | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 3-4 d | 2 ■■ | 2 ■■ |
| Alphanine | | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 3-4 d | 3 ■■■ | 3 ■■■ |
| Haemonine | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 3-4 d | 4 ■■■■ | 4 ■■■■ |
| **rekombinante Blutgerinnungsfaktor-IX-Präparate mit normaler Wirkdauer** | | | | |
| Rixubis | ✓ | 40 bis 60 I.E./ kg KG alle 3-4 d | 1 ■ | 2 ■■ |
| BeneFIX | ✓ | 63,7 (± 19,1) I.E./ kg KG alle 3-7 d | 2 ■■ | 1 ■ |
| **rekombinante Blutgerinnungsfaktor-IX-Präparate mit verlängerter Wirkdauer und monoklonale Antikörper** | | | | |
| Idelvion | ✓ | 35 bis 50 I.E./ kg KG alle 7 d oder 75 I.E./ kg KG alle 10 oder 14 d | 1 ■ | 2 ■■ |
| Alprolix | ✓ | 50 I.E./ kg KG alle 7 d oder 100 I.E./ kg KG alle 10 (-14+) d | 2 ■■ | 3 ■■■ |
| Alhemo | ✓ | individuell, je nach Concizumab-Plasmakonzentration 0,15-0,25 mg/kg 1x täglich (siehe Fachinformation) | 3 ■■■ | 4 ■■■■ |
| Refixia | | 40 I.E./ kg KG alle 7 d | 4 ■■■■ | 1 ■ |
| Hympavzi* | | 150 mg 1x/ Woche (bei KG ≥ 35 kg) oder 300 mg 1x/ Woche (bei KG ≥ 50 kg möglich, siehe Fachinformation) | 5 ■■■■■ | 5 ■■■■■ |

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird ein nach dem Verordnungsvolumen gewichteter Durchschnittspreis aus den verfügbaren Stärken des jeweiligen Fertigarzneimittels eines Herstellers für das Ranking der Therapieoptionen genutzt. Für den Fall, dass für ein Fertigarzneimittel keine Verordnungen vorliegen, erfolgt eine Gleichgewichtung der jeweiligen Stärken. Aufgrund patientenindividueller Parameter wie z.B. Körpergewicht, Dosierungen und Dosierungsintervalle kann es zu unterschiedlichen wirtschaftlichen Reihenfolgen der Therapieoptionen kommen. Bitte nutzen Sie ausschließlich die aktuellste Version.

*es gilt ein vertraulicher Erstattungsbetrag nach § 130b Absatz 1c Satz 1 SGB V.

## Erwachsene (über 18 Jahre) mit Hämophilie B

Stand (Lauer-Taxe): 01.11.2026

Version: 12

| Medikament | Rabatt-vereinbarung | Standarddosierung<br><br>genauere Informationen siehe jeweilige aktuelle Fachinformation | Rang der Wirtschaftlichkeit für Versicherte der AOK Niedersachsen anhand der **Minimaldosierung** | Rang der Wirtschaftlichkeit für Versicherte der AOK Niedersachsen anhand der **Maximaldosierung** |
|---|---|---|---|---|
| | | | Die Therapieoptionen werden nach Rang gelistet und grafisch dargestellt. **Die wirtschaftlichste Therapieoption hat dabei den Rang 1.** | |
| **plasmatische Blutgerinnungsfaktor-IX-Präparate** | | | | |
| Immunine | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 3-4 d | 1 ■ | 1 ■ |
| Octanine F | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 3-4 d | 2 ■■ | 2 ■■ |
| Alphanine | | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 3-4 d | 3 ■■■ | 3 ■■■ |
| Haemonine | ✓ | 20 bis 40 I.E./ kg KG alle 3-4 d | 4 ■■■■ | 4 ■■■■ |
| **rekombinante Blutgerinnungsfaktor-IX-Präparate mit normaler Wirkdauer** | | | | |
| BeneFIX | ✓ | 40 I.E./ kg KG (13 bis 78 I.E./ kg KG) alle 3-4 d | 1 ■ | 1 ■ |
| Rixubis | ✓ | 40 bis 60 I.E./ kg KG alle 3-4 d | 2 ■■ | 2 ■■ |
| **rekombinante Blutgerinnungsfaktor-IX-Präparate mit verlängerter Wirkdauer und monoklonale Antikörper** | | | | |
| Idelvion | ✓ | 35 bis 50 I.E./ kg KG alle 7 d oder 75 I.E./ kg KG alle 10 oder 14 d | 1 ■ | 2 ■■ |
| Alprolix | ✓ | 50 I.E./ kg KG alle 7 d oder 100 I.E./ kg KG alle 10 (-14+) d | 2 ■■ | 3 ■■■ |
| Alhemo | ✓ | individuell, je nach Concizumab-Plasmakonzentration 0,15-0,25 mg/kg 1x täglich (siehe Fachinformation) | 3 ■■■ | 4 ■■■■ |
| Refixia | | 40 I.E./ kg KG alle 7 d | 4 ■■■■ | 1 ■ |
| Hympavzi* | | 150 mg 1x/ Woche (bei KG ≥ 35 kg) oder 300 mg 1x/ Woche (bei KG ≥ 50 kg möglich, siehe Fachinformation) | 5 ■■■■■ | 5 ■■■■■ |

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird ein nach dem Verordnungsvolumen gewichteter Durchschnittspreis aus den verfügbaren Stärken des jeweiligen Fertigarzneimittels eines Herstellers für das Ranking der Therapieoptionen genutzt. Für den Fall, dass für ein Fertigarzneimittel keine Verordnungen vorliegen, erfolgt eine Gleichgewichtung der jeweiligen Stärken. Aufgrund patientenindividueller Parameter wie z.B. Körpergewicht, Dosierungen und Dosierungsintervalle kann es zu unterschiedlichen wirtschaftlichen Reihenfolgen der Therapieoptionen kommen. Bitte nutzen Sie ausschließlich die aktuellste Version.

*es gilt ein vertraulicher Erstattungsbetrag nach § 130b Absatz 1c Satz 1 SGB V.