

Silberhaltige Wundverbände – bewusst verordnen

Verbandstoffe stellen einen wichtigen Kostenfaktor in der Versorgung dar. Sie sind relevant für Ihr Verordnungsvolumen.

Checkliste zur Verordnung von Silberverbänden

- ✓ Leitlinien-Empfehlung¹: Bei infizierten und infektionsgefährdeten Wunden.
- ✓ **Silberverbände maximal 1 bis 2 Wochen anwenden.**
- ✓ Anschließend die Wunde und den Behandlungsansatz erneut beurteilen.²
- ✓ Bei ausbleibendem Erfolg: Andere Maßnahmen ergreifen.

Grundsätzlich sind bei der Verordnung zu beachten:

- ✓ die empfohlenen Einsatzbereiche,
- ✓ die Einhaltung einer sinnvollen Liegedauer bzw. einer angemessenen **Wechselfrequenz**,
- ✓ mögliche Kontraindikationen und das
- ✓ Wirtschaftlichkeitsgebot.

Mehr erfahren auf aok.de/gp/nds > Arztpraxen > Wirtschaftliche Verordnung > Arzneimittelinformationen der AOK Niedersachsen > Wundversorgung

¹ Quelle: 091-001L_S3_Lokaltherapie_chronischer_Wunden_2012-06 (dga-gefaessmedizin.de).

² Quelle: https://www.icwunden.de/fileadmin/Fachinfos/2012_konsensus_silber.pdf.