


Versichertenstruktur

AOK PLUS Versicherte 2021

Betrachtete Population: AOK PLUS – Versicherte 50+ (Alter 50-69 Jahre)



Sachsen	männlich	1.077.063
	weiblich	1.182.813
Thüringen	männlich	489.491
	weiblich	528.744

		2016			2019			2021		
		weiblich	männlich	Gesamt	weiblich	männlich	Gesamt	weiblich	männlich	Gesamt
Sachsen	Gesamt 50+	299.910	278.517	578.427	325.333	299.116	624.449	326.217	300.563	626.780
	50 - 54 Jahre	81.897	77.606	159.503	78.210	75.003	153.213	74.864	73.657	148.515
	55 - 59 Jahre	78.442	74.280	152.722	88.926	82.546	171.472	88.848	82.847	171.689
	60 - 64 Jahre	75.159	69.866	145.025	79.139	72.185	151.324	83.494	75.186	158.680
	65 - 69 Jahre	64.412	56.765	121.177	79.058	69.382	148.440	79.011	68.885	147.896
Thüringen	Gesamt 50+	133.518	131.067	264.585	149.813	143.606	293.419	152.347	145.361	297.708
	50 - 54 Jahre	36.553	36.285	72.838	36.298	35.302	71.600	34.893	34.403	69.296
	55 - 59 Jahre	36.173	36.178	72.351	41.866	40.613	82.479	41.720	40.148	81.868
	60 - 64 Jahre	33.116	32.884	66.000	37.323	35.707	73.024	40.060	37.745	77.805
	65 - 69 Jahre	27.676	25.720	53.396	34.326	31.990	66.316	35.674	33.065	68.739
AOK PLUS Gesamt (Sachsen, Thüringen, sonstige)	Gesamt 50+	449.154	428.995	878.149	489.300	462.115	951.415	494.557	467.563	962.120
	50 - 54 Jahre	123.884	121.017	244.901	119.469	117.594	237.063	115.102	116.006	231.108
	55 - 59 Jahre	118.895	115.939	234.834	134.980	129.137	264.117	135.254	129.390	264.644
	60 - 64 Jahre	111.804	106.845	218.649	119.297	111.636	230.933	126.963	117.489	244.452
	65 - 69 Jahre	94.571	85.194	179.765	115.554	103.754	219.308	117.238	104.678	221.916


In 2021 waren knapp ein Drittel der AOK PLUS Versicherten im Alter zwischen 50 - 69 Jahre.

Früherkennung/Vorsorgeuntersuchungen


		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil Versicherte mit Inanspruchnahme			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil Versicherte mit Inanspruchnahme			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil Versicherte mit Inanspruchnahme			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
Check Up 35	männlich	23,9%	19,3%	17,3%	-38,4%	22,4%	18,7%	17,5%	-28,5%	23,2%	19,0%	17,1%	-35,3%
	weiblich	27,6%	21,2%	20,0%	-37,9%	25,5%	20,5%	19,7%	-29,6%	26,9%	20,9%	19,8%	-35,4%
	Gesamt	25,8%	20,3%	18,7%	-38,1%	24,0%	19,6%	18,6%	-29,0%	25,1%	20,0%	18,5%	-35,3%
Check Up PLUS	männlich	2,6%	2,4%	2,2%	-15,5%	0,8%	0,8%	0,8%	-0,7%	1,9%	1,8%	1,7%	-14,7%
	weiblich	3,4%	2,9%	2,8%	-20,7%	1,0%	0,9%	0,9%	-9,2%	2,6%	2,2%	2,1%	-21,0%
	Gesamt	3,0%	2,7%	2,5%	-18,5%	0,9%	0,9%	0,8%	-5,2%	2,3%	2,0%	1,9%	-18,2%
Darmkrebs	männlich	9,3%	11,2%	10,4%	10,4%	8,9%	12,1%	11,1%	19,9%	9,1%	11,3%	10,4%	13,3%
	weiblich	23,1%	22,6%	19,9%	-16,3%	20,9%	20,5%	18,4%	-13,7%	22,2%	21,8%	19,2%	-15,8%
	Gesamt	16,5%	17,2%	15,3%	-7,4%	15,0%	16,4%	14,8%	-0,9%	15,8%	16,7%	14,9%	-5,7%
Hautkrebs	männlich	8,9%	9,7%	9,2%	3,2%	6,1%	6,8%	6,6%	7,6%	7,9%	8,6%	8,2%	4,0%
	weiblich	12,1%	12,8%	12,0%	-0,8%	8,2%	8,9%	8,5%	3,8%	10,8%	11,4%	10,8%	-0,1%
	Gesamt	10,6%	11,3%	10,7%	0,9%	7,1%	7,9%	7,6%	5,6%	9,4%	10,1%	9,5%	1,7%
Gebärmutterhalskrebs	weiblich	49,8%	49,8%	47,7%	-4,5%	39,9%	43,2%	41,2%	3,0%	46,4%	47,4%	45,2%	-2,6%
Brustkrebs	weiblich	28,8%	26,7%	28,2%	-2,3%	25,6%	28,4%	29,0%	11,7%	27,6%	27,0%	28,2%	2,1%
Prostatakrebs	männlich	19,6%	19,8%	19,3%	-1,5%	18,3%	19,1%	18,6%	1,3%	18,9%	19,3%	18,8%	-0,8%

Ergebnis

- Frauen nehmen Früherkennungs- bzw. Vorsorgeuntersuchungen häufiger in Anspruch als Männer.

Trend 2016 - 2021 

- Brustkrebs (+2,1%)
- Hautkrebs (+1,7%)

Trend 2016 - 2021 

- Check Up 35 (-35,3%)
- Check Up PLUS (-18,2%)
- Darmkrebs (-5,7%) (Männer: 13,3%, Frauen: -15,8%)
- Prostatakrebs (-0,8%)
- Gebärmutterhalskrebs (-0,8%)

Impfungen

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil Versicherte mit Inanspruchnahme			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil Versicherte mit Inanspruchnahme			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil Versicherte mit Inanspruchnahme			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
Influenza	männlich	29,3%	32,0%	30,6%	4,2%	23,8%	27,0%	26,6%	10,7%	27,0%	29,7%	28,7%	6,2%
	weiblich	33,7%	36,7%	35,1%	4,2%	26,4%	29,6%	29,5%	10,4%	31,1%	34,1%	33,0%	5,8%
	Gesamt	31,6%	34,4%	33,0%	4,2%	25,1%	28,3%	28,1%	10,6%	29,1%	32,0%	30,9%	6,0%
Pneumokokken	männlich	0,9%	1,5%	1,0%	13,7%	0,8%	1,9%	1,1%	24,1%	0,8%	1,6%	1,0%	18,0%
	weiblich	0,9%	1,5%	1,2%	25,5%	0,8%	1,9%	1,2%	30,6%	0,9%	1,7%	1,2%	27,4%
	Gesamt	0,9%	1,5%	1,1%	20,4%	0,8%	1,9%	1,2%	27,6%	0,9%	1,6%	1,1%	23,2%
Herpes Zoster	männlich		0,7%	3,2%			0,6%	2,8%			0,7%	3,0%	
	weiblich		1,1%	4,7%			0,9%	3,8%			1,0%	4,4%	
	Gesamt		0,9%	3,7%			0,9%	4,0%			0,8%	3,3%	

Ergebnis

- Der Anteil der geimpften Versicherten ist bei allen drei Impfungen seit 2016, bzw. bei Herpes Zoster ab 2019, bis 2021 gestiegen.

Inanspruchnahme Ärzte

	Arztgruppengebiet (Ausschluss: Arztgruppen ohne Arztobergruppenzuordnung, Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychotherapie)	Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil Versicherte mit Arztkontakt			Veränder- ungsrate 2016-2021	Anteil Versicherte mit Arztkontakt			Veränder- ungsrate 2016-2021	Anteil Versicherte mit Arztkontakt			Veränder- ungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
Gesamt	Anästhesiologie	3,4%	3,5%	3,5%	3,0%	3,7%	3,9%	3,8%	2,1%	3,5%	3,6%	3,6%	2,4%
	Augenheilkunde	27,5%	26,7%	24,6%	-10,5%	26,8%	27,1%	25,0%	-6,5%	26,9%	26,5%	24,4%	-9,3%
	Chirurgie	16,0%	16,0%	15,1%	-5,6%	16,2%	16,0%	15,2%	-5,7%	15,9%	15,9%	15,0%	-5,9%
	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	29,1%	28,8%	28,1%	-3,7%	27,3%	28,0%	27,5%	0,7%	28,2%	28,2%	27,4%	-2,6%
	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	16,4%	17,0%	15,8%	-3,4%	15,3%	16,2%	15,1%	-1,0%	15,9%	16,5%	15,4%	-2,8%
	Hausärzte	88,7%	89,4%	91,4%	3,0%	89,3%	90,2%	92,7%	3,8%	88,4%	89,0%	91,1%	3,1%
	Haut- und Geschlechtskrankheiten	18,5%	18,8%	17,3%	-6,8%	15,7%	15,8%	14,9%	-5,6%	17,4%	17,6%	16,3%	-6,7%
	Humangenetik	0,2%	0,2%	0,3%	67,2%	0,2%	0,2%	0,3%	53,7%	0,2%	0,2%	0,3%	62,8%
	Innere Medizin	26,6%	27,7%	27,5%	3,5%	26,0%	28,4%	28,0%	7,7%	26,2%	27,6%	27,4%	4,6%
	Laboratoriumsmedizin	48,4%	54,2%	59,2%	22,5%	47,4%	53,8%	57,6%	21,6%	47,6%	53,5%	58,0%	21,8%
	Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie	14,3%	14,1%	15,7%	9,9%	6,1%	6,7%	10,6%	72,2%	11,6%	11,6%	13,9%	20,0%
	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	0,2%	0,3%	0,3%	6,2%	0,6%	0,7%	0,7%	15,0%	0,3%	0,4%	0,4%	11,7%
	Neurochirurgie	1,5%	1,8%	1,8%	19,4%	1,9%	2,1%	2,2%	17,4%	1,6%	1,9%	2,0%	18,7%
	Neurologie, Psychiatrie	11,9%	12,1%	12,3%	3,3%	12,0%	12,3%	12,4%	3,0%	11,9%	12,1%	12,2%	2,9%
	Nuklearmedizin	2,9%	2,8%	2,6%	-8,5%	3,8%	4,1%	4,1%	8,0%	3,2%	3,2%	3,1%	-1,7%
	Orthopädie	22,6%	23,5%	23,3%	3,1%	24,0%	24,7%	24,0%	-0,2%	22,9%	23,7%	23,3%	2,0%
	Pathologie	18,4%	20,9%	13,6%	-26,1%	15,1%	17,1%	12,6%	-16,7%	17,1%	19,4%	13,1%	-23,6%
	Physikalische und Rehabilitative Medizin	0,9%	0,9%	0,9%	2,6%	1,0%	1,0%	1,2%	21,4%	0,9%	0,9%	1,0%	9,3%
	Psychologische Psychotherapie	1,9%	2,4%	2,6%	34,2%	1,5%	2,1%	2,2%	45,8%	1,8%	2,3%	2,4%	36,7%
	Psychosomatische Medizin und Psychotherapie	0,3%	0,4%	0,4%	18,7%	0,4%	0,5%	0,6%	56,8%	0,4%	0,4%	0,5%	30,6%
Radiologie	34,9%	34,8%	34,7%	-0,5%	33,4%	35,8%	35,1%	5,1%	34,1%	34,7%	34,4%	1,0%	
Strahlentherapie	1,0%	1,1%	1,1%	8,1%	1,2%	1,2%	1,1%	-5,8%	1,0%	1,1%	1,1%	2,9%	
Transfusionsmedizin	1,2%	1,4%	0,7%	-44,1%	0,2%	0,2%	0,3%	11,6%	0,9%	1,0%	0,6%	-38,3%	
Urologie	12,4%	13,1%	12,9%	4,1%	11,8%	12,4%	12,1%	2,5%	12,1%	12,7%	12,5%	3,5%	

Asthma/COPD (ICD J44, J45)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
männlich	50 - 54 Jahre	7,6%	7,8%	8,1%	7,1%	9,2%	9,8%	9,8%	6,8%	8,0%	8,3%	8,4%	5,8%
	55 - 59 Jahre	9,3%	9,9%	9,6%	3,7%	12,0%	12,2%	12,1%	0,9%	10,1%	10,5%	10,3%	2,3%
	60 - 64 Jahre	11,5%	11,9%	12,1%	5,3%	14,6%	15,8%	15,9%	8,6%	12,5%	13,1%	13,2%	6,1%
	65 - 69 Jahre	13,2%	13,7%	13,7%	3,9%	17,5%	17,7%	17,6%	1,0%	14,6%	14,9%	15,0%	2,5%
	Gesamt	10,2%	10,7%	10,8%	6,4%	13,0%	13,7%	13,8%	6,6%	11,0%	11,5%	11,6%	5,9%
weiblich	50 - 54 Jahre	9,3%	10,3%	10,7%	14,7%	11,8%	12,7%	13,0%	9,5%	10,1%	10,9%	11,3%	11,9%
	55 - 59 Jahre	10,1%	10,9%	11,4%	12,0%	12,9%	14,2%	14,6%	13,1%	11,1%	11,9%	12,4%	11,8%
	60 - 64 Jahre	11,0%	12,1%	12,2%	11,0%	15,0%	16,2%	16,2%	8,1%	12,3%	13,4%	13,5%	10,1%
	65 - 69 Jahre	11,8%	12,7%	12,9%	8,8%	15,8%	17,0%	17,6%	11,5%	13,1%	14,0%	14,4%	9,8%
	Gesamt	10,5%	11,5%	11,8%	12,4%	13,7%	15,0%	15,4%	11,8%	11,5%	12,5%	12,9%	11,8%
Gesamt	50 - 54 Jahre	8,5%	9,1%	9,4%	11,1%	10,5%	11,3%	11,4%	8,4%	9,0%	9,6%	9,8%	9,0%
	55 - 59 Jahre	9,7%	10,4%	10,5%	8,2%	12,5%	13,2%	13,4%	7,4%	10,6%	11,2%	11,4%	7,4%
	60 - 64 Jahre	11,3%	12,0%	12,2%	8,2%	14,8%	16,0%	16,1%	8,4%	12,4%	13,3%	13,4%	8,1%
	65 - 69 Jahre	12,5%	13,2%	13,3%	6,4%	16,6%	17,4%	17,6%	6,2%	13,8%	14,4%	14,7%	6,2%
	Gesamt	10,3%	11,1%	11,3%	9,6%	13,4%	14,4%	14,6%	9,4%	11,3%	12,1%	12,3%	9,0%

Ergebnis

- In 2021 wurde bei ca. 12% der 50+ Versicherten Asthma/COPD codiert, 2016 waren es rund 11%. Somit erhielt jeder zehnte Versicherte die Diagnose Asthma/COPD. Der Trend ist zwischen 2016 und 2021 leicht steigend (Veränderungsrate: 9,0%).
- Je älter die Menschen werden, desto höher ist der Anteil der Versicherten mit Asthma/COPD.
- In Thüringen sind mehr Versicherte betroffen als in Sachsen.

Adipositas (ICD E66)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
männlich	50 - 54 Jahre	11,4%	11,4%	11,6%	1,2%	13,2%	13,9%	14,1%	6,4%	11,8%	11,9%	12,0%	2,0%
	55 - 59 Jahre	14,0%	14,3%	14,2%	1,6%	16,1%	16,5%	16,4%	1,9%	14,5%	14,8%	14,7%	1,7%
	60 - 64 Jahre	16,7%	16,8%	16,8%	0,6%	19,7%	19,8%	19,2%	-2,8%	17,6%	17,7%	17,4%	-0,9%
	65 - 69 Jahre	19,2%	19,7%	18,9%	-1,4%	21,5%	22,6%	22,0%	2,7%	19,9%	20,6%	19,9%	-0,1%
	Gesamt	15,0%	15,4%	15,3%	1,8%	17,3%	18,0%	17,8%	3,4%	15,6%	16,0%	15,9%	2,0%
weiblich	50 - 54 Jahre	14,5%	14,4%	14,8%	2,0%	16,6%	17,1%	17,4%	4,6%	15,0%	15,1%	15,5%	2,7%
	55 - 59 Jahre	17,1%	16,6%	16,2%	-5,3%	19,7%	19,2%	18,7%	-5,0%	17,8%	17,3%	16,9%	-5,6%
	60 - 64 Jahre	20,3%	19,0%	18,5%	-8,9%	23,8%	22,8%	21,4%	-9,8%	21,3%	20,2%	19,4%	-9,3%
	65 - 69 Jahre	23,4%	22,3%	20,8%	-11,3%	27,4%	26,6%	24,5%	-10,6%	24,6%	23,6%	21,9%	-10,9%
	Gesamt	18,5%	18,0%	17,5%	-5,3%	21,4%	21,3%	20,5%	-4,6%	19,4%	19,0%	18,4%	-5,1%
Gesamt	50 - 54 Jahre	13,0%	12,9%	13,2%	1,4%	14,9%	15,5%	15,7%	5,4%	13,4%	13,5%	13,7%	2,2%
	55 - 59 Jahre	15,6%	15,5%	15,2%	-2,3%	17,9%	17,9%	17,5%	-1,8%	16,2%	16,1%	15,8%	-2,3%
	60 - 64 Jahre	18,6%	18,0%	17,7%	-4,7%	21,7%	21,3%	20,3%	-6,5%	19,5%	19,0%	18,4%	-5,5%
	65 - 69 Jahre	21,4%	21,1%	19,9%	-7,1%	24,5%	24,6%	23,3%	-5,0%	22,4%	22,2%	21,0%	-6,3%
	Gesamt	16,8%	16,8%	16,5%	-2,2%	19,4%	19,7%	19,2%	-1,0%	17,5%	17,5%	17,2%	-2,0%

Ergebnis

- Bei rund 17% der 50+ Versicherten wurde im Jahr 2021 Adipositas codiert.
- Bei Frauen wird Adipositas etwas mehr codiert, der Trend ist hierbei zwischen 2016 und 2021 rückläufig, d.h. der Anteil mit Adipositas codierter Frauen war 2016 höher. Insbesondere bei den 65-69 Jährigen lag die Veränderung bei ca. -11%.
- Bei den Männern zeigt sich zwischen 2016 und 2021 ein leichter Anstieg (+2 %).
- In Thüringen ist der Anteil der adipösen Versicherten höher als in Sachsen (2016: 2,6 Prozentpunkte (Pp), 2019: 2,9 Pp, 2021: 2,7 Pp).

Diabetes mellitus Typ 2 (ICD E11)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
männlich	50 - 54 Jahre	11,6%	10,8%	10,6%	-8,6%	11,4%	10,7%	10,6%	-7,0%	11,3%	10,6%	10,3%	-9,0%
	55 - 59 Jahre	18,3%	17,1%	16,2%	-11,1%	17,0%	16,4%	15,9%	-6,9%	17,7%	16,6%	15,9%	-9,8%
	60 - 64 Jahre	26,6%	25,0%	24,0%	-9,7%	24,9%	23,3%	22,6%	-9,0%	25,9%	24,2%	23,3%	-9,9%
	65 - 69 Jahre	34,8%	33,4%	32,3%	-7,3%	32,8%	31,5%	30,7%	-6,5%	34,1%	32,7%	31,6%	-7,3%
	Gesamt	21,9%	21,2%	20,5%	-6,4%	20,5%	20,1%	19,7%	-3,9%	21,2%	20,5%	19,9%	-6,0%
weiblich	50 - 54 Jahre	7,3%	6,8%	6,6%	-9,3%	7,2%	7,0%	7,0%	-2,3%	7,3%	6,8%	6,7%	-7,6%
	55 - 59 Jahre	12,4%	11,1%	10,6%	-14,2%	12,1%	11,1%	10,5%	-13,7%	12,3%	11,1%	10,5%	-14,5%
	60 - 64 Jahre	19,1%	17,3%	16,5%	-14,0%	19,0%	17,2%	16,1%	-15,6%	19,1%	17,3%	16,3%	-14,6%
	65 - 69 Jahre	27,1%	25,3%	23,6%	-12,9%	26,9%	24,7%	23,4%	-13,1%	27,0%	25,1%	23,5%	-13,0%
	Gesamt	15,8%	15,0%	14,3%	-9,5%	15,6%	14,7%	14,2%	-8,8%	15,7%	14,8%	14,2%	-9,6%
Gesamt	50 - 54 Jahre	9,4%	8,8%	8,6%	-8,5%	9,3%	8,8%	8,8%	-5,2%	9,3%	8,7%	8,5%	-8,1%
	55 - 59 Jahre	15,2%	14,0%	13,3%	-12,5%	14,6%	13,7%	13,1%	-10,1%	14,9%	13,8%	13,2%	-11,9%
	60 - 64 Jahre	22,7%	21,0%	20,0%	-11,9%	21,9%	20,2%	19,2%	-12,3%	22,4%	20,6%	19,7%	-12,2%
	65 - 69 Jahre	30,7%	29,1%	27,6%	-10,0%	29,7%	28,0%	26,9%	-9,6%	30,4%	28,7%	27,3%	-10,0%
	Gesamt	18,7%	18,0%	17,3%	-7,8%	18,0%	17,4%	16,9%	-6,3%	18,4%	17,6%	17,0%	-7,7%

Ergebnis

- Bei ca. 17% der 50+ Versicherten wurde in 2021 Diabetes mellitus Typ 2 codiert, 2016 waren es noch 18,4%. Der Trend ist somit zwischen 2016 und 2021 rückläufig.
- Männer sind häufiger an Diabetes mellitus Typ 2 erkrankt (2021: Differenz von 5,7 Prozentpunkte).
- Jeder fünfte Versicherte Mann erhielt 2021 eine Diagnose mit Diabetes mellitus Typ 2, bei den Frauen ist es jede siebte Versicherte.
- Je älter die Versicherten sind, desto höher ist die Prävalenz. 2021 war der Anteil der 65-69 Jährigen mit Diabetes mellitus Typ 2 Diagnose dreimal so hoch als bei den 50-54 Jährigen.

Schilddrüsenerkrankungen (ICD E01-E07)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
männlich	50 - 54 Jahre	8,1%	8,1%	8,0%	-1,2%	9,6%	9,7%	9,8%	2,0%	8,4%	8,4%	8,3%	-0,8%
	55 - 59 Jahre	9,4%	10,0%	10,0%	6,1%	11,4%	11,7%	11,8%	4,2%	10,0%	10,4%	10,4%	4,9%
	60 - 64 Jahre	11,3%	11,4%	11,5%	2,2%	13,7%	13,9%	13,8%	0,9%	12,0%	12,1%	12,2%	1,7%
	65 - 69 Jahre	13,8%	13,9%	13,5%	-2,2%	17,4%	17,0%	16,5%	-5,4%	14,8%	14,8%	14,4%	-2,9%
	Gesamt	10,4%	10,8%	10,7%	2,7%	12,6%	13,0%	12,9%	2,2%	11,0%	11,3%	11,2%	2,3%
weiblich	50 - 54 Jahre	26,4%	27,4%	27,3%	3,6%	28,7%	29,6%	30,1%	4,9%	26,9%	27,8%	27,9%	3,9%
	55 - 59 Jahre	28,5%	29,6%	29,9%	4,7%	31,6%	32,5%	32,5%	2,5%	29,4%	30,3%	30,5%	3,8%
	60 - 64 Jahre	30,5%	31,1%	31,4%	2,9%	33,7%	34,8%	35,2%	4,5%	31,5%	32,3%	32,5%	3,4%
	65 - 69 Jahre	33,7%	33,4%	33,3%	-1,2%	37,7%	37,7%	37,4%	-0,8%	34,8%	34,7%	34,6%	-0,8%
	Gesamt	29,5%	30,4%	30,5%	3,3%	32,6%	33,6%	33,8%	3,7%	30,4%	31,2%	31,4%	3,4%
Gesamt	50 - 54 Jahre	17,5%	17,9%	17,7%	1,5%	19,1%	19,8%	20,0%	4,4%	17,7%	18,2%	18,1%	2,0%
	55 - 59 Jahre	19,2%	20,2%	20,3%	5,4%	21,5%	22,3%	22,3%	3,9%	19,8%	20,6%	20,7%	4,5%
	60 - 64 Jahre	21,2%	21,7%	22,0%	3,5%	23,8%	24,6%	24,9%	4,7%	21,9%	22,5%	22,8%	3,7%
	65 - 69 Jahre	24,4%	24,3%	24,1%	-1,2%	27,9%	27,7%	27,3%	-2,1%	25,4%	25,3%	25,1%	-1,2%
	Gesamt	20,3%	21,0%	21,0%	3,3%	22,7%	23,5%	23,6%	3,9%	20,9%	21,6%	21,6%	3,4%

Ergebnis

- In 2021 wurde bei jedem fünften 50+ Versicherten eine Schilddrüsenerkrankung codiert (21,6%).
- Es liegt ein gravierender Geschlechtsunterschied vor. Frauen sind dreimal so häufig betroffen als Männer (2021: Differenz von 20,2 Prozentpunkten).
- Die Änderungsrate liegt insgesamt bei 3,4%.

Bluthochdruck (ICD I10-I15)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
männlich	50 - 54 Jahre	42,2%	40,7%	39,5%	-6,5%	45,1%	44,3%	44,0%	-2,3%	42,2%	40,7%	39,8%	-5,8%
	55 - 59 Jahre	52,7%	52,3%	51,8%	-1,8%	55,8%	56,1%	56,0%	0,2%	53,0%	52,7%	52,3%	-1,3%
	60 - 64 Jahre	64,0%	63,2%	62,5%	-2,4%	66,2%	66,3%	66,6%	0,6%	64,2%	63,6%	63,2%	-1,6%
	65 - 69 Jahre	72,2%	71,8%	71,5%	-1,0%	75,0%	74,8%	74,4%	-0,8%	72,8%	72,5%	72,2%	-0,9%
	Gesamt	56,6%	56,6%	56,0%	-1,1%	59,2%	59,9%	60,1%	1,5%	56,7%	56,7%	56,4%	-0,6%
weiblich	50 - 54 Jahre	39,0%	36,6%	35,6%	-8,7%	42,8%	41,2%	40,2%	-6,2%	39,8%	37,6%	36,6%	-8,1%
	55 - 59 Jahre	49,3%	47,6%	46,4%	-6,0%	53,0%	51,9%	51,0%	-3,8%	50,2%	48,6%	47,5%	-5,4%
	60 - 64 Jahre	60,3%	57,7%	56,7%	-6,0%	64,3%	62,4%	61,6%	-4,2%	61,4%	59,0%	58,1%	-5,4%
	65 - 69 Jahre	70,5%	68,5%	66,7%	-5,3%	74,4%	72,5%	71,6%	-3,8%	71,6%	69,6%	68,1%	-4,8%
	Gesamt	53,8%	52,5%	51,5%	-4,3%	57,5%	56,6%	56,1%	-2,3%	54,6%	53,4%	52,5%	-3,8%
Gesamt	50 - 54 Jahre	40,6%	38,6%	37,5%	-7,5%	43,9%	42,8%	42,1%	-4,2%	41,0%	39,1%	38,2%	-6,9%
	55 - 59 Jahre	51,0%	49,9%	49,0%	-3,9%	54,4%	54,0%	53,4%	-1,8%	51,5%	50,6%	49,8%	-3,4%
	60 - 64 Jahre	62,1%	60,3%	59,4%	-4,3%	65,3%	64,3%	64,1%	-1,9%	62,8%	61,2%	60,5%	-3,6%
	65 - 69 Jahre	71,3%	70,0%	68,9%	-3,3%	74,7%	73,6%	72,9%	-2,4%	72,2%	71,0%	70,0%	-3,0%
	Gesamt	55,1%	54,4%	53,6%	-2,8%	58,3%	58,2%	58,1%	-0,5%	55,6%	55,0%	54,4%	-2,2%

Ergebnis

- Bei mehr als der Hälfte aller 50+ Versicherten wurde in den Jahren 2016, 2019 und 2021 Bluthochdruck codiert. 2016 war es ähnlich hoch.
- Der Trend von 2016 zu 2021 ist leicht sinkend (Veränderungsrate 2016-2021: -2,2%).
- Männer sind häufiger betroffen (2021: 56,4% vs. 52,5%).
- Je älter die Menschen werden, desto höher ist der Anteil der Versicherten, bei denen die Diagnose codiert wird.
- 2021 ist in Thüringen der Anteil Betroffener 4,5 Prozentpunkte höher als in Sachsen.

Koronare Herzkrankheit/KHK (ICD I20-I25)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
männlich	50 - 54 Jahre	5,8%	5,5%	5,3%	-8,5%	7,1%	6,8%	6,6%	-8,1%	6,1%	5,8%	5,6%	-8,8%
	55 - 59 Jahre	9,4%	9,2%	8,8%	-5,8%	11,4%	11,0%	10,5%	-7,6%	10,0%	9,6%	9,3%	-6,7%
	60 - 64 Jahre	14,9%	14,2%	13,9%	-7,2%	17,4%	16,7%	16,2%	-7,1%	15,7%	14,9%	14,5%	-7,6%
	65 - 69 Jahre	20,9%	20,4%	19,8%	-5,1%	23,7%	22,8%	22,0%	-7,2%	21,7%	21,1%	20,5%	-5,8%
	Gesamt	12,1%	12,1%	11,7%	-3,1%	14,1%	14,0%	13,7%	-3,4%	12,7%	12,5%	12,2%	-3,6%
weiblich	50 - 54 Jahre	2,6%	2,4%	2,4%	-8,9%	3,7%	3,5%	3,2%	-11,9%	2,9%	2,7%	2,6%	-10,4%
	55 - 59 Jahre	4,3%	3,9%	3,8%	-12,6%	5,7%	5,4%	5,0%	-11,8%	4,7%	4,4%	4,2%	-12,4%
	60 - 64 Jahre	7,3%	6,5%	6,0%	-18,2%	9,3%	8,7%	7,9%	-14,9%	7,9%	7,2%	6,6%	-16,7%
	65 - 69 Jahre	11,1%	10,0%	9,5%	-14,0%	14,3%	12,8%	11,7%	-18,0%	12,0%	10,8%	10,2%	-15,6%
	Gesamt	6,0%	5,7%	5,4%	-10,6%	7,8%	7,5%	6,9%	-11,2%	6,6%	6,2%	5,8%	-10,9%
Gesamt	50 - 54 Jahre	4,2%	3,9%	3,8%	-7,9%	5,4%	5,1%	4,9%	-9,5%	4,5%	4,3%	4,1%	-8,8%
	55 - 59 Jahre	6,8%	6,5%	6,2%	-8,3%	8,5%	8,1%	7,7%	-9,6%	7,3%	7,0%	6,7%	-8,9%
	60 - 64 Jahre	11,0%	10,2%	9,7%	-11,6%	13,4%	12,6%	11,9%	-10,7%	11,7%	10,9%	10,4%	-11,3%
	65 - 69 Jahre	15,7%	14,8%	14,3%	-8,6%	18,8%	17,6%	16,7%	-11,5%	16,6%	15,7%	15,0%	-9,6%
	Gesamt	9,0%	8,7%	8,4%	-5,9%	11,0%	10,7%	10,2%	-6,6%	9,5%	9,3%	8,9%	-6,4%

Ergebnis

- Bei 8,9% der 50+ Versicherten wurde im Jahr 2021 KHK codiert.
- Der Trend von 2016 zu 2021 ist rückläufig (Veränderungsrate: -6,4%).
- Männer sind häufiger betroffen (2021: 12,2% vs. 5,8%).
- Je älter die Menschen werden, desto höher ist der Anteil der Versicherten, bei denen die Diagnose codiert wird.
- 2021 ist in Thüringen der Anteil der Betroffenen 1,8 Prozentpunkte höher als in Sachsen.

Kardiale Arrhythmien (ICD I44-I45, I46.0, I46.9, I47-I49)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate
		2016	2019	2021	2016-2021	2016	2019	2021	2016-2021	2016	2019	2021	2016-2021
männlich	50 - 54 Jahre	5,6%	5,7%	5,6%	-0,4%	6,1%	6,4%	6,2%	1,4%	5,7%	5,8%	5,6%	-1,2%
	55 - 59 Jahre	8,2%	8,5%	8,4%	2,9%	8,9%	9,3%	9,1%	2,3%	8,3%	8,6%	8,5%	2,1%
	60 - 64 Jahre	12,3%	12,6%	12,7%	3,2%	13,2%	13,5%	13,6%	3,1%	12,5%	12,8%	12,8%	2,7%
	65 - 69 Jahre	17,9%	18,5%	18,3%	2,5%	18,8%	19,3%	18,8%	-0,1%	18,2%	18,7%	18,4%	1,3%
	Gesamt	10,5%	11,1%	11,1%	5,6%	11,1%	11,8%	11,8%	5,7%	10,6%	11,2%	11,1%	4,9%
weiblich	50 - 54 Jahre	6,1%	6,1%	6,1%	0,0%	7,2%	7,5%	7,6%	5,2%	6,4%	6,4%	6,5%	1,4%
	55 - 59 Jahre	7,2%	7,6%	7,6%	5,4%	8,7%	8,9%	8,9%	3,1%	7,6%	7,9%	8,0%	4,2%
	60 - 64 Jahre	10,1%	9,8%	9,6%	-4,7%	11,4%	11,6%	11,3%	-0,2%	10,4%	10,3%	10,1%	-3,0%
	65 - 69 Jahre	13,7%	13,8%	13,4%	-2,1%	15,7%	15,9%	15,2%	-3,3%	14,3%	14,3%	13,9%	-2,6%
	Gesamt	9,0%	9,3%	9,2%	1,8%	10,4%	10,8%	10,7%	3,1%	9,4%	9,7%	9,6%	2,1%
Gesamt	50 - 54 Jahre	5,9%	5,9%	5,8%	-0,3%	6,7%	7,0%	6,9%	3,5%	6,0%	6,1%	6,0%	0,1%
	55 - 59 Jahre	7,7%	8,0%	8,0%	4,0%	8,8%	9,1%	9,0%	2,7%	8,0%	8,3%	8,2%	3,1%
	60 - 64 Jahre	11,1%	11,1%	11,1%	-0,7%	12,3%	12,5%	12,4%	1,3%	11,4%	11,5%	11,4%	-0,2%
	65 - 69 Jahre	15,7%	16,0%	15,7%	0,3%	17,2%	17,5%	16,9%	-1,6%	16,1%	16,4%	16,0%	-0,6%
	Gesamt	9,7%	10,1%	10,1%	3,7%	10,8%	11,3%	11,2%	4,4%	10,0%	10,4%	10,3%	3,5%

Ergebnis

- 2021 wurde bei jedem zehnten der 50+ Versicherten eine kardiale Arrhythmie diagnostiziert.
- Der Trend ist zwischen 2016 und 2021 leicht steigend (Veränderungsrate 3,5%).
- Männer sind etwas häufiger betroffen (2021: Differenz von 1,5 Prozentpunkten).
- Mit zunehmenden Alter steigt der Anteil der Versicherten mit einer kardialen Arrhythmie. 2021 lag der Anteil 65-69 jährigen bei ca. 16% und war damit mehr als das Doppelte so hoch als bei den 50-54 Jährigen (6,0%).
- In Thüringen ist 2021 der Anteil der Versicherten mit einer kardialen Arrhythmie etwas höher als in Sachsen (2021: Differenz von 1,1 Prozentpunkten).

Herzinsuffizienz (ICD I50)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
männlich	50 - 54 Jahre	2,9%	3,2%	3,1%	6,1%	3,8%	4,1%	3,7%	-2,3%	3,2%	3,4%	3,2%	1,2%
	55 - 59 Jahre	4,9%	5,8%	5,4%	9,5%	6,7%	6,8%	6,5%	-3,0%	5,5%	6,0%	5,6%	3,1%
	60 - 64 Jahre	8,5%	9,5%	9,0%	5,7%	10,2%	11,1%	10,9%	7,3%	9,0%	9,9%	9,5%	5,4%
	65 - 69 Jahre	12,0%	14,0%	13,6%	13,3%	15,1%	15,9%	15,0%	-0,6%	12,9%	14,5%	13,9%	7,5%
	Gesamt	6,7%	7,9%	7,6%	13,4%	8,4%	9,2%	8,9%	6,0%	7,2%	8,2%	7,8%	9,3%
weiblich	50 - 54 Jahre	1,6%	1,8%	1,8%	16,1%	2,1%	2,2%	2,2%	1,7%	1,7%	1,9%	1,9%	9,7%
	55 - 59 Jahre	2,6%	3,1%	2,9%	12,7%	3,9%	3,9%	3,6%	-7,4%	3,0%	3,3%	3,1%	3,5%
	60 - 64 Jahre	4,6%	5,3%	5,0%	7,5%	6,3%	6,8%	6,3%	-0,4%	5,2%	5,8%	5,4%	3,9%
	65 - 69 Jahre	7,2%	8,7%	8,1%	11,9%	10,4%	10,7%	10,0%	-3,7%	8,2%	9,3%	8,6%	5,1%
	Gesamt	3,8%	4,7%	4,4%	16,5%	5,4%	5,8%	5,5%	2,3%	4,3%	5,0%	4,7%	10,0%
Gesamt	50 - 54 Jahre	2,2%	2,5%	2,5%	10,2%	3,0%	3,1%	3,0%	-1,0%	2,4%	2,6%	2,6%	4,7%
	55 - 59 Jahre	3,7%	4,4%	4,1%	10,4%	5,3%	5,3%	5,0%	-5,2%	4,2%	4,6%	4,3%	2,9%
	60 - 64 Jahre	6,5%	7,3%	6,9%	5,8%	8,2%	8,9%	8,5%	3,6%	7,0%	7,7%	7,3%	4,3%
	65 - 69 Jahre	9,5%	11,2%	10,6%	12,6%	12,7%	13,2%	12,4%	-2,0%	10,5%	11,7%	11,1%	6,4%
	Gesamt	5,2%	6,2%	6,0%	14,5%	6,9%	7,5%	7,2%	4,2%	5,7%	6,5%	6,2%	9,4%

Ergebnis

- 2021 wurde bei 6,2% der 50+ Versicherten Herzinsuffizienz codiert, 2016 waren es 5,7%.
- Die Veränderungsrate liegt insgesamt bei 9,4%.
- Männer sind doppelt so häufig betroffen als Frauen (2021: 7,8% vs. 4,7%).
- Mit zunehmenden Alter steigt der Anteil der betroffenen Versicherten an. 2021 waren viermal so viele 65-69 Jährige von der Herzinsuffizienz betroffen als die 50-54 Jährigen.

Atherosklerose (ICD I65, I66, I67.2, I70, I73.9)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate
		2016	2019	2021	2016-2021	2016	2019	2021	2016-2021	2016	2019	2021	2016-2021
männlich	50 - 54 Jahre	3,8%	3,6%	3,4%	-10,6%	4,8%	4,6%	4,3%	-12,1%	4,1%	3,8%	3,6%	-12,7%
	55 - 59 Jahre	7,3%	7,2%	7,0%	-4,5%	9,0%	9,0%	8,3%	-7,0%	7,8%	7,6%	7,3%	-5,6%
	60 - 64 Jahre	11,8%	11,9%	12,1%	2,8%	14,3%	14,3%	14,4%	0,3%	12,6%	12,6%	12,7%	1,6%
	65 - 69 Jahre	15,5%	17,0%	17,2%	11,0%	18,9%	20,1%	20,2%	6,9%	16,6%	17,9%	18,1%	9,5%
	Gesamt	9,1%	9,7%	9,7%	6,6%	11,1%	11,7%	11,6%	4,7%	9,7%	10,2%	10,2%	5,3%
weiblich	50 - 54 Jahre	2,1%	2,0%	2,0%	-3,9%	3,1%	3,0%	2,9%	-5,2%	2,4%	2,4%	2,3%	-4,9%
	55 - 59 Jahre	3,8%	3,8%	3,8%	2,3%	5,3%	5,5%	5,4%	1,8%	4,3%	4,3%	4,3%	2,0%
	60 - 64 Jahre	6,3%	6,4%	6,6%	4,7%	8,8%	9,4%	8,8%	0,2%	7,0%	7,3%	7,3%	3,4%
	65 - 69 Jahre	8,6%	9,6%	10,0%	16,0%	12,7%	13,2%	13,2%	4,4%	9,9%	10,7%	11,0%	11,4%
	Gesamt	5,0%	5,4%	5,6%	12,7%	7,1%	7,6%	7,6%	6,7%	5,6%	6,1%	6,2%	10,2%
Gesamt	50 - 54 Jahre	2,9%	2,8%	2,7%	-7,7%	4,0%	3,8%	3,6%	-9,5%	3,2%	3,1%	2,9%	-9,5%
	55 - 59 Jahre	5,5%	5,4%	5,4%	-2,3%	7,1%	7,2%	6,9%	-4,1%	6,0%	6,0%	5,8%	-3,1%
	60 - 64 Jahre	8,9%	9,0%	9,2%	3,0%	11,6%	11,8%	11,5%	-0,4%	9,7%	9,9%	9,9%	1,8%
	65 - 69 Jahre	11,8%	13,0%	13,4%	12,8%	15,7%	16,5%	16,6%	5,8%	13,0%	14,1%	14,4%	10,1%
	Gesamt	7,0%	7,5%	7,6%	8,8%	9,1%	9,6%	9,6%	5,1%	7,6%	8,1%	8,1%	7,0%

Ergebnis

- In 2021 wurde bei 8,1% der 50+ Versicherten Atherosklerose codiert. 2016 waren es 7,6%. Der Trend ist somit zwischen 2016 und 2021 steigend (Veränderungsrate: 7%). Hierbei ist die Veränderungsrate bei den Frauen insgesamt doppelt so hoch wie bei den Männern (5,3% vs. 10,2%).
- Männer sind häufiger von Atherosklerose betroffen (2021: Differenz von 4 Prozentpunkten).
- Knapp jeder zehnte Versicherte Mann erhielt 2021 eine Diagnose mit Atherosklerose, bei den Frauen ist es knapp jede zwanzigste Versicherte.
- Mit zunehmenden Alter steigt die Wahrscheinlichkeit an Atherosklerose zu erkranken. 2021 war der Anteil bei den 65-69 Jährigen fünfmal so hoch als bei den 50-54 Jährigen.

Herzinfarkt (ICD I21, I22)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
männlich	50 - 54 Jahre	0,28%	0,31%	0,31%	7,8%	0,44%	0,39%	0,45%	2,2%	0,33%	0,34%	0,34%	3,5%
	55 - 59 Jahre	0,41%	0,47%	0,39%	-6,8%	0,56%	0,59%	0,55%	-1,5%	0,47%	0,51%	0,45%	-3,9%
	60 - 64 Jahre	0,61%	0,60%	0,56%	-7,9%	0,68%	0,80%	0,72%	6,3%	0,65%	0,67%	0,61%	-5,8%
	65 - 69 Jahre	0,71%	0,77%	0,71%	0,1%	0,87%	0,89%	0,86%	-1,7%	0,77%	0,81%	0,75%	-2,7%
	Gesamt	0,49%	0,53%	0,48%	-0,6%	0,62%	0,66%	0,64%	3,8%	0,53%	0,57%	0,53%	-0,6%
weiblich	50 - 54 Jahre	0,10%	0,10%	0,10%	-1,0%	0,13%	0,11%	0,10%	-23,6%	0,12%	0,11%	0,10%	-14,2%
	55 - 59 Jahre	0,13%	0,11%	0,14%	11,0%	0,18%	0,19%	0,15%	-14,7%	0,14%	0,14%	0,15%	1,8%
	60 - 64 Jahre	0,13%	0,19%	0,17%	30,1%	0,24%	0,26%	0,27%	15,5%	0,17%	0,21%	0,21%	22,7%
	65 - 69 Jahre	0,26%	0,28%	0,23%	-9,6%	0,36%	0,32%	0,36%	-1,5%	0,30%	0,29%	0,27%	-9,6%
	Gesamt	0,15%	0,17%	0,16%	8,4%	0,22%	0,22%	0,22%	0,9%	0,17%	0,19%	0,18%	3,1%
Gesamt	50 - 54 Jahre	0,19%	0,20%	0,20%	6,3%	0,28%	0,25%	0,27%	-4,0%	0,22%	0,22%	0,22%	-0,2%
	55 - 59 Jahre	0,27%	0,28%	0,26%	-2,8%	0,37%	0,39%	0,35%	-5,7%	0,30%	0,32%	0,29%	-3,0%
	60 - 64 Jahre	0,36%	0,39%	0,36%	-1,5%	0,46%	0,53%	0,49%	7,4%	0,40%	0,43%	0,40%	-0,5%
	65 - 69 Jahre	0,47%	0,51%	0,45%	-3,0%	0,61%	0,60%	0,60%	-1,7%	0,52%	0,54%	0,50%	-4,9%
	Gesamt	0,31%	0,34%	0,32%	1,5%	0,42%	0,44%	0,42%	2,3%	0,35%	0,37%	0,35%	0,1%

Ergebnis

- In 2021 wurden 0,35% aller 50+ Versicherten mit der Diagnose Herzinfarkt in einem Krankenhaus behandelt.
- Der Anteil liegt 2021 bei den Männer bei knapp 0,53%, und ist somit dreimal so hoch wie bei den Frauen, wo er bei knapp 0,18% liegt.
- Je älter die Menschen werden, desto höher ist der Anteil der Versicherten, die wegen einem Herzinfarkt im Krankenhaus behandelt wurden. 2021 war der Anteil bei den 65-69 Jährigen doppelt so hoch als bei den 50-54 Jährigen.
- In Thüringen ist der Anteil Betroffener höher als in Sachsen.

Schlaganfall (ICD G45, I60-I64)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate
		2016	2019	2021	2016-2021	2016	2019	2021	2016-2021	2016	2019	2021	2016-2021
männlich	50 - 54 Jahre	0,39%	0,42%	0,39%	0,5%	0,51%	0,43%	0,40%	-22,9%	0,43%	0,42%	0,39%	-10,5%
	55 - 59 Jahre	0,65%	0,64%	0,56%	-13,5%	0,69%	0,61%	0,68%	-1,9%	0,67%	0,63%	0,60%	-10,6%
	60 - 64 Jahre	1,01%	0,87%	0,84%	-17,4%	1,08%	1,07%	0,96%	-11,2%	1,04%	0,93%	0,88%	-15,0%
	65 - 69 Jahre	1,16%	1,27%	1,17%	1,0%	1,49%	1,37%	1,24%	-16,3%	1,28%	1,30%	1,19%	-6,6%
	Gesamt	0,77%	0,79%	0,73%	-5,7%	0,89%	0,85%	0,81%	-9,2%	0,81%	0,80%	0,75%	-7,9%
weiblich	50 - 54 Jahre	0,28%	0,26%	0,22%	-23,6%	0,33%	0,32%	0,28%	-16,2%	0,30%	0,27%	0,23%	-22,8%
	55 - 59 Jahre	0,30%	0,37%	0,34%	13,8%	0,46%	0,45%	0,44%	-4,9%	0,35%	0,39%	0,37%	4,2%
	60 - 64 Jahre	0,53%	0,48%	0,40%	-24,3%	0,64%	0,63%	0,58%	-10,4%	0,57%	0,53%	0,47%	-18,0%
	65 - 69 Jahre	0,63%	0,65%	0,61%	-2,7%	0,78%	0,89%	0,81%	4,2%	0,69%	0,73%	0,67%	-2,1%
	Gesamt	0,42%	0,44%	0,39%	-7,2%	0,54%	0,56%	0,52%	-2,1%	0,46%	0,48%	0,43%	-6,2%
Gesamt	50 - 54 Jahre	0,34%	0,34%	0,30%	-9,5%	0,42%	0,37%	0,33%	-20,3%	0,36%	0,35%	0,31%	-15,3%
	55 - 59 Jahre	0,47%	0,50%	0,44%	-4,8%	0,57%	0,53%	0,55%	-3,5%	0,51%	0,51%	0,48%	-5,6%
	60 - 64 Jahre	0,76%	0,66%	0,61%	-20,4%	0,86%	0,84%	0,76%	-11,4%	0,80%	0,73%	0,67%	-16,6%
	65 - 69 Jahre	0,88%	0,94%	0,87%	-0,6%	1,12%	1,12%	1,02%	-8,9%	0,97%	1,00%	0,92%	-5,0%
	Gesamt	0,59%	0,61%	0,55%	-6,3%	0,71%	0,70%	0,66%	-6,8%	0,63%	0,63%	0,59%	-7,4%

Ergebnis

- 2021 wurden rund 0,59% der 50+ Versicherten mit einem Schlaganfall in einem Krankenhaus behandelt. 2016 waren es 0,63%. Der Trend ist somit zwischen 2016 und 2021 marginal gesunken (Veränderungsrate -7,4%).
- Männer erleiden fast doppelt so oft einen Schlaganfall (2021: 0,75% vs. 0,43%).
- Mit zunehmenden Alter steigt die Wahrscheinlichkeit einen Schlaganfall zu erleiden. Demnach wurden dreimal so viele 65-69 Jährige mit einem Schlaganfall im Krankenhaus behandelt als die 50-54 Jährigen.
- In Thüringen ist der Anteil Betroffener höher als in Sachsen.

Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (ICD M40-M43, M45-M54)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
männlich	50 - 54 Jahre	38,7%	38,6%	38,9%	0,5%	41,9%	43,1%	43,8%	4,5%	39,0%	39,1%	39,4%	0,9%
	55 - 59 Jahre	42,3%	42,7%	43,1%	1,8%	45,6%	47,4%	48,0%	5,3%	42,8%	43,6%	44,0%	2,9%
	60 - 64 Jahre	45,4%	47,1%	47,4%	4,3%	49,0%	51,1%	52,0%	6,1%	46,2%	48,0%	48,4%	4,9%
	65 - 69 Jahre	45,2%	45,4%	45,9%	1,6%	48,2%	49,5%	49,8%	3,4%	45,8%	46,5%	47,0%	2,5%
	Gesamt	42,7%	43,4%	43,8%	2,6%	46,0%	47,7%	48,5%	5,5%	43,2%	44,2%	44,6%	3,4%
weiblich	50 - 54 Jahre	52,5%	52,8%	52,7%	0,4%	55,3%	56,2%	56,4%	2,0%	53,0%	53,4%	53,2%	0,4%
	55 - 59 Jahre	55,0%	55,5%	55,2%	0,5%	56,8%	59,0%	59,4%	4,7%	55,2%	56,3%	56,2%	1,8%
	60 - 64 Jahre	56,8%	57,6%	57,5%	1,2%	58,6%	60,7%	61,2%	4,4%	57,2%	58,5%	58,4%	2,1%
	65 - 69 Jahre	56,7%	56,8%	56,4%	-0,6%	58,4%	59,2%	59,6%	2,0%	57,0%	57,3%	57,2%	0,3%
	Gesamt	55,1%	55,7%	55,5%	0,7%	57,2%	58,8%	59,2%	3,6%	55,5%	56,4%	56,3%	1,5%
Gesamt	50 - 54 Jahre	45,8%	45,9%	45,9%	0,2%	48,6%	49,8%	50,1%	3,1%	46,1%	46,3%	46,3%	0,4%
	55 - 59 Jahre	48,8%	49,4%	49,4%	1,1%	51,2%	53,3%	53,8%	5,2%	49,1%	50,1%	50,3%	2,4%
	60 - 64 Jahre	51,3%	52,6%	52,7%	2,7%	53,8%	56,0%	56,7%	5,4%	51,8%	53,4%	53,6%	3,5%
	65 - 69 Jahre	51,3%	51,4%	51,5%	0,4%	53,5%	54,5%	54,9%	2,6%	51,7%	52,2%	52,4%	1,2%
	Gesamt	49,1%	49,8%	49,9%	1,5%	51,6%	53,4%	54,0%	4,6%	49,5%	50,4%	50,6%	2,4%

Ergebnis

- Jeder zweite Versicherte im Alter von 50 bis 69 Jahre litt 2021 an einer Krankheit der Wirbelsäule oder des Rückens.
- Der Trend ist zwischen 2016 und 2021 leicht steigend (Veränderungsrate 2,4%).
- Frauen sind häufiger betroffen (2021: 11,7 Prozentpunkte mehr betroffene Frauen).
- In Thüringen ist der Anteil der adipösen Versicherten höher als in Sachsen (2021: Differenz von 4,1 Prozentpunkten).

Arthrose (ICD M15-M19)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
männlich	50 - 54 Jahre	13,6%	13,1%	12,5%	-8,2%	15,7%	16,0%	15,0%	-4,2%	13,9%	13,6%	12,9%	-7,8%
	55 - 59 Jahre	19,4%	19,5%	19,3%	-0,4%	22,3%	22,3%	22,0%	-1,0%	20,0%	20,1%	19,9%	-0,7%
	60 - 64 Jahre	25,7%	26,8%	26,7%	3,9%	28,9%	29,7%	29,9%	3,6%	26,4%	27,5%	27,5%	4,0%
	65 - 69 Jahre	29,3%	30,1%	30,1%	2,7%	32,2%	33,2%	32,9%	2,3%	30,0%	30,9%	30,8%	2,9%
	Gesamt	21,4%	22,1%	22,0%	2,7%	24,1%	25,0%	24,9%	3,6%	21,9%	22,7%	22,5%	2,9%
weiblich	50 - 54 Jahre	17,2%	17,0%	16,8%	-2,3%	20,1%	20,4%	19,7%	-2,1%	18,0%	17,9%	17,6%	-2,3%
	55 - 59 Jahre	24,8%	24,7%	24,5%	-1,3%	27,9%	27,9%	27,6%	-1,3%	25,7%	25,5%	25,3%	-1,5%
	60 - 64 Jahre	32,3%	32,5%	32,1%	-0,8%	35,7%	36,2%	35,6%	-0,5%	33,2%	33,6%	33,1%	-0,5%
	65 - 69 Jahre	37,9%	38,0%	37,5%	-1,0%	40,9%	41,0%	40,7%	-0,3%	38,7%	38,8%	38,4%	-0,8%
	Gesamt	27,4%	28,0%	27,8%	1,4%	30,4%	31,1%	30,9%	1,8%	28,2%	28,8%	28,6%	1,5%
Gesamt	50 - 54 Jahre	15,5%	15,1%	14,7%	-5,1%	17,9%	18,2%	17,4%	-3,0%	16,0%	15,8%	15,2%	-4,9%
	55 - 59 Jahre	22,2%	22,2%	22,0%	-0,8%	25,1%	25,1%	24,9%	-1,0%	22,9%	22,9%	22,6%	-1,1%
	60 - 64 Jahre	29,2%	29,8%	29,6%	1,3%	32,3%	33,0%	32,8%	1,5%	29,9%	30,6%	30,4%	1,6%
	65 - 69 Jahre	33,9%	34,3%	34,1%	0,6%	36,7%	37,2%	37,0%	0,8%	34,5%	35,1%	34,8%	0,8%
	Gesamt	24,5%	25,2%	25,0%	2,0%	27,3%	28,1%	28,0%	2,7%	25,1%	25,8%	25,6%	2,1%

Ergebnis

- 2021 wurde bei jedem vierten der 50+ Versicherten Arthrose diagnostiziert.
- Der Trend ist zwischen 2016 und 2021 leicht steigend (Veränderungsrate 2,1%).
- Frauen sind häufiger von Arthrose betroffen (2021: Differenz von 6,1 Prozentpunkten).
- Mit zunehmenden Alter steigt der Anteil der Versicherten mit Arthrose. 2021 lag der Anteil 65-69 Jährigen bei ca. 35% und war damit mehr als das Doppelte so hoch als bei den 50-54 jährigen.
- In Thüringen ist 2021 der Anteil Versicherter mit Arthrose höher als in Sachsen (2021: Differenz von 3,0 Prozentpunkten).

Osteoporose (ICD M80-M82)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
männlich	50 - 54 Jahre	0,9%	0,9%	0,8%	-15,5%	1,4%	1,3%	1,1%	-19,6%	1,0%	1,0%	0,9%	-17,2%
	55 - 59 Jahre	1,5%	1,4%	1,3%	-18,4%	2,2%	2,0%	1,8%	-20,2%	1,7%	1,5%	1,4%	-20,0%
	60 - 64 Jahre	2,3%	2,2%	2,0%	-13,0%	3,0%	2,8%	2,7%	-9,0%	2,5%	2,4%	2,2%	-12,3%
	65 - 69 Jahre	3,0%	3,0%	2,9%	-6,1%	4,1%	3,8%	3,5%	-15,2%	3,4%	3,3%	3,1%	-9,0%
	Gesamt	1,9%	1,8%	1,7%	-9,2%	2,6%	2,5%	2,3%	-11,8%	2,1%	2,0%	1,8%	-10,7%
weiblich	50 - 54 Jahre	2,3%	2,1%	1,8%	-20,2%	3,3%	2,9%	2,6%	-22,5%	2,6%	2,3%	2,0%	-21,5%
	55 - 59 Jahre	4,6%	4,1%	3,8%	-17,9%	6,1%	5,7%	5,1%	-15,8%	5,1%	4,6%	4,2%	-17,5%
	60 - 64 Jahre	8,4%	7,7%	7,1%	-15,8%	10,2%	9,6%	8,9%	-13,4%	9,0%	8,3%	7,6%	-14,9%
	65 - 69 Jahre	12,1%	11,9%	11,3%	-6,1%	14,5%	14,1%	13,3%	-7,7%	12,8%	12,5%	11,9%	-6,6%
	Gesamt	6,5%	6,4%	6,0%	-8,1%	8,1%	7,9%	7,5%	-8,0%	7,0%	6,8%	6,4%	-8,2%
Gesamt	50 - 54 Jahre	1,6%	1,5%	1,3%	-19,5%	2,4%	2,1%	1,9%	-21,6%	1,8%	1,7%	1,4%	-20,8%
	55 - 59 Jahre	3,1%	2,8%	2,6%	-17,7%	4,2%	3,9%	3,5%	-16,2%	3,4%	3,1%	2,8%	-17,7%
	60 - 64 Jahre	5,5%	5,1%	4,7%	-14,5%	6,6%	6,3%	5,9%	-11,2%	5,8%	5,4%	5,0%	-13,6%
	65 - 69 Jahre	7,8%	7,7%	7,4%	-5,8%	9,5%	9,2%	8,6%	-9,2%	8,3%	8,1%	7,7%	-6,8%
	Gesamt	4,3%	4,2%	3,9%	-8,1%	5,4%	5,2%	4,9%	-8,2%	4,6%	4,5%	4,2%	-8,5%

Ergebnis

- 4,2 % der 50+ Versicherten wurden 2021 wegen Osteoporose ambulant oder stationär behandelt.
- Der Trend ist zwischen 2016 und 2021 rückläufig (Veränderungsrate -8,5%).
- Der Anteil betroffener Frauen ist 2021 3,5 mal höher als bei den Männern. 2016 war der Unterschied ähnlich.
- Mit zunehmenden Alter steigt der Anteil der Versicherten mit Osteoporose. 2021 lag der Anteil der 65-69 Jährigen bei ca. 8% und war damit 5 mal so hoch als bei den 50-54 Jährigen.
- In Thüringen ist die Prävalenz in 2021 etwas höher als in Sachsen (2021: Differenz von 1,0 Prozentpunkten).

Migräne/chronische Kopfschmerzen (ICD G43, G44)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate
		2016	2019	2021	2016-2021	2016	2019	2021	2016-2021	2016	2019	2021	2016-2021
männlich	50 - 54 Jahre	2,4%	2,7%	3,0%	22,8%	2,7%	3,1%	3,4%	25,1%	2,5%	2,8%	3,0%	23,0%
	55 - 59 Jahre	2,1%	2,4%	2,6%	21,6%	2,7%	2,9%	3,1%	14,7%	2,3%	2,6%	2,7%	19,0%
	60 - 64 Jahre	1,9%	2,2%	2,4%	23,5%	2,3%	2,7%	2,8%	21,0%	2,0%	2,3%	2,5%	22,4%
	65 - 69 Jahre	1,8%	1,9%	1,9%	2,1%	2,0%	2,1%	2,4%	22,2%	1,9%	1,9%	2,0%	8,7%
	Gesamt	2,1%	2,3%	2,5%	17,5%	2,5%	2,7%	2,9%	19,1%	2,2%	2,4%	2,6%	18,0%
weiblich	50 - 54 Jahre	10,9%	11,1%	11,5%	5,0%	12,4%	12,8%	12,9%	4,6%	11,3%	11,5%	11,8%	4,7%
	55 - 59 Jahre	9,8%	10,3%	10,7%	8,6%	10,7%	11,6%	12,4%	16,6%	10,0%	10,6%	11,1%	11,0%
	60 - 64 Jahre	8,5%	9,0%	9,5%	11,3%	9,3%	10,2%	10,9%	17,0%	8,7%	9,3%	9,9%	13,2%
	65 - 69 Jahre	7,1%	7,5%	7,9%	12,2%	7,5%	8,2%	8,8%	16,3%	7,2%	7,6%	8,1%	13,6%
	Gesamt	9,2%	9,5%	9,9%	7,4%	10,1%	10,8%	11,3%	11,2%	9,4%	9,8%	10,3%	8,6%
Gesamt	50 - 54 Jahre	6,8%	7,0%	7,3%	6,9%	7,5%	8,0%	8,2%	8,5%	6,9%	7,2%	7,4%	6,9%
	55 - 59 Jahre	6,1%	6,5%	6,8%	11,3%	6,7%	7,4%	7,8%	17,5%	6,2%	6,7%	7,0%	13,1%
	60 - 64 Jahre	5,3%	5,7%	6,1%	14,5%	5,8%	6,6%	7,0%	19,6%	5,5%	5,9%	6,3%	16,0%
	65 - 69 Jahre	4,6%	4,8%	5,1%	10,7%	4,9%	5,3%	5,7%	17,5%	4,7%	4,9%	5,3%	13,0%
	Gesamt	5,8%	6,1%	6,3%	9,4%	6,3%	6,8%	7,2%	13,7%	5,9%	6,2%	6,5%	10,6%

Ergebnis

- Bei 6,5% der 50+ Versicherten wurde in 2021 Migräne oder chronische Kopfschmerzen diagnostiziert. 2016 waren es noch etwas weniger (5,9%). Der Trend ist somit zwischen 2016 und 2021 steigend (Veränderungsrate 10,6%).
- 2021 ist der Anteil betroffener Frauen vier mal höher als bei den Männern.
- Je älter die Menschen werden, desto geringer ist der Anteil der Versicherten mit der Diagnose Migräne/chronische Kopfschmerzen. 2021 lag der Anteil bei den 65-69 Jährigen bei 5,3%, bei den 50-54 Jährigen bei 7,4%. Das entspricht einer Differenz von 2,1 Prozentpunkten.

Depression (ICD F32, F33)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
männlich	50 - 54 Jahre	7,8%	8,1%	8,4%	8,3%	9,2%	9,5%	9,6%	4,4%	8,1%	8,4%	8,6%	6,0%
	55 - 59 Jahre	9,1%	9,3%	9,8%	7,1%	10,2%	11,0%	11,1%	8,8%	9,4%	9,8%	10,1%	7,5%
	60 - 64 Jahre	10,0%	11,0%	11,5%	14,7%	11,4%	12,5%	13,1%	15,7%	10,4%	11,4%	12,0%	14,6%
	65 - 69 Jahre	9,1%	9,5%	10,3%	13,7%	10,3%	11,3%	11,6%	12,7%	9,5%	10,1%	10,8%	13,1%
	Gesamt	9,0%	9,5%	10,0%	11,6%	10,2%	11,1%	11,4%	11,3%	9,3%	9,9%	10,4%	11,0%
weiblich	50 - 54 Jahre	17,3%	17,7%	17,8%	3,1%	20,0%	20,9%	20,9%	4,2%	18,2%	18,6%	18,7%	3,1%
	55 - 59 Jahre	19,2%	19,9%	20,2%	5,1%	22,1%	23,4%	23,6%	6,8%	20,1%	21,0%	21,3%	5,5%
	60 - 64 Jahre	19,8%	21,0%	22,3%	12,9%	23,0%	25,3%	25,6%	11,3%	20,8%	22,4%	23,4%	12,1%
	65 - 69 Jahre	17,6%	18,3%	19,5%	10,5%	20,5%	21,6%	22,8%	11,3%	18,5%	19,3%	20,5%	10,6%
	Gesamt	18,5%	19,2%	20,0%	8,3%	21,4%	22,9%	23,3%	8,8%	19,4%	20,4%	21,0%	8,2%
Gesamt	50 - 54 Jahre	12,7%	13,0%	13,2%	3,9%	14,6%	15,3%	15,3%	4,4%	13,2%	13,6%	13,7%	3,4%
	55 - 59 Jahre	14,3%	14,8%	15,2%	6,0%	16,2%	17,3%	17,5%	8,2%	14,9%	15,5%	15,8%	6,5%
	60 - 64 Jahre	15,1%	16,2%	17,2%	14,0%	17,2%	19,1%	19,6%	13,7%	15,8%	17,1%	17,9%	13,5%
	65 - 69 Jahre	13,6%	14,2%	15,2%	11,7%	15,6%	16,6%	17,4%	11,8%	14,3%	15,0%	15,9%	11,6%
	Gesamt	13,9%	14,6%	15,2%	9,4%	15,9%	17,1%	17,5%	10,2%	14,5%	15,3%	15,9%	9,3%

Ergebnis

- In 2021 litten ca. 16% der 50+ Versicherten an einer Depression, 2016 waren es 14,5%. Es zeigt sich ein zunehmender Trend zwischen 2016 und 2021 (Veränderungsrate 9,3%).
- Frauen sind doppelt so häufig betroffen als Männer (2021: 10,4% vs. 21,0%). Jede fünfte Frau im Alter von 50 bis 69 Jahren erhielt 2016, 2019 und 2021 die Diagnose Depression.
- In Thüringen ist 2021 der Anteil Versicherter etwas höher als in Sachsen (2021: Differenz von 2,3 Prozentpunkten).

Angstzustände (ICD F40, F41)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
männlich	50 - 54 Jahre	4,1%	4,3%	4,7%	15,7%	4,3%	4,7%	5,2%	21,3%	4,1%	4,3%	4,7%	16,2%
	55 - 59 Jahre	4,5%	4,7%	5,0%	12,8%	4,7%	5,3%	5,7%	22,4%	4,5%	4,8%	5,2%	16,0%
	60 - 64 Jahre	4,5%	5,0%	5,5%	21,5%	4,6%	5,5%	6,5%	40,7%	4,5%	5,1%	5,8%	27,4%
	65 - 69 Jahre	4,3%	4,5%	5,0%	16,4%	4,7%	5,4%	5,9%	26,7%	4,4%	4,8%	5,2%	20,0%
	Gesamt	4,3%	4,6%	5,1%	16,7%	4,5%	5,2%	5,8%	28,4%	4,3%	4,7%	5,2%	20,2%
weiblich	50 - 54 Jahre	10,5%	10,8%	11,8%	12,0%	10,7%	11,4%	12,1%	13,8%	10,5%	10,8%	11,8%	12,2%
	55 - 59 Jahre	10,6%	10,9%	11,8%	12,0%	11,0%	12,1%	12,5%	13,4%	10,6%	11,2%	12,0%	12,4%
	60 - 64 Jahre	10,8%	11,2%	12,4%	13,9%	11,1%	12,3%	13,5%	21,3%	10,9%	11,5%	12,7%	16,0%
	65 - 69 Jahre	10,6%	10,5%	11,5%	8,9%	10,7%	11,1%	12,2%	13,6%	10,6%	10,6%	11,6%	10,2%
	Gesamt	10,6%	10,8%	11,9%	11,8%	10,9%	11,7%	12,6%	15,8%	10,6%	11,1%	12,0%	12,8%
Gesamt	50 - 54 Jahre	7,4%	7,6%	8,3%	12,1%	7,5%	8,1%	8,7%	16,1%	7,3%	7,6%	8,2%	12,5%
	55 - 59 Jahre	7,6%	7,9%	8,6%	12,6%	7,8%	8,7%	9,2%	16,9%	7,6%	8,1%	8,7%	13,9%
	60 - 64 Jahre	7,8%	8,2%	9,1%	16,7%	7,9%	9,0%	10,1%	28,1%	7,8%	8,4%	9,3%	19,9%
	65 - 69 Jahre	7,6%	7,7%	8,4%	11,1%	7,8%	8,3%	9,1%	17,4%	7,6%	7,9%	8,6%	13,0%
	Gesamt	7,6%	7,9%	8,6%	13,3%	7,7%	8,6%	9,3%	20,1%	7,6%	8,0%	8,7%	15,1%

Ergebnis

- In 2021 litten ca. 9% der 50+ Versicherten an Angstzuständen, 2016 waren es noch ca. 8%. Der Trend ist somit zwischen 2016 und 2021 steigend (Veränderungsrate: 15,1%).
- 2021 ist der Anteil betroffener Frauen doppelt so hoch als bei den Männern. Knapp jede achte Frau erhielt die Diagnose, bei den Männern nur jeder zwanzigste.
- In Thüringen liegt 2021 der Anteil erkrankter Versicherter bei 9,3%, in Sachsen bei 8,6%.

Demenz (ICD F00-F03, F05.1, G30, G31, R54)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
männlich	50 - 54 Jahre	0,9%	0,7%	0,6%	-39,4%	0,7%	0,6%	0,5%	-29,4%	0,8%	0,6%	0,5%	-37,3%
	55 - 59 Jahre	1,5%	1,2%	1,0%	-32,1%	1,2%	1,1%	1,0%	-23,5%	1,4%	1,2%	1,0%	-30,0%
	60 - 64 Jahre	2,3%	2,1%	2,0%	-14,2%	2,1%	2,0%	1,7%	-19,5%	2,2%	2,0%	1,8%	-17,6%
	65 - 69 Jahre	3,4%	3,5%	3,3%	-4,1%	3,5%	3,2%	2,8%	-20,6%	3,5%	3,4%	3,2%	-10,6%
	Gesamt	1,9%	1,8%	1,7%	-13,7%	1,8%	1,7%	1,5%	-17,2%	1,9%	1,7%	1,6%	-16,1%
weiblich	50 - 54 Jahre	0,5%	0,4%	0,4%	-30,3%	0,6%	0,5%	0,4%	-28,7%	0,5%	0,4%	0,4%	-30,0%
	55 - 59 Jahre	0,8%	0,6%	0,6%	-23,6%	0,9%	0,8%	0,7%	-17,2%	0,8%	0,7%	0,6%	-21,5%
	60 - 64 Jahre	1,5%	1,3%	1,2%	-20,7%	1,4%	1,4%	1,2%	-15,8%	1,5%	1,3%	1,2%	-19,8%
	65 - 69 Jahre	2,5%	2,3%	2,3%	-5,5%	2,8%	2,5%	2,3%	-18,1%	2,6%	2,3%	2,3%	-10,2%
	Gesamt	1,2%	1,1%	1,1%	-10,8%	1,3%	1,3%	1,1%	-13,9%	1,3%	1,2%	1,1%	-12,4%
Gesamt	50 - 54 Jahre	0,7%	0,5%	0,5%	-35,8%	0,7%	0,5%	0,5%	-29,1%	0,7%	0,5%	0,5%	-34,3%
	55 - 59 Jahre	1,1%	0,9%	0,8%	-29,1%	1,1%	1,0%	0,8%	-21,2%	1,1%	0,9%	0,8%	-27,0%
	60 - 64 Jahre	1,9%	1,7%	1,5%	-17,2%	1,8%	1,7%	1,5%	-18,4%	1,8%	1,7%	1,5%	-18,8%
	65 - 69 Jahre	2,9%	2,8%	2,8%	-4,8%	3,1%	2,8%	2,5%	-19,5%	3,0%	2,8%	2,7%	-10,5%
	Gesamt	1,6%	1,4%	1,4%	-12,6%	1,5%	1,5%	1,3%	-15,9%	1,6%	1,4%	1,3%	-14,6%

Ergebnis

- Bei 1,3% der 50+ Versicherten wurde 2021 eine Demenz diagnostiziert, 2016 waren es 1,6%. Der Trend ist zwischen 2016 und 2021 leicht rückläufig (Veränderungsrate -14,6%).
- Männer sind etwas häufiger betroffen (2021: 1,6% vs. 1,1%).
- Mit zunehmenden Alter steigt der Anteil der betroffenen Versicherten. Bei den 65-69 Jährigen ist der Anteil mehr als fünfmal so hoch als bei den 50-54 Jährigen.

Schlafstörungen (ICD F51, G47)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
männlich	50 - 54 Jahre	5,8%	6,6%	7,1%	22,5%	7,2%	8,5%	8,8%	22,7%	6,2%	7,0%	7,5%	21,2%
	55 - 59 Jahre	7,3%	8,5%	8,7%	20,2%	8,7%	10,1%	11,0%	26,9%	7,7%	8,9%	9,4%	22,7%
	60 - 64 Jahre	8,7%	10,4%	10,9%	25,1%	10,4%	12,2%	13,2%	26,9%	9,2%	10,9%	11,6%	25,5%
	65 - 69 Jahre	9,8%	11,0%	11,7%	20,0%	11,5%	13,4%	14,1%	21,9%	10,3%	11,7%	12,4%	20,7%
	Gesamt	7,7%	9,0%	9,6%	23,7%	9,3%	11,0%	11,8%	27,0%	8,2%	9,5%	10,2%	24,5%
weiblich	50 - 54 Jahre	6,5%	7,1%	7,7%	17,1%	8,0%	8,9%	9,6%	20,5%	7,0%	7,6%	8,2%	17,6%
	55 - 59 Jahre	7,6%	8,9%	9,6%	25,3%	9,4%	10,9%	11,6%	23,5%	8,2%	9,5%	10,2%	24,0%
	60 - 64 Jahre	8,7%	9,8%	10,6%	21,7%	10,7%	12,3%	13,1%	22,3%	9,3%	10,7%	11,4%	22,5%
	65 - 69 Jahre	9,5%	10,3%	10,8%	14,5%	11,6%	12,7%	13,2%	13,8%	10,1%	11,0%	11,6%	14,6%
	Gesamt	8,0%	9,0%	9,7%	21,3%	9,8%	11,2%	11,9%	21,7%	8,5%	9,7%	10,4%	21,3%
Gesamt	50 - 54 Jahre	6,2%	6,9%	7,4%	19,5%	7,6%	8,7%	9,2%	21,6%	6,6%	7,3%	7,8%	19,2%
	55 - 59 Jahre	7,5%	8,7%	9,2%	22,9%	9,0%	10,5%	11,3%	25,2%	7,9%	9,2%	9,8%	23,4%
	60 - 64 Jahre	8,7%	10,1%	10,8%	23,3%	10,6%	12,3%	13,1%	24,5%	9,3%	10,8%	11,5%	24,0%
	65 - 69 Jahre	9,6%	10,6%	11,2%	17,1%	11,6%	13,1%	13,6%	17,7%	10,2%	11,3%	12,0%	17,5%
	Gesamt	7,9%	9,0%	9,6%	22,4%	9,5%	11,1%	11,8%	24,2%	8,4%	9,6%	10,3%	22,9%

Ergebnis

- Rund jeder zehnte der 50+ Versicherten litt im Jahr 2021 an einer Schlafstörung.
- Zwischen 2016 und 2021 ist ein steigender Trend zu verzeichnen (Veränderungsrate 22,9%).
- Es gibt keinen Geschlechtsunterschied.
- In Thüringen liegt 2021 der Anteil der betroffenen Versicherten bei 11,8% und ist somit 2,2 Prozentpunkte höher als in Sachsen (9,6%).

Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (ICD F10)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate
		2016	2019	2021	2016-2021	2016	2019	2021	2016-2021	2016	2019	2021	2016-2021
männlich	50 - 54 Jahre	7,4%	6,6%	5,9%	-20,3%	7,7%	6,5%	5,8%	-25,3%	7,4%	6,4%	5,7%	-22,5%
	55 - 59 Jahre	8,9%	8,5%	7,7%	-12,8%	8,2%	8,1%	7,8%	-5,1%	8,6%	8,2%	7,6%	-10,9%
	60 - 64 Jahre	8,3%	9,0%	9,1%	8,7%	8,1%	8,2%	8,4%	2,7%	8,3%	8,7%	8,7%	5,7%
	65 - 69 Jahre	6,8%	7,7%	8,1%	18,6%	6,7%	7,1%	7,4%	10,6%	6,9%	7,6%	7,9%	15,2%
	Gesamt	7,9%	8,0%	7,7%	-2,7%	7,8%	7,6%	7,4%	-4,9%	7,8%	7,7%	7,5%	-4,1%
weiblich	50 - 54 Jahre	2,0%	1,9%	1,7%	-17,1%	2,0%	1,8%	1,7%	-18,6%	2,0%	1,9%	1,7%	-16,9%
	55 - 59 Jahre	2,3%	2,2%	2,2%	-6,2%	2,3%	2,1%	2,0%	-10,8%	2,3%	2,2%	2,1%	-8,4%
	60 - 64 Jahre	2,0%	2,3%	2,3%	17,2%	1,8%	2,1%	2,2%	20,5%	1,9%	2,2%	2,3%	17,6%
	65 - 69 Jahre	1,6%	1,8%	1,9%	20,5%	1,4%	1,4%	1,7%	23,3%	1,5%	1,7%	1,8%	20,0%
	Gesamt	2,0%	2,1%	2,0%	1,8%	1,9%	1,9%	1,9%	0,1%	2,0%	2,0%	2,0%	0,8%
Gesamt	50 - 54 Jahre	4,7%	4,2%	3,8%	-18,8%	4,9%	4,2%	3,7%	-24,0%	4,7%	4,1%	3,7%	-20,6%
	55 - 59 Jahre	5,5%	5,2%	4,9%	-11,8%	5,3%	5,1%	4,9%	-7,4%	5,4%	5,1%	4,8%	-10,9%
	60 - 64 Jahre	5,0%	5,5%	5,5%	9,3%	5,0%	5,1%	5,2%	4,4%	5,0%	5,3%	5,4%	7,0%
	65 - 69 Jahre	4,0%	4,6%	4,8%	18,6%	4,0%	4,2%	4,5%	12,8%	4,1%	4,5%	4,7%	15,9%
	Gesamt	4,8%	4,9%	4,8%	-2,0%	4,8%	4,7%	4,6%	-4,7%	4,8%	4,8%	4,7%	-3,4%

Zusammenfassung

- Bei 4,7% der Versicherten im Alter von 50 bis 69 Jahren wurde in 2021 eine Diagnose gestellt, die auf Alkoholmissbrauch hindeutet.
- Grundlegend ist der Trend zwischen 2016 und 2021 leicht rückläufig (Veränderungsrate -3,4%). Bei Betrachtung der einzelnen Altersgruppen zeigt sich bei den beiden jüngeren Altersgruppen (50-54 Jahre, 55-59 Jahre) ein Diagnoserückgang. Bei den beiden älteren Altersgruppen hingegen ist eine Zunahme der Diagnosehäufigkeit zu beobachten.
- 2021 ist der Anteil betroffener Männer mit 7,5% knapp viermal höher als bei den Frauen (2,0%). Rund jeder dreizehnte Mann erhielt 2021 die Diagnose F10.

Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak (ICD F17)

		Sachsen				Thüringen				Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)			
		Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021	Anteil erkrankte Versicherte			Veränderungsrate 2016-2021
		2016	2019	2021		2016	2019	2021		2016	2019	2021	
männlich	50 - 54 Jahre	10,1%	10,9%	10,9%	7,1%	11,4%	12,4%	12,3%	8,1%	10,4%	11,2%	11,1%	6,0%
	55 - 59 Jahre	11,5%	12,8%	12,9%	12,2%	12,6%	14,3%	14,5%	15,4%	11,8%	13,1%	13,3%	13,1%
	60 - 64 Jahre	11,3%	13,2%	14,0%	23,1%	11,9%	14,4%	15,3%	28,5%	11,5%	13,5%	14,3%	24,3%
	65 - 69 Jahre	9,3%	11,3%	12,4%	33,7%	9,4%	11,9%	13,4%	42,1%	9,4%	11,5%	12,7%	36,0%
	Gesamt	10,6%	12,1%	12,6%	18,1%	11,5%	13,3%	13,9%	21,7%	10,9%	12,4%	12,9%	18,6%
weiblich	50 - 54 Jahre	6,1%	6,8%	7,1%	17,3%	8,5%	10,1%	10,1%	18,5%	6,9%	7,9%	8,1%	17,0%
	55 - 59 Jahre	6,3%	7,3%	7,6%	21,3%	8,5%	10,3%	10,7%	25,4%	7,0%	8,3%	8,6%	22,7%
	60 - 64 Jahre	5,1%	6,9%	7,8%	53,3%	6,8%	9,7%	11,0%	61,1%	5,7%	7,8%	8,8%	56,3%
	65 - 69 Jahre	3,3%	4,7%	5,9%	82,2%	4,4%	6,6%	8,1%	81,9%	3,7%	5,3%	6,6%	80,9%
	Gesamt	5,3%	6,5%	7,1%	35,3%	7,2%	9,3%	10,0%	38,1%	5,9%	7,4%	8,1%	35,9%
Gesamt	50 - 54 Jahre	8,1%	8,8%	9,0%	11,5%	9,9%	11,2%	11,2%	12,5%	8,6%	9,5%	9,6%	10,7%
	55 - 59 Jahre	8,8%	10,0%	10,2%	15,3%	10,5%	12,2%	12,6%	19,1%	9,4%	10,7%	10,9%	16,5%
	60 - 64 Jahre	8,1%	9,9%	10,7%	32,3%	9,4%	12,0%	13,1%	39,8%	8,5%	10,6%	11,5%	34,6%
	65 - 69 Jahre	6,1%	7,8%	9,0%	47,2%	6,8%	9,1%	10,6%	55,4%	6,4%	8,2%	9,5%	49,4%
	Gesamt	7,9%	9,1%	9,7%	24,0%	9,3%	11,2%	11,9%	27,8%	8,3%	9,8%	10,4%	24,8%

Ergebnis

- 2021 wurde bei 10,4% der 50+ Versicherten eine psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak diagnostiziert, 2016 waren es noch 8,4%. Das entspricht einem Zuwachs von 25% (Veränderungsrate). Der Trend ist somit zwischen 2016 und 2021 steigend.
- Männer sind häufiger betroffen als Frauen (2021: 12,9% vs. 8,1%).
- Der Anteil der betroffenen Versicherten steigt bis zur Altersgruppe 60-64 Jahre an und sinkt dann wieder ab.
- In Thüringen sind mehr Versicherte betroffen als in Sachsen (2021: 9,7% vs. 11,9%).

Covid-19 und Long-Covid (ICD U07.1, U09.9)

		Sachsen			Thüringen			Gesamtversicherte (Sachsen/Thüringen/sonstige)		
		Anteil erkrankte Versicherte Covid-19		Long-Covid 2021	Anteil erkrankte Versicherte Covid-19		Long-Covid 2021	Anteil erkrankte Versicherte Covid-19		Long-Covid 2021
		2020	2021	2021	2020	2021	2021	2020	2021	2021
männlich	50 - 54 Jahre	3,2%	11,5%	1,3%	2,4%	10,8%	1,5%	2,8%	10,8%	1,3%
	55 - 59 Jahre	3,3%	10,4%	1,4%	2,6%	9,9%	1,6%	3,0%	9,9%	1,4%
	60 - 64 Jahre	3,1%	9,2%	1,4%	2,0%	9,1%	1,7%	2,7%	9,0%	1,5%
	65 - 69 Jahre	2,3%	6,4%	0,8%	1,6%	6,3%	1,0%	2,0%	6,3%	0,8%
	Gesamt	3,0%	9,4%	1,2%	2,2%	9,1%	1,5%	2,7%	9,1%	1,3%
weiblich	50 - 54 Jahre	5,2%	13,9%	2,2%	4,0%	13,5%	2,6%	4,7%	13,4%	2,3%
	55 - 59 Jahre	4,8%	12,4%	2,2%	3,7%	12,4%	2,5%	4,4%	12,2%	2,2%
	60 - 64 Jahre	3,9%	10,4%	1,9%	2,8%	9,9%	2,1%	3,5%	10,1%	1,9%
	65 - 69 Jahre	2,0%	6,2%	0,9%	1,5%	6,0%	1,0%	1,8%	6,1%	0,9%
	Gesamt	4,0%	10,7%	1,8%	3,1%	10,5%	2,1%	3,6%	10,5%	1,9%
Gesamt	50 - 54 Jahre	4,2%	12,7%	1,8%	3,2%	12,2%	2,1%	3,8%	12,1%	1,8%
	55 - 59 Jahre	4,1%	11,4%	1,8%	3,2%	11,2%	2,1%	3,7%	11,1%	1,8%
	60 - 64 Jahre	3,5%	9,8%	1,6%	2,5%	9,5%	1,9%	3,1%	9,6%	1,7%
	65 - 69 Jahre	2,1%	6,3%	0,9%	1,6%	6,1%	1,0%	1,9%	6,2%	0,9%
	Gesamt	3,5%	10,1%	1,5%	2,6%	9,8%	1,8%	3,2%	9,8%	1,6%

Ergebnis

- 2021 waren rund 10% der 50+ Versicherten an Covid-19 sowie 1,6% an Long-Covid erkrankt.
- Die Prävalenz ist bei den jüngeren Altersgruppen höher als bei den älteren.

Ausgewertete Krankheitsbilder

In die Auswertung sind ambulant gesicherte sowie stationäre Diagnosen eingeflossen. Bei den Akutereignissen Schlaganfall und Herzinfarkt wurden nur stationäre Diagnosen geprüft.